




*The Dibner Library
of the History of
Science and Technology*


SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES




395
485

10 woodcuts with a very small amount of coloring
a small hole in nineteen leaves repaired

f 125






DE HISTORIA STIR-
PIVM COMMENTARII INSIGNES, MA-
XIMIS IMPENSIS ET VIGILIIS ELA-
BORATI, ADIECTIS EARVNDEN VIVIS PLVSQVAM
quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effi-
ctis & expressis, LEONHARTO FVCHSIO medico hac
nostra ætate longè clarissimo, autore,

Regiones peregrinas pleriq; alij alias, sumptu ingenti, studio indefesso, nec sine discrimine uitæ non-
nunquam, adierunt, ut simplicium materiæ cognoscendæ facultatem compararent sibi:
eam tibi materiam uniuersam summo & impensarum & temporis compendio,
procul discrimine omni, tanquam in uiuo iucundissimoq; uiridario,
magna cum uoluptate, hinc cognoscere licebit.

Accesit ijs succincta admodum uocum difficilium & obscurarum
palsim in hoc opere occurrentium explicatio,

Vnà cum quadruplici Indice, quorum primus quidem stirpium nomencla-
turas græcas, alter latinas, tertius officinis seplasiariorum &
herbarijs usitatas, quartus germanicas continebit,



*Cautum præterea est inuictissimi CAROLI Imperatoris decreto, ne quis
alius impunè usquam locorum hos de stirpium historia com-
mentarios excudat, iuxta tenorem priuilegij
antè à nobis euulgati.*

BASILEAE, IN OFFICINA ISINGRINIANA,
ANNO CHRISTI M. D. XLII.

LEONHARTVS FVCHSIVS
ÆTATIS SVÆ ANNO XLI



7
97
41
F95
FB
W111H

ILLVSTRISSIMO ET CHRISTIANISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO IOACHIMO, SACRI RO-
MANI IMPERII ELECTORI, MARCHIONI BRÄNDENBVR-
genſi, Stetinæ, Pomeraniæ, Caſſuborum, Sclauorumq; Duci, Burg-
grauio Norimbergenſi, necnon Rugiæ Principi, Domino
fuo longè clementiſſimo, LEONHARTVS
Fuchſius medicus S. P. D.



VANQVAM uniuerſa medicina nullis non ſeculis glorioſa & diuina ſit habita, Illuſtriſſime ac generoſiſſime PRINCEPS, tamen in hoc eius ſummo ſplendore ſemper plus laudis, admirationis ac ponderis, ea illius pars quæ naturas ſtirpiũ ueſtigat rimaturq; obtinuit: idq; partim quod uetuſtate, cuius maxima ſemper apud omnes autoritas & ueneratio fuit, eſſet antiquiſſima: partim etiam quod iucunda, utilis & neceſſaria eius eſſet cognitio.

Herbaria medici nam multũ admirationis & laudis ſemper obtinuiſſe.

Nam cum reliquæ propemodum omnes artes, ſimulatque à Deo

ſtirpium origo diuina.

opt. max. creatus eſt homo, inuenta e ſunt, ac ſubinde multorum induſtria auclæ, ſolæ herbæ poſt condita ſtatim elementa, nulloq; adhuc exiſtente homine, unã cum diuinis ſuis uiribus, ita iubente Deo, è terre latebris eruperũt. Vt hoc nomine nullius rei aut artis inuentio uerius quàm medicinæ et ſtirpium, Deo aſſignetur. Quod ſi tamen quiſpiam ijs quæ aſſerimus impudenter reclamare audeat, huic quidem Moſen, omnium qui ſcripſerunt uetuſtiſſimum teſtem, utpote ante quem nullum alium inuenies ſcriptorem, neq; apud Chaldaeos, neq; Aegyptios, neq; Phoenices, neque Græcos, quæ tamen ſunt uetuſtiores nationes, opponemus, qui palàm quod nos, in Geſeſi ſua affirmat. Neq; eſt cur inſolenter & contumelioſe quis illius teſtimoniũ repudiet aut aſpernetur, ut quem nõ noſtri modo, ſed & profani quiq; nunquam non admirati ſunt, ſummisq; extulerunt laudibus: quem etiam uenerandum ueridicumq; ipſa uetuſtas facit. Si quidem hæc ipſa, Cicerone teſte, proximè ad deos accedit: quapropter quo propius abeſt ab ortu, et diuina progenie, hoc melius ea quæ uera ſunt retinet. Proinde haud temerè quotquot unquam extiterunt homines, adhiberi fidem uenerandæ uetuſtati conſtanter aſſeruerunt. Cæterum non ſolum Moſes, ſed etiam quotquot eum ſequuti ſunt poëtæ & hiſtorici, Aegyptia exculti diſciplina, herbarum originem & inuentionem dijs tribuerunt. Græcorum nanque antiquiſſimi poëtæ Homerus & Heſiodus (neque enim quicquam Græci habent quod ante illos citent) aperte ſtirpium diuinam eſſe originem teſtantur. Hic quidem dum homines ignorare tradit, quantũ in Malua & Aſpodelo reconditum ſit. Nam ijs uerbis ſubobſcurè admodum herbarum uires in intimis earundem medullis reconditas eſſe, hominibusq; ignotas, nec niſi dijs ipſis, qui illarũ ſunt inuectores, perſpectas innuit. Ille uerò, dum Moly herbæ laudatiſſimæ, & contra Circes ueneficia mirè efficaciſ, inuentionem Mercurio deorum apparitori acceptam refert, hominibusq; inuentu difficilem, dijs uerò nõ item, eſſe ſcribit. Quinetiam in ſuis Theriacis Nicander Panaces, quod ipſo ſtatim nomine morborũ omnium remedia pollicetur, à dijs ipſis inuentũ eſſe, huicq; ad eò Chironium, Aſclepium & Herculeum appellatum, memoriæ prodidit. Quod græci poëtæ particulatim atq; de ſingulis ferè generibus aſſeruerunt, hoc inter Latinos Ouidius, quem unum pro multis nunc produxiſſe teſtem ſatis ſit, in uniuerſum de omnibus, dum ita loquentem de ſeipſo Apollinem fingit, affirmare uoluit, dicens:

Moſes ſcriptor omnũ antiquiſſimus.

Vetuſtatis autoritas.

Homerus & Heſiodus Græcorũ ſcriptores antiquiſſimi.

Inuentum medicina meum eſt, opifexq; per orbem

Dicor, & herbarum ſubieclæ potentia nobis.

Quare nunc omnibus perſpicuum eſſe arbitror, ſi antiquitatem diuinamq; originem ſpectemus, herbaria medicina nihil uſquam eſſe laudabilius, ſplendidius, honorificentius. Quod

Herbarie medicinae utilitas.

si uero utilitatis magnitudinem, quam haec ipsa hominibus affert, animo expendas, quid ea praestantius sit non uideo. Nam nulla alia re magis bonam corporis ualeitudinem conseruamus, tuemur, sustentamus, quam stirpium omnis generis subsidio. Ualeitudine autem bona nihil neque melius, neque praestantius, neque optabilius existit, utpote sine qua nec potestiam, nec diuitiam, nec ullae aliae res suauis, et usui esse possunt: ut praclare ab Hippoc. nostro dictum sit, ἔσθ' ἢ ὄφελός ἐστιν ἔτε χυμῶν, ἔτε σωματός, ἔτε τ' ἄλλων ἐδ' οὐκ, ἀτοπ' τῆς ὑγιείης.

Herbarie medicinae necessitas.

Neque presentem tantum ualeitudinem herbarum beneficio tuemur, sed et laefa clatam et conuulsam ijs ipsis corrigimus, emendamus ac restituiamus. Ut enim apes ex illarum floribus materiam colligunt unde mel conflant, ita nos ex immensa earundem uarietate aduersus morbos remedia decerpimus. Porro cum innumeri ferè sint morbi qui nobis à fronte, tergo, lateribus insidias tendunt, summè necessariam quoque esse exquisitam stirpium notitiam nemini obscurum fore, sed constare inter omnes puto. Neque enim sine diuinis illarum uiribus ut à nobis propulsemus morbos licebit.

Incunditas cognitiōnis stirpium.

Quantum uero incunditatis ac delectationis habeat stirpium cognitio, non est cur pluribus exponam, cum nemo sit qui nesciat nihil esse in hac uita incundius, delectabiliusque, quam syluas, montes, campos, uarijs ijsque elegantissimis flosculis ac herbis redimitos et ornatos peragrarè, intentisque oculis intueri. Voluptatem uero ac incunditatem illam non parum auget, si earundem facultatum ac uirium accedat notitia. Neque enim minor in cognoscendo, quam aspiciendo suauitas et delectatio. Quare cum ueteres illi diuinam esse stirpium originem, easque in tanta uita humana fragilitate non modò usum et fructum immensum habere, sed et summè necessarias esse animaduertent, non solum de hac parte medicinae honorifice sentire coeperunt, uerum etiam nihil in ipsa natura quod suspicerent dignius, aut quod inuestigare et perscrutarentur pulchrius, aut quod cognoscerent incundius esse duxerunt. Proinde se totos et animo et corpore in earundem inquisitionem atque indagacionem contulerunt. Et hoc studio uestigandarum stirpium non plebeij tantum et abiectionis sortis homines tenebantur, sed et ex omni genere hominum potentia, diuitijs, prudentia et doctrina praestantes. Quanto enim illi generis nobilitate clariores, prudentiaque et doctrina praestantiores fuerunt, atque adeò de hac parte medicinae incorruptius iudicare potuerunt, tanto magis ad seclandum hoc

Reges olim studio perscrutandarum stirpium mirifice occupati.

studium animi illorum sunt excitati ac inflammati. Hinc est quod plerique Reges, potentia et prudentia excellentes, neglecto interim regij fastigij honore, cum toto regiae dignitatis satellitio, per uastas multarum regionum solitudines ire, inuia montium iuga peragrarè, lacus inaccessos lustrare, abditas terrae fibras scrutari, hiantes uallium sequi specus, minime grauati sunt. Quod ut facerent, non tam eos immensa incunditas et uoluptas, quibus tum fruebantur quum uaria loca uarijs floribus ac herbis ornata obibant, inuitauit, quam ut de humano genere, adeoque tota posteritate optimè mererentur, et immortale nomen adipiscerentur, ardor quidam impulit. Quare de illis quas quisque inuenit sibi asserendis non minus acriter et strenuè, quam de imperio, aut uita ipsa, qua nihil charius, dimicauerunt: id quod uerum esse multarum stirpium nomina testantur. Neque enim Polemonia herba alia de causa etiam Philetæria, teste Plinio, dicta est, quam propter certamen

Gentius Illyriorum rex.

inuentiois regum. Nonne Gentiana etiam ipsa, cui à Gentio Illyriorum rege eius inuentore nomen inditum est, satis docet quam ille studiosus herbarum fuerit? utpote quem etiam inter media arma earundem indagacioni operam nauare, et Gentianæ rimari facultates non piguit, idque nullo alio nomine, nisi ut hac ratione memoriam sibi perpetuam ac nunquam intermorituram conciliaret. Porro Lysimachum Macedonum regem non tam animi magnitudo uiriumque gloria nobilitauit, quam Lysimachia herba, quae in hunc usque diem nomen eius retinet. Mithridates sanè, Ponti et Parthorum rex maximus, ne uiginti quidem duarum

Lysimachus Macedoniae rex.
Mithridates Ponti rex.

linguarum

linguarum peritia, uarijsq; hinc inde uictorijs nomen sibi parasse contentus fuit : sed ut clarior celebriorq; euaderet, in eam quoque curam fortiter incubuit, ut omnium simplicium medicamentorum, eorum maxime quæ letalibus aduersantur, exactam notitiam nancisceretur. Quàm uerò intentum in eam rem animum habuerit, quantumq; hinc laudis & gloriæ consequutus sit, nihil attinet dicere, quod id ipsum abundè satis medicamentum hoc quod in hodiernum usque diem nomen eius retinet, ac Mithridaticum appellatur, quodq; adhuc hodie ad arcenda uenena à medicis usurpatur, declarat. Et quidem Scordium herba, quæ non alia de causa, Crateia herbario autore, nominata Mithridatia est, quàm studiosus ille fuerit stirpium satis etiam monstrat. Prædictis iam regibus nobis adiiciendus uenit omnium quotquot fuerunt unquam regum sapientissimus opulentissimusq; Solomon, ad cuius immensas laudes, quas illi sacra Bibliorum historia defert, hoc ueluti maximum, & quod reliqua omnia superare uidetur, accedit, quod de singulis stirpibus sapientissimè differere potuerit. Præterea primus Pergami rex Attalus, ut testis est grauissimus autor Galenus, omnis generis medicamentorum studiosissimus fuit, ita ut multas ac uarias compositiones, quæ adhuc extant, & nominis eius inscriptionem retinent, construxerit. Euax etiam Arabum rex tanto studio inquirendarum stirpium flagrasse dicitur, ut de simplicium effectibus ad Neronem scripserit. Iuba denique Mauritiæ rex herbarum studio quàm regno memorabilior factus est. Quantam enim huic Euphorbium herba, quam ille à se inuentam medici sui nomine appellauit, mirisq; laudibus priuatim ei dicato uolumine celebravit, pepererit, neminem esse puto qui ignoret. Cæterum quum sequentibus subinde annis Romanorum reges & Imperatores propter publicas, easq; uarias & maximas, occupationes, indagandis stirpibus operam nauare non possent, hoc saltem studiose & diligenter curarunt, quod idem Galenus testatur, ut uarijs in locis, maximis quidem impensis, herbarios alerent : idq; nulla alia de causa, quàm ut studium hoc cognoscendarum stirpium, hominibus non minus utile quàm necessarium, fouerent, & ab interitu conseruarent. Verum relicis nunc regibus, alijsq; multis insignibus heroibus, Teucro Atiacis fratre, qui Teucro nomen dedit: Achille, à quo Millefolia Achilleia cognominata est: Chirone Centauro, à quo Centauriū nomen accepit: Hercule, qui Hyoscyamū inuenisse traditur: quantum operæ ac studij in perquirendis omnis generis stirpibus ueteres tum Græci tum Latini poëta & philosophi posuerint, breuiter perstringemus. Atqui ex compluribus paucos aliquot, eosq; optimos produxisse sufficiat. Plinius quidem inter Græcos antiquissimum poëtam Orpheum (nemo enim ante hunc apud illos memoratur, siquidem ante omnes alios poëtas & philosophos floruit) de herbis aliqua, curiosius etiam, prodidisse, & post eum Musæum & Hesiodū Polium herbam miris laudibus celebrasse scribit. Præterea rerum humanarū peritissimū uatem Homerum curam cognoscendarū stirpium magni fecisse, nec à se reiecissee aut aspernatum fuisse, Nepenthe, Moly, Lotos, & Alcinoi hortus satis ostendunt. Virgilium autem, Latinorū poëtarū principem, stirpium fuisse peritissimū, tam crebre earundem in suis uersibus mentiones palam testantur. Quare nō raro etiā interpretibus grammaticis facescit negociū, illum miseris modis enarrantibus. Quàm uerò studiosus herbarū fuerit Ouidius, nemini nō notū est, nisi qui illius carmina introspicere dedignatus est. Philosophos autem herbariam medicinā non neglexisse aut contempsisse hinc colligitur, quod literis proditum sit Pythagoram, clarum sapientia uirum, integro uolumine Bulbos celebrasse, perinde atq; Chrysiptum Brassicam, Zenonem Capparin: quod facere tanti philosophi nunq; in animum induxissent, si nō optimè de hac medicinæ parte sensissent. Aristotlem præterea, summū certè philosophum, aliquot de stirpibus libros reliquisse nemo nescit: unde quantifecerit herbarum cognitionem, tam excellentis ingenij uir, qui uis cōiecturam fa-

Solomon rex
Hebræorum.Attalus Per-
gamirex.Euax Ara-
bum rex.Iuba Mauri-
taniæ rex.Cæsares Roma-
ni suis impensis
herbarios alerePoëtarū & phi-
losophorū in ue-
stigandis stirpi-
bus studium.

Orpheus.

Musæus.

Hesiodus.

Homerus.

Virgilius.

Ouidius.

Pythagoras.

Chrysiptus.

Zeno.

Aristoteles.

cit. Sed desino tandem illustrum uirorum qui de herbaria medicina honorificentissimè & senserunt & scripserunt, texere catalogum, ubi prius unam etiam è præclaris mulieribus, Artemisiam Mausoli Carie reguli uxorem, quæ ab hoc indagandarum stirpium studio non abhorruit, illis adiecero. Quàm enim incredibili quodam ardore ac desiderio cognoscendarum herbarum hæc ipsa flagrarit, Artemisia stirps, quæ in hunc usque diem nomen eius retinet, cum antea Parthenis sit appellata, loquitur. Vt nunc omnibus perspicuum sit, omnis & ætatis & generis homines, eosq; nobilitate ac doctrina præstantissimos, non solum de herbaria medicina præclare sensisse, uerum etiam ut illam perdicerent plurimum operæ, studij, diligentia & laboris contulisse. At qui cognoscere fortassis à nobis quispiam huic parti medicinae parum æquus desiderabit, quid tandem illi per nos longo ordine commorati, hoc studio inquirendarum stirpium cõsecuti sint? Rem sanè longè præstantissimam, nullisq; neq; diuitijs, neque uoluptatibus postponendam, memoriam scilicet apud posteros immortalem ac sempiternam. Tandiu enim firma & illabefacta eorum manebit memoria, quandiu tellus fida & optima rerum parens Gentianam, Lysimachiam, Scordium, Eupatorium, Euphorbium, Chymenon, Polemoniam, et id genus alias stirpes quibus præclarissimorum regum indita sunt nomina, producet. Viuunt itaque hodie grata hominum memoria, illorum nomina, alioqui statim simulatq; è uiuis excessissent cum ipsis peritura, nisi illa stirpibus indita post se reliquissent. Et à nobis certè meritò hoc omnium longè præclarissimum ac saluberrimum tantorum regum & doctissimorum hominum studium atque certamen laudibus ad cælum usque extollitur, quoties quàm optimis donis uitam nostram excoluerint, & quàm de nobis præclare sunt meriti recordamur. Quare uerissime Plinius dixit: Singula quosdam inuenta deorum numero addiderunt, omniumq; uitam clariorem fecerunt cognominibus herbarum, tam benignè gratiam memoria referente. Quod ubi mecum reputo, mirari subit cur nemo propèmodum principum nostrorum, ueterum regum & heroum exemplum imitari studeat, atque iuuare saltem eos qui hoc studio indagandarum herbarum tenentur, in animum inducat. Scio quidem eos molestis & operosis negocijs sic implicitos, modò Spartam quæ illis obtigit, probè tueri uelint, ut inquirendis stirpibus operam dare ipsi non possint. At tamen illorum nihilominus erat hortos optimis, & à longè etiam petitis herbis consitos construere, atque qui easdem subinde colant, augeant & conseruent herbarios, quod etiam olim Cæsares Romanos fecisse supra cõmemorauimus, suis impensis alere. Idq; ea potissimum de causa, quod nulla sit res unde sibi plus laudis & gloriæ aucupari ualeant, aut de tota posteritate melius mereri, quàm si hac ratione stirpium notitiam conseruare studuerint. Optarem itaque aliquam saltem partem, eamq; planè minimam suorum sumptuum, quos magna ex parte in res fluxiles ac momentaneas, ne quid grauius dicam, collocant, ad illustrandam hanc medicinae partem, quæ nunc quasi caput suum è profundis tenebris exerit, ponerent. Sed prò Deum immortalem, quid mirum reges & principes hoc studium indagandarum stirpium non admodum respicere, cum nostræ ætatis etiam medici sic ab eo abhorreant, ut inter centum uix unum qui pauucas saltem herbas exactè cognititas habeat, reperire liceat. Quod quidem alia de causa fieri nõ iudico, quàm quod eam medicinae partem quæ stirpium cognitionem tradit, ad se pertinere haud putent: aut uiliorem inhonestioremq; esse censeant, quàm ut ad se pertinere patientur. Dignitati enim existimationiq; suæ non parum detractum iri arbitrantur, si ea tractent, quorum seplasticarum & quidam alij, si dijs placet, sibi iam cognitionem uendicarunt. Hinc est quod totam hanc curam in pharmacopolas, indoctum mebercule magna ex parte hominum genus, & in stultas mireq; superstitiosas mulierculas reijciant. Ad eò ut nostra tempestate uniuersa herbaria medicina in manibus sit rusticarum & uetularum mulierum, ineruditorumq; hominum, qui errorem sub-

Quid ueteres studio inquirendarum stirpium consecuti sint.

A principibus herbarij alendi, aut sumptus ad inquirendas herbas suppeditandi.

Medici nostri teporis à studio indagandarum herbarum abhorrent.

Herbariam medicinam hodie in manibus esse imperitæ plebis.

rem sub-

rem subinde errore cumulant. Meritò itaq; reprehensionem & obiurgationē nostram multorumq; aliorum bonorū uirorum incurrunt medici, qui hanc cognoscendarū stirpium curam funditus repudiant, aspernantur, & pro nibilo putant. Quis enim æquo animo ferret hoc si bi studium ignominiosum existimare, quod olim regibus, Græcorumq; ducibus, adde etiam poëtis & philosophis, fuisse longè honorificentissimū demonstrauimus? Quod si uerò quispiam secum etiam reputet quàm utilis quamq; necessaria medicis sit hæc herbarū notitia, longè maxima castigatione & obiurgatione dignos censebit. Nam nemo illorum morbis rectè mederi potest, aut medicamenta componere, aut antea inuentis commodè & opportunè uti, nisi simplicium exactam habeat notitiam. Id quum omnibus sit manifestissimū, cur pluribus demonstremus nihil opus est. Ad hanc autem consequendam notitiam non satis est semel aut bis tēre illorum discrimina, Galeno etiam nostro teste, sed frequenter admodum in-
 spexisse. Proinde cum ueteres olim cum philosophi tum medici auctoꝝ suarū propriamq; inspe-
 ctionem ad exquisitam stirpium notitiam consequendam necessariam esse perspectum habe-
 rent, harum inquirendarum munus non rudibus & imperitis seplasiarijs, non horum mini-
 stris æquè imperitis, aut multò rudioribus, non etiam stultæ & ineptæ plebi permisierunt:
 sed ad se potius pertinere hanc prouinciam arbitrati, non unius & item alterius tantum re-
 gionis tractus, sed magnam orbis partem peragrarunt, ut non solum suis ipsorū oculis omnis
 generis herbas contuerentur, uerum etiam manibus contrectarent, degustarentq; , ut scilicet
 hac ratione non tantum earundem imagines, sed & uires planè addiscerent. Sic sanè Theo-
 phrastū, qui nobis nouem de historia libros certè præstantissimos reliquit, multas peragra-
 se prouincias constat: neq; enim aliàs tam exquisita ratione singulas stirpium differentias,
 quas diuersarum regionum ratione habent, tradere potuisset. Dioscorides quoq; , ut metipse
 testatur, incredibili quodam cognoscendarum herbarum desiderio ductus, multa admodum
 in militari labore loca perlustrauit, tantam hinc consecutus peritiam stirpium, ut post se de-
 issem, Galeno etiam teste, absolutissimos reliquerit libros, quos multi hodie herbariæ me-
 dicinæ studiosi, magno cum fructu, non tantum assiduè domi legunt, sed & secum nunquam
 non circumferunt. Prætereo nunc lubens Crateiam, Dionysium, Methrodorum, utpote
 quorum scripta non extent, temporumq; iniuria perierint. Omitto etiam Plinium Secun-
 dum, diuini illius operis De mundi historia autorem, quem omnes plurimū operæ non so-
 lum in hoc cognoscendarum stirpium, uerum etiam multarum aliarum rerum studio posuif-
 se, ac tandem mortem oppetiisse sciunt. Quàm uarias autem terræ regiones ut medicam
 materiam exactè cognosceret, uitamq; mortalium iuaret, Galenus lustrauerit, nemo qui
 libros eius paulò diligentius legit, ignorare potest. Nam metallorum gratia in Cyprum,
 quæ ibidem multa sunt: bituminis & aliorum quorundam causa, in Syriam Palestinam
 nauigauit. Quantum uerò studij & operæ in sola dignoscenda terra Lemnia posuerit, ijs
 qui nauigationis suæ descriptionem legerunt notum est. Hæc longius commemorauimus
 nulla alia de causa, quàm ut hinc nostri seculi medici discerent, quantum ipsi à ueterum ab-
 essent diligentia: quos maximo etiam rerum suarum, adeoq; corporis dispendio, in densissi-
 mis syluis & nemoribus oberrare, altissimamq; montium iuga conscendere ut exactam stir-
 pium notitiam consequerentur, haud piguit: & ut uel tantorum uirorū exemplo tandem con-
 uicti, stirpiū cognoscendarū studium ad se pertinere credant. Quod si tamen ijs exemplis pa-
 rum mouentur, ad hanc suscipiendam curam uel pudor eos impellat adigatq;. Nemo enim est
 cæterorū artificum qui sibi nõ ignominiosissimū esse duceret, si suæ artis instrumenta & ma-
 teriã quã quotidie manibus contrectat, ignorare iudicaretur. Cum itaq; in manuarijs artibus
 omnes eum ridendū esse artificem existiment, qui artis eius quam proficetur materiã nõ satis
 perspectã habeat; multò certè maiori cachinno dignus erit medicus, qui suæ artis materias,

Stirpium notitia
 medicis tum uti-
 lis tum necessaria

Veterum medi-
 corum circa sim-
 plicium medica-
 mentorum cogni-
 tionem studium.

Theophrastus.

Dioscorides.

Plinius Secun-
 dus.

Galenus.

Medicū ignora-
 re materiam me-
 dicam, ridiculū.

atq; adeò sanandi instrumenta, ignorat. Et detestanda quidem si nullo alio, hoc tamen potissimum nomine, hæc medicorum quorundam inertia, desidia, socordia, & negligentia, quod effecerit ut propèmodum omnis stirpium cognitio extincta & funditus deleta fuerit. Atque acclum planè de medicina herbaria fuisset, nisi aliquot bonos, eruditos, & diligentes viros Deus excitasset, qui hoc studium quod iam ad internitionem tendebat, & propè totum oblitteratum erat, maximis vigilijs & laboribus iuuare, atq; ab interitu vindicare uoluisent. Inter eos autem qui strenuè in hanc curam incubuerunt, mea quidem sententia primas tenet genere & eruditione clarus Hermolaus Barbarus, qui primus omnium, quod sciam, nostra ætate facinus longè pulcherrimè aggredi, eamq; medicinæ partem neutiq; contemnendam, à tenebris in lucem reuocare ausus est. Nam initio suscepti illius laboris præstantissimè, atq; multis iam seculis cõprobatè medicæ materiæ scriptorè Dioscoridem Latio donauit. Quo feliciter peractò labore, Corollarium adiecit, quo nihil eruditius, nihil copiosius, nihil deniq; magis uarium post Plinium in latina lingua editum esse docti unanimes sententia fatentur. Quicquid enim à Theophrasto, Athenæo, Oribasio, Aëtio, Paulo, Polluce, Plinio alijsq; cum Græcis tum Latinis eruditis admodum hominibus, quos nominare nunc nihil attinet, sparsim notatè est, hoc totum in Corollario suo, uno quasi fæscè, complexus est Barbarus. Et quidem huius celeberrimi uiri studiū eò magis à nobis prædicandum esse censeo, quod ipse primus, quæuis professione medicus nõ esset, securè interim in utramuis aurem dormitantibus medicis, nutanti tum breuiq; casuræ rei herbariæ auxiliares manus porrigere dignatus sit. Incõparabilis huius uiri exemplum ac institutū, paulò post imitatus est Ioannes Ruellius Gallus, homo supra linguarū peritiā nõ uulgari rerum cognitione præditus: is enim pari conatu ac studio cum prodigiosis monstris congressurus, eum primū nobis autorem latinitate donatum exhibuit, unde ueram exquisitamq; materiæ medicæ cognitionem petere liceret, ut scilicet proscripitis & explois tandem Auicennæ & aliorum Arabum insulsis, erroribusq; nõ leuibus refertis de re herbaria placitis, è purissimo fonte Dioscoride stirpium notitiam hauriremus. Certarunt itaq; inter se hi duo insignes uiri uter alterū uinceret: honestum sanè, Hesiodo & Galeno nostro testibus, certamen, è quo uterq; immortalē est consecutus gloriam. Cæterum cum Ruellius ueteres atq; adeò legitimas stirpium nomenclaturas, quibus eas Dioscorides appellauit, accessione nouarū, quas nobis magna ex parte monachorū & mulierularū superstitione peperit, obscuratas nunc & oblitteratas esse, neq; etiam singulas stirpes ab uno Dioscoride descriptas animaduerneret, paucis abhinc annis opus, ut apparet, multis uigilijs adornatū, cui de stirpium natura titulum indidit, edere uoluit. In quo sanè quicquid usquam ferè apud Theophrastum, Plinium, Galenum, aliosq; ueteres & recentes probatos autores de stirpibus scriptum est, complecti magno studio annexus est. Quare à plerisq; hodie uir ille bonus male audit, eò quod complura admodum ad uerbum aliunde, è Plinio præsertim ac Hermolai Corollario, transcripta, suppressis eorum nominibus, in suos transtulerit cõmentarios: quasi uerò illi quibus hoc suum tuere tur factum, modò superstes esset, ueterum eorumq; probatissimorū scriptorum exempla desent. Atqui ut mortuo iam nõnihil patrocinemur, unum tantū cõmemorabimus. Neminè esse arbitramur qui nesciat Plinium uastum hoc suum & immortalitate dignum de historia mundi opus ex antiquissimis ac uarijs autoribus contexuisse: is tamen non quouis in loco eorum unde singula descripsit nominatim mentionē facit, cõtentus id ipsum semel fecisse. Quare cum in Plinio haud culpatur quod non nisi semel, libro nimirum primo, eorum unde sua transcripsit meminere, qui fit ut hoc ipsum Ruellio uitio detur? cum tamen constet hunc in præfatione eius operis ingenuè fateri, ea quæ sparsim à ueteribus tradita sunt, se ueluti in compendium digessisse, atq; usque adeo ab ijs adiutum esse, ut eis penè totum acceptū referat.

Proinde

Proinde cum is aliorum scriptis cōmodè usus sit, eaq; quasi in ordinem digesserit, atq; aded sua fecerit, nō erat cur passim autorum unde singula mutuauerat nomina, maximo legentium fastidio apponeret. De ijs itaq; Ruellij laboribus alij statuunt ac iudicent quicquid uelint: scio enim quā disparsa, & magna ex parte iniqua, multorum de ijs ipsis sint iudicia: me certè non pudebit apertè fateri, mihi eius cōmentarios multum profuisse. Quamuis nec illud nobis dissimulandum sit, nos non raro ab illo dissentire, tantum abesse ut quispiam me in uniuersum omnia quæ in ijs libris de natura stirpium decernit, probare existimet. Vicumq; autem multa sint in Ruellij cōmentarijs quæ nō probemus, debet tamen nihilominus eius studium nobis esse longè gratissimum, ut qui in tanta rei herbariæ caligine plus tamen omnibus qui hunc antecesserunt præstiterit. Sed de Ruellio satis, aut certè plura quàm oportuerit diximus, præsertim cum non desint suæ gentis homines tum eruditi tum eloquentes, qui illi multò rectius quàm ego patrocinari in hac causa possint. Ad Marcellum igitur Virgilium Florentinum, qui post Ruellium hanc medicinæ partem illustrare aggressus est, accedamus. Quamuis uerò ille non magnam admodum herbarum notitiam habuisse uideatur, ut qui professione medicus non fuerit, eoq; tempore quo densissimis tenebris res herbaria obducta iacuit sua ediderit, tamen quia complura obscura & deprauata Dioscoridis loca enucleauit, & pristino uitori restituit, debet uel hoc saltem nomine illius studium & conatus nobis probari, cum nihil æque ad rectè intelligendū Dioscoridem aliosq; autores conducat, ac exemplariorū integritas & puritas. Quod uerò nōnunquam à uerbis Dioscoridis paulò longius recesserit, nec eorum legitimū & genuinū sensum affecutus fuerit, id illi uitiū cum cæteris interpretibus cōmune est, utpote qui nō raro Plinij magis quàm Dioscoridis sensum exprimere ac sequi studuerint. Quod uerò nōnulli Marcellum Dioscoridis interpretem planè grammaticū esse iudicant, nō magno opere reprehendo. Sed quod adijciūt eum in hac arte nō satis tritum, hoc faciunt more suo, ne non palam omnibus insanire ac furere uideantur, dum ita sinistrè actemerè de hoc uiro multisq; alijs de literis et re medica optimè meritis iudicare audent. Ego uerò omni asseueratione affirmare nihil metuo, Marcellum in tanta etiam rerum omnium caligine, plures herbas cognitās habuisse, magisq; grammaticū fuisse, quàm illi hodie, qui tam impudenter de fama illius et aliorū eruditorū hominū detrabere nō uerentur. Verum omiſſis nunc exteris, ad Germanos nostros, uiros aliquot bonos & eruditos, qui editis scriptis medicinæ herbariæ lucem afferre, & eam quasi in integrū restituere conati sunt, ueniamus, ut ne eos etiā merita defraudemus laude. Inter hos autem primus fuit Otto Brunfelsius, uir quidem eruditus & planè ὀνότοπος, qui primū latino, dein etiā germanico scripto herbariā medicinā iuuare & illustrare conatus est. Quamuis autē multa in illius scriptis desiderantur, utpote quod descriptiones picturis passim nō respondeāt, et quod paucas admodum, & inulgares tantū stirpes protulerit, quodq; sæpe nō suis & legitimis nominibus appellauerit herbas: nihilominus tamen ut hunc omnes certatim laudibus efferant uel unica hac de causa meritis est, quod ipse primus omnium rectam pingendarum stirpium rationem denuò in Germaniam nostram inuexerit, alijsq; hanc imitandi occasionem præbuerit. Cætera quæ in eo desiderantur, cum illa præstare non potuerit multas ob causas, potissimum uerò propter crebras ac multas typographi molestias, qui importunè insisterat, editionemq; ut metipse in aliquo suarum uigiliarū loco fatetur, maturabat, ueniam merentur. Quid multa? cum constet Brunfelsium primum fuisse in Germania nostra qui herbariam medicinam propemodum extinctam è crassissimis eruere tenebris attentauerit, certe hoc nomine, quam non omnia ex sententia ceciderint, uenia dignissimus est: nam etiam iuxta prouerbiū, συγγνώμη τῶ πρώτοισίν. Præterea cum huic optimo uiro nihil optatius fuerit, quàm ut posteritati plurimum prodesset, æqui bonisq; faciendos studiosis omnibus

Marcellus Virgilius Florentinus.

Defenditur ab iniuria Marcellus.

Otto Brunfelsius

eius labores, qualescunq; sunt, censeo. Brunfelsio in hoc studio illustrandæ rei herbariæ
 Emericus Cordus *succesit Emericus Cordus, uir præter singularem poetices, aliarumq; disciplinarum eruditionem, integerrimus ac diligentissimus. Quantum autem rei herbariæ uindicandæ ab interitu profuerit, Botanologicon quod ille posteritati suæ diligentæ testem reliquit, abundè testatur, adeò ut nunc nostra cõmendatione huic non opus sit. Hoc tamen in præsentia dicere uolui, uirum hunc longiori uita fuisse dignissimum, ut qui opera sua instaurandæ herbariæ medicinæ plurimum momenti adferre potuisset. Sed quod parenti per ipsa fata non fuit intergrum perficere, hoc filius, quem post se reliquit, Valerius Cordus, optimæ spei iuuenis, et incredibili quodam cognoscendarum stirpium studio amoreq; flagrans, nisi dii quoq;, quod longè absit, illi uitam longiorè inuideant, cumulatè præstabit. Cum enim nunc paternis uestigijs strenuè insistat, nõ est cur uelit quasi in medio cursu gradum sistere. Post Emericum Cordum in hanc arenam descendit Hieronymus Tragus, qui anno abhinc altero, cum iam propèmodum hos cõmentarios absolueramus, germanicũ scriptum bene longum de stirpibus publicauit. Cuius quidem conatus mihi ualde probantur. Nam etsi mihi cum eo nulla intercedit familiaritas, apparet tamen in hoc homine mira quædam in inquirendis stirpibus diligentia. Et quidem hunc non esse imperitum herbarum, earundem descriptiones quas affert palam testantur. Eiusmodi enim magna ex parte sunt, ut oculis suis inspexisse huc herbas quas pingit abundè demonstrant. Atq; hoc quidem nomine laudem meritus est nõ uulgarem, potuissetq; multorum uitare reprehensionè, nisi singulis ferè herbis sua ex Dioscoride nomina accersere uoluisset: quasi uerò Dioscorides omnium regionum stirpes descripsisset, cognitãq; habuisset, cum tamen cõstet quamuis propèmodum terram suas priuatim ferre herbas. Dum itaq; omnibus stirpibus sua ex Dioscoride nomina imponere studet, dictu mirum quàm interdum temerè admodum, probatas & multis iam seculis receptas Dioscoridis lectiones immutare ac deprauare cogatur. Quod quidem ius præter necessitatem immutandi loca autorum non solum sibi Tragus, uerum etiam alij quidam, idq; magno cum supercilio, usurpant: ut nihil mirum sit raros esse admodum autores, quamuis optimi sint, quos nõ infinitis mendis contaminatos uideamus. Neque enim alia est maior deprauandi bonos autores occasio, quàm cum quisq; quod maxime placet in ijs immutandis statuit. Qui enim fieri potest ut dum quis pro suo arbitrio nunc demit, nunc adijcit aliquid, maneat illabe facta genuina & legitima scriptoris sententia? Quare non minus uerè quàm lepide quidam dixit, eos libros esse optimos, qui nullam prorsus lituram experti essent. Cum igitur is mos temerè quæuis in bonis autoribus immutandi nobis semper suspectus & insensus fuerit, diligenter admodum cauimus ne quid facile in Dioscoride mutaremus, nisi ut id ipsum faceremus manifestissimæ coniecturæ, aut Plinius, aut alius quispiam fide dignus autor moneret cogeretue. Sed ad Tragum reuertamur, qui quum strenuè annititur ut singulis herbis nomina ex Dioscoride imponat, in alterum peccatum incidit, ut nõ raro falsas & adulterinas facultates, quod perniciosissimũ esse nemo nõ nouit, eisdem assignet. Hactenus tum exterorum, tum etiam nostræ gentis uirorum aliquot sanè eruditorum, qui editis scriptis rem herbariam iuuare studuerunt, honorificam facere mentionem uoluimus, ut quàm bene de nobis totaq; posteritate meriti essent ostenderemus, & ut extaret etiam erga iam mortuos aliqua gratitudinis nostræ significatio. Cæteros qui de ea medicinæ parte scripserunt nihil moror, ut quos constet plus illi tenebrarum offudisse, quàm lucis attulisse, taceo quod eorum scripta multis ac grauibus erratis plena sint. Verũ inter omnes herbarios libros qui hodie extant, nulli sunt qui plus crassissimorum errorum habeant, quàm illi quos iam iterum atq; iterum edidit Egenolphus typographus. Nam multis in locis unam atq; eandem herbam pro duabus tribusue, ijsq; & forma & facultatibus distantibus, pingit. Sic ex uno quidem Polygonato, Dictamnũ & Elleborum*

Egenolphus herbarij libri.

borum album facit. Una etiam pictura Atriplicem & Mercurialem exprimit. Gladioſi nomine tres inter ſe differentes herbas deſcribit. Omitto alia multa quæ quiuis, modò perueniẽ herbarum notitiã habeat, primo ſtatim aditu deprehendet. De picturis eius hoc dixiſſe ſatis ſit, me mirari maiorem in modum cur ſuis pyxidibus non appinxiſſet etiam aſſidentes pharmacopolas, aut illorum miniſtros præcinctos corio, cum melli aduolantes muſcas, & aquæ naues, atq; in ijs ad tranſtra ſedentes nauitas adhiberi curauerit. Sed cum non magni faciat cõmoda ſtudioſorũ, & ad rem augendam magis attentus ſit, nihil mirum ex illius officina prodire eiufmodi libros. Porro ut eò tandem quò tendebat animus perueniam, ego quidem paulò antè cõmemoratorum longè doctiſſimorum uirorum ſtudioſum imitatus, hos de hiſtoria ſtirpium commentarios maximis cum uigilijs tum ſumptibus confecei. In quibus initio quicquid ad uniuerſam cuiuſque ſtirpis hiſtoriam attinet, omnibus ſuperuacaneis reſciſiſ, breuiter, & ordine, ut confiſimus, optimo, eodemq; perpetuo, complexi ſumus. Deinde ſingulis ſtirpium hiſtorijs, uiuas & ad naturæ æmulationem à nullo unquam, pace omnium dixerim, artiſcioſius expreſſas imagines adieciſimus: idq; nulla alia de cauſa, quàm ut ea quæ nudis uerbis exponit hiſtoria, certius exprimeret, atque adeo altius animo inſingeret pictura. Neque ſanè peregrinarum tantum ſtirpium, ſuaq; ſponte in Germania noſtra haud prouenientium, quarum tamen plus centum ijs in commentarijs ſtudioſi reperiunt, picturas dedimus: uerum etiam uulgarium, & earum quæ iuxta ſepes ac dumeta paſſim proueniunt. Idq; ut faceremus duabus potiſſimum rationibus moti ſumus. Primum ut herbariæ medicinae ſtudioſi earundem etiam hiſtoriam integram, & in ordinem digeſtam haberent, quæ magna ex parte à ueteribus non eſt tradita, apud recentiores uerò non niſi manca & conſuſa. Dein ne poſteris noſtris accidat quod nobis eueniſſe nemini obſcurum eſt, ut ſcilicet quæ hodie ſunt omnibus notiſſimæ ſtirpes, illis prorsus incognitæ fiant. Nam quis eſt qui neſciat Dioſcoridis ſeculo pleraſq; herbas tam notas fuiſſe, ut illum piguerit earundem notas, quibus à poſteris ſuis agnoſcerentur, tradere? Quod ſi tamen hodie peritiſſimos etiam herbariæ rei homines perconteris, nemo erit qui eas cognoſcet. Quare ne noſtra negligentia, aut temporum iniuria eueniat ut è notitia hominum uulgares nunc plebeisq; cognitæ ſtirpes excidant, earundem etiam hiſtorias & imagines ijs noſtris commentarijs inferendas eſſe duximus. Et quare notas & uulgares admodum ſtirpes contemneremus, cum ſæpius maior illis uis inſit, quàm ijs quæ à remotiſſimis extremisq; orbis partibus, non ſine maximis ſumptibus conquiſita, importantur? Nam quid Polygono magis uulgare? quid contemptius? omnium ſiquidem conculcatur pedibus: quod ſi tamen uim eius quam in ſiſtendo ſanguine obtinet experiri uolueris, nihil eo præſtantius dices. Poſſem huic ſimilia multa commemorare, ſed in re nota non eſt cur temerè uerba fundamus. Quid multa? ut tanquam diuerſis copijs iunctis nobis contra uarios morborum inſultus aciem inſtruere liceret, tam noſtratum quàm exterarum ſtirpium tum hiſtorias tum imagines ſtudioſorum oculis ſubijcere placuit. In acquirendis autè peregrinis et radicibus & ſeminibus quæ ſubinde terræ mandata nobis feliciter prouenere, multũ nobis profuit Hieronymus Schallerus medicus Noricus, homo & herbarũ aliarumq; multarũ rerum peritiſſimus. Quod hoc loco cõmemorare uolui, ut noſtræ amicitia ac charitatis aliquod apud poſteros extaret teſtimoniũ, & ut ſtudioſi quantum huic bono & erudito uiro, qui ſua nobis nunquam deſuit opera, deberent palàm intelligerent. Cæterum cum multarum ſtirpium quas neq; Dioſcorides neq; alij ueteres cognouerunt hiſtorias huic operi inferuerimus: nam cum magna ex parte ſint uulnerariæ, atq; ad eò in quotidiano multorũ, maximè chirurgorũ, uſu, prætereundas minimè putauimus: illarũ certè uſitatis atq; ad eò barbaris nobis utendum fuit nomenclaturis, quandoquidem latinis deſtitueremur. Maluimus enim uti ineptis minusq; latinis appellatombus, q̃

Conſilij ſui rationem in ſciſcendis ijs de ſtirpium hiſtoria cõmentarijs exponit.

Vulgatiſimarũ etiam herbarum picturæ non contemendæ.

Hieronymus Schallerus.

Quare interdũ uſitatis & barbaris uſus ſit nomenclaturis.

illis adulterinas uel græcas uel latinas accersere, ne scilicet cum illegitimis earundem nomen daturis adulterinæ etiam illis facultates ascribendæ nobis essent: quod cõtigisse nõnullis qui de re herbaria scripserunt, supra cõmemorauimus. Quare ubi potuimus habere dictionem græcam per omnia germanicæ appellationi respondentẽ, hanc potius quàm falsam aliquam ex Dioscoride illis imposuimus. In alijs stirpibus quas Dioscorides cognouit unicè cauimus, ne omnes earundem nomenclaturas quæ initio capitum reperiuntur cõmemorarem, quod sciremus propemodum omnes à sciolis quibusdam ex Apuleio, aut alio eius generis autore adiectas, & in contextum Dioscoridis temerè raptas esse: & quod perspectum habeamus, nihil æque herbarum cognitioni obfuisse, maioremq; iacturam attulisse, ac illam confusam appellationum coacervationem. Prestat igitur paucis admodum, ijsq; ueris & legitimis uti, ne nomenclaturarum confusio, rerum etiam nobis cõfusionem pariat. Porro adiecimus etiam aliquot arborum historias & imagines, non quod nobis consilium fuerit singulas uelle describere, id enim infiniti laboris erat: sed cum Dioscorides alijs rei herbariæ scriptores illis stirpium quarundam folia asimilent, atq; adeò sine earum deliniatione tota historia satis intelligi non possit, harum etiam aliquas ijs cõmentarijs inserere uoluimus, ad quas in cognoscenda stirpium historia studiosi respicerent. Quapropter quod fecimus, non errore, sed iudicio factum æ qui iudices iudicabunt. In facultatibus cõmemorandis summa diligentia cauimus, ne alicui stirpi adulterinas ac illegitimas, quod pleriq; nõ sine maximo errato & uitæ humanæ dispendio fecerunt, assignarem. Quare in historia stirpiũ quas ueteres cognouerunt, eas duntaxat quæ à Dioscoride, Galeno, Plinio, interdũ etiã quæ ab Aëtio, Paulo, & Simeone Sethi traduntur retulimus. Idq; ea maxime de causa, ut omnes scirent eas facultates in quibus illi tres concordēs sunt, esse eiusmodi, ut in ijs, tanquã maxime legitimis, spem certam ponere liceat. Nam si inter se dissentiunt, tum Galeni potius quàm Dioscoridis, & huius rursus magis quàm Plinij erit sequenda sententia. Cur autem Galeni sententia omnibus alijs sit præferenda, nulla alia est ratio, quàm quod is stirpium facultates partim certa quadam ratione & methodo, quam literis subinde mandauit, cognouerit, partim etiam experientia didicerit. In reliquis quidem stirpibus quæ ignotæ ueteribus fuerunt, Galeni secuti sumus exemplum: nam eas tantum facultates cõmemorauimus, quas multorum experientia comprobauit, quæq; longo usu receptæ sunt ab omnibus, & quæ ab earundem qualitatibus non abhorrebant. Quod uerò in ijs cõmentarijs græcarum literarum ordinem secuti sumus, id necessitate ipsa quasi nos cogente fecimus. Nam multò maluissimus, Dioscoridis exemplo, congeneres sibi herbas passim connectere, quàm eum qui instituit sequi ordinem, nisi id ipsum per picturas nobis non licuisset. Siquidem cum nullius stirpis historiam sine uua eiusdem imagine ijs nostris cõmentarijs inserere constituissemus, stirpes uerò ipsas ac earundem genera non nisi diuersis temporibus, & nonnunquam aliquot annorum interuentibus interuallis nancisceremur, hunc literarum græcarum sequi ordinem coacti sumus. Quanquam non uideam cur mihi tam exquisita opus sit excusatione, cum hunc etiam ordinem sequi Galenum, Plinium, & post eos Paulum, Aëtium, aliosq; complures nõ puduerit. Quod ad picturas ipsas attinet, quæ certe singulæ ad uiuarum stirpium lineamenta & effigies expressæ sunt, unicè curauimus ut essent absolutissimæ, atque adeo ut quæuis stirps suis pingeretur radicibus, caulibus, folijs, floribus, seminibus ac fructibus summam adhibuimus diligentiam. De industria uerò & data opera cauimus ne umbris, alijsq; minus necessarijs, quibus interdum artis gloriam affectant pictores, natiua herbarum forma obliteraretur: neq; passi sumus ut sic libidini suæ indulgerent artifices, ut minus subinde ueritati pictura responderet. Pictorum miram industriam præclare imitatus est Vitus Rodolphus Specklin sculptor Argentoracensis longè optimus, qui uniuersiusq; picturæ sculpendo

Cur multæ & cõfise apud Dioscoridem stirpiũ nomenclaturæ præteritæ.

Arborũ quarundam historie & imagines cur adiectæ.

Quid in cõmemoratione facultatum stirpiũ cõsiderandum.

Ordinis in ijs cõmentarijs ratio.

Picturæ & imagines quales.

Vitus Rodolphus Specklin sculptor.

pendo lineamenta tam affabrè expressit, ut cum piclore de gloria & uictoria certasse uideatur. Sed etsi multis & impensis & sudoribus picturas parauerimus, tamen non defuturos In contemptores scimus qui easdem ueluti inuitiles ac nullius momenti damnabunt, atque huic quidem suæ incipitissimæ sententiæ Galenum patrocinari clamabunt, ut qui ne describi quidem stirpes uoluerit, tantum abest ut earundem picturas probauerit. Picturæ. Quanquam uerò neminem esse putem qui non quantū illi insaniant intelligat, tamen eos hoc in loco rogare haud pigebit, ostendant nobis ubi locorum Galenus stirpium descriptiones & picturas damnarit? cum certò sciam hoc illi ne per somnium quidem uenisse in mentem. Atqui respondebunt statim, Galenum id ipsum libro sexto de simplicium medicamentorum facultatibus, capite de Abrotono, disertè asserere. Verum nos uicissim illis respondemus: fateri nos quidem Galenū noluisse stirpium formas ac species describere, non tamen quod eas ipsas damnaret aut inuitiles esse iudicaret, sed quod id ipsum post tot tantosq; uiros, Dioscoridem præsertim, qui hoc, Galeno etiam ibidem teste, absolutissimè præstitit, conari planè superuacaneum existimaret. Sed quid multis moror? quis quæso sanæ mentis picturam contemneret, quam constat res multò Picturæ laus. clarius exprimere, quàm uerbis ullis, etiam eloquentissimorum, deliniari queant. Et quidem natura sic comparatum est, ut pictura omnes capiamur: adeoq; altius animo insident quæ in tabulis aut charta oculis exposita sunt & depicta, quàm quæ nudis uerbis describuntur. Hinc multas esse stirpes constat, quæ cum nullis uerbis ita describi possint ut cognoscantur, pictura tamen sic ob oculos ponuntur, ut primo statim aspectu deprehendantur. Proinde nō immeritò bonis pictoribus suis semper apud omnes ætates honos fuit. Et in uniuersa Græcia hunc morem fuisse notū est, ut ingenui et liberè educati pueri ante omnia, aut saltem unā cum literis picturam docerentur, quòd illis constaret, hanc ipsam esse quæ singularū rerum non solum naturam exprimeret, sed & memoriam conseruaret. Quare ea quoq; ars in primum gradum liberaliū artium recepta est, semperq; honos ei fuit, ut ingenui eam exerceant, mox ut honesti, perpetuo interdicto, ne seruitia docerentur: ideoq; in hac nullius qui seruiuerit opera celebrantur. Atqui de pictura, quam quidā satis certè imprudenter explodunt, hæc dixisse satis sit. Præterea cum in texenda stirpiū historia uocabulis paulò obscurioribus, & ab imperitorū intelligentia sensuq; distinctis nobis utendū fuerit, operæ precii nos facturos duximus, si horum breuem quandam explicationē adijceremus, ne inter legendum parum peritos remorarentur. Porro cum singulis ferè stirpibus quatuor nomenclaturas inditas esse constet, græcam nimirum, latinam, barbaram, qua officinæ seplastiariorū utuntur, & germanicam, quadruplicem etiam Indicem concinnauiimus, ut quisq; statim audito nomine, cuiusq; stirpis historiam quærere nullo labore possit. De nobis insuper hoc affirmare possumus, nos neq; impensis neq; laboribus in ijs adornandis cōmentarijs peperciisse, ut multorum de nobis expectationi satis faceremus. Neq; enim grauati sumus in campos & soluas creberrimè excurrere, altissima iuga montium cōscendere, multaq; artificum tædia, quæ illis erratorum interdum emendatio peperit, deuorare: quod quiuis rerum æquus æstimator per se statim deprehendet, ita ut non opus sit nostram operam parum modestè prædicare. Quod si tamen quid nobis humanitus accidit, sat scimus uenia dignos esse nos boni quicq; iudicabunt, quòd unius hominis non sit rem herbariam funditus propèmodum obscuratam, ita in integrū restituere, ut omni prorsus reprehensione uacet, in hac præsertim rerum omnium difficultate, ac ueterū de stirpibus cōmentariorū inopia. Inter omnia enim ueterum de stirpium natura scripta quæ earundè coniunctim notas tradunt, nullum prorsus nisi Dioscoridis extat: qui tamen nec omnes, ut supra cōprehensum est, describit, nec quas pingit semper diligenter & accuratè deliniat. Nam in facie stirpium representanda interdum uariius esse apparet, nonnunquā etiam tam multas præterit notas, ut nihil minus quàm eam Dioscorides in re presentanda stirpium facie interdum uariius & ne gligens.

de qua illi sermo est stirpem exprimere uideatur. Id quod tum maximè fit, ubi à se non uti-
 fas, & ex aliorum sententia stirpes depingit. Præterea non pudebit etiam nos errata, si
 qua commississe conuincamur, agnoscere, atque palinodiam canere: tantum abest ut indignè
 laturi simus, si quod nos non potuimus, impediti aut negligentia, aut iudicij tenuitate, alij in-
 ueniant aut sarciant, modò omiſſis maledictis & conuicijs, ut ueritatis studiosos decet, ra-
 tionibus potius & probatissimorum scriptorum testimonij sententiam nostram reuellant
 & conuincant. Quod si uerò quispiam omnino stomachari, & malignè in conuicia prorum-
 pere perget, hunc ipsum suæ magis quàm nostræ existimationi obfuturum arbitramur: quod
 nemo eum bonum uirum reputet, qui temerè detrabere de fama alterius audeat. Et certè
 qui tam prompti & parati sunt ad alienos labores uel extenuandos, uel contemnendos, uel
 prorsus repudiandos, magna ex parte in tenebris deliteſcunt, & in angulis se continent, ubi
 apud sui similes & imperitos asinos mirè triumphant. Quod si tamen momi illi aliquan-
 do è tenebris erumperent, & in apertum prodirent, nemo non statim intelligeret quàm ina-
 ni eruditionis fastu turgeant, quamq; sint impudentes nugatores. Et nos certè istos conui-
 ciatōres sic exciperemus, ut sese in latebris continuisse, & lucem nunquam affectasse opta-
 rent. Nam ad illos probè tractandos, ac eorundem tela & iacula fortiter propellenda re-
 torquendaq; neque uires neque artes nobis defuturas confideremus. De Michaëlis
 Isingrinij typographi Basiliensis diligentissimi, in excudendo hoc opere industria & se-
 dulitate hoc in loco plura dicerem, nisi has ipsas ex alijs multis quæ nunc annis aliquot ex il-
 lius officina prodierunt, satis cognititas ac testatas esse sciremus. Et quidem opus ipsum per
 se satis loquitur quàm in eo imprimendo diligens fuerit. Quantos autem fecerit sumptus,
 facile quiuis æstimabit qui operis magnitudinem & picturas ipsas pro rei dignitate ex-
 pendere uoluerit. Plurimum itaque huic uiro debent rei herbariæ studiosi, ut qui neque im-
 pensis neque laboribus, quo illorum commodis inseruiret studiâq; iuuaret, pepercerit. Cum
 uerò hodie multos esse typographos compertum sit, qui instar fucorum alienis insidientur la-
 boribus, librosq; optimis ac elegantissimis typis excusos, & præstantissimis picturis orna-
 tos, inepta sua æmulatione deformant atque contaminant, idq; nulla alia de causa, quàm ut ex
 aliorum incommodis sua comparent cōmoda, Isingrinij etiam, qui immensos in hoc opere ex-
 cudendo sumptus fecit, ratio habenda fuit: ideoq; ne quis alius hos nostros commentarios
 usquam locorum impunè imprimat, Cæsareo decreto, quod initio etiam operis monuimus,
 cautum & prospectum est. Quum uerò usitato more patronum aliquem ijs nostris
 commentarijs querere nobilitate & uirtutum splendore excellentem, nemo omnium cui iu-
 stius quàm tibi Illustrissime Princeps IOACHIME, clarissimo heroi, hos dedicandos esse
 putarem occurrebat. Nam si generis tui uetus statem atque nobilitatem speculo, nemo te ho-
 die Principum aut melior, aut præstantior, utpote cuius maior à Guelfis, qua uix ulla in
 Germania uetustior est nobilitas, ortos esse constat. Quod si eorundem uirtutes expen-
 do, nullam prorsus uirtutem magnis & bonis Principibus dignam illis defuisse uideo. Om-
 ni uerò genere uirtutum fuisse claros uel inde maximè colligi potest, quod Franciæ pars ad
 Mœnum sita, cuius tamen gens libertatis tuendæ semper studiosissima fuit, non alio nomine
 quàm nobilitate & uirtute eorum inuitata, ijs parère coeperit. Possẽm nunc singulorū ma-
 iorum tuorū qui res maximas gesserunt uirtutes cōmemorare, si longius euagari epistolæ ra-
 tio permitteret: quare prætereo cæteros, atq; unū eumq; præcipuū produco ALBERTVM
 illum, quem ut reliqui propter insignem fortitudinẽ, inq; prælijs dexteritatem ac felicitatem,
 germanici Achilles cognomine celebrarūt: ita ego propter singularem prudentiã, atq; in re-
 bus agendis miram industriã & solertiam, germanicū Ulyſsem meritò appellandū esse cen-
 seo. De huius autẽ multis ac uarijs uirtutib. multa extant præclara testimonia in eorū libris,
 qui Prin-

IOACHIMI
 electoris, Mar-
 chionisq; Bran-
 denburgensis
 laus.

Albertus Mar-
 chio Brandenbur-
 gensis germani-
 cus Achilles &
 Ulyſſes.

qui Principum Germaniæ res bene gestas memoriæ prodiderunt, adeo ut de ijs nunc longius mihi differendū minimè sit. Ad tuam itaq; celsitatem redeo, de qua uerissimè dici potest quod semina uirtutis à bonis parentibus in posteros propagentur. Tantum enim abest ut à maioribus tuis Principibus optinis degeneraueris, ut plerosq; etiam ingenio & uirtute superaueris. Nam ut multas et q; præclaras & magno Principe dignas uirtutes tuas, iusti Virtutes Princi-
 tiam in imperio, pacis tuendæ curam, magnitudinè animi, integritatè, modestiam, clementiã, pe magno dignæ
 & eximiam bonitatem, omittam, nonne hæc uerè in te regia est uirtus quod studia literarū, studia literarum
 quæ tamen uulgus Principum odit cane peius & angue, adiuuare, ornareq; tantopere stu- iuuare uirtus: re-
 des? Quod autem immenso fauore literarum prosequaris studio maximo est argumentum, gia.
 quod non solum scholam, sed & aulam doctissimis uiris, quorum opera ad studiorum ac re-
 rum gubernationem uteris, quorumq; te colloquio oblectas, pulchrè ornatam habeas. In eo
 autem quod literas earumq; cultores amas, obseruas, tueris, amplissimisq; honoribus auges,
 singularis tua elucet prudentia: intelligis nanq; sapientiæ studio, atque adeo literis ipsis flo-
 rentibus, res omnes quibus humana societas constat cõseruari. Literis enim debemus quod Literarum
 hodie doctrinæ coelestis, aliarumq; disciplinarum puritate fruamur. Isdem etiam acceptum cõmoda.
 referendum quod aliquid, quicquid est, adhuc restat, quodq; non omnia unà cum corporibus
 eodem puluere obruta & sepulta sint. Quid enim maiorum nostrorū uirtutes, atq; res præ-
 clarè gestas ab interitu & obliuione uindicauit nisi literæ ipsæ? Quid aliarum rerum om-
 nium memoriã usq; ad hæc nostra tempora cõseruauit nisi literæ? Sed id ipsum uno & item
 altero exemplo breuiter demonstremus. Nemo hodie animantium naturas exploratas ha-
 beret, nisi Aristoteles præclarissimos illos de eorundem historia libros conscribere uo-
 lisset. Quod ut præstare posset non parum Alexandri adiutus est liberalitate, qui ad con- Alexandri libera-
 ducendos uenatores & alendas bestias illi octingenta talenta, hoc est, quadringenta & octo- litias in Aristot.
 ginta millia coronatorū transmisit. Nullam præterea stirpium peritiam hodie apud ullam
 gentem reperire liceret, si Dioscorides, Theophrastus, Plinius, & alij quidam earundem
 notas quibus deprehenduntur, literis non mandassent. Meritò igitur hæc uerè regia in te
 uirtus nobis multis modis prædicanda erit, hoc præsertim tempore, quo maximus literarum
 omnium contemptus nõ tantum rusticis irrepsit casas, & artificum tabernas, sed & magna- Hodierno tempo-
 rum domos ac Principum aulas. Quotus enim quisq; hodie est Principū, quem hæc cura con- re maximus lite-
 seruandorum studiorum tangat: ita ut nobis metuendum sit, nisi C. T. aliorumq; quorundam, rarū cõtempus.
 paucorum tamen pro dolor, Principum patrocinio & liberalitate adiutæ fuerint, ne prope-
 diem è manibus nostris elabantur, redeatq; pristina illa uerè Scythica barbaries. Quare
 ut literas quemadmodum cœpisti perpetuò ames, foueas, & cõserues, non solum hortor,
 imò etiam per CHRISTVM oro. Siquidem dum eas iuuare & ornare studes, simul etiam Que commoda
 religionem, cuius in primis cura habenda est, naturæ cognitionem, leges, & quicquid est ad literarum cõser-
 reipub. pacem & tranquillitatem cõseruandam necessarium, tueris. Proinde non est cur uationem sequati-
 C. T. eius liberalitatis, qua in cõseruatione literarū uteris, pœniteat: dum enim harum cul- tur.
 toribus succurris, atq; adeo ut suum cursum strenuè urgeant efficias, tibi etiam simul sempiter-
 nam laudem paras. Quum enim illis non sit quod pro tantis tibi beneficijs quibus eos ornas
 rependant, tamen hoc præstabunt uicissim, ut memoria tua apud posteros perpetuò sit dura-
 tura. Nam quanquam reliqua humana omnia, utcumq; in speciem uideantur firma & soli-
 da, cum annis simul labantur & deficiant: sola tamen laus quam doctrinæ cõseruatio pepe-
 rit, immortalis existit. Quapropter neq; ampliorem, neq; splendidiorẽ famam & gloriã
 tibi, imò toti tuæ ornatisimæ familiæ, comparare poteris, quàm doctrinæ & studiorū cõ-
 seruatione. Ut autem id quod nunc facis perpetuò quidem facias, in primis te necessitas ipsa,
 quam paulò antè exposui, cohortetur: dein diuinum etiam præceptum quod hoc ipsum abs te

alijsq; Principibus seuerè admodum exigit, ut liberalitate uestra sic inuetis studia, ut horum subsidio publica pax & tranquillitas conseruetur. Sed non est cur C. T. sponte currenti calcaria addam, quò inter omnes Germaniæ nostræ Principes uix alius reperiatur qui æquè atq; tu literas, eosq; qui opinione aliqua eruditionis clari sunt, amet, foueat, tueatur, ornet. Nobilitatis itaq; tuæ, multarumq; aliarum præclarissimarum quæ in te elucent uirtutum splendore motus, hos, quos multis sanè sudoribus & impensis adornauit, de Stirpium historia commentarios Celsitati tuæ inscripsi. Per speculum enim habebam eos non uulgare, sed excellens aliquod patrocinium requirere, quandoquidem uix ulla alia possit esse cõmentatio quæ plurimum calumnijs pateat & exposita sit, quàm ea quæ de stirpium natura explicanda suscipitur. Proinde cum in spem certissimam adduceremur, nostras has uigilias non uulgarem gratiam ex amplissimi nominis tui inscriptione apud candidos & æquos inuituras, foreq; ut eam ob causam maledicorum conuicatorum petulantia perfringeretur, te quidem in tanto ornatis morum Principum numero mihi delegi, cui potissimum has ipsas consecrarem. Quare cum eas suscipies illustris. PRINCEPS, cõmendari tibi defensionem & conseruationem huius partis medicinæ quæ stirpium naturas inquirunt, statues. Quam ut cupidè & libenter in te recipias multa, scio, mouebunt: potissimum uerò hoc ipsum, quod uix ex ulla alia re magis diuina presentia & benignitas eluceat, quàm ex tam uaria stirpium tum forma, tum natura, dum scilicet omnes illas ad usum hominis conditas à Deo ipso perpendimus. Si quid igitur aliud, herbarum cerè diligens contemplatio excuscat, imò cõfirmat in animis nostris opinionem hanc, quod homines Deo curæ sint, qui tam anxie laborauit in ijs iuandis ac tuendis, dum tot elegantissimis atq; præstantissimis stirpibus, quibus illi tam uarios morbos propulsare possunt, terram exornauit. Non parum etiam ad eam suscipiendam curam te præclarissimorum tum Regum tum Principum exempla, quæ supra recitauimus, hortabuntur. Sed omnium maximè immensa cõmoditas quæ ex istius partis medicinæ conseruatione ad uniuersos perueniet. Ad herbariæ deniq; medicinæ tum amorem tum defensionem mira quoq; iucunditas, quæ in contemplandis tot herbarum generibus animi subibit tuum, inuitabit. Quid enim iucundius, quid delectabilius quàm intueri stirpes, quas Deus opt. max. tot tamq; uarijs pinxit coloribus, tot elegantissimis redimiuit floribus, quorum colorem nullus unquam pictor satis exprimere potuit: tot deniq; seminibus & fructibus, quorum & in culina & in medicina usus est maximus, ornauit? Verum non est cur te pluribus in admirationem huius partis medicinæ pertrahere coner, utpote qui antea studio & amore eius sic tenearis, ut uix sit aliud quod te magis delectet. Nunquam enim in extruendis hortis tot arboribus atq; herbis confitis tantum operæ & impensarum poneres, si non illuc te rei iucunditas ac singularis amor pertraheret. Reliquum nunc est illustris. PRINCEPS, ut pro tua excellenti humanitate, quæ uestræ familiæ cognata est, munus hoc nostrum tanquàm specimen & testem mei erga C. T. amoris & obseruantia, exporrecla lætaq; fronte accipias, atq; me tuo fauore cõplectaris, & autoritate ab inuidorum calumnijs defendas. Bona autem spes est hunc hortum quem donamus C. T. fore longè gratissimum, non tantum quod in eo omnis ferè generis herbas elegantissimè pictas reperire queas, uerum etiam quod inde ad quæuis morborum genera remedia decerpere tibi liceat. Deus opt. max. te tuamq; ditionem incoluam seruet, ut Reipub. Christianæ atque literis diuissimè prodesse possis. Tubingæ, Calen. Martijs, Anno à nato Christo M. D. XLII.

Dedicationis
causæ.

Diuina præsen-
tia & benignitas
ex stirpibus ipsis
elucet.

EXPLICATIO QVARVNDAM VOCVM TOTO HOC opere passim occurrentium, in quibus assequendis non admodum peritus lector hærere possit.



Acetabula ab aceto denominata uidentur: quæ uis alij ab accipiendo dictum putent, atque hinc est quod scribant acceptabulum; uasculaç fuerunt orbiculata, concava, sine marginis latitudine, quæ aceto plena ad intinctus ponebantur. Dehinc uox ad omnia alia quæ similem concavitatem habent, translata fuit. Primumçq; sic concavas partes in polyporum flagellis, quibus id animal nititur, & uelut adminiculis solum exurgit, nominauerunt. Translata etiam uox ad fœminarum locos, uocaueruntçq; acetabula uenarum arteriarumçq; ora, quæ in uterũ feruntur hiantia. Transfulerunt postremò etiam hoc nomen ad herbam, quam eam ob causam Acetabulum dixerunt, quod folia acetabulo similia in orbem circumacta, sensimçq; sic ut sensum fallant, in concavam lacunam descendentia, habeat, *κατυλιδώνες* græcè nominantur.

Acinus non tantum grana interna uuae, quemadmodum quidam existimant, sed totũ fructum, qui ex succo, & parte quæ ueluti caro est, & ex uinaceis, & ambiente forinsecus cute constat, significat, Testis Galenus, qui libro 2. de facultatibus alimentorũ sic scriptũ reliquit: Acini corpus ex quatuor partibus constat, ex ea scilicet quæ eius ueluti caro est; exçq; humore per eam disperso, unde uinum; præterea ex nucleo, atq; eo quod omnia hæc foris circumcludit membranoso tegumento, *πέπε* Græcis dicitur.

Aculei, quæçq; duriuscula in culspide turbinata punctiõnem insiliunt spiculorũ modo, nominantur. Acus, purgamentũ frumenti, leuissimũ scilicet in eo quod uentilabris extra aream iaculai.

Adnata, uel Adnascentia, siue Appendices, ramuli dicuntur quos caulis nõnunçq; ex se mittit, quasi nouã adscititiãçq; prolem. Sic autem uocantur, quod quasi cauli adnascentur & superaccedant, Græci *παράφυλλοι*, quod circumcaulem erũpentes accrescant, appellarũt.

Alæ, caui inter caulem, & ramulos anfractus, unde sinuatim noua proles egreditur, facta ab humanis alis translatione, dicuntur. Græci *μυα*

Alabaftra, *σχηλλας* uocant. Alabastrum sunt seruandis odoribus ex solidissima & frigidissima materia facta uascula, sic dicta Græcis quod ob læuorem suam capi teneriçq; manibus non facile possent, lubricaçq; dilaberentur. Hinc alabastrites lapis, quem nunc alabastrum uocant, quoniam ex eo alabastrum fierent, denominatus est.

Aluta pellis seu corium dicitur postquam ad usum & opus calceorũ & aliarum rerum concinnatũ est. Hinc alutamen, si

uealutamentũ, opus ex cõcinnatis pellibus factum. Et alutarij, pellium & coriorũ cõcinnatores. Alsiosa nõ dicuntur ea quæ frigidis locis gaudent, sed contrã potius quæ algores ferre non possunt. Amulera remedia sunt præsentanea aduersus uenena & fascinores, qualia quidã in annulis, & è collo suspensa gestare solent. Amphora mensura est quæ capit duas urnas, seu octo congios. Apices quæ in medio calycis seu folliculi quo flos clauditur erumpũt, stamina sunt, quæ ueluti filamenta ab intimo floris sinu prosiliũt. Habent apices sæpius in summo quidpiam crassiusculum, à qua similitudine nomẽ acceperũt. Arbor est quicquid à radice statim simplici caudice, brachiatũ ramis, furculosum, dissolutuçq; contumax assurgit. Articuli sunt partes quæ in nodos quosdam intumescũt, à quibus persape ramuli prodeũt. Asparagi quæ primum in lucem prodeũt olerũ germina, priusquam in folia explícẽt, recentissimicq; turiones qui edendo sunt, dicuntur. Arista, est quæ ut acus tenuis, longa, eminet à gluma. In summa, aristæ quasi apices & cornua sunt spicarũ.

Alsiosa.
Amulera.
Amphora.
Apices.
Arbor.
Articuli.
Asparagi.
Arista.

B

Baccæ sunt fetus minutiores herbarũ, fruticũ, arborum uel, qui dispersus rariuscq; enascuntur: ut partus lauri. Atq; in hoc ab acinis differunt, quod ij densius proueniunt.

Brachia sunt plantarũ, præcipuẽ autẽ arborum ramuli, quod instar brachiorũ in homine extendant. Bulbi radices sunt rotundæ tunicata, quales sunt hyacinthi, asphodeli, & colchici.

Baccæ.
Brachia.
Bulbi.

C

Cachryes sunt oblonga panicularum modo nucamenta, quæ squamatis cõpacta propendent è ramis. Crescũt hyeme, uere dehiscũt in flauescentes squamulas, & folio prodeunte, decidunt: qualia in abiete, picea, & alijs permultis uidere licet. Plinius pilulas nominat. Calathus est rectus turbo, hoc est, id quod ex angustijs in latitudinem se diffundit. Calathi effigiem planè referunt flores liliorũ.

Cachryes.
Calathus.

Calyx folliculus est, quo flos primũ, mox feminis fetus clauditur. Capillamenta particula teretes & oblongæ in capilli modũ extenuata dicuntur. Caput est id quod sursum deorsum uel in globũ extuberat, aut in orbem glomeratur. Si magnitudine cesserit, capitulũ nominat. Extremã tamen uitis partem caput etiam uocant, id est, ultimũ & productissimũ flagellum. Capreoli sunt coliculi in ortu ueluti cincinnidã in ipsis pampinis tenerioribus apparentes, quibus uitis ueluti manibus quibusdam adminicula cõplectitur, ac cõprehendit. It enim uel utitem teneant, serpunt ad locum capiendum: unde à capiendi capreoli dicti sunt. Caro dicitur id quod cortici subest.

Calyx.
Capillamenta.
Caput.
Capreoli.

Caudex dicitur in arboribus & fruticibus, id quod à radice supra terrã simplex assurgit, & in quod à radice fertur alimonia. Caulis

Caro.
Caudex.
Caulis.

uerò idem quod supra solū simplex profilit in herbis nominat. Sic utiq; caudex ad frutices & arbores, caulis ad herbas duntaxat pertinet,

Ceruis. Ceruis est pars illa à capitis radicibus pro diens, prelonga, teresq; sic dicta, quod in colli speciem figuretur. **Cyathus** Græcis *κῆρ τῶν ἄνθεων*, id est, à fundendo dictus, est duodecima pars sextarij. **Cymæ** herbarū delicatioris tenioresq; colliculi, quos à prima germinatione, & in summa stirpe proferūt. Nam cum uer num tempus appetit, primo quoq; foliorū pul lularu, præclusis adhuc florū calycibus, quos- dam quasi turiones, olus subministrat, in qui- bus floris primū, mox seminis foetus cōcludi- tur. **Cirri** sunt capillamenta quæ contorta crispanitur. **Clauiculæ** colliculi sunt, quibus quasi manib, proreptans uitis adminicula cō- prehendit. **Coma** est quicquid hilari uenu- state criniū modo, summa ramorū uel colicu- lorum exornat. **Congius**, qui græcè *κῆρ* dici- tur, sex sextariorū capax mensura est. Eadem etiā congiariū appellat. **Conus** Græcis, uel pyramis, est inuerfus turbo, hoc est, id quod ex latitudine in arcū protrahitur ac fastigia- tur. Cui calathus, ut diximus, cōtrarius existit.

Cor. Cor est quod in medio ligni residet, & tertiu à cortice cōtinetur, uelut in ofsibus medulla.

Matrix. Ab alijs matrix, à nōnullis medulla nominat.

Corymbus Corymbus est hederarū uua dependentib, acinis coacta. Transferē tamen ad multos her barū fructus. **Cortex** pars est ultima à sub- iecto corpore separabilis, ueluti crusta quædā ad tegendū data. **Cotyle** uox est in Græcia nata, nam Romani hemina uocabulo utunt.

Crenæ. Vide in dictione Hemina. **Crenæ** sunt quæ dam in extremis oris incisuræ, à quibus crena- ta herbarū folia uocantur, hoc est, serrata, per ambitūq; secta. **Cubitus** est mensura quāta patet à cubiti flexura usq; ad summū mediū di- gitū, quæ sex palmis digitis uel uiginti quatuor cōstat. **Culmus** frumētū calamus est, qui spi- cam sustinet.

D

Decussis. **D**ecussis antiquis ad x literæ figurā fie- bat, quæ apud Latinos decem significat. Hinc decussari est in speciem literæ x diduci.

Dilutum. Dilutū dicitur, quod est mixtū; unde uinum aqua mixtū dicitur dilutū. Dilutum uerò sub stantiuū factū, est id liquidum, in quo aliquid certo tempore maceratū & infusum fuit; ut si in uas uini appositū absinthiū fuerit, deinde post interiectū tempus abstractū, id uinum ab sinthij dilutū uocatur. **Dodrans** est men- sura duodenū digitorū. Aliàs palmus maior La- tinis, & Græcis *καρβαν* dicitur. Dodrantalis itaq; cauliculus uocatur, qui longitudine duo- denos æquat digitos.

E

Echinus. **E**chinus est quicquid numerosa congerie faculeorum stipatur, siue tegmen, siue cap- put, siue cacumē fuerit; sic dictus quod globo

so spinarū agmine maris herinaceū mentiat.

F

Fibra capillamētis germanæ sunt, quæ her- barum arborumq; minutiores sunt radi- culæ, in quas uelut extremas, crassiores effuse sparguntur. **Fimbriæ** sunt uestium extremi- tates, à quibus & fimbriata folia dicuntur, quæ in ambitu in quasdam fimbrias exeunt.

Flagella dicuntur cymæ arborum & ipsarū summæ partes, quæ ad cuiusq; uenti flatū mo- uentur; unde etiam nomen traxerunt ab eo quod flatibus perantur. **Flagella** etiam sunt ui- tium ramū oblongiores, & productiores, alijs tamen minores, ab ipsis brachijs sursum ascen- dentes: dicta tabella prius, à uenti flatu scilicet. **Folliculus** theca rei cuiuslibet, quæ gra- num uel semen cōtinet inuolutum. Sic mem- branosa cutis acini folliculus dicitur. **Fru- ctus**, quod carne & semine cōpactum est. Fre- quenter tamen pro eo, quod in uolucro perin- de quasi carne & semine coactum est, accipi so- let. **Frutex** est quod à radice caudice multi- plicis, ramofumq; sese attollit, ut rubus.

Frons interdū pro ramo ponitur. **Proprie** tamen dicitur id quod ipse ramus circunqua- que producit, multa interdū folia habens, & non nihil corticis, ac ueluti cauliculi.

G

Gemma in uite idē est quod oculus, quia ueluti ocellus quidā cōspiciuus, aut gem- ma quædam excellens conspici possit, cum primū ē uite prodit, aut sarmento. Hæc in eun- te uere sese ostendit, & ab ea primū flos, deinde fructus prodit tam in ipsis uitibus, quam arbo- ribus. **Geniculi** siue genicula sunt nodi qui in herbis, aut leguminibus, aut etiam subfruti- cibus apparent. Sic geniculatæ radices nomi- nantur, quæ nodis quibusdā interstinctæ pro- tuberāt, rotundæ & leuiter capitulatæ. **Glu- ma** est folliculus grani quod in spica continet, uel grani theca. **Grossi** appellātur fici, quæ nō maturescūt. Priuatim tamen in bifera fico eas intelligunt, quæ per messes maturantur. Has grossulos Græci uocant *δράκιδος*.

H

Hemina Romana uox est, ex græco quidē *ἡμισ*, quod dimidia sextarij pars sit, deri- uata. Græcis *νοτῆλις* nominatur. Caput uncias decem mensurales, ut copiose in annotationi- bus nostris in quartū de uenda sanitate librū Galeni demonstrauimus. **Herba** est quod à ra- dice foliatum, sine caudice prouenit, sæpiusq; semen in caule fert.

I

Internodiū, quod inter artus uel genicula mediū intercedit, dici cōsueuit. **Interue- niū**, quod inter uenas intercipiē. **Iuba** est arūdinacea coma effusa, qualis in milio est; me- taphora desumpta à iubis, hoc est crinibus ani- maliū à collo pendentib. **Iulus** tam Græcis *ἴλος* Latinis est quod in corylo cōpactilli callo race- matim

Fibra

Fimbriæ

Flagella

Folliculus

Fructus

Frutex

Frons

Gemma

Geniculi

Glu- ma

Grossi

Hemina

Herba

Internodiū

Interueniū

Iuba

Iulus

matim

E X P L I C A T I O.

matim coliaeret, & ueluti prælongus uermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructum præcedit.

L

Lachryma est is humor, qui statim defecto caudice, uel ramo, aut tantum ipso ligno, profilit, & apparet. Lanugo in herbis atq; arboribus lanata quædam est hirsuties, qua folia, coliculiq; canescunt. Liber pars corticis interior quæ ligno prescius adhæret. Is qui bus scribimus libris nomen dedit. Libra Romana capit uncias duodecim mensurales, Ligula. Ligula quarta pars cyathi dicitur, hoc est, semuncia, demptis scilicet duobus scriptulis. Loculameta. Loculameta sunt seminũ in uolucra, quæ ueluti parua capsula ea recludunt. Lomentum. Lomentum, fabarum farina est. Lacinia. Lacinia: partes sunt extremæ particulatim decoris causa concisa, orarumq; summarum casura. Inde folia membratim per flexuras digesta, uel natius segminibus discretæ, lacinia uocantur. Sunt tamen qui laciniosum pro sinuoso usurpent.

M

Mallicorium est mali punici putamen. Malleolus. Malleolus nouellus est palmes in natus prioris anni flagello, cognominatus a similitudineret, quod in ea parte qua deciditur ex uetere sarmento, prominens utrinq; malleoli speciem præbet. Vel, quod capillatus utrinq; & furcatus solebat ferri. Matrix, uide in dictione Cor. Medulla, uide ibidem. Mucro. Mucro est acumen in quod pars quæcunque desinit. Sic foliorum mutorũ, siliquarum quarumdam, & spinarum omnium extrema in mucronem acuminantur. Mucosus. Mucosus est id quod in ipsa corticis superficie quarundam arborum lanuginosum apparet, ueluti cani quidam ipsarum arborum uilli. In quibusdam etiam quædam ipsarum arborum quæ uisitur uillosa flosculorum congeries, quæ quod confercta sit densa q; floreat, mucosus dici consueuit; ut in Muscaria. Ligustro, & compluribus alijs. Muscaria sunt in orbem radiata herbarũ comæ, cacuminaq; in fascies coacta; a stabri similitudine, cuius uentilatu muscæ cõuiuis abigunt, dicta.

N

Nucamenta dicuntur ea quæ callo squamatim compactili pendunt è ramis nucum, roborum, picearum; sic dicta, quod sint quasi quædam naturæ rudimenta, pineam nucem facere condiscens.

O

Oculus gemmula illa in herbarũ furculis, primum germinationis argumentũ dicitur.

P

Palma dicitur maius uitis flagellum, unde nascuntur uua. Palmus ueteribus duplex fuit. Minor digitorum quatuor habebatur, Græcis *πεντακτύλιος* uocatus, Maior digitorũ


duodecim, *αββαύη* Græcis dictus. Palmi-tes dicuntur qui è stirpibus ac furculis quotannis prodeunt; sic nominata, quod in modum humanarũ palmarum uirgulas quasi digitos ædant. Pampini sunt frondentium ramusculorum comæ coliculiq; fructum fontes, & ab impendente uindictantes iniuria. Hinc pampinare, est pampinos superfluos ex uinea detrahere, posteaquã fronduit. Panicula dici potest quicquid sublonga uel subrotunda effigie tumet, ut quæ pendet è picearum ramis. Lanosam quoq; comã in milio, panico, arundine, & qualem in aruis complures herbae, & in palustribus iunci gerunt, Latini paniculam dixere. Pappus tam Græcis quàm Latinis est lanugo ex floribus aut fructibus, decidua. Sic etiam lanosi quidam uilli, qui deslorescentibus aliquot herbis remanent, & postmodum in auras euanescent, pappi sunt, ut in fenecione, soncho, & plerisq; alijs fit. Pediculus, siue quod idem habet, Periolus, id est quo foliũ, fructus, aut flos dependet. Pedamenta quibus stat recta uinea dicuntur, hoc est, quibus ueluti pedibus nititur. Nominant etiam à quibusdam pedamina. Pitula, uide Cachrys. Pyramis, uide Conus. Propago dicitur uitis uetula depressa, atq; in terrã per inflexos arcus submersa, ut ex una plures emergant. Pulpa in arboribus est, quod nos in animalium corporibus musculum appellamus. Puluinus est quod inter sulcos eminulũ protumet, sic dictus quod quandam referat puluinorum in quibus sedemus similitudinem.

Q

Quincuncialis figura, eius figuræ quæ decussim antiquis significabat, media est. Fiebat uerò decussis ad x literę formam, quæ quidem apud Latinos decem significat. Atq; hæc si per medium secetur, remanebit v figuræ, quæ quinarium numerũ, atque adeo quincuncem demonstrat. Sed hæc quidem multoties tum superius, tum etiam inferius multiplicata, figuram facit, quæ quincuncialis appellatur. Talem planè Trichomanis cauliculi efficiunt. Typos formæ quincuncis, & quincuncialis ordinis, subiicere placuit.

Quincunx.

Ordo quincuncialis.



R

Racemus pro uua accipitur. Neq; tantũ ipse uitis est, sed etiam hedera, & aliarũ herbarũ, aut fruticum uuas quasdam producentiũ. Dicitur etiam ramosum id, quo dependunt acini. Rami sunt, qui in caule fissi multiplices sparguntur.

Sarmenta. Sarmenta praelongæ sunt vitium uirgule, in quas uitis luxurians spargitur; hoc est, uitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tam dum sunt in ipsa uite, quam dum exsecta, & exempta sunt. Scapus est caulis qui in styli modum sursum prorepat, aut in altum fertur, ducta à columnaribus scapis similitudine.

Scapus. Scopus ramosum id, quo dependet acini.

Scopus. Sefqui uocabulum cum aliqua mensura uel modi, uel numeri, uel temporis collocatū, non integrum modò id cui iungitur explicat, sed integrum & semis. Sic sequilibra, libram unam & semis significat, Sefquimensis integrum mensuri dimidio, Sextarius capit uncias uiginti mensurales. Siliqua tegumentum est, quo uel grana leguminū, uel herbarū semina concluduntur. Nam non modò legumina, sed & complures quoq; & herbaræ & frutices siliquas proferunt. Sinus alarum caua sunt. Spica est quod culmus extulit. Hanc antiquitus rustici specam uocabant, & à spe uidetur nominata: eam enim quod sperant fore, ferunt, Tria uerò continet, granum, glumam, & aristam. Spica mutica est quæ non habet aristam. Et mutica, quasi mutilla nominatur. Spongiæ antiqui olitores uocarunt radículas illigatas & connexas. Hinc Asparagi satiuū & altilis radices multæ irretitæ capillamentis coalescentes, & inter se implicatæ, ac quasi in unitatem coeuntes spongiolæ, & spongiæ spongiolæq; appellantur. Stamina sunt qui in medio calycis erumpunt apices; sic dicta, quod ueluti filamenta ab intimo floris sinu prosiliant. Stipulæ folia uel culmū ambientia. Striæ partes sunt quædam quæ protuberant & eminent. Hinc striatus caulis, qui huiusmodi striis est præditus, aut striaturis exasperatus. Strigiles etiam, si Vitruuius credimus, appellantur.

Stolones. Stolones appellantur coliculorum soboles, inutilesq; è radicibus fruticatio. Suffrutices sunt quæ cō pluribus ramulis furculisq; lignosis scænt, sed minutis constant folijs.

Surculus. Surculus, quod ex ramis simplex ac induiduum oritur, estq; uelut germen quoddam ex ipso trunco uel caudice productum.

Thyrus. Thyrsus est caulis, idq; nomen sibi uendicauit, quod uirgulæ in modū, uel reli cōtitudinem consurgat. Tomentū Latinis omne id quo culcitra ad molliorem & calidiorē quietem infarciantur, dicitur, siue id lana sit siue pluma, siue quod uoluerit aliquis, excipiendis molliter & fouendis calore corporib; nostris aptum. Sic Dictamnifolia, quod mollia uidentur esse, tomentitia & lanea dicuntur à Dioscoride, hoc est, γναφαλοειδής. Tori prominentes partium calli, & in se pulparum mo-

do collecti nominantur. Græci κωνύλλος uocant. Hinc κωνύλλωδης, id est, torosus, quod idem Latinis est ac nodi formā præ se ferens.

Triens quatuor cyathi. Tunica est tenuis cortex & ueluti membranaceus, quo uel arbor, uel radix inuestitur. Sic cape folliculis est tunicatum. Turbo dicitur quicquid ex acumine tendens in amplius spaciā. Hinc turbinatum, quod ex angusto continenter in latius prodit. Sic turbinata conspiciuntur pyrorū forma. Per multa etiam herbarum folia in mucronem turbinantur. Turiones sunt tene ritates summitatū ipsarum arborum, quæ singulis annis cresunt. Topiarium opus est quod ex arbore, frutice, uel herba ad decorem componitur in testudines aut cameras fornicatum. Hinc topiariæ dici merentur arbores uel herba quæ nimirum huic operi, quod flexiles sunt, ac suo lentore sequaces, accommodantur.

Triens.
Tunica.

Turbo

Turiones.

Topiarium

V

Vascula, seminū inuolucra sunt. Vænae sunt quæ in plantarū folijs apparent, & ramulos & humorē habentes. Vermiculatum quod rosæ modo, quasi purpuriflo, rutilat, dicitur. Verticillum florum uel foliorū ambitus, qui coliculos aut ramulos herbarum coronat, existit; ab instrumenti muliebris similitudine dictum, quod fuso uertendi gratia solitum est adhiberi. Vinacæ, grana sunt acinorum, γίγναρα Græcis nominant, quæ pressis uuis cum folliculo abijciuntur.

Vascula.

Væna.

Vermicula-
latum.

Verticillum.

Vinacæ.

Virga est quæ ex radicibus, aut caudicis lateribus exit. A nonnullis uirgæ appellatæ sunt soboles. Virgultum furculus is est, qui terræ cōmittitur, ut in arborē insurgat. Viticulae non palmites aut sarmenta sunt, sed flagella quæ uitis modo reptantia longè lateq; uagantur, ac uicinos frutices nacta sic intrincant eos, ut ijs perinde quasi pedamini bus abutantur; uel scandentia suis irretitū clauiculis, quibus quasi digitis hærent, quales in cucumeribus, cucurbitis, & plerisq; alijs inueniuntur.

Virga.

Virgultum

Viticula.

Vimbella est floris seminis ue pedamentū, in plures digestum longiores pediculos, qui si mul ex fastigio eodem orti, in latius continuo radiantur, singulisq; uel florem, uel semē sustinent, in orbem circumactum, Græci hunc floris habitum σινδύριον, Latini uerò quoniā umbellæ, qua mulieres uultum uindictant à sole, & æstum arcent, circinatā effigiem gerit, umbellam dixerunt. Umbilicus id in pomis est, quod in eis medium uel prominet, uel conditur. Vngues in rosæ & foliatis floribus intellexerunt ueteres, imas suorum foliorum partes, quibus in capite suo cohærent, decolorsq; dependent. Vel breuius; Vnguis infima pars foliorum rosæ alba appellatur.

Vimbella.

Umbilicus.

Vngues.

GRÆCARVM NOMENCLATIONVM INDEX: cuius numerus paginam, litera frequens eiuſdem paginae partem, designat. Picturas, uel ante, uel post capita locatas, uel hīdem inferias repe-



Α
 Βρότονου Β. C 81. A
 ἄγρια κάρδα-
 μου 324. D
 ἄγρωσις 135. A
 ἄδιαντον 81. A
 ἄδιον 191. A
 ἄειζον 31. A
 ἀέζων ἀγριου 799. B
 αἰγοκόρη 797. A
 αἶσα 128. C
 ἀκαλύφη 105. A
 ἀκασθῶ, ἢ ἀκασθα 51. D
 ἀκασθα λυκία 54. B
 ἀκόνιτον 86. C
 ἀκρονον 13. A
 ἀκτιν 63. A
 ἄλθαία 16. C
 ἄλθισμα 43. C
 ἄλθεια 79. B
 ἀλκυονίδιον 268. C
 ἀλόη 137. A
 ἀλοήνη 20. C
 ἀμαφρακον 582. C. C
 ὄσσ. C
 ἀμαραντῶς 98. C
 ἀμιμ 66. D
 ἀμπελος λυκία 95. A
 ἀμπελῶ μελαίνα 96. D
 ἀμπελῶ οἰνοφύρον 83. B
 ἀναγαλλίς 17. A
 ἀναγαλλίς ἐνυδρον 724. C
 ἀνδροσαμμον 75. A.
 C 830. C
 ἀνδράχην 111. A
 ἀνυθον 29. A
 ἀνθεμίς 24. D
 ἀνθρωπομόρφον 529. A
 ἀνισον 61. A
 ἀνις 60. C
 ἀπαρίνη 51. C
 ἀπιῶ 132. C
 ἀρίστρον 68. C
 ἀριστολογία 89. B
 ἀρκειον 71. B
 ἀρκεύθος ἢ ἀρκευθίς 77. A
 ἀρνώγλωσσον 40. A
 ἀρον 68. C
 ἀρτεμισία 48. A

Β
 ἄστρον 9. C
 ἀσκληπίας 130. C
 ἀσπερον, ἢ ἀσπεροειδές 73. B
 βασιλεύον 59. C
 ἀσπερῶν 133. A
 ἄστρον 448. C
 ἀσφύδελον 114. D
 ἀστροκτύλις 123. A
 ἀστράφαξις 120. C
 ἀφάκη 109. B
 ἀψίνθιον 3. A

Β
 Βαλωτή 153. B
 βαρύτρον 149. A
 βασιλικόν 546. D
 βάτῶ 151. A
 βατρύμιον 155. A
 Βήμιον 139. B
 Βίσιον 171. A
 Βλήχιον 197. A
 Βλήπιον 173. A
 Βολβος ἀγριον 168. D
 βοτάνιον ἕρμα 474. C
 βότρως 178. C
 βοσάνιον 133. A
 βογλωσσον 141. B
 βόσκρος 797. A
 βοσκία 175. A
 βοσφάκιον 143. A
 βρέβυς 149. A
 Βρύον 165. A
 βρυονία 95. A
 βρώμιος 184. C

Γ
 Γαλιέθδον 193. A
 γαλιόσις 193. A
 γαλλιον, ἢ γαλλέσιον, ἢ γαλατίον 195. B
 γαυτινή 192. A
 γορδάνιον 210. C
 γίσις σέφανος 877. A
 γιγίδιον 217. A
 γιλιχον 197. A
 γλυκνύριζα 191. A
 γλυκνύσιον 201. A
 γναφάκιον 221. A
 γογγύλη ἢ γογγυλίς 211. A

Δ
 Διασώνιον 43. C
 δαίσιος 230. D
 δάκρυ ἁλεξανδρεια, ἢ ἰδαία 237. A
 διαφροειδές 226. D
 διὸς Βαλάνος 376. D
 δήλακος 223. A
 δρακοντία μεγαλή, ἢ δρακόντι μέγαρα 234. D
 δρυς 228. C
 δνύσομον 775. B

Ε
 Εβρόντρον 81. A
 ἐβίσκος 16. C
 ἐλατήριον 704. D
 ἐλελίσφακον 247. A
 ἐλγίον 241. A
 ἐλοσέλιον 271. A
 ἐλίχυσον 98. C
 ἐλεβρος λυκίος 271. A
 ἐλίση κισάμπυλος 259. A
 ἐλίση 278. C
 ἐλυμος 252. C
 ἐμπρονον 729. B
 ἑθροκάρπτον 237. A
 ἐπιδόφιλον 259. B
 ἐρεβίνθος 266. C
 ἐρεβιν 254. D
 ἐρπυλλον 250. C
 ἐρυθρόδονον 279. A
 ἐρύσιμον 256. C
 ἔρωμον 261. A
 ἐυπατώσιον, ἢ ἕπατώσιον 243. A
 ἐυφροσώνη 245. A
 ἐφυδρον 324. C
 ἐφημέρον 239. A
 C 358. C
 ἔχιον 268. C

Ζ
 Ζεϊά 282. C
 Ζεϊνιον 128. C

Η
 Ηλιόσιος 287. A
 ἡμιονίτις 295. A
 ἡπατώσιον 243. A
 ἡεργίον 285. A
 ἡεργιον 297. A
 Θ
 Θέρμος ἡμέρος 308. C
 θλάσι, ἢ θλασσιδίου 305. A
 θείδαξ 298. C
 θύαρος 128. C
 θύμβρα 303. A
 θύμιος 826. C

Ι
 Ἰβόσις 324. D
 ἰβίσκος 16. C
 ἰερα βοτάνη 591. A
 ἰεράκιον 318. D
 ἰέσις 328. D
 ἰόν πορφυροῶν 310. D
 ἰπποσέλιον 326. D
 ἰπποσις 321. B
 ἰεις 316. C
 ἰεις ἀγρία 239. A
 ἰσάτις 330. C
 ἰχνας 132. C
 ἰτάς 333. A
 ἰχθυότρον 450. C

Κ
 Καλαμίνθη 433. A
 καλλιτρονον 81. A
 κωνάσις 392. C
 κωπινῶ 337. B
 καρδίαιον 301. B
 καρδαιομωτική 324. D
 κάρτος 397. A
 κάρυς ποικίλη 397. B
 κάρυον βασιλικόν 378. C
 κασσίνθα 347. A
 κάσωνα 376. D
 κέχρητος 410. D
 κενταύριον μακρόν 386. C
 κερσαίτις 797. A
 κερσατος 426. C
 κέρσον 349. B
 κίνη ἢ κρότων 339. A
 κίρκια 529. A
 κίσιον 341. A
 κισός 421. A
 κισματίς διαφροειδής 359. A
 κινδύ 105. A
 κνίκος 410. C
 κνίκος ἀγρία 123. A
 κοκκιμυλία 402. C
 κοκκιμυλία ἐδάδιμος 357. A
 κοκκιμυλίς 373. A
 κοκκίται 445. A
 κοκκιον, ἢ ἐφημέρον 358. C
 κομῆ 820. D
 κόσιον ἢ κοσιάνον 344. C
 κορωνόπιος 448. C
 κωσιον 405. A
 κωσικῆ ἢ ἡμέρος 412. D
 κωσική 437. B
 κωσιον 363. B
 κρόκος 442. C
 κρόμμιον 429. A
 κρότων 339. A
 κύμας 388. C
 κύμας 427. A
 κυδιανία μυλία 375. A
 κυκλάμιος 450. C
 κυνία 443. A
 κυνιόγλωσσον 407. A
 κυνοκράμβη 443. A
 κυνός ορχίς 558. C
 κυπρότος ἢ κυπριος 452. D

Λ
 Λαγώπιος 493. A
 λαθύσις 454. D
 λαδοπιον 460. D
 λάσιξ 495. A
 λαμιονιον 466. D
 λαμιον 363. B
 λαχην 472. C

GRAECARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

λίανθ^Θ 628. C
 λεπιδιον 483. A
 λεπιδόκρυα 397. B
 λδύκωνον 563. A
 λδυκόιον διασκοειδης 456. D
 λδυκόιον θεοφράσ^ς 485. A
 λιβανωτίς. 477. A
 λιβάστρομον 488. C
 λιμνήσιον καὶ λιμναίου 386. C
 λιπόζωσις 474. C
 λιπόζωσις ἀγρια ἀβρίλιω 443. A
 λίνου 470. C
 λόπιμον 376. D
 λυσιμάχιον 490. C

M

Μαλαχίη 510. C
 μανδραγόρας 529. A
 μάραθρον 500. C
 μέλαν παράσιον 153. B
 μελαυθίον 502. D
 μελιλωτός 526. C
 μελισσόφυλλον, ἢ μελι-
 φυλλον 497. A
 μήκων ἡμφο^Θ 517. B
 μήκων ἰσραηλῆτις 521. A
 μήκων ῥοιῆς 514. D
 μίλαξ 717. B
 μίνθη 287. A
 μορέα 521. B
 μυελικα 512. C
 μύρρις ἢ μύρρα 524. D

N

Ναπυ 537. A
 ναρδ^Θ ἀγρια 855. B
 νεκίον 542. C
 νυμφαία 534. C

Ξ

Ξανθίον 578. D

O

Οἶον 575. A
 οἶνονθη 563. A
 οἶνον 546. D
 ὀμφαλόκρηπ^Θ 51. C
 ὄξυάκωνθα 542. D
 ὄξυς 565. A
 ὄροσέλινον 573. A
 ὄριγαν^Θ 551. A
 ὄρινον 567. A
 ὄροθ^Θ 570. C
 ὄσους 544. D
 ὄρχις 558. C
 ὄρχις σεραπίαις 561. A
 ὀριόγλωσσον 578. C

Π

Παιονία 201. A
 παρβήριον 582. C
 πηγάφυλλον 622. D

πῆπλ^Θ 604. C
 πωρδίνιον 278. C
 πημιλίμινον 645. A
 πημιδρέωμ 591. A
 πωρσικὴ μιλία 602. C
 πεπασίτης 643. B
 πετροσέλινον 654. C
 πετροσέλινον ἀγριον 573. A
 πωδικέλιον^Θ 598. D
 πηγῆγονον κηπυτόμ 615. B
 πῆσον 628. C
 πῆσα 474. C
 πολυγόνατον 548. C
 πολυγόνον ἀβρίλιω 613. B
 πολυπόδιον 587. A
 πολυπόρον 81. A
 ποταμογέτωμ 652. C
 πρᾶσιον 589. A
 πρᾶσιον μέλιον 153. B
 πρᾶσον 633. A
 προσώπιον, ἢ προσωπίς. 71. B
 πῆρικη 638. C
 πωτόρις, ἢ πῆριον, 594. D
 πῆξ^Θ 643. A
 πῆριον 640. C
 πῆριος 647. B

P

Ραφαν^Θ, ἢ ῥαφανίς. 658. D
 ῥοδιόριξ 664. C
 ῥοδιόριξ 542. C
 ῥοδιόριξ 542. C
 ῥοδιόριξ 656. C

Σ

Σαμφύλον 666. C
 σαρδανία βαλάνος 376. D
 σαρξίφραγον, ἢ σαρξίφα-
 γον 729. B
 σατυρίον τρίφυλλον 709. B
 σαῦν^Θ βασιλικόν. 711. B
 σέλινον κηπῆριον 743. A
 σέρις 676. C
 σέσελι κηπῆριον 809. B
 σέσελι τὸ μαοσαλιωτι-
 κόν 787. A
 σόστλον 804. D
 σιδιρίτης 770. C
 σίκυς, ἢ σίκυ^Θ ἡμφο^Θ 702. C
 σίκυς ἀγριας 704. D
 σιλῆιον 762. C
 σίνπι 537. A
 σίνπι ἀγριον 305. A
 σίον 724. C
 σίκερον 750. C
 σισυμβειον 721. A

σάκλα 781. A
 σκόλιμος 791. A
 σκόροδον 775. B
 σκόροδον 735. A
 σμίλαξ λεία 719. A
 σμίλαξ τραχέα 717. B
 σμίλαξ κηπῆρια 707. A
 σμύριον 759. B
 σόγγιτης 318. D
 σόγγος 673. A
 σπικηρία 668. C
 σπᾶρον, ἢ σπᾶριον 759. A
 σπᾶριον 295. A
 σπαρόντιος 419. A
 σάκλις ἀγρια 785. A
 σαφυλίνας 685. A
 σαχίς 765. B
 σαχίτης 652. C
 σιγᾶς 777. B
 στρατιώτης ὀχλιόφυλλος 726. C
 σρᾶριον 779. A
 σρῆγιος 691. A
 συλαμῆνια 521. B
 συκῆ ἡμφο^ς 754. C
 σύμφουτον 694. C
 χροισσροφος 392. C

T

Τελέλιον 799. B
 τδύλιον 828. C
 τδύτλον 804. D
 τήλις 797. A
 τήνυμάλιος 810. C
 τέρδιον, ἢ τέρδιον 809. B
 τραγόπωρον 820. D
 τριόρχις 561. A
 τρίφυλλον 816. C
 τριφυλλὸν ἡμφο^ς 820. C
 τριχόμανδρ 795. A
 τριχίος 691. A
 τύφι 822. C

Υ

Υακινθος 834. C
 ὑδροπέπονδι 842. C
 ὑδροσέλινον 271. A
 ὑδονύκμος 832. C
 ὑπῆριον 830. C
 ὑσώπος 840. C

Φ

Φάκος, ἢ φακί 858. D
 φάσγανον 578. D
 φέλιον 863. A
 φελαυθρῶπος 51. C
 φλόμος 845. A
 φᾶς 855. B.

Χ

Χαμαίικη 63. B
 χαμαίβάλανος 132. B

χαμαίικη 868. C
 χαμαίικη 877. A
 χαμαίικη 873. B
 χαμαίικη 880. C
 χαμαίικη 882. C
 χαμαίικη 42. D. C
 χαμαίικη 582. C
 χαμαίικη 884. C
 χαμαίικη 830. C
 χαμαίικη 324. C
 χαμαίικη 864. C
 χαμαίικη 866. C
 χαμαίικη 878. C
 χαμαίικη 120. C

Υ

Υεοδνᾶρδης 889. A
 ψιλλῶρον 95. A
 ψιλλῶρον 887. B
 ψυχοσφορον 349. B

Ω

Ωκμοφᾶς 895. A
 ὠνις 60. C

LATINA-
 RVN APPELLA-
 tionum Index.



Brotonū. 8.c
 Abinthiū. A
 Acanthus, si-
 ue Acantha

A

51. D
 Aconitum 86. D
 Acorum 13. A
 Adiantum 81. A
 Aiga, siue Abiga 884. C
 Aizoön 31. A
 Alcea 79. B
 Alciacum 278. C
 Alisma 43. C
 Allium 735. A
 Aloë 137. A
 Althæa 16. C
 Amarcus 666. C
 Amarantus 98. C
 Ambubeia 676. C
 Ammi 66. D
 Anagallis 17. A
 Anagallis aquatica 724. C
 Androsamon 75. A
 Anethum 29. A
 Anethi uaccini 143. B
 Angelica 126. C
 Anguria 702. C
 Anisum 61. A
 Anonis 60. C
 Anthemis 24. D
 Aparine 51. C
 Aphaca 676. D
 Apha 109. B
 Apiastrum 155. A
 Apium agreste 155. A
 Apium hortense 743. A
 Apium montanū 573. A
 Apium palustre 271. A
 Apium faxatile 654. C
 Apios

LATINARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

Apios	132.C	Cicerbita	673.A	Fenumgracum	797.A	Leporinus pes	493.A
Apollinaris	832.C	Cicuta	405.A	Fontalis	652.C	Leucoion Diofcoridis	
Aristolochia	89.B	Cinara	791.A	Fragaria	854.C	456.D	
Armoracia	661.A	Cincinnatiis	81.A	Fumaria	337.B	Leucoion Theophrasti	
Arnoglossum	40.A	Citrago	497.A	Fufus agrestis	123.A	485.A	
Artemisia	48.A	Clematis Daphnoides		G			
Arum feu aris	68.D	359.A		GAleopsis	193.A	Lolium	128.C
Afarum	9.B	Cnicus & cneus,	410.C	Gallion	195.B	Lichen	472.C
Afclepias	130.C	Cnicus fyluefter	123.A	Geminalis	567.A	Ligufrum	479.A
Afcyrum	73.B	Colubrina	234.D	Genifta	219.A	Lilium	363.B
Asparagus	59.C	Columbaris feu colum-		Geniftella	219.A	Limonion	466.D
Aphodelus	114.D	bina	591.A	Gentiana	199.A	Lingua canina	407.A
After atticus	133.A	Colutea	445.A	Geranium	210.C	Lingua ferpentina	578.C
Atractylis	123.A	Coma	820.D	Gingidium	217.A	Linum	470.C
Atriplex	120.C	Confolida media	390.D	Gith	502.D	Lithofpermum	488.C
Auena	184.C	Confolida minor	145.B	Gofpium	580.C	Lunaria minor	481.A
Auricula muris	20.C	Conuolulus	259.A	Gramen	135.A	Lupinus fatius	305.C
B		Corion feu coriannon		H			
Ballote	153.B	344.C		HAlicacabum	691.A	Lychnitis	845.B
Balfamine	188.C	Corona regia	526.C	Hedera	421.A	Lycogtonum	86.C
Barba caprina	180.C	Corona Veneris	721.A	Hedera terrefteris	877.A	Lyfimachia	490.C
Batrachium	155.A	Cotonea mâlus	375.A	Hedypnois	676.C	M	
Beta	804.D	Crambe	412.D	Helxine	278.C	MAiorana	666.C
Beta fylueftris	466.D	Crifta gallinacea	591.A	Helxine ciffapelos	259.A	Mâla infana	532.C
Bellis fiue bellius	145.A	Crocus	442.C	Hemionitis	295.A	Malua	510.C
Betonica	349.B. & 351.B	Cruciatia	419.A	Hepatorium	243.A	Mâlus cotonea	375.A
Blattaria	182.C	Cucumis, feu cucumer		Hiberis	324.D	Marrubium	589.A
Blitum fiue blitius	173.A	702.C		Hieracium	318.D	Melilotus	526.C
Botrys	178.C	Cucumis anguino	704.D	Hierobotane	591.A	Melones	702.C
Bouis lingua	141.B	Cucurbita	367.A	Hirci barba	820.D	Mentha	285.A
Brâfica fatiua	412.D	Cucurbita fylueftris		Hirudinaria	400.D	Menthafrum	287.A
Bubula lingua	141.B	373.A		Hordeum	437.B	Mercurialis	474.C
Bugloflum	141.B	Cunila	303.A	Hordeum diftichū	437.B	Mercurialis fylueftris	
Buglofū magnū	341.A	Cyanus	427.A	Hordeum polyftichum		mas	443.A
Bulbus fylueftris	168.D	Cydonia	375.A	437.B		Milium	410.D
& 358.C		Cynia	443.A	Hyacinthus	834.C	Millefolium	582.C
Bupthalmum	143.A	Cynoforchis	558.C	Hydropiper	842.C	Mors uermium	5.B
Buxus	643.A	Cyperus & cypir	452.D	Hyofcyamus	832.C	Morus	521.B
C		D		Hypericum	830.C	Myrice	512.C
CA lamintha	433.A	D Amaffonium	43.C	Hyfopus	840.C	Myrrhis	524.D
Callitrichum	81.A	Daphnoides	226.D	I			
Caltha uel calthula,	381.B	Daucus	230.D	I Biga	884.C	N apus	175.A
Campanula	431.B	Dolichi	707.B	Ibifcus	16.C	Napus bunias fatius &	
Canina brâfica	443.A	Dracunculus maior		Illecebra	799.B	fylueftris	175.A
Canina mâlus	529.A	234.D		Inguinalis	133.A	Nardus fylueftris	855.B
Cannabis	392.C	Dulcis radix	191.A	Intubus	676.C	Nafturtiū agrefte	324.D
Capillaris	795.A	E		Inula	241.A	Nafturtium fatium	
Capfella	303.A	E Bifcus	16.C	Iouis glans	376.D	361.B	
Carduus	791.A	Ebulus	63.B	Irion	254.C	Nepeta	433.A
Carduus Veneris	223.A	Echium	263.C	Iris	316.C	Nerion	542.C
Carduus fuarius	880.C	Elenium	241.A	Iris fylueftris	239.A	Nigella	502.D
Carduus niger	882.C	Elleborus albus	271.A	Iſatis	330.C	Nummularia	400.D
Cardiaca	394.C	Elleborus niger adulteri-		Iuglans	378.D	Nux auellana	397.B
Caron uel careum	397.A	nus	276.C	Iuniperus	77.A	Nux Regia & Perfica	
Caryophyllata	383.A	Ephemerū	239.A et 358.C	Iunonis rofa	363.B	378.D	
Cafthua	347.A	Equinalis herba	321.B	L			
Caffa herba	201.A	Equifetum	321.B	L Abrum Veneris,	223.A	Nux caftanea	376.D
Caftanea	376.D	Erica	254.D	Lactaria herba	810.C	Nux Pontica	397.B
Centūmorbia	400.D	Eruca	261.A	Lactuca	298.C	Nymphæa	534.C
Centunculū aut centun-		Eruum	570.C	Lactuca caprina aut ma-		O	
cularis herba	221.A	Eryngium	297.A	rina	810.C	OC imum	546.D
Cepa	429.A	Eupatorium	243.A	Lactuca fyluatica	318.D	Ocimafrum	895.A
Cerafus	426.C	Eupatorium adulterinū		Lamium	468.D	Oenanthe	563.A
Chamaecypariffus,	873.B	264.C		Lanaria herba	779.A	Olus atrum	326.D
Chamaedaphne	359.A	F		Larix feu Larex	495.A	Ononis	60.C
Chamaeleon albus,	880.C	F Aba	388.C	Lafer, feu Laferpitium		Ophiogloflum	578.C
Chamaemelon	24.D	Farrago	767.A	762.C		Ophris	565.B
Chelidonium maius		Farfaria	139.B	Lathyrus	454.D	Orchis	558.C. & 561.A
864.C		Febrifuga	386.C	Lauer	724.C	Origanum	551.A
Chelidonium minus		Fel terræ	386.C	Laurus Alexandrina aut		Orminum	567.A
866.C		Ficus fatiua	754.C	Idæa	237.A	Olyris	542.D
Chryfanthemum	878.C	Filicula	587.A	Lens, fiue lenticula,	858.D	Oxalis	465.A
Cicer	266.C	Filix	594.D	Lepidion	324.D,	Oxyacantha	542.D
		Feniculum	500.C	& 483.A		Oxylapathum	460.D
						Oxys	565.A

L A T I N A R V M N O M E N C L A T I O N V M I N D E X .

P Aeonia 201.A	Salaia 247.A	Thymbra 303.A	Aloë 137.A
Panicum 252.C	Sambucus 63.A	Thymus 826.C	Altaraxacon 676.D
Papauer fatium 517.B	Sanguinalis 613.B.&C	Thryallis 845.B	Altercum 832.C
Papauer corniculatum 521.A	Sanguinaria 448.C	Tilia 863.A	Ameos 66.D
Papauer nigrum 502.D	Sanicula 672.C	Tintinabulū terræ 466.D	Amoris poma 532.C
Papauer rhœas 514.D	Sardiana glans 376.D	Tithymalorum genera plura 810.C	Anethum 29.A
Parthenium 582.C	Satyrium regium 711.B	Tordylon, siue tordylium 809.B	Anisum 61.A
Pastinaca 685.A	Satyrium trifoliū 709.B	Trichomanes 795.A	Apium hortense 743.A
Pedicularis herba 785.A	Saxifraga 729.B	Trifoliū odoratū 816.C	Apium agreste 155.A
Peplos 604.C	Scandulaceum 305.A	Triticum 647.B	Aquilegia 101.B
Pepones 702.C	Scilla 781.A	Trifolium pratense 820.C	Archangelica 468.D
Petafites 643.B	Scorpium 86.C	Trifago 868.C	Arcococus 791.A
Petrofelinum 654.C	Scythica radix 191.A	Trixago palustris 775.B	Aristologia 89.B
Petrofelinum fyluestre 573.A	Secale 767.A	Tuber terræ 450.C	Armoracia 661.A
Perfoliata 631.B	Sedum 31.A	Tusilago 139.B	Artemisia 48.A
Perficaria 631.A	Semen 282.C	Typha 822.C	Arthanita 450.C
Perfica mālus 602.C	Semen lumbricorū 5.B		Artheticae herbae 845.B
Perfonatia 71.B	Seminalis 613.B	V	Artococalus 791.A
Pes anserinus 652.D	Senetio 285.A	Veratrū album 271.A	Afa fetida 762.D
Pes cornicis 448.C	Sentes 151.A	Verbascum 845.A	Afarum 9.B
Peucedanus 598.D	Septifolium 259.B	Verbascula duo 845.B	Aspergula 51.C
Phu 855.B	Seriola 676.C	Verbenaca 591.A	Afprella 321.B
Pinastellus 598.D	Seris 676.C	Vernilagium 882.C	Atriplex 120.C
Piperitis 731.A	Serpentaria 400.D	Vesicaria 691.A	Auena 184.C
Pistolochia 89.B	Serpentaria maior 234.D	Vetonica 349.A	B
Pifum 628.C	Serpyllum 250.C	Vicia 171.A	BAlfamita 721.A
Pituitaria 785.A	Sertula campana 526.C	Victoriola 237.A	Baptifecula 427.A
Plantago 40.A	Seseli Creticum 809.B	Viola 456.D	S.Barbara herba 745.A
Polygonatum 584.C	Seseli Mafiliense 787.A	Viola alba 485.A	Bardana 71.B
Polypodium 587.A	Sideritis prima 770.C	Viola matronalis 312.D	Basilicon 546.D
Polytrichon 628.D	Silicuastrum 731.A	Viola muraria uel purpurea 310.D	Bedegarim, siue Bedeguar 54.B
Polytrichum 81.A	Sinapi 537.A	Vifcum 328.D	Belzuinum 762.D
Porrum 633.A	Sion 724.C	Vitis alba 95.A	Benedicta herba 383.A
Portulaca 111.A	Sifer 750.C	Vitis nigra 96.D	Berberis 542.D
Potamogeton 652.C	Sifymbrium 721.A	Vitis unifera 83.B	Betonica 349.A
Prænestina nux 397.B	Sifymbrium cardamine 721.A	Vmbilicus terræ 450.C	Bipennula 607.B
Proferpinaca 613.B	Sitanium 647.B	Volucrum maius 645.A	Biforta 259.B.
Prunus 402.C	Smilax aspera 717.B	Vrcularis 278.C	& 772.D
Pseudonardus 889.A	Smilax hortensis 707.A	Vrtica 105.A	Bifnaluia 16.C
Pfilothrum 95.A	Smilax lacuis 719.A	Vrtica labeo 193.A	Bombafum 580.C
Pulegium 197.A	Smyrniūm 759.B	Vua crispa 186.C	Bombax 580.C
Pulicaris herba 887.B	Solanum 691.A		Bonifacia 237.A
Pulmonaria 636.C	Solidago 694.C	X	Bonus Henrichus 465.A
Pyrethri fyluestre 638.C	Solis oculus 582.C	XAnthium 578.D	Borrago 141.B
Q	Sonchus 673.A	Xylon 580.C	Branca urfina 51.D
QVercus 228.C	Sorbus 575.A	Z	Brufcandula 165.A
Quinquefolium 622.D	Spartum 759.A	Z Ea 282.C	Bryonia 95.A
R	Spina alba 54.B		Bucheiden 711.B
RAdicula 658.D	Spinacia, uel spinaceum olus 668.C		Buglossa 341.A
Radix 658.D	Spina mollis 341.A		Buglofū fyluestre 268.C
Ranunculus 155.A	Stachys 765.B		Burfa pastoris 305.A
Raphanus 658.D	Sternutamentaria 638.C		C
Raphan ^o fyluestris 132.C	Stichas 777.B (762.C)		CAlamentum 433.A
Rapum 211.A.&C 450.C	Stratiotes millefolia 791.A		Calendula 381.B
Rhodia radix 664.C	Strobilus 791.A		Camomilla 42.D
Rhododendron 542.C	Succifa 714.C		Campana 241.A
Ricinus 339.A	Superciliū terræ 81.A		Campanella 719.A
Rofa 656.C	Sylæ mater 645.A		Canapus 392.C
Rofinaripus 477.A	Symphytum 694.C		Candela regis, quæ & candalaria 845.A
Rubia 279.A	T		Capillus Veneris 81.A
Rubus 151.A	Tamarix 512.C		Caprifolium 645.A
Rumex 460.D	Telephium 799.B		Caputi caules 412.D
Ruta hortensis 615.B	Terminalis 392.C		Cardo fullonū, feu Cardus fullonius 223.A
S	Terræ capillus 81.A		Cardopatum 880.C
SAbina, siue Sauina 149.A	Terræ corona 877.A		Cardu ^o benedict ^o 123.A
Sagminalis herba 591.A	Terreftris mālus 529.A		Carota 685.A
Saliuaris 640.C	Testiculum ferapias, siue orchis 561.A		Cartamum 410.C
Salix 333.A	Teucrium 828.C		Cartam ^o fyluestris 123.A
Salix equinalis 321.B	Teucrion Plinij 295.A		Cartafilago 729.A
	Thlafpi 305.A		Carui 397.A
			Cafrangula 193.A
			Garapu-

INDEX NO
M E N C L A T I O N V M
quibus officinæ se-
plafiariorū, & her-
barij nostri tempo-
ris utuntur.



A
Brotonū. 8.C
Abfinthiū. 3.A
Acorū 13.A
Acus pasto-
ris 210.C
Acetoſa 465.A
Acutella 60.C
Affodillus 114.D
Agrimonia 243.A
& 620.C
Alchimilla 613.A
Alliariſ & alliaria 103.A
Alleluya 565.A
Allium 735.A
Alkakengi 691.A

OFFICINIS SEPLASIARIORVM CONSVETAS NOMENCLATVRAE.

Cataputia maior	339. A	Flos amoris	98. C	Malua	510. C	Phaffoli	707. B
Cataputia minor	454. D	Flos februarij	483. A	Malua uifcum	16. C	Pilofella	604. D
Cauda equina	321. B	Flos omnium menfium	381. B	Mandragora	529. A	Pin-pinella	607. B
Caulis	412. D	Feniculum	500. C	Marrubium nigrum	153. B	Piper Hispanum, feu Indianum	731. A
Cauta	582. C	Feniculus porcinus	598. D	Marrubiaftrum	153. B	Piperitis	483. A
Cepa	429. A	Fenumgræcum	797. A	Materijlua	645. A	Plantago	40. A
Cepa fylueftris & 839. B	168. D	Fortis, feu fortis herba	729. A	Matricaria	48. A	Podagra lini	347. A
Centauria minor	386. C	Fuga dæmonum	830. C	Melanzana	532. C	Polypodium	587. A
Centumnodia	613. B	Fumus terræ	337. B	Melilotum	526. C	Polytrichon	795. A
Centumcapita	297. A	Funis arborum	719. A	Melififfa	497. A	Porrum	633. A
Chamaedrys	868. C	G		Mentha	287. A	Portulaca	111. A
Chærefolium	217. A	G allitrichum	81. B	Mentha aquatica	721. A	Potentilla	620. C
Cheiri	456. D	& 567. A		Mentha Romana	287. A	Præfum	589. A
Chelidonia	864. C	Geneffa, fiue Geneffa		Mentha Saracenicæ	287. A	Præfum foetidum	153. B
Cheruilla	750. C	219. B		Mercurialis	474. C	Primula ueris	145. B
Cicer	266. C	Gentiana	199. A	Milium	410. D	Prunella	622. D
Cichorea	676. C	Glaftum	310. C	Milium folis	488. C	Prunella, fiue Prunella	402. C
Cicuta	405. A	Gratia Dei	230. C	Millefolium	726. C	Pseudomclanthion	1128. C
Cicutaria	524. D	Guadum	330. C	Millemorbia	193. A	Ptyllium	887. B
Citonia	375. A	H		Mora uaticana	151. A	Pulegium	197. A
Citriuli uel citreoli	702. D	H ederæ terreftres	877. A	Morella	691. A	Pulegium fyluefcre	433. A
Coloquintida	373. A	Hepatica	472. C	Morfus diaboli	714. C	Pyrethron	640. C
Colubina	772. D	Herba diui Ioan.	830. C	Morfus gallinæ	20. C	Pyrethrum fyluefcre	638. C
Conditif	779. A	Herba fortis	729. A	Morus celfi	521. B	Pyrola	466. D
Confolida maior	694. C	Herba fullonum	779. A	Muralis	278. C	Q	
Coniandrum	344. C	Herba paralyfis	845. B	N afturtium	361. B	Q ercus	228. C
Cornu ceruinum	448. C	Herba Roberti	210. C	N afturtium aquaticum	721. A	Q uinquefolium	622. D
Corrigiola	613. B	Herba ftella	448. C	N afturtium tectorum	305. A	R	
Cotula færida	582. C	Hermodaftylus	358. C	Nenuphar	534. C	R aphanus minor & maior	661. A
Cotula non færida	143. A	Hirundinaria	130. C	Nigella	502. D	Rapiftrum	256. C
Cotum	580. C	Hispania	668. C	Nil	330. C	Rapum	211. B
Craffula maior	799. B	Hispanicum olus	668. C	Nilech	330. C	Rapunculus	211. B
Crefcio hortenfis	361. B	Hordeum	437. B	O		Remora aratri	60. C
Crocus	442. C	Humulus	165. A	O cularia	245. A	Refta bouis	60. C
Crocus hortenfis	410. C	Hypericum	830. C	O culus bouis aut uacca	143. A	Rhabarbarum monachorum	460. D
Cuculus	691. A	Hyfifopus	840. C	Oleander	542. C	Ribe	662. D
Cucumer, feu Cucumis	702. C	I		Ophthalmica	245. A	Roberti herba & Robertiana	210. C
Cucumer affinis	704. D	I acobiflos	741. B	Orobis	570. C	Rofe caninæ	656. D
Cucurbita	367. A	Iarum	68. D	Origanum	551. A	Rofmarinus	477. A
Cufcuta	347. A	Indicum	330. C	Os mundi	109. B	Rofmarinus aculeatus	219. B
Cyclamen	450. C	Iringus	297. A	Oftitium	762. C	Roftrum ciconiæ	210. C
Cynogloffum	407. A	Iris	316. C	P		Roftrum porcinum	676. D
Cypirus	452. D	Iua mufcata	884. C	Pæonia	201. A	Rubea tinctorum	279. A
Cyreffus	873. B	Iuniperus	77. A	Pagana lingua	237. A	Ruta	615. B
D		Iufquiamus	832. C	Palma Chrifti	339. A	S	
D ens leonis	676. D	K		Pampinula	607. B	S accidotis uirile	68. D
Diapenfia	672. C	K eirim	456. D	Panis cuculi	565. A	Salicaria	490. C
Digitalis	892. C	Kernua	339. A	Panis porcinus	450. C	Salua	247. A
Digitri citrini	711. B	L		& 132. D		Salua uita	729. B
E		L actuca	298. C	Papauer	517. B	Sanamunda	383. A
E lleborus albus	271. A	Lactucella	673. A	Papauer cornutum	521. A	Sancti fpiritus radix	126. C
Endiua uera	676. C	Lapatium acutum	460. D	Papauer rubeum	514. D	Sandaracha Arabum	77. A
Enula	241. A	Lanaria	845. A	Parietaria	278. C	Sanguiforba	790. C
Enula campana	241. A	Lappa maior	71. B	Pafinaca	750. C	Sanicula	672. C
Equina mentha	287. A	Lappa inuerfa	578. D	Pentadaftylon	339. A	Saponaria	779. A
Eruca	261. A	Lappa minor	578. D	Pera pafitoris	610. C	Sardianæ glandes	376. D
Efula	810. C	Larga	495. A	Perforata	830. C	Satureia	303. A
Efula rotunda	604. C	Laureola	226. D	Perfica	602. C	Sauina uel Sabina	149. A
Euficum	16. C	Lens	853. D	Peruinca	359. A	Saxifraga lutea	748. D
Eupatorium adulterinum	264. C	Leuifticum	759. B	Pes anferinus	652. D	Saxifraga maior	748. C
Euphrasia	245. A	Lilium album	363. B	Pes affinis	103. A	Scabiofa	717. A
F		Lilium conuallium	239. A	Pes columbinus	210. C	Scarifola	676. C
F aba	388. C	Lilium inter fpinas	645. A	Pes corui	155. A	Sclerata	155. A
Faba craffa	799. B	Linaria	544. D	Pes leonis	613. A	Scolopendria	295. A
Fafefoli	707. B	Lingua bouis	341. A	Pes uiruli	68. D	Scrophularia	866. C
Ficaria	193. A	Lingua ceruina	295. A	Petrofelinum	573. A	Scro-	
Ficus fatiua	754. C	Linum	470. C				
Filago	729. A	Liquiritia	191. A				
Filipendula	563. A	Luparia	86. C				
Filix	594. D	Lupinus	308. C				
Flammula	355. A	Lupulus	165. A				
		M					
		M aiorana	666. C				

GERMANICARVM APPELLATIONVM INDEX.

Scrophularia maior 193.A	alba 468.D	Braun betonick. 349.B	Esels cucumer 704.D
Semperuiuum 31.A	Vua lupina 691.A	Braun dosten 551.A	F
Semperuiuum marinum 137.A	Vua uerfa seu uulpina 86.C	Braun melanzg. 532.D	Figbon 308.C
Sena 445.A	Vua uulpis 691.A	Braunellen 622.C	Feigebaum 754.C
Serpentaria minor 68.D	Vuularia 237.A	Braun weiderich. 490.C	Feigwarzefraut 866.C
Serpentaria officinarum 772.D	Z	Braunwurz 193.A	Felber 333.A
Serpyllum 250.C	Zingiber caninum 731.A	Brauner fingerhüt 892.C	Feldnegele 351.B
Serpyllü romanü 826.C		Brenntraut 845.A	Fenchel 500.C
Seruilla 750.C		Bryßlauch 633.A	Fenich 252.C
Serullum 750.C		Buchwurz 243.A.	Ferbblümen 809.A
Sigillü Salomonis. 584.C		631.B	Fieberkraut 386.C
Siler monranum 787.A		Bunnen-leberkraut 472.C	Filzfraut 347.A
Simeonis herba 79.B		Bübenleuß 578.D	Fingerhüt 892.C
Sinapi 537.A		Büchampffer 565.A	Fischmünz 721.A
Sinapi rusticum 305.A		Büchbot 565.A	Fogzwang/oder Forz wein 799.B
Sinapi syluestre 256.C		Büchflee 565.A	flachß 470.C
Sitanium 647.B		Buchßbaum 643.A	flachsfrant 544.D
Solatrum 691.A		C	flachsfeiden 347.A
Solidago Sarracenia 729.A		Castani 376.D	flachßkraut 631.A
Sorba 575.A		Calecturischer/oder Indiamischer pfeffer 731.A	Frauenweiel 312.D
Sorgi 772.C		Chustwurz 276.C	freyßchamkraut. 802.D
Sparagus 59.C		Ciernullen 702.D	Frembder Petersilien 654.C
Spelta 282.C		Cypres 873.B	fünffblatt 622.D
Sphatula fatida 793.B		Coloquint 373.A	fünffingerkraut 622.D
Squilla 781.A		Couander 344.C	G
Staphisagria 785.A		Creuzbaum 339.A	Amenderle 868.D
Stella herba 448.C		Creuzsalbey 247.A	Garben 726.C
Stichas arabica 777.B		Creuzwurz 285.A	Garten oder heimisch Benedictenwurz. 383.B
Stichas citrina 98.C		Cucumern 702.C	Gartenkress 361.B
Stramonia 691.B		D	Garten hyßop 303.A
Succus cyrenaic9. 762.D		Dubetropff. 337.B	Gartenfennß 537.A
T		Demet/oder Fruß deymant 287.A	Gauchblüm 324.D
Tamariscus 512.C		Denngraß 613.B	Gauchbot 820.D
Tanacetü 43.B. & 49.C		Denenmarck 855.B	Gauchflee 565.A
Tanacetü syluestre. 620.C		Deschelkraut 610.C	Geßblatt 645.A
Tapfus barbatus 845.A		Dinckelfoam 282.C	Geeler fingerhüt. 892.C
Taraxacon 676.D		Dondernegele 351.B	Geeler/oder guldener flee 748.D
Testiculus canis 558.C		Dosten 551.A	Geelmünz 433.A
Testiculus uulpis, aut fa- cerdotis 709.B		Drasblüm 878.C	Geel melanzg. 532.D
Tilia 863.A		Dreißelsteigeytblümen 802.D	Geel ölmagen 521.A
Tinctorius flos 809.A		Droppwurz 587.A	Geel rüben 685.A
Tormentilla 259.B		Durchwachß 631.B	Geel schlüßelblümen. 845.B
Trifoliü. 816.C. & 820.C		E	Geel seeblümen. 534.C
Trifoliü acetosum. 565.A		Edel salbey 247.A	Geel weiderich. 490.C
Trifolium humile. 493.A		Einforn 282.C	Genßfuß 652.D
Trinitas 493.A		Eisenkraut 591.A	Genßpappel 510.C
Trinitatis herba 802.D		Eisernhart 591.A	Gerlin/oder Geirlin 750.C
Triticum 647.B		Engelsfuß 587.A	Gersten 437.B
Tunica 351.B		Engelkraut 400.D	Gerwel 726.C
Turcicü frumentü. 824.C		Ephew 421.A	Glabblümen 809.A
V		Eppßich/oder Eppich 271.A. 743.A	Gilgen 363.B
Valeriana 855.B		Erß 628.C	Glatte winden. 719.A
Vernix 77.A		Erßell 542.D	Glabßkraut 278.C
Verbena 591.A		Erdappfel 450.C	Glabßkraut 770.C
Veronica 168.C		Erdbeer 854.C	Glabßchen 514.D
Vincaperuina 359.A		Erdwurz 450.C	Golbblüm 878.C
Vinceroxicum 130.C		Erdtrophew 421.A.	Gottheyl 622.C
Viola 310.D		877.A	Gotts vergeß 589.A
Virga pastoris 223.A		Erdentrenzlin 877.A	Graßblümen 351.B
Vitcum 328.D		Erdrauch 337.B	Gundkraut 285.A
Vitalis 259.A		Erdwurz 868.D	Gundwurz 460.D
Vitia syluestris 109.B		Erdwurz 450.C	Groß bathengel. 828.C
Viticella 95.A		Erdgall 386.C	Große beinwell. 694.C
Vngula caballina 139.B		Ernroß 510.C	Groß eppßich 326.D
Volubilis maior 719.A		Eruen 570.C	Groß feigwarzen= fraut
Volubilis media 259.A			
Vrinalis herba 544.D			
Vrtica 105.A			
Vrtica iners, mortua uel			

GERMANICARVM APPELLATIONVM INDEX.

A	
Abhon 795.A	
Äckerpfimmen 809.A	
Äffolker 328.D	
Älant 241.A	
Ätraum 529.A	
Ämelfoin 647.B	
Ändon das weible 589.A	
Äpostemkraut 717.A	
Ärticoca 791.C	
Äuffenblatt 237.A	
Äugentrost 245.A	
Äugenwurz 855.B	
B	
Bachmünz 721.A	
Baldauon 855.B	
Balsammünz 287.A	
Balsamkraut 287.A	
B. Barbara kraut 745.B	
Basilien 546.D	
Basilgram 546.D	
Baumfar 587.A	
Baumwoll 580.C	
Baurenepich. 271.A	
Baurnsenß 305.A	
Beinhölzlin 479.A	
Benedictwurz. 383.B	
Bergmünz 551.A	
Bertram 640.C	
Beerwurz 809.B	
Besentkraut 305.A	
Bettlersleuß 578.D	
Biberkraut 386.C	
Bibmellen/oder Bibernellen 607.B	
Bilsamkraut 832.C	
Bingelkraut 474.A	
Bismünz 785.A	
Baumephew 421.A	
Blaternkraut 866.C	
Blaw gulden oder blaw schwertel 316.C	
Blaw Fornblümen 427.A	
Blawmenderle. 868.D	
Blaw merzenblümle 834.C	
Blaw viel 310.D	
Blütkraut 790.C	
Blüströpffle 351.B	
Boberellen 691.A	
Bocksbart 820.D	
Bocksborn 797.A	
Bonen 388.C	
Brachendistel 297.A	

GERMANICARVM APPELLATIONVM INDEX.

Frant 193. A
 Groß schwalbenkraut 864. C
 Groß zam mozen. 750. C
 Groß stehend windt 717. B
 Groß Teuffelsmilch 810. D
 Guckganchklee 565. A
 Gulde gungel 390. D
 Guldener widerthyon 678. D
 Gundelrebe 877. A
 Gurken 702. D
 Güter Heinrich 465. A
H
 Abichkraut 318. D
 Halskraut 431. B
 Hanff 392. C
 harnkraut 544. D
 harsfrang 598. D
 haselnuss 397. B
 hasenflee 565. A
 hasenfuß 493. A
 hasenpappel 510. C
 hasenpfeil 604. D
 hauchblate 237. A
 hederich 256. C
 herbstros 510. C
 berggotsbärtlin 790. C
 herzigspan 394. C
 herzkraut 287. A
 heyd 254. D
 heydosen 656. D
 heydelsfench 252. C
 heydnisch wundtkraut 729. A
 himelbrant 845. A
 himelshlüssel 845. B
 hirs 410. D
 hirtenseckel 610. C
 hirszung 295. A
 hirtentklee 264. C
 hoben steinbrech 748. C
 holzmangolt 466. D
 hünereul 303. A
 hünereul 350. C
 hundsbäum 582. C
 hundsköl 443. A
 hundszung 407. A
I
 Jacobs blüm 741. B
 S. Johanskraut. 830. C
 S. Johans treublin/ oder beerlin 662. D
 Joseplen 303. A
 Jipen 840. C
 Jop 840. C
 Judenhürtlin / Judensdocken/oder Judensfirsen 691. A
K
 Katzenköbel. 337. B
 Kägle 493. A
 Kantenkraut 321. B
 Kappiskraut 412. D
 Kagenflee 493. A
 Kagenkraut 855. B
 Kagenmünz 433. A
 Kagenwedel 321. B
 Kerzenkraut 845. A
 Kesten 376. D

Kinlin 250. C
 Kirschenbaum 426. C
 Klapperzosen 514. D
 Klein bathengel. 868. C
 Klein ephew 421. A
 Klein monkraut 481. A
 Klein zam moze. 750. C
 Klein naterzüng. 400. D
 Klein salbey 247. A
 Klein schelwurz. 866. C
 Klein Tausentguldenkraut 386. C
 Knabenkraut 799. B
 558. C
 Knobloch 735. A
 Knospen 822. C
 Köhl 412. D
 Köhleskraut 790. C
 Köhlkraut 676. D
 Korn 767. A
 Kornrosen 514. D
 Kornmünz 433. A
 Kränsfuß 448. C
 Kraus balsam 287. A
 Aren 661. A
 Kress 305. A
 Kreuzblümen 711. B
 Bronäglin 810. C
 Krottendill 582. C
 Krottenflachß 544. D
 Köhorn 797. A
 Kürbß 367. A
 Kürwurz 474. C
 Kunel 303. A
 Kunigundkraut. 264. C
 Küttenbaum 375. A
L
 Lattich / oder Lacuck 298. A
 Lauch 633. A
 Lauendel 889. B
 Lein 470. C
 Liebstöckel 759. B
 Luesen 822. C
 Linden 863. A
 Linsen 858. D
 Lynkraut 544. D
 Löschbaum 495. A
 Löwenfuß 613. A
 Löwentapen 613. A
 Lungenkraut 636. C
M
 Adelgeer. 419. A
 Män 517. B
 Magsomen 517. B
 Maiozan / oder Meyran 666. C
 Meyenblümen. 239. A
 Mangolt weiß vnd rot 804. D
 Mansterew 297. A
 Marienrosen 845. B
 Marobel 589. A
 Matkümich 397. A
 Maulberbaum 521. B
 Maurephew 421. A
 Maurrauten 729. B
 Meerhirs 488. C
 Meerzwibel 781. B
 Meer cucumer. 702. D
 Meyenkraut 866. C
 Meysterwurz 762. C
 Melan 702. D

Melissen 497. A
 Mengelwurz 460. D
 Mercuriusfrut. 474. C
 Merretich 661. A
 Merzenblüm. 485. A
 Mergze violen 310. D
 Mettram 48. A
 Meußkölin 604. D
 Mistel 328. D
 Mittelwunden 259. A
 Mosfolb 822. C
 Münch rhabarbarum 460. D
 Münz 287. A
 Muckenkraut 842. C
 Munderholz 479. A
N
 Nabelkraut. 544. D
 Nachtschatt. 691. A
 Nagelkraut 604. D
 Narenkolb 822. C
 Naterwurz 772. D
 Naterzünglin 578. C
 Negelblümen 351. B
O
 Ochszung. 341. A
 Odermeng 243. A
 Olander 542. C
P
 Pesselfbeer. 542. D
 Pappel 510. C
 Pastney/ oder pastnach 685. A
 Peterlin 573. A
 S. Peters Korn 282. C
 S. Per. schlüssel 845. B
 S. Peterskraut 278. C
 Peterfilien 573. A
 Peterfilien der frembd 654. C
 Pestilenzwurz 643. B
 Pfaffenhöddlin 866. C
 Pfaffenödlin/ oder pfaufenblate 676. D
 Pfenben 702. D
 Pfefferkraut 483. A
 Pfeisichbaum 602. C
 Pfraumen 402. C
 Pfennigkraut 400. D
 Pferdswanz 321. B
 Pfirumen 759. A
 Pieffen 804. D
 Porst 512. C
 Prumen 402. C
 Psillenkraut 887. B
Q
 Wendel 250. C
R
 Raddistel 297. A
 Ragwurz 561. A
 Rappensfuß 448. C
 Ruch öpffelkrut. 621. B
 Rauten 615. B
 Reinweiden 479. A
 Rettich 659. A
 Riechd andorn. 765. B
 Ringelblüm 381. B
 Roeken 767. A
 Römisch pappel 510. C
 Römischer quedel 826. C
 Rote 279. A
 Rosen 656. C
 Rosenwurz 664. C

Rosmarin 477. A
 Rosmünz 287. A
 Rospappel 510. C
 Rosßschwanz 321. B
 Rot beilwurz 259. B
 Rot nachtschatt. 691. A
 Rot rüben 685. A
 Rot steinbrech 563. A
 Rot wasserpfeffer 842. D
S
 Saffran 442. C
 Salbey 247. A
 Samkraut 652. C
 Sanktel 672. C
 Saturn 303. A
 Saurampffer 465. A
 Saurer klee 565. A
 Saurich 542. D
 Sauwurz 193. A
 Scabiosen 717. A
 Scariol 676. C
 Schaffripp 726. C
 Schaffgarben 726. C
 Schaffibew 321. B
 Scharlach 567. A
 Scharpff wind 717. B
 Schmirlauch 633. A
 Schelkraut 864. C
 Schirung 405. A
 Schlehen 402. C
 Schlüsselblüm. 845. B
 Schlutien 691. A
 Schmalzblüm 878. C
 Schilweiden 479. A
 Schmerwurz 694. C
 Schwalberwurz. 866. C
 Schwarz Coriander 502. D
 Schwarz gartendissel 882. C
 Schwarz kömich 502. D
 Schwarzwurz. 694. C
 Schwarz ephew. 421. A
 Schwefelwurz. 598. D
 Schweinstrod 652. D
 Schweinbroet 450. C
 Seebüm 534. A
 Seyffenkraut 773. A
 Senet 445. A
 Sergenkraut 303. A
 Sesel 787. A
 Serbon 832. C
 Serbroet 450. C
 Serfenschel 598. D
 Serwode 652. D
 Sibengzeit 816. C
 Sinaw 13. A
 Syngrün 359. A
 Sorgfomen 772. C
 Speckgilgen 645. A
 Speierling 575. A
 Spelz 282. C
 Spereustich 419. A
 Spicanardi 889. B
 Spizmünz 287. A
 Spinet/ oder spinnat 668. C
 Springkraut 454. D
 Sprung ömer 454. D
 Spurzöpfel 575. A
 Stechend öpfelkraut 691. B
 Stein

Steinklee	748. S	526. S	Weisser ephew	421. A	Wilden poley	433. A
Steinleberkraut	472. C	Vogelneft	Weyde	330. C	Wild rofen	656. S
Steinmünz	433. A	W	Weyßen	647. B	Wilde falbey	567. A
Steinrauten	729. B	WAndlöffkrut	Weyßenkoltz	647. B	Wild fcharlach	567. A
Steinfonten	488. C	Waldfar	Welfch veiel	312. S	Wilden fenff	256. C
Stendelwurz	709. B	Waldelilgen	Welfch linfen	445. A	Wild fchwarzer corian	
Stichakraut	777. B	Waldtöl	Welfch nuß	378. S	der	502. S
Streyffwurz	460. S	Waldmägolt	Welfcher birß	772. C	Wild wollkraut	845. B
Streichblümen	809. A	Walwurz	Welfcher fleinle	526. S	Windenkraut	719. A
T		Wasserbatonig	Welfcher weyßen	647. B	Wintergrün	466. S
T Ag vñ nacht.	278. C	Wasserdost	Widertode	795. A	Wyfenklee	820. C
Tamarifck	512. C	Wasserepff oder eppich	Wildampffer	460. S	Wyfenkümel	397. A
Taubneffel	468. S	271. A	Wilder balsam	287. A	Wolffsmilch mancher	
Taufensblatt	726. C	Wassermähen	Wild Basilg	895. A	ley	810. C
Teuffels abbiß	714. C	Wassermünz	Wild Benedicte wurz		Wolgemüt	551. A
Teuffelsmilch	604. C	Wasserpfeffer	383. B	Wolricheder klee	816. C	
Thym	826. C	Wegdrit	Wilder bertram	638. C	Wüterich	405. A
Todtern	347. A	Weggras	Wild bingelkraut das		Wullkraut	845. A
Todnessel	468. S	Wegwarten / oder weg	menfle	443. A	Wunderbaum	339. A
Tornentill	259. B	weiß	Wild chamillen	582. C	Wundkraut	799. B
Treibförner	454. S	Weiden	Wild cucumer	704. S	Wurmkraut	48. A
Triacks	855. B	Weiderich	Wild flafchs	544. S	Wundfcherling.	405. A
Türckisch Cucumern	702. S	Weingartenwinden	Wilder galgan	452. S	Wuzerling	405. A
Türckisch Form	824. C	259. A	Wilder gartensaffran		Y	
V		Weinrauten	410. C	Wild Himelschlüssel		Y lenger ye lieber
Viel	456. S	Weiß Andom	845. B	Wild Himelschlüssel		Yngrün. 359. A (884. C
Veielwurz	316. C	Weiß Glocken	845. B	Wilden klee	526. S	Z
Vergif mein nit.	868. S	Weiß Hornungß blü	men	Wilder fo:ßell	524. S	Zäpfllin kraut. 237. A
Versich	542. S	Weiß Hornungß blü	men	Wilder freß	324. S	Zam Pastiney 685. A
Vnholden kertz	845. A	Weiß lilgen	485. A	Wilder fürß	373. A	Zam / oder gartensenf
Vnfer frawen flachß	544. S	Weiß mozelen	750. C	Wild maen	514. S	537. A
Vnfer frawen mantell	613. A	Weiß münz	271. A	Wild mozen	750. C	Zamer saffran
Vnfer frawen münz	287. A	Weiß seeblümen	534. C	Wild münz	287. A	Zeitlofen
Vnfer frawen fchüchlin		Weiß fenff	261. A	Wild negelblüm	351. B	Zeunling
		Weißwurz	584. C	Wild ochsenzungen	269. C	Ziffen
		Weißfteinbrech.	748. C	Wild ochsenzungen	269. C	Ziterwurz
				Wild pastiney	685. A	Zweyblatt
						Zwibel
						303. A. 429. A

Sequentes duæ appendices suis capitibus adijciantur.

Appendix in caput de Colutea. Pag. 445.


Colutea
differt à
Colytea

Dum hæc cōmentarios conscriberemus non erat ad manū græcus Theophrastus: quare cum latino tantū utendum esset exemplari Theophrasti, nō satis cōjicere potuimus an per y aut per ov uox ipsa scriberetur, cum nō raro Latini eas uoces in quibus græcè v est, per u efferant. Quare latinè dici hanc herbam Coluteam & Colyteam putauimus. Sed nactō tandem græco Theophrasti codice, statim deprehendimus *κολυτῆα* à *κολυτῆα* diuersam esse: idipsum enim Theophrastus manifestè innuit. In latina uerò Theodori uersione perperam pro Colytea scribitur Colycea: id quod nobis etiam tenebras offudit. Legendum itaq; initio capitris de Colutea in eum modum erit: *κολυτῆα* Græcis, Colutea Latinis dicitur & c. Expungenda itaq; dictio Colytea, & passim in hoc capite pro Colytea legendum Colutea.

Appendix in caput de Trifolio odorato. Pag. 816.

Non latet hanc herbam propè accedere ad descriptionē Loti syluestris. Caulem namq; fert bicubitalem, & aliquando maiorē, numerosis alarum cauis. Folia Trifolio quod in pratis nascitur similia: semen Fœnogræco ita respondens, ut nisi minus esset, uix ab inuicem discerneres: sapore item medicato. Tamen non minus accedit etiam ad Trifolij acutipicturam. Frutex enim uerius esse quàm herba uidetur. cubito maior, uirgas habens tenues, nigras, iuncosa adnata obtinentes, in quibus sunt folia Loti, in singulis pediculis tria, in ambitu cuspidibus serrata, ut hinc cōmodissimè dici mereatur *δυσίπυλλον*. Hæc etiam odorata sunt uehementer, ut nonnullis caput offendant: & ad bituminis certè odorem proximè accedunt, sed non parum tamen suauior & iucundior est. Florem præterea ex se mittit purpuream, hoc est, ad purpuræ colorem nonnihil accedentem: ex albo enim purpureus, aut subcæruleus est. Semen etiam modicè latum, & subhirsutum, ex altero sine ueluti cornu obtinens. Quod ego non de ipso quidem nudo semine, sed de eius potius folliculo, quod in cacumine planè aculeatum ac ueluti cornutum existit, intelligendum puto. Radix deniq; illi longa, gracilis, & tenax existit, nihilq; est in tota descriptione quod ei aptissimè nō quadret. Accedit præterea amaritudo quæ in semine non est obscura, pulchrè sibi etiam Trifolij odorati facultates uendicans: mouent enim quæ amara sunt uirinam, menses ducit, comitialibus profunt, aliæq; quæ Dioscorides Trifolio huic adscribit efficere possunt. Quare ijs rationibus motus, à concepta sententia discedere non dū queo, nisi contingat nobis aliam intueri stirpem, cuius semina, atque adeo grana ipsa hirsuta, & cornuta existant. Quanquā non lateat parum admodum ferere utram sententiā, nostram aut aliorum amplectaris, cum Lotus & Trifolium facultatibus non multum aut ferè nihil distent. In hoc tamen semine, quod nos Trifolij odorati esse contendimus, nulla inesse apparet adstrictio, quam tamen in Loti semine Dioscorides requirit. Quod pro confirmanda nostra sententia adijcere uoluimus.


Errata quædam momentanea ad finem operis quære.



ABSINTHIVM
VVLGARE.

Wormw.


A



SERIPHIVM
abfinthium,

Welsomen.

NOMINA.



VINOION græcè, Absinthium latinè appellatur. In officinis suam appellationem retinuit. Germanicè *wermit* / quasi prohibens hilaritatem & alacritatem, ob immensam suam amaritudinem, nominatur. Nomen hoc Græci ab ἀψιθρα, id est, contrectando, per ἀντίφρασις deflexerunt, quod nulum animal, ob eximiam amaritudinem, hanc herbam attingat. Veteres Græci Comici ἀπίνθιον quoque conformi etymo, quasi impotabilem dixerunt, quod hanc nemo, propter insignem amarorem, bibere possit.

Absinthium una de dictum.

GENERA.

Absinthij genera sunt tria, Galeno & Dioscoride testibus. Vnum quod Romanum, vulgare seu comune uocant, & est id quod passim in Germania nostra nascitur, & cuius picturam hic damus. Huius generis est quod à Ponto regione, in qua nascitur, Ponticum cognominatur, estq; ceteris multo præstantius. Alterum genus est marinum, quod Seriphium nominant. Germani *welsomen*. Tertium Santonicum, à Santonibus Gallie populis, apud quos plurimum gignitur, dictum est. Hinc nonnulli eius semen corrupta uoce Sanctum, quoniam Sanctonicum dicendum esset, appellant. Nisi id nominis ob insignem eius efficaciam, quam in necandis lumbricis obtinet, illi imposuerint. Hodie semen lumbricorum nuncupant, germanicè *wurmsomen*.

Vulgare Absinthium.

*Ponticum.
Seriphium.
Santonicum.*

FORMA.

Absinthium vulgare, herba est caule ramoso, folijs incanis, multipliciter sectis, aureo flore, semine rotundo, racematim coherente. Seriphium uero herba est præternues ramos cirrosue habens, minori similis Abrotono, exiguis referta seminibus, subamara, & graui odore. Ex qua deliniatione omnibus perspicuum fit, herbam cuius effigiem damus esse Seriphium. Siquidem herba est tenuibus cirris, Abrotono feminae similis, semine in siliquis paruo, grauiter odorata, & subamara. Santonicum simile est Absinthio, sed non adeo copioso semine scatens, & subamarum.

*Vulgare.
Seriphium.*

Santonicum.

LOCVS.

Nascitur, Oribasio & Apuleio autoribus, locis cultis, montosis & saxosis; plurimum autem præstantissimumq; in Ponto, Cappadocia, & Tauro monte. Seriphium passim circa itinera, macerias uinearum, & sepes provenit: ut uerum sit quod à Plinio dictum est, pleraq; herbas pedibus cõculcamus, quarum si nobis uirtus perspecta esset, eas in cœlum laudibus ferremus, Santonicum in Gallia, ut diximus, copiose gignitur.

TEMPVS.

Colligendum in fine Iulij mensis, ac in umbra exiccandum, quo etiam tempore floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Ponticum minus calefacit, quod adstrictionis multæ sit particeps. Minus etiam cæteris generibus extenuat, nõ minus tamen resiccat. Galeno itaq; autore calidum in primo gradu, & siccum in tertio statuitur. Succus autem eius longè quàm herba ipsa calidior est. Vulgare quidem adstrictoriam, amaram & acrem qualitatem obtinet, haud secus atq; Ponticum. In hoc tamen ab eo differre uidetur, quod in illo maior sit amaritudo quàm adstrictio. Quamuis neque Ponticum modicè amarum sit, quod Ouidius satis ijs innuit uersibus:

Turpia deformes gignunt Absinthia campi,

Terraq; de fructu, quàm sit amara docet.

Loquitur autè de Ponto. Seriphium ipsum Abrotono minus est calidum, uerum Absinthio calidius. Santonicum in extenuando & calefaciendo deficcandoue, Seriphio paulò imbecillius,

VIRES. EX DIOSCORIDE.

c Absinthium caesfacit, adstringit, bilemque stomacho & uentri inhaerentem expurgat. Urinas cit. Crapulam praesumptum arcet. Inflationibus, uentrisque & stomachi doloribus, cum Sefeli & Nardo Gallico potum prodest. Fastidia discutit. Morbo regio correptos, dilutum aut decoctum eius per singulos dies cyathis tribus haustu sanat. Menses cum melle sumptum aut appositum euocat. Strangulationibus fungorum ex aceto potum subuenit. Ixiæ, cicutæ, muris aranei morfibus, & draconi marino cum uino aduersatur. Anginis cum melle & nitro inungitur. Contra epinyctidas ex aqua, sugillata uero & oculorum caligines cum melle, similiter auribus ex quibus manat sanies, illinitur. Decocti eius uapor suffitusue, dentium auriumque dolores lenit. Decoctum cum passo dolentibus oculis oblinitur. Praecordijs, iecinori, & stomacho dolenti, ac longo tempore affecto, cum cerato Cyprino tritum illinitur. Stomacho autem cum rosaceo subactum. Cum ficis, nitro, & farina loliacea, aqua inter cutem, lienosisque subuenit. Praeterea uestiarijs arcisque inditum Absinthium, uestes ab erodentium iniurijs seruat. Culices cum oleo perunctum a corporibus abigit & arcet. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas a murium erosione tuetur. Par est etiam succum haec omnia facere, attamen in potionibus improbatur, stomacho enim obest, & capitis dolores adfert. Seriphium uero per se, uel cum oryza decoctum, & cum melle sumptum, ascaridas & rotundos lumbricos necat, aluum simul leuiter subducens. Eadem potest praestare cum edulio aut lenticula decoctum, Santonicum eadem quae Seriphium potest.

EX GALENO.

D Absinthium adstrictoriam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, ex calfaciens pariter & extergens, roborans & desiccans. Proinde biliosos uentris humores per egestionem infernam propellit, ac per urinam euacuat. Magis uero quod in uenis est biliosum per urinas expurgat. Ideo contentam in uentre pituitam, sumptum nihil iuuat. Sic neque si in thorace aut pulmone continetur; nam adstringens in eo facultas, quam amara ualentior est.

EX PLINIO.

Stomachum corroborat, & ob hoc sapor eius in uina transfertur. Bibitur decoctum in aqua, & postea nocte & die refrigeratum sub dio: decoctis sex drachmis foliorum cum ramis suis in ecclesiis aquae sextarijs tribus. Oportet & salem addi. Tritum, ut aiunt, raro in usu est, sicut & succus expressus. Bibitur & madefacti dilutum. Exprimitur autem cum primum semen turgescit, madefactum aqua triduo recens, aut siccum septem diebus, deinde coctum in aereo uase ad tertias, decem heminis, in aquae sextarijs quadragintaquinque, iterumque percolatum, herba eiecta, lente coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minore Centaurio quaeritur succus. Sed hic Absinthij succus inutilis stomacho capitique est, cum (ut tradunt) sit illud decoctum saluberrimum: nam stomachum adstringit, bilemque detrahit, urinam cit, aluum emollit, & in dolore sanat, uentris animalia pellit. Malaciam stomachi & inflationes cum exiguo Sili & Nardo Gallico, addito aceto, discutit. Fastidia abstergit, concoctiones adiuuat. Cruditates detrahit cum ruta, & pipere, & sale. Antiqui purgationis gratia dabant cum marinae aquae ueteris sextario, seminis sex drachmis, cum tribus salis, & mellis cyatho. Efficacius purgat duplicato sale. Quidam in polenta dedere supradictum pondus addito Pulegio. Alij contra paralyin. Alij pueris folia in fico, sic ut amaritudinem fallerent. Facile thoracem purgat cum Iride sumptum. In regio morbo crudum bibitur cum Apio, aut Adianto. Aduersus inflationes calidum paulatim sorbetur ex aqua. Iecinoris causa cum Gallico Nardo, lienis cum aceto, aut pulte, aut fico sumitur. Aduersatur fungis ex aceto. Item uisco, cicutæ ex uino, & muris aranei morfibus, draconi marino, scorpionibus. Oculorum claritati mulrum cofert. Epiphoris cum passo imponitur, sugillatis cum melle. Aures eius decoctum

A decoctum uaporis suffitu sanat: aut si manat sanies, cum melle tritum. Urinam ac menses ciunt tres quatuorue ramuli, cum Gallici nardi radice una, cyathis aquae vi. menses priuatim cum melle sumptum, & in uellere appositum. Anginis subuenit cum melle & nitro. Epinyctidas ex aqua sanat: uulnera recentia, priusquam aqua tangantur impositum: pretereaq; capitis ulcera. Peculiariter ilibus imponitur, cum cypria cera, aut cum fico. Sanat & pruritus. Non est dandum in febris. Nauseas maris arcet in nauigationibus potum: inguinum tumorem in uentrali habitum. Somnos allicit olfactum, aut inscio sub capite positum. Vestibus insertum tineas arcet. Culices ex oleo perunctis abigit, & fumo si uratur. Atramentum librarium ex diluto eius temperatū, literas à musculis tuetur. Capillum denigrat absinthij cinis, unguento rosaceoq; permixtus. Marinum, quod quidam seriphium uocāt, stomacho inimicum, Aluum mollitq; animalia interaneorum. Bibitur cum oleo & sale, aut in farinae trimestre forbitione dilutum. Coquitur quantum manus capiat, in aquae sextario ad dimidias.

VINI ABSINTHITIS VIRES,
EX DIOSCORIDE.


Absinthites uinum stomacho accommodatum est, urinam cit. Tarde cōcoquentibus utile: iecinorosis itidem, nephriticis, & regio correptis morbo. Cibum nō appetentibus, & stomacho male affectis, & longis prae cordiorum distensionibus ac inflationibus, rotundis lumbricis, & suppressis mensibus auxiliatur. Contra ixiæ uena hausta, copiosius potum, & uomitionibus redditum prodest.

CONFECTIO.

Variae uini absinthitis sunt confectiones, ut ex Dioscoride constare potest. Optimum tamē fit, si tusae Pontici absinthij drachmæ octo, linteo raro ligatae, in amphoram uini cōijciuntur. Mustum deinde mittitur, relicto uno uasis spiraculo ne efferefcens foras exiliat.


APPENDIX.

Santonici, quod ut cōmemoratum est, hodie semen lumbricorū trocant, praeci- Semen lum-
puus hoc tempore ad lumbricos ex corpore pellendos & enecandos usus est. Et si bricorum.
genuinum est, magna efficacia cum melle assumitur tam à pueris, quàm adultis. Seriphium quoq; aduersus lumbricos à multis cōmendatur, eoq; nomine mors uermium appellatur. Sunt Mors uermiū.
etiam qui lumbricorū semen nominent.



ABROTONVM
MAS.

Stabwurtz mennele.



ABROTONVM
FOEMINA.

Stabwurtz weible.

A 4

C

NOMINA.

Abrotonum unde dictum.



ΒΡΌΤΟΝΟΝ Græcis, Abrotonum Latinis nominatur. Officinæ antiquū nomen retinuerunt. Germanis Garthagen/ Stabwurcz/ Schoffwurcz/ Gertwurcz/ Kuelkraut/ Affrisch/ appellatur. Hoc autem nomen sibi usurpauit, ut Nicandri testatur interpres, *ὅτι τὸ πρὸς ἄμυ ἀβρόν, ἢ ἀπάλου φαίνεται, ἀλλ᾽ ὡσεὶ ἡδὲ τὸ δύσπνονον εἶναι.* hoc est, quod conspectu tenerum, molle & delicatum appareat, aut quod grauem, acremue & difficilem halitum prospiret.

GENERA.

Abrotonū duorum est generum, ueterum & recentiorū omnium sententia, mas & fœmina. Plinius lib. xxi. cap. vii. mas quidem campestre uocat Abrotonum, fœminam uero mōtanum. Vulgus, syluestrem Cypressum, à similitudine & odore foliorum eiusdem, nomenclaturæ herbæ fruticisue uocat. Germanicè weiff garthan/ oder wilder cypress.

FORMA.

Abrotonū mas.

Abrotonū, quod mas appellamus, sarmentosum, minutis folijs, minus album quàm fœmina, tenui semine ac numeroso uti Absinthiū. Semen autem nō quouis tempore producit, sed ad Septembris duntaxat mensis initia, quo si diligenter obseruabis tempore, semine prægnans esse comperies. Recte igitur *λεπτοκαρπυ* in Dioscoride legitur, huic lectioni nō solum ueterum codicum fide, uerumetiā sensu suffragante. Fœmina frutex est, arboris speciem habens, candicantibus folijs, Seriphij modo minutim circum ramulos incisis, floribus refertus, in summo auri fulgore comantes corymbos obtinens, odoratus etiā cum grauitate quadam.

Abrotonum fœmina.

LOCVS.

Mas passim apud Germanos in hortis, & in campestribus nascitur: fœmina uero in collibus & montibus sua sponte prouenit.

TEMPVS.

Floret utrunq; Augusto. Colligitur autem in autumnno, potissimum Septembri mense: hoc enim tempore semen, ut diximus, profert.

TEMPERAMENTVM.

Abrotonū calidum & siccum, inq; tertio ordine seu recessu post media situm est, id quod amaritudo eius, quam gustu præ se fert, facile monstrat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtriusq; abrotoni semen feruefactū & crudum tritum cum aqua potum nō nisi recta ceruice spirantibus, ruptis, conuulsis, ischiadicis, urinæ difficultatibus, & suppressis mensibus auxiliatur. Potum in uino exitialium uenenorum antidotum est. Cum oleo rigentibus illinitur. Serpentes lecto instratum & suffitum fugat. Cum uino potum aduersus eorundem morsus, peculiariter autem scorpionum & phalangiorum, prodest. Oculorum inflammationibus cum cotoneo cocto, aut pane illitum subuenit. Tritum cum farina hordeacea decoctumq; tubercula discutit. Admisctetur irino unguento.

EX GALENO.

Non in strenue excalfacit & desiccet. Nam siue comā cum floribus (reliqua enim eius palea inutilis est) cōtusam ulceri puro illinas, mordax & irritans uidebit, siue eo in oleo macerato, caput aut uentrem perfundere uoles, admodū calefacere reperies. Quin & si qui per circuitum rigoribus capiuntur, eos ante inuasionem rigorum hoc uoles confricare, minus utiq; rigore concutientur, imò & sensus confestim ubi admotum fuerit ipsum calfacere percipit. Porrò quod lumbricos interimat par est, nimirū quum sit amarum. Protinus uero quod & digerendi & incidendi uim habeat scies. Præterea abrotonum ustum calidum & siccum facultate est, magis etiā quàm cucurbita sicca usta, & anethi radix. Illa enim ulceribus humidis simul

A simul & citra phlegmonem callo induratis profunt, ac proinde maxime ulceribus ijs quæ in pudendorum præputijs sunt competere uidentur; at cinis Abrotoni ulceribus omnibus mordax est, ac idcirco cum oleo tenuium partium, Cicino scilicet, aut Raphanino, aut Sycionio ueteri, potissimum Sabino, ad alopecias confert. Barbam etiam segnius tardiusq; enascentem cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed nec minus illis, lentiscino maceratum. Rarefaciendi enim uim, eò quod tenuium est partium, obtinet, & mordax est, & calidum. Abrotonum uero inimicum stomacho existit.

EX PLINIO.

Vsus est & folijs, sed maior semine, ad calefaciendum, ideo neruis utile, tussi, orthopnoicis, urinæ, torminibus, conuulsis, ruptis, lumbis. Datur bibendum manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen tusum in aqua drachmæ pondere. Prodest & uulua. Concoquit panos cum farina hordeacea, & oculorum inflammationibus illinitur cotoneo malo cõcocto. Serpentes fugat. Contra ictus eorum bibitur in uino, illiniturq;. Efficacissimum contra ea quorum ueneno tremores & frigus accidunt, ut scorpionum & phalangiorũ, & contra alia uenena. Prodest quoquomodo argentibus, & ad extrahenda ea quæ in herent corporibus. Pellit interaneorum mala. Ramo eius si subiiciatur puluino, uenerem stimulari tradunt: efficacissimamq; herbam esse contra omnia ueneficia, quibus coitus inhibeat.

DE ASARO CAP. III.

B

NOMINA.



ΣΑΡΟΝ græcè, Asarũ latinè dicitur. Officinis hodie nomen retinet. Germanicè *Naselwurz*. Asaron autem dictum est, quod in ornatũ non ueniat, uel ut Plinius lib. xxi. cap. vi. inquit, quoniam in coronas atq; festa non addatur: uel quod manualibus scopis, quæ odoris gratia gestantur, minime solitum sit inseri.

Asaron eius dictum.

FORMA.


Folia hederæ similia habet, longè tamen molliora, rotundioraq;. Flores inter folia ad radicem purpureos, odoratos, Hyoscyami cytino similes, in quo semen acino nõ dissimile. Radices multas, geniculas, tenues, obliquas, gramini persimiles, longè tamen graciliores, odoratas, calefacientes, & linguam admodum erodentes. Cæterum hic admonendum esse lectore duximus, omnia Dioscoridis exemplaria hoc in loco deprauata esse, perperamq; habere uel *πικρότερα* uel *μυρότερα*, cum potius scribendum sit *μαλακότερα*, id quod partim Plinij testimonio, partim etiam iudice sensu ipso comprobari potest. Plinius siquidem lib. xij. cap. xij. Asarum sic depingit: Est hederæ folijs, rotundioribus tantum, mollioribusq;. Si quis uero ea de re ad iudicem sensum referat, Asarumq; cum hederæ conferat, Asari certè folia neq; densiora, neq; minora hederæ folijs esse comperiet, quum Asari folia maiora multò sint quàm hederæ. Proinde cum folia hederæ illorum comparatione multò minora sint, euidentissimum est pro *μυρότερα* legendum esse *μαλακότερα*, huic nimirum lectioni ad stipulantibus Plinio & sensus iudicio, ut dictum est: ad tactum em̄ huius folia longè sunt hederæ molliora. Accedit quod ab una dictione in aliam facilis sit transitus. His itaque rationibus motus, Asari folia *μαλακότερα*, hoc est, molliora hederæ folijs esse dixi, ut reuera etiam sunt.

Dioscoridis loci emendatus.

LOCVS.

Nascitur in umbrosis locis, montibus potissimum & syluis: aspera enim macræue & sicca loca amat.

TEMPVS.



ASARVM

Gäfelwurtz.

A

TEMPVS.

Bis anno, uere nimirum & autumnus floret. Colligendum in fine Augusti, à die uidelicet decimoquinto eius mensis, usq; ad octauum Septembris.

TEMPERAMENTVM.

Afarum in calefaciendo & exiccando ordinis tertij existit, radices potissimū eius.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radices Afari calefaciunt, & urinam mouent. Hydropicis & ischiadicis diuturnis profunt. Ducunt menses pondere drachmarum sex cum mulso potæ. Purgant Ellebori albi modo. Ruptis præterea, conuulsis, tussi ueteri, difficultati spirandi, & urinæ conferunt. Cum uino potæ ferarum moribus salutare. Folia adstringunt. Illita capitis doloribus, oculorum inflammationibus, ægilopis incipientibus, mammis à partu tumentibus, ignibusq; sacris profunt. Coma somnum etiam conciliat. Sic Crateias herbarius de Afaro proditum reliquit.

EX GALENO.

Afari radices utiles sunt, facultate similes radicibus Acori, intensiores tamē. Itaq; ex ijs, quæ de illis prodita sunt, hic facienda coniectura.

EX PLINIO.

Nardi uim habet Afarum, quod & ipsum aliqui syluestre Nardum appellant.

EX MARCO AEMYLIO.

Est Afaron græcè Vulgago dicta latinè.

Hæc calidæ & siccæ uirtutis dicitur esse.

Tertius est illi gradus, ut dicunt, in utroque.

Prouocat urinam, potatq; menstrua purgat.

Hocq; modo iecoris medicatur sumpta dolori.

Hydropicosq; iuuat, schiasim fugat hausta frequenter.

Et uulvæ morbis decoctio subuenit eius.

Dicitur ictericum potata repellere morbum.

Elleboriq; modo uomitu præcordia purgat.

Sed non est huius purgatio tam uiolenta,

Nec metuenda quidem, si fiat taliter illa:

De folijs eius triginta recentia tollens,

Adde meri tantum quo possint cuncta recondi.

Tota nocte mero facias macerentur in illo,

Mane terens, uino quo sunt macerata resolue.

Tunc olus excoctum cum pingui carne recenti

Porcina, prius ægroto da sufficienter,

Et sumat uini uult quantum fortis & albi,

Sic Afari succum colatum trade bibendum.

Fortibus & magnis est hic numerus foliorum

Sufficiens, reliquis, ut diximus, est minuendus

Iuxta quod uires, ætas, & cætera poscunt.

APPENDIX.

Lixiuum in quo Afarum decoctum est, si eo caput lauetur, cerebrum roborat, & memoriam, Succus etiam eius cum Pompholyge, caligantibus oculis confert.



ACORVM
officinarum.

Drachenzurzt.

NOMINA.



AKOPON græcè, Acorū latinè appellatur. Officinis nomen retinet. Germanicè *Gel lilgen/Drachenwurz* oder *Ackerwurz* uocatur. Acoron aphrodisiam quasi ueneream Græci etiam uocant. Apuleius, quicumq; ille fuerit, in cōmentariolo quod de aliquot herbis scriptū à se reliquit, Piper apium dictam fuisse hanc herbam testatur, quod ea in aluearijs suspenſa, nunquam diffugiant apes.

FORMA.

Folia Iridis habet, angustiora tamen. Radices non dissimiles, implicatas, neq; in rectum enatas, sed obliquas, & in superficie existentes, geniculis seu internodijs distinctas, subalbas, gustu acres, odore non ingratas. Præstat densum, candidum, non cariosum, plenum & odoratum, cuiusmodi est in Colchide & Galatia. Ex qua sanè Dioscoridis descriptione satis liquet Acorum nostrum, quo hodie officinæ utitur, etsi non uerū sit, tamen aliquā saltem Acori speciem esse: Iridis enim folia obtinet, angustiora tamen. Radices quoq; similes, implicatas & inuicem adnatas, non in rectū, sed in obliquum tendentes: non in profundo delitescentes, sed in superficie existentes, & modico cespite tectas: deniq; geniculis seu internodijs interceptas. Neq; etiam in colore ab eo quem Dioscorides pingit uariare uidetur: nostrū enim Acorū non raro *ὑπολευκός*, hoc est, subalbas seu candicantes radices habere conspicitur. Accidit autem ut & rubentes intus habeat radices, quæ tamen cum candicantes passim intercurrentes uenas obtineant, recte subalbæ dici possunt, quod nimirū neq; uere rubescant, neq; candidum etiam prorsus colorem referant, sed eum potius qui ex rubro & candido mixtus sit. Cæterū radices Acori quæ intus candicant, foris ut plurimū subrubet. Hinc est quod Serapion in Acori descriptione Dioscoridis uerba referēs,

Acorum officinarum non est uerū Acorum.

B

ὑπολευκός dictionē ita uertere uoluit: Et color radicū exterior tendit ad rubedinem. Proinde qui hac sola ratione, quod Acori radix intus interdum rubescat, mouētur, ut diuersum nostrū prorsus à Dioscoridis credant, ij non utuntur argumento quod tanti momenti sit, ut quod conātur, persuadere alijs possit. Cum enim Dioscorides Acori radices *ὑπολευκός*, hoc est, albicantes faciat, nosster certe nunquam non tales habere deprehenditur: uel enim uere candicantes sunt, uel subrubentes, quas etiam *ὑπολευκός* recte dici posse iam ostendimus. Porro quamuis odorata non sint eius radices, tamen nihil ob stare posset odor, quo minus nostrum uerum esse putaremus Acorum, quum abunde constet illum, haud aliter quàm colorem, secundum diuersas regiones in eadem sæpe herba mutari: si non esset aliud, quod ut diuersum certo crederemus nos urgeret, hoc nempe, quod nostri Acori radices gustu acres non sint, quod tamen omnes ueteres uno ore de Acoro affirmant, sed potius adstringentes. Quapropter etsi tota ferè descriptio illi respōdere uideatur, tamen quia acris non est, uires eas quas uero Acoro tribuunt ueteres, habere non potest: ut hoc nomine uehementer errent qui à solis descriptionibus tantū pendent. Nec minus hallucinantur officinæ quæ ad urinas mouendas, aut menses euocandos, lienesue minuendos eo utuntur. Perperam etiam Diacori compositionem ex eodem faciunt. Curent itaq; ut uerum Acorum habeant, quod iam in multis Germaniæ officinis profutare puto. Nam radix illa quæ à nonnullis seplasiarijs nunc sub nomine maioris Galangæ uenditur, si cætera etiam respondeat, haud dubie radix ueri Acori est. Et debent seplasiarij ea uti, quoties in compositionibus medicamentorū Acori fit mentio, præcipue autem in Diacori compositione apparanda, quod hæc calefaciendo cōcoctionem stomachi supra modum iuuat. Et hoc cō confidentius faciendum esse hortor, quod Galangam maiorē ueri Acori radicem esse existimem: geniculis enim scætet, foris subrubra, intus subalba, gustu acris, odore non ingrata, ut hoc nomine illa tutò & sine errore officinæ pro Acoro uti queant.

B

C

LOCVS.

Apuleius locis cultis, pratis ac hortis nasci, raramq; inuentu herbam hanc tradit. Nostrum Acorum iuxta amnes, & passim in aquosis & palustribus locis prouenit.

TEMPVS.

Legitur radix Acori æstatis initio, & siccat in umbra digitalibus frustis.

TEMPERAMENTVM.

In calefaciendo & desiccando tertij est ordinis. Nostrum quidem desiccet, at citra calefactionem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Acori radix calefaciendi uim habet. Decoctum eius potum, urinam cit. Prodest lateris, thoracis & iecoris doloribus; torminibus, ruptis, conuulsis. Lienes minuit. Urinæ stillicidie, & uenenatorū moribus subuenit. In fessu, quemadmodum Iris, ad muliebria utilis est. Succus radicis caligines oculorum discutit. Antidotis præterea radix utiliter miscetur.

EX GALENO.

Acori utimur radice quæ gustu acris est, & modicè amara, odoreq; non iniucunda. Hinc manifestum est hanc facultate calidam, & cōsistentia tenuium partium esse. Huic consentaneū est, ut urinam moueat, & lienes induratos iuuet, tum corneæ membranæ crassitiem detergeat simul atq; extenuet. Ad hoc autē melior est ipsius succus. Omnino uero siccificum esse clarum est.

EX PLINIO.


Vis ei est ad calefaciendum extenuandumq; efficax, contra suffusiones & caligines oculorum succo eiusdem potu, cōtraq; serpentes. Pectoris doloribus subuenit, & ideo antidotis miscetur. Iecinori medetur, thoraci quoq; & præcordijs. Urinam cit eius decoctum, & omnia uesciq; uitia sanat. Testium tumores radix decocta in uino, tritaq; & illita mirè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat, decocto huius herbæ fountibus. Cōtusis & euersis pota duobus obolis in mulsi cyathis tribus radix prodest. Acoron quoq; utile est interioribus sceminarum morbis.

ACORI OFFICINARVM VIRES.

Acori adulterini facultates.

Gustus abunde monstrat eius radicem immensam adstringendi facultatem obtinere. Hinc est quod diuersam planè à ueri Acori radice uim sortita sit. Nam ut hæc tenuium est partiū & facultate calida, atq; adeò detergit, extenuat atq; discutit: ita illa consistentia crassarū partium, ac facultate frigida, constringit, densat, cogit & contrahit. Quare urinam nō cit, ut uerum Acorum, nec menses euocat, sed potius suppressit. Sanguinem etiam undecunq; manantem cohibet. Proinde recte Pandecta rum autor scribit, eum qui secum Acori radicem gestet, à nullo sanguinis profluuio corripī. Et ex recentioribus aliqui hanc facultatem Acori nostri obseruarunt, atque hinc adeò tradunt eius succum igne expressum, menses nimium promanantes constringere posse, id quod certè de Acoro affirmare uanissimū erit. Ex ijs itaq; intelligentiam seplasiarij, quis usus nostri etiam in medicina sit Acori: nec cōmittent, ut fanatici cuiusdam, qui nuper Morophrasti impudentis hominis pestilentissimas nugæ & ineptias tegere, atq; adeò epistola aliqua operi illius temerè præfixa cōmendare, ac præ illo monstro reliquos omnes medicos, si dijs placet contemnerent ausus est, cōsilio obsecuti, hoc prorsus abijciant, cum illius immensa sit adstringendi, quod demonstrauimus, facultas.

De Althæa



ALTHAEA

Eibisch.

B 2

NOMINA.

Bismalua.
Maluauiscus.Althæa unde
dicitur.

ΑΘΑΙΑ, ἄλθειον, ἰβειον græcè: Althæa, Ebiscus, Ibiscus latinè dicitur. Officinæ, quæ ut plurimū barbaris uocibus gaudent, Bismaluum, Maluauiscum, & simpliciter Euiscum nominant. Maluauisci autem uox corrupta est, ex malua nimirū & uisco composita, quasi dicat aliquis Malua ebiscus, hoc nomine illam ab alijs maluis, quæ sanè multæ sunt, segregans. Germanicè Ibisich/oder Eibisich/Grosz/oder wild pappeln. Althæa uero à multiplici remediorū potestate & usu, uel ut Plinius ait, ab excellentiā effectus nominata est. Siquidē ἄλθεια Græcis idem ualeat, ac si à medendo medicā simpliciter dicas. Nam ἀλθαίσιπ illis mederi significat, ἀλθὸς uero remediū & medicinam.

FORMA.

Syluestris Maluæ genus est, cui folia ut Cyclamino rotunda, lanuginosa, flos rosaceus, caulis cubitorum binūm, radix lenta uiscosaq̃, intus candida.

LOCVS.

Locis humentibus, pinguibusq̃ gaudet.

TEMPVS.

Radices, ut reliquarum ferè herbarum omnium, inter autumnii initia, hoc est, in fine Augusti, & Septembris mensis principio, legendæ. Folia uero & semen in æstate. Floret Iulio & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Folia & flores calidi & sicci primo excessu seu ordine. Radices uero in principio secundi.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Radix in aqua mulsa aut uino cocta, aut per se pota, ad uulnera, parotidas, strumas, abscessus, mammarū inflāmationes, sedis contusiones, inflations, neruorum distentiones, efficax est. Siquidem discutit & maturat, aut rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta quo dictum est modo, & cum adipe anserino aut suillo, uel terebinthina subacta, ad uteri inflāmationes & præclusiones utiliter admouetur. Decoctum eius idem præstat, secundasq̃ à partu relictas educit. Decoctum radice cum uino potum, urine difficultati, calculosorū cruditati, dysentericis, ischiadicis, tremulis, & ruptis succurrit. Dentium mitigat dolorem cum aceto decocta, colluto inde ore. Semen autem uiride siccumq̃ tritum, cum aceto in sole perunctum alphas extergit. Cum aceto & oleo inunctum à uenenatorū morsibus præseruat. Valet ad dysenteriam, sanguinis reiectionē, & alui fluores. Seminis decoctum in posca aut uino contra omnes apum & minutarū ferarum ictus bibitur. Folia cum exiguo oleo, morsibus & ambustis illinuntur. Addensat aquam sub diuo radix trita & admixta.

EX GALENO.

Digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi coctu difficilia tubercula. Porrò radix eius & semen cætera quidem pari herbæ uiridi modo agunt, uerum tenuiorum partium, magisq̃ exicatoriam, ad hæc magis exterforiam quam illa facultatē ostendunt, ut & alphas detergant, & semen renum calculos constringat. Radicis autem decoctum, dysentericæ, alui profluuii, & sanguinis reiectioni utile est, nempe cum adstringentem quandam facultatem possideat.

EX PLINIO.

Althææ contra omnes aculeatos ictus efficacior uis, præcipuè scorpionum, uersparum, similiumq̃, & muris aranei. Quin & trita cum oleo, hac peruncti antè, uel habentes eam, non feriuntur. Eius radix præcipuè cõuulsis ruptisq̃ efficax est. Cocta in aqua aluum sistit. Ex uino albo strumas & parotidas, & mammarum inflāmationes, & panos in uino folia decocta & illita tollunt. Eadem arida in lacte decocta,

A cocta, quamlibet perniciosæ tussi citissimè medentur. Hippocrates uulneratis, sicutibusq; defectu sanguinis, radicis decoctæ succum bibendum dedit. Et eam uulneribus, cum melle & resina, item cõuulsis, luxatis, tumentibus, & musculis, neruis, articulis imposuit. Et asthmaticis ac dysentericis in uino bibendam dedit. Mirum, aquã radice ea addita addensari sub dio, atq; elactescere. Efficacior aut̃ quo recētior.

EX THEOPHRASTO.

Vfus eius ad rupta, & tussis è uino dulci, & ad ulcera in oleo. Aliàs si carnibus concoquas, in idem aggregare, ac ueluti conglutinare posse affirmant.

DE ANAGALLIDE CAP. VI

NOMINA.



ANAGALLIS græcè, Anagallis latinè, officinis inusitata, germanicè *Gauchheyl* / oder *Colmartraut*. Hoc nominis fortè à Germanis inditum est, quod Anagallis in limine uestibuli suspensa maleficiorum introitū pel-
lere credita sit. Errant qui Morsum gallinæ seu Passerinā uulgò dictam herbam, Anagallida putant: haud secus atque ij, qui Auriculam muris pro Anagallide depictam ostendunt herbarij.

Gauchheyl
Germanis quare
re dicta.

Anagallis non
est Morsus gallinæ,
neque Auricula muris.

GENERA.

Duo duntaxat Anagallidis esse genera ueterum omnium testimonio constat, marem scilicet & fœminā, quæ sanè nullo nisi florū discrimine distant. Mas enim puniceo, fœmina uero cœruleo flore conspicitur. Proinde hallucinari iuniores ac barbaros medicos euidentissimū est, qui plura duobus Anagallidis genera constituunt.

FORMA.

B Frutices sunt Anagallides parui in terra iacentes, folia in quadrangulis caulibus pusilla habentes, & modicè rotunda ad Helxines similitudinem. Semen gerunt rotundum. Non quicquam sanè certius hac scriptorum pictura respondet, cum duplex sit in flore color, puniceus nimirū & cœruleus, quadranguli caules per terram sparsi, folia non toto ambitu rotunda, & semen coriandro nō dissimile circinatum. Non est tamen quod sic humi prostratos hos frutices intelligas, ut profus nō suppullulent. Nam in altum etiam surgunt, non tamen altius, quàm ipsa tibi examulsi-
sim pictura monstrat.

LOCVS.

Pedibus in aruis uineisq; ubiq; calcatur, neq; quicquam nunc Anagallide despectius est, cum tamen in antiqua medicina multus eius fuerit usus. Licet autem ubique ferè proueniat, in uliginosis tamen lætior.

TEMPVS.

Per æstatem utriusq; prouentus maximus est, potissimum autem mense Augusto. Florent autem à Maio mense usque in autumnum.

TEMPERAMENTVM.

Anagallidis uterq; sexus calidam & siccam facultatē obtinet, quod scilicet extergere possint. Mulieres nanq; quæ asperiorē & decolorē à natura cutem acceperunt, ad leuorem nitorēq; uultus harum succo utuntur, ut hac ratione errare necesse sit, qui Anagallidas frigidas & humiditas esse statuunt.

Error quorundā
detegitur.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtraq; mitigandi facultatē habent. Inflammationes arcent, surculos extrahunt, ulcera serpentia cōpescunt. Succus earū gargarissatus pituitā capitis purgat. Per nares infusus dolorē dentium lenit, si in contrariā narem injiciat. Argema cum Attico melle emendat, & oculorū caligines iuuat. Contra uiperarū morsus, renum & ictericis uitiis, ex uino potus prodest. Tradunt nonnulli eam quæ cœruleum florem habet, prociduam sedem reprimere; quæ uero puniceum, illitu euocare.



ANAGALLIS
M.A.S.

Sauchheyl mennle.



ANAGALLIS
FOEMINA.

Saunders & Co. Weible.

B 4

C

EX GALENO.

Anagallis utraq; tam ea quæ florem parit cœruleum, quàm ea quæ puniceum, admodum extergendi facultatem obtinent. Quendam etiam calorem attractoriū possident, ita ut impactos corpori refigant aculeos. Succus earum ex naribus purgateadem de causa. Et ut summam dicatur, exicatoriam citra mordicationē facultatem habent, quamobrē uulnera glutinant, & putrida adiuuant.

EX PLINIO.

Vtriusq; succus oculorum caliginem discutit cum melle, & ex ictu cruorem, & argema rubens, magis cum Attico melle inunctus. Pupillas dilatat, & ideo hoc inunguntur antè, quibus paracentesis fit. Iumentorū quoq; oculis medentur. Succus caput purgat per nares infusus, ita ut deinde uino colluat. Bibitur & contra angues fucci drachma in uino. Mirum, quod scēminam pecora uitant. At si decepta similitudine (flore enim tantum distant) degustauerit, statim eam quæ Asyla uocatur, in remedio quaerunt. Ea à nostris ferus oculus nuncupatur. Præcipiunt aliqui effossuris, ante solis ortum, priusquā quicquid aliud loquantur, ter salutare eam, tunc sublatam exprimere, ita præcipuas esse uires. Vrinam cient Anagallides. Iecinori mirè profunt. Cohibent quas nomas uocant. Vitiles & recentib; plagis, præcipuè senum corpori. Ad recentia quoq; uulnera tanta traditur uis, ut saniem ossibus extrahant. Anagallis cœrulea procidentia sedis retro agit, è diuerso rubens proritat.

Superstitio sum.

DE ALSINE CAP. VII.

NOMINA.

Morsus gallinae.

D

Alfinc cur dicta.

Auricula muris.



ΑΣΙΝΗ græcè, Auricula muris latinè, Morsus gallinae uulgò appellatur. Pauerina Italicè, quod paueris, id est, iunioribus anseribus gratum pabulum sumministrat. Auiculas caueis inclusas, cum fastidiunt escā, aucupes hac herba recreare solēt. Hinc germanicè Vogeltraut / Hünerferb / Hünerderm / Hünerbiß uocatur. Alfinc autem dicta est, quod lucos, quæ Græci ἄλσος nominant, nemorosaq; & umbrosa loca amet, Auricula uero muris, quod musculorum auribus folia similia habeat.

GENERA.

Quamuis Dioscorides & alij unam tantum Alsinen faciunt, nos tamen tria eiusdem genera, licet plura adhuc inueniantur, damus. Primum genus Alsinen maiore uocauimus, quod scilicet uera sit Alfinc, & alijs maior, germanicè Hünerderm nominatur. Alterius generis plantam Alsinen mediā appellauimus, germanicè Hünerferb. Hæc quod ad flores attinet, qui cœrulei sunt, à descriptione uariat: eiusdem tamen cum priore facultatis. Tertij generis herbam Alsinen minorem uocauimus. Hæc, quidem, ut prima, pulchrè descriptioni respondet, germanicè Kleimogeltraut nuncupatur.

FORMA.

Cauliculis serpit rotundis, è quorum geniculis exiles ramuli profiliūt, folijs Helxines minoribus, minusq; hirsutis, flore exiguo, candido, foris herbaceo. Hæc cum teritur cucumis odorem refert. Non autem illam Peponis maturi iucunditatem, sed herbaceum cucumeris odorem subolet. Porrò cum Dioscorides Helxinæ similem esse Alsinen tradit, non de ea Helxine quæ uulgò Parietaria, sed ea potius quæ alio nomine Cissampelos dicitur, intelligas oportet: hæc enim folia Hederæ haud dissimilia obtinet. Aded ut liquidò iam cõstet, Alsinen esse eam herbam quam passim hodie Morsum gallinae appellant. Huc accedit quod facultates, ut ex sequentibus patebit, quas uulgus Morsui gallinae tribuit, ab Alsinis uiribus nihil uariant.

Helxine duplex.

LOCVS


Nascitur in lucis, hortis, & maximè in parietibus, macerijis, opacisq; locis.

TEMPVS.




ALSINE
MAIOR

Lunaria.



ALSINE
MEDIA.

Günerserb.



ALSINE
MINOR,

Kleinnogelkraut.

TEMPVS.

Incipit à mēdia hyeme. Arefcit autē æstate media. Cum proreperit, muscutorū aures imitatur folijs.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerantem & humectantem haud secus quàm Helxine obtinet facultatem: est enim aqueæ essentiæ frigidæq̃; quare & citra adstrictionem refrigerat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Alfine refrigerandi facultatem obtinet. Oculorū inflammationibus cum polenta illita cōuenit. Succus eius aurium doloribus instillatus prodest. In uniuersum eadem quæ helxine potest.

EX GALENO.

Ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

EX PLINIO.

Vfus eius ad collectiones inflammationesq̃. Quin emendat omnia quæ Helxine, sed infirmius. Epiphoris peculiariter imponitur: item uerendis ulceribusq̃ cum farina hordeacea. Succus eius auribus infunditur.

APPENDIX.

Easdem facultates, herbis quas morsus gallinæ uulgo nominant, nostri temporis herbarij tribuunt, quod scilicet ad feruentes inflammationes, ac erysipelata profint. Omnes enim, ut dictum est, refrigerant atque humectant. Hinc est quod minorem aliqui Germanorū Siebertrant uocent, quia scilicet febribus accōmoda, & utilis sit.

DE ANTHEMIDE CAP. VIII.

NOMINA.


D Chamæmelon
cur dictum.



ΝΟΕΜΙΣ, ἢ χαμαίμηλον græcè, Anthemis, Chamæmelon latinè, officinis corrupto nomine Camomilla dicitur, Germanicè Camillen, Chamæmelon, quoniam odorem habeat mâli, appellant, id quod de primo genere potissimum intelligendum uenit.

GENERA.

Tria eius genera, floribus tantum distantia, inueniuntur. Hi enim etsi intus aurei sint, tamen foris per ambitū illis adiacent folia aut candida, aut lutea, aut purpurea. Quæ foris in orbem candida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκάνθημον, & uulgo hodie Camomilla uocatur. Quæ uero luteis per ambitum folijs cōstat, ea haud dubie est, quæ priuatim Dioscorides à suis floribus χρυσάνθημον nominat, Germani autem, pulchrè ad græcam appellationem alludētes, Goldtblumen, / Gelcamillen, / Streichblimen appellant. Tertia species chamæmeli, quæ nimirū purpurea per orbem folia habet, nulla alia est nisi ea quam hodie uulgo medicorum Consolidam regalem, Germani autē à similitudine calcaris, cui respondet flosculus eius herbæ, & à colore lepto regioq̃, qui aspectari nunquā satis potest, Kittersporn uocant. Dioscorides peculiariter ἰερὸν ἀνθημον, eo quod uere floreat, dici tradit. Tria itaq̃; in uniuersum Anthemidis seu Chamæmeli genera sunt, quorum sanè primum Chamæmelon leucanthemon, alterū Chamæmelon chrysanthemon, tertium Chamæmelon eranthemon Dioscoridī nominatur. De duobus primis generibus neminē dubitare, quin uera & legitima sint, arbitramur, quod nihil in ijs sit quod Dioscoridis descriptioni, quam mox subiiciemus, non respondeat. Tertium fortè nonnullis qui morosius omnia obseruant, minime genuinum Chamæmeli genus esse uidebitur: ideoq̃; quibus simus argumentis & cōiecturis impulsī, ut tertium Anthemidis esse genus credamus, necesse erit ostendere. Potissimū autem quod nos in hanc sententiam pertraxit est, quod singula in Dioscoridis descriptione illi congruant, rami scilicet palmum non excedentes, fruticosi, multas alas habentes, parui & exigui, capitula




CHAMAEMELON
LEVCANTHEMON.

Camillen.



CHAMAEMELVM
CHRYSANTHEMON.

Gel camillen.



CHAMAEMELVM
ERANTHEMON.

Bittersporn.

C 20

C pitula rotunda, aurea, foris purpureis folijs, magnitudine in nullo alio genere Rutę folijs magis similibus circumdata. Deinde sententiam hanc nostram cōfirmavit antiquissimus codex manuscriptus, in quo pictura exquisitissime Regalem dictā consolidā refert, quam ijs sanē uerbis describit: Herba est quam quidā Monachellā, siue Capuciarīā uocant (ā cucullo haud dubiē monachorū, quem flores illius herbę referunt, nomen imponentes) Dioscorides Eranthemom appellat, & est una species Anthemidis, quę folia instar Camomillę habet, nigriora tamen: florem autem uio lę similē. Hęc ille. Quibus omnibus illud etiā accedit, nostram de hac herbā sententiam mirificē corroborans, quod uulgus hodie medicorū Consolidā regalē calculosis, & oculis prodesse tradat, ad eō ut illius etiā conspectū multos ex oculis laborantes sanasse dicant. Atq; hinc fit ut studiosi passim eam herbā in suis musæis suspensam habeant, oculis hac ratione cōsulere uolentes. Has autem omnes facultates ut ex sequentibus patebit, Eranthemom suo Dioscorides etiam adscribit. Quamobrem nihil certius est, quàm Consolidam regalem tertium esse Anthemidis genus, id quod argumenta nostra iam adducta palām euincunt.

FORMA.

Rami palmum non excedunt, fruticosi, frequentes alas habentes, parui, tenues & multi, capitulis rotundis. Flores intus aureos continent, foris uero per ambitum candidos, aut luteos, aut purpureos, foliorum Rutę magnitudine.

LOCVS

Nascuntur in aspero, sicco, macroq; solo, & iuxta semitas atq; itinera.

TEMPVS.

Colliguntur uere, in calidis potissimum regionibus, in nostris inter æstatis initia, hoc est, Iunio mense.

D

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & desiccant in primo ordine.

VIREŚ. EX DIOSCORIDE.

Vim habent radices, flores & herba calfaciendi, extenuandiq;. Potu & infusione menses, fœtus, calculos & urinam pellunt. Aduersus inflationes, & tenui intestini dolores bibuntur. Bile suffusos expurgant, & icinorosis medentur. Decocto earum uescicę uitia fouentur. Efficacius ex omnibus generibus est, quod florem fert purpureum, ceterisq; maius existit, idq; propriē Eranthemom uocatur. Quod uero Leucanthemon & Chrysanthemom cognomināt, uehementius urinam ciunt. Aegilopijs illitę medentur. Commanducata oris ulcera sanant. Nonnulli in dysteribus ex oleo utuntur, terentes ipsas ad pellendos febrium circuitus. Folia & flores reponi debent, & separatim contusa in pastillos conformari. Radix quoq; sicatur, & usu poscente interim partes duas herbę, floris aut radicis modō unam: interim contrā floris duas, & herbę unam, alternis diebus duplicantes pondus, dare conuenit. Bibere autem oportet in uino diluto mulso.

EX GALENO.

Tenuium est partium, quamobrem digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatē obtinet. Est itaq; Chamemelon tenuitate Rosę per simile, calore uero ad olei facultates magis accedit, animali familiares, & temperatas. Quapropter lassitudinib; ut si quid aliud, cōfert, doloresq; mitigat. Præterea tenfa remittit & laxat, quæq; mediocriter dura sunt emollit, quæq; cōstipata cōdensatę sunt rarefacit. Ad hæc febres quæ citra uisceris alicuius inflammationē infestant, dissoluit, præsertim quæ ex humorib; biliosis, aut cutis densitate cōsistunt. Qua de re & ab Aegyptiorū sapientissimis Soli cōsecrata est, febriumq; omniū remediū putat. Verum hac quidem in re à ueritate aberrat: solas enim quas diximus febres sanare potest, easq; quæ iam cōcoctę sunt. Iuuat autem pulchrē reliquas etiam omnes quę melancholicę sunt aut pituitosę, aut ex uisceris inflammatione prognatę; nam & harum remediū Chamemelum

melum

A melum uel strenuissimū est, ubi iam cōcoctis adhibetur: quapropter & hypochondrijs, ut si quid aliud, gratum existit.

EX PLINIO.

Medici uere folia tusa in pastillis digerunt: item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ unius pondere contra serpentum ictus. Pellit mortuos partus, item menstrua in potu, & urinam, calculosq; inflationes, iecinorū uitia, bilem suffusam, ægilopia. Cōmanducata ulcerum manantes in ore eruptiones sanat. Ex omnibus ijs generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius & foliorum & fruticis amplitudo maiuscula est. Hanc propriè quidem Eranthemon uocant.

DE ANETHO CAP. IX.

NOMINA.



ANETHON græcè, Anethum latinè appellatur. Nomen in officinis genium retinet. Germanicè Dyllen/ & Hochtraut nominatur.

FORMA.

Anethum sesquicubitali proceritate assurgit, multicaule, ramosum, exilitate folij in staminis penè modum extenuata, luteolo flosculo, semine lato & quasi foliato, radice lignosa, neque adeò proluxa, umbella fœniculi, cui cognatum quasi genus, propter similitudinem uideri potest.

LOCVS.

In hortis feritur: interdum & sponte, fœniculi modo, prouenit.

TEMPVS.

B Floret in æstate, Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Anethum adeò calefacit, ut habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantiū uero ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Vstum autem tertij tum calefacientium, tum desiccantium ordinis fit.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Anethi aridi comæ feminisq; decoctum potum lac euocat. Tormina & inflationes sedat. Aluum leuesq; uomitiones sistit. Urinam cit. Singultus lenit. Oculos hebetat, & genituram assidue potum extinguit. Decoctum eius mulieribus præfocacione uulvæ laborantibus ad insidendum utile. Semen eiusdem ustum & illitum condylomata tollit.

EX GALENO.


Anethum in oleo decoctum digerit, sedat dolores, somnum conciliat, crudos & incoctos tumores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies pus mouentibus, & maturantibus uocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tum calidius, tum tenuiorum partium est, atque adeo digerēdi facultate præditum. Vstum ulceribus admodum humidis illitum prodest, potissimum ijs quæ in pudendo consistunt. Quæ autem in præputio sunt inueterata, ijs probè cicatricem inducit. Cæterum uiride humidius est, & minus calidum, itaq; magis cōcoquit sicco, & somnum cōciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi uidentur ueteres coronis ex eo concinnatis in sympoijis usi esse.

EX PLINIO.

Anethū ructus mouet, & tormina sedat. Aluum sistit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua uel uino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptū ex aqua sedat cruditates. Cinis eius uam in faucibus leuat, oculos & genituram hebetat.

EX SIMEONE SETHI.

Ad crassorū humorū inflationes prodest. Quidā sanè ipsum stomacho bonum



ANETHVM

Dill.

A esse, alij uero minimè, dixerunt. Illi quidem ad eius caliditatem, & facultatē quæ humiditatem cōcoquit, & flatus qui sunt in uentriculo discutit, respexerunt: ij uero ad substantiam eius, quæ crassarum est partium, concoctu difficilis, & nauseosa. Oleo incoctum discutit, & somnum conciliat. Inunctū tumores crudos concoquit. Inflationes quoque quæ in uentriculo generantur, digerit. Corpus ex immodico labore defatigatum, curat. Renes uero, ut quidam aiunt, lædit.

DE AIZOO CAP. X.

NOMINA.



AIZON græcè: Aizoon, Sedum, Semperuiuum latinè nominatur. Postremum nomen officinæ obtinuerunt. Vulgò Iouis barba, Germanicè *Hauswurß*, *Donderbar* dicitur, quòd scilicet nonnullis locis plebis animos iam pridem inuasit opinio, non ferri fulmine domum, in cuius tegulis uireat Sedum. Porro Aizoon & Semperuiuum appellant, quòd perpetuò, tam æstate quàm hyeme uireat, nec ullis frigoribus, aut cœli iniuria quantumuis frigida, emoriatur.

Iouis barba.

GENERA.

Dioscoridem sequentes tria eius genera statuiamus. Primum Aizoon seu Sedum maius, quod folia latiora habeat. Alterum Sedum minus, quod Græcis etiam *τρυβελές*, quia ter floreat in anno, uocatur. Vulgò Vermicularis, à similitudine foliorum, quæ rotunda sunt, & figuræ oualis, ut uermiculos putes, & Crassula minor nominatur. Huius iterum duo sunt genera: alterum enim mas est, quod nimirum floribus luteis spectatur, & Germanis *Klein hauswurß das mennle* appellatur. Alterum fœmina, quod pallidis seu candidis conspicitur floribus, Germanicè *Klein hauswurß das weible* uocatur. Tertium genus est quod Aizoon syluestre, ab alijs Portulaca syluestris, aut Illecebra minus rectè & improprie dicitur. Nam Portulaca syluestris diuersa ab hoc tertio Sedi genere herba est, ut suo dicemus loco. Illecebræ autem nomen aliæ debetur herbæ, quæ Telephion uocatur, ut in eiusdem historia docebimus. Nomina uero hæc generi illi indiderunt, seducti errore eorum qui Portulacam syluestrem cum tertio Aizoo apud Dioscoridem confuderunt, atque adeò quæ debent Portulacæ & Telephio nomina; Aizoo temerè assignarunt. Ut enim uiribus diuersa est Portulaca syluestris ab hoc genere tertio Aizoi, ita etiam nomine & forma. Quare merito reprehendendi sunt qui duo hæc capita sic sibi temerè miscuerunt. Vulgares herbarij Vermicularem minorem uocant, Germani *Kasentreuble oder Waurpfeffer*.

Aizoon maius.

Vermicularis.

Crassula minor.

Aizoon minus.

Tertium genus

Aizoi.


FORMA.

Semperuiuiū maius caules profert cubitales, interdū etiam maiores, pollicis crassitudine, pingues, egregiè uirentes, incisuras Characiæ Tithymalli instar habentes. Folia pingua, pollicis magnitudine, in cacumine linguæ similia, alia in terram resu pinata, alia in capite inuicem contracta, circulo oculi figuram circumscribunt. Minus Aizoon caules ab una radice exeuntes multos habet, tenues, folijs plenis rotundis, pinguibus, paruis, in summo acuminatis. Emittit autē è medio caulem palmi altitudine, umbellam & flores pallidos luteosue sustinentem: *χλωρά* enim hoc loco, ut aliàs sepe, pro *ώρα* accipitur, id quod ex Serapione etiam abunde constare potest, qui hunc Dioscoridis locum ita reddidit: Et habet uirgam in medio longam, circa longitudinem palmi, super quam est capitellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Eam autem Semperuiui minoris speciē quæ flosculis luteolis spectatur, dilucidioris doctrinæ gratia, marem appellauimus. Alteram uero quæ candidos obtinet flores, fœminā. Tertium Semperuiui genus syluestre dictum, foliola habet pinguiora, ad Portulacæ figuram accedentia, & hirsuta, breuioriq; cacumine. His uerbis ex-

Maius.

Minus.

χλωρά.



SEDVM MAIVS

Stoßhaufwurz.




SEDVM MINVS
M.A.S.

Klein haustwurz
mennle.



SEDUM MINVS
FOEMINA.

Klein haustwurtz weiblich.



SEDI TERTIVM
GENVS.

Katzencreble.

cquisitè admodum Dioscorides & Plinius tertium Aizoi genus, quod uermicularè minorem hodie appellant, deliniarunt. Habet enim pinguia admodum foliola, ad Portulacæ syluestris formam nonnihil accedentiã, hirsuta, & breuiori quàm in Aizoo minori cacumine. Reliqua quæ sequuntur in quibusdam Dioscoridis exemplaribus, manifestè adulterina sunt. Neq; ijs plura habet Aldinũ exemplar, & alia quæ paulò sunt castigatiora.

LOCVS.

Maius nascitur in montanis & testeis. Nonnulli autem in tectis domorum conserunt. Minus Aizoon in muris & petris, macerijis uinearũ, parietibusq; prouenit. Tertium in petrosis locis, sepulchris umbrosis, oppidorumq; fossis.

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio mensibus maius & minus. Tertium autem genus in Maio tantum floribus ornatur luteis.

TEMPERAMENTVM.

Aizoon utrunque, tam maius quàm minus, desiccant modicè, uehementer autem refrigerant: sunt enim ex tertio ordine & recessu refrigerantium. Tertium genus calidum esse, Dioscoridis & omniũ ueterum testimonio constat. Gustus etiam minimè reclamatur: si enim gustaueris, linguam uehementer urit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Maius uim obtinet refrigerandi & adstringendi. Conferunt ad erysipelata, herpetas, nomas, oculorũ inflammationes, ambusta, podagras, folia per se, & cum polenta illita. Succus uero cum polenta & rosaceo, capiti in doloribus infunditur. Datur à phalangio morsis in potu, diarrhœa laborãtibus, dysentericisq;. Teretes lumbricos cum uino potus excutit. Subditus in pello, muliebres fluxiones sistit. Succus etiam lippientibus à sanguine utiliter inungit. Minoris folia antedicto eandem facultatem habent. Tertium genus calcificandi uim habet, acrem, & exulcerantem. Cum axungia illitum, strumas discutit.

EX GALENO.

Semper uim utrunq; tam maius quàm minus desiccatur modicè, quandoquidè & mediocriter adstringat, omnis alterius uehementis qualitatis expert: quare in eo aquea essentia abundat. Refrigerat non mediocriter, ideoq; ad erysipelata, herpetas, & à fluxione natas phlegmonas prodest.

EX PLINIO.

Vtriusq; uis eadem, perfrigerare & adstringere. Medentur epiphoris folia imposita, uel succus inunctus. Purgant enim ulcera oculorum, explentq;, & ad cicatricè perducunt. Palpebras deglutinant. Eadem capitis doloribus medentur, succo uel folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum ictibus: aconito uero maius Aizoom præcipuè. A scorpionibus quoque feriri id habentem negant. Medentur & aurium dolori.

APPENDIX.


Errat non parum hodie magna medicorũ pars, qui Sedi genus tertium refrigerare, asserere haud uerent. Et mirum sanè cur ab eo errore illos Dioscorides non reuocet, qui difertè ait, hoc ipsum calcificandi, & exulcerandi facultatem habere. Sed fortè non magnopere laborant quid de hac planta Dioscorides tradat: debuisset tamen erroris huius admonuisse eos saltem germanica eius plantæ nomenclatura. Neque enim alia ratione *Waurpfeffer* nostris Germanis dicta est, nisi quod in muris proueniat, gustuq; acris admodum sit.



PLANTAGO
MAIOR.

Bieyt wegrich.

D



PLANTAGO
MINOR.

Spitziger Weg-
rich.

NOMINA.



PNOTΛΩΣΣON Græcis: Arnoglossum, Plantago Latinis nominatur. Nomen latinū Plantaginis officinæ retinuerūt. Germanicè Wege rich/ Schafzungen/ quod nomen græco pulchrè respondet, dicitur. Arnoglossum, quod eius folia agnitiuæ linguæ simillima sint, appellarūt Græci. Latini autem Plantaginem, ducto à planta uocabulo, nuncuparunt. Sunt tamen qui à multitudine neruorum, quibus quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sunt, Polyneuron uocant.

Arnoglossum un
de dicitur.

Plantago.

Polyneuron.

GENERA.

Duo Plantaginis sunt genera, ueterum omnium sententiâ, maior & minor. Maior, quam peculiariter à septenis quæ in folijs apparent costis, græcè ἐπὶ ἑπτὰ πλάστρον, id est, Septineruiâ uocant, Germanis nostris à foliorum latitudine grosser oder breyter wegrich nominatur. Minor, eo quod eius folia fibris quinq; tanquã neruis distincta sunt, πενταπλάστρον, id est, Quinqueneruia dicitur. Officinæ, quoniam folium arctius definit in acumen, & uelut in lanceæ mucronē fastigiatur, Lanceolatam, uulgus autem Lanceolam appellat. Germanicè klein oder spiziger wegerich/ quia scilicet acuminatior & longior est, & ab equinæ costæ similitudine, Rossripp uocatur.

FORMA.

Minor Plantago angustiora, minora, molliora, leuiora & tenuiora folia habet, caule anguloso, in terram inclinato: flores pallidos: semen in summis caulibus. Maior contra crassior uegetiorq; latiore folio, betaceo. Folia siquidem maioris Plantaginis betaceorum effigiem, nō alterius oleris referunt, quod Dioscorides λαχωνίδιον dixit. Nam apud Athenienses λαχωνιον pro Beta sæpe sumi solet, à cuius folijs non multum Plantaginea uidentur abhorrere. Non itaq; olus intelligere potuit, cum in exprimenda similitudine speciatim loqui, non generatim conueniat. Huius caulibus angulosus, subruber, altitudine cubitali, à medio sui ad uerticē usq; tenui semine circumdatus, flosculum in spica luteum, nōnunquam herbaceum ostentat. Radices subfunt illi teneræ, hirsute, candidæ, digitali crassitudine. Descriptiones hæ Dioscoridis pulchrè picturæ respondent. Antiquus etiam herbarius eandem pro maiori & minori Plantagine herbas exhibet.

Minor.

Maior.

λαχωνιον

LOCVS.

Maior in palustribus potissimum nascitur. Vtraq; autem circum sepes, aggeres, prata, & lacunosa loca.

TEMPVS.

Herba & flores in ætatis initio, Maio & Iunio mensibus, semen uero Augusto carpitur mense.

TEMPERAMENTVM.

Mixtæ est temperaturæ Plantago, habet enim quiddam aqueū frigidum: habet uero & austerum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul & deficcatur, & in utroq; secundū recessus à medijs est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habent folia exicatoriâ & adstringentē, ideo ad omnia ulcera maligna, elephantica, quæ humore scatent, & sordida, cōferunt. Eruptiones sanguinis, nomas, carbunculos, herpetas, epinyctidasq; cohibent. Vlcerata uetera & inæqualia cicatrice obducunt. Medentur & ijs quæ Chironia nuncupantur. Sinus glutinant. Morsibus canis, ambustis, inflammationibus, parotydi, panis, profunt. Strumis & ægilopis cum sale illita cōferunt. Olus coctū cum aceto & sale dysentericis & coeliacis sumptum subuenit. Datur & in locum Betæ cum lenticula coctum. In leucophlegmatia post aridas epulas in medio herba decocta datur. Comitialibus & asthmaticis data proficit. Foliorū succus oris ulcera continua collutione purgat. Cum creta cimo-

c lia & cerusa ignibus sacris medetur. Fistulas infusus sanat. Auriū doloribus & lipitudinibus succus instillatus, & collyrijs additus prodest. Gingiuis sanguinolentis, & sanguinē reijcientibus potus cōfert. Dysentericis subter per aluum inijcitur. Bibitur contra tabem. Aduersus uteri strangulationes in lana apponitur: item uulua fluxiones. Semen cum uino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. Radix decocta collutione, & cōmanducata, dentiū dolores sedat. Eadem cum folijs in passo ad uesticā renumq; ulcera præbetur. Ferunt tres radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ potas, tertianis auxiliari, & quatuor quartanis, Sunt qui radice è collo suspensa ad strumas discutiendas utantur.

EX GALENO.

Quæcunq; medicamenta cum hoc quod refrigerant unà etiam adstringunt, ea & ad ulcera maligna omnia, & ad fluxiones, & putredines profunt, atque adeo etiã ad dysenterias: nam & sanguinis eruptiones sistunt, & si quid aduratur refrigerant. Sinus quoq; glutinant, & alia ulcera recentia simul & uetera. In omnibus ferè id genus medicamenti primas tenet, aut certè nulli secundū est Arnoglossum, idq; temperaturæ symmetria. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatē quæ nondum obstupefaciat. Semen eius & radix similis sunt facultatis, attamen siccioris, & minus frigida. Semen etiam subtilium est partium, radices autem crassiorū. Et huius herbe folia exiccata, subtilioris & minus frigida facultatis fiunt, nempe difflato ex eo ac digesto excremento aqueo. Hac ratione radicibus utuntur ad dentiū dolores, tum manducantes, tum collutionibus incoquentes. Præterea ad iecinoris & renum obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoque & multo magis semen: hæc enim quandam abstergendi in se facultatē habent, quam & in herba uiridi inesse satis conijci potest, uerum ab humiditatis copia uinci.

D

EX PLINIO.

Vis mira in siccando densandoq; corpore, cauterij uicem obtinens. Nulla res æque sistit fluxiones, quas greci rheumatismos uocant. Stomachū corroborat Plantago per se sumpta in cibo cum lente alicæ uē sorbitione. Strumis medetur. Semen eius in uino tritum, uel ipsa ex aceto cocta, aut alica ex succo eius sumpta dysentericis datur. Lichenis foedo malo medetur trita. Vitia sedis & attritus celerrimè sanat. Ex aqua mulsa duabus horis ante accessionem pota duabus drachmis, tertianas leniores facit, uel succus radicis madefactæ uel tusa, uel ipsa radix trita in aqua ferro calefacta. Quidam ternas radices in tribus cyathis aquæ dederunt. Idem in quartanis quaternas fecerunt. Hydropicos sanat in cibo cum prius panem siccum comederint sine potu. Folia podagras refrigerant, & in primo impetu podagræ rubentis, hoc est, calidæ, conueniunt. Oris ulcera succus emendat, & folia radicesq; cōmanducata, uel si rheumatismo laboret os. Vitio reiectionis sanguinis idem medetur. Phthisim sanat si bibatur, & ipsa decocta in uino cum sale & oleo à somno matutino refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollunt folia tusa, addito sale modico. Fistulis infusus succus auxilio est. Sanguinis profluuium sistit semen, si ore reijciatur, siue aluo fluat, siue foeminarum utero. Succus uomentibus sanguinem datur.

Contusis, euerfis omnibus modis ipsa sumitur. Medetur omnium generum ulceribus, peculiariter foeminarum, senum, & infantium, igne mollita, melior & cum cerato.



PLANTAGO
AQUATICA.

Wasserweggrich.

C

NOMINA.

Plantago aquatica.



ALISMA, ἢ δ'αμασονίον græcè: Alisma, Damafonium latinè nominatur. Sunt qui eam herbam esse putent, quam herbarij & uulgi nominant Barbam syluanam, & Plantaginè aquaticam: nōnulli uero eam, quam multi pastoralem fistulam uocāt. Prior Germanis Wasser wegrich / & Groschlöffel / quod scilicet in palustribus nascatur, ubi frequentes sunt ranæ. Altera uero ipsidem Hirtenspeiff nominatur. Plantaginem autem aquaticā, ob natales & similitudinem quæ illi cum uera Plantagine est, dixerunt: quemadmodū fistulam pastoralem, quod singulari scapo rudis fistulæ & longitudinē & effigiem quandam uideatur imitari. Quæ uero nostra de ijs sit sententia paulò post indicabimus.

FORMA.

Alisma folia Plantagini similia habet, angustiora tamen & in terram reflexa, demissaq;. Caulis illi est tenuis, simplex, altitudine cubitum excedente, thyrsis similis, capitula habens. Flores tenues, candidos & aliquatenus pallidos obtinet. Radices ut Ellebori nigri tenues, odoratas, acres, modicèq; pingues. Ex qua quidē delinatioe satis constat neutram herbarum quarum picturas damus, esse Alisma. Nam herba quam hodie Plantaginem aquaticam uocant, non per omnia historiæ respondet. Ut enim alia præteream, radix eius neque odorata, neque acris est. Alterius autem, quam pastoralem fistulam nominauimus, etsi radix odorata sit, minimè tamē acris existit. Quicquid tamen sit, hac potius quàm altera pro Alismate utendum esse cenfeo. Eius effigiem suo loco dabimus.

LOCVS.

Aquosa amat loca, in quibus passim nascitur.

TEMPVS.

D In æstate colligi potest, tum enim floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse hanc herbam satis monstrant radices, quas acres esse constat. Absterforiam etiā quandam in se facultatem obtinet.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Radix unius aut alterius drachmæ pondere cum uino pota, his qui leporem marinum deuorarunt, prodest, & quos rubeta rana momorderit, quicq; opium hauserunt. Torminibus & dysenteria per se, aut cum Dauco pari pondere pota confert. Conuulsis itidem & uteri strangulationibus. Herba fistulæ aluum, menses ducit, & œdemata illita lenit.

EX GALENO.

Damafonium aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, quod radix eius epota dysenterias sanet, & aluum sistat, atq; œdemata mitiget. Nos uero ea experti non sumus. Quod autem cōstitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit pota cōminuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quod absterforiam quandam facultatem obtinet.

EX PLINIO.

Vfus in radice aduersus ranas & lepores marinos. Lepori marino aduersatur in uino potum. Strumis imponitur ex aqua cœlesti folium tritum, uel radix cum a-xungio tusa, ita ut imposta folio suo operiatur. Sic & ad omnes ceruicis dolores, tu moresq;, quacuncq; in parte.




ARTEMISIA
LATIFOLIA.

Beifuß.

D 4

45




ARTEMISIA
TENVIFOLIA.

Nett. & Schum.



ARTEMISIA
MONOCLONOS.

Reinfarn.



TAGETES
INDICA.

Indianische
negelen.

NOMINA.



ARTEMISIA Græcis, Artemisia latinis, Germanis *Bey süß* / *Bucken* / *S. Johans gürtel* / *Sonnenwend gürtel* / oder *Grosser reinfaru* appellatur. Officinę ueterem appellationē retinent. Nomen herbę inditum putant ab Artemisia uxore Mausoli regis, quę sibi hanc herbam adoptauit, cū antē Parthenis, id est, uirginalis, quod uirgo dea illi nomen dederit, uocaretur. Non desunt qui ab Artemide cognominatā arbitrentur, quod priuatim foeminarū malis, quibus *ἀρτεμεις*, hoc est, Diana præest, medeatur. Nomen Germanicū *S. Johans gürtel*, quasi diui Ioannis zonam dicas, à superstitionis nōnullis monachis & mulierculis herbę huic impositum est. Nam fuerunt qui non coronas duntaxat, sed etiam zonas ex ista herba cōfecerunt, quas tandem in ignem, qui in die diuo Ioanni baptistę sacro, in singulis plateis urbium succendebatur, nescio in quem euentū, proiecerunt, haud dubiē hac herba in deserto diuum Ioannem cinctum fuisse somniati.

Artemisia uide dicta.

GENERA.

Tres sunt, Dioscoride teste, Artemisię species, quę etiam hodie apud nos passim reperiuntur. Prima *πλατύφυλλος*, latinē Artemisia latifolia dici potest. Ea autem est quę simpliciter hodie Artemisia uocatur. Huius iterū duo sunt genera colore duntaxat distantia: unū caule & floribus rubens, Germanis *Rot bucken* / uel *Rot bey süß* dicitur: alterum candidans caule, floribus uero flauis, Germanicē *weiß bucken* appellatur. Altera gręcē *λεπτόφυλλος*, latinē uero Tenuifolia nominatur: quod quidē genus uulgus hodie *Matricariā*, Germani *Müstertraut* / & *Wettram*, quod uteri, quem *matricē* uocant, morbis medeāt. Tertia species Artemisia monoclonos dicitur, Tanacetū corrupto nomine pro Tagetē hodie nominant, Germani *Reinfaru*, quod filicis ferē speciē referat, & in aquarum ripis nascatur. Alio nomine *Wurmtraut*, quoniā lumbricos ē uentre pellat. Esse uero hanc herbam aliquam Artemisię speciē uel hinc etiam cōstare potest, quod primam speciē, ut diximus, nōnulli Germanicē *Grossen reinfaru* uocant: hac enim nomenclatura manifestē docent, & eam quam Tagetem appellant Artemisię esse congenerem, quod scilicet eandem habeat appellationē. Huius haud dubiē generis est herba quę elegantissimos profert flores, garyophyllos Indos uocatos: nulla enim in re nisi floribus, qui sunt elegantiores & longē maiores, ab hac nostra distat: odore tamē nostrā hanc etiam uincit. Hinc est quod Tagetē Indicam appellauerimus, Germanicē autem *Indianische negelen*. His autē herbis tribus cōuenire Dioscoridis descripsiōes faciliē unus quisq; ex ijs quę paulō pōst dicemus cognoscat. Esse autem Artemisię genera ex manuscripto codice, quem ob uetustatem lubens cito, manifestē colligi potest. Is enim pictas ordine tres iam cōmemoratas herbas ita ob oculos ponit, ut nemo qui illas uel semel saltem uiderit, non agnoscat. Picturę accedunt descripsiōes, & nomenclaturę hodie etiam usitatę. Primam enim Artemisiam, alteram *Leptophyllon* & *Matricariam*, tertiam uero Tagetem, quo nomine Apuleius usus est, & Tanacetum appellat, ita ut nemo deinceps quin uera sint Artemisię genera dubitare debeat, aut meritō possit.

Artemisia latifolia.

Artemisia tenuifolia.

Matricaria.
Artemisia monoclonos.

Tanacetum.
Tagetes.

FORMA.

Prima species quę priuatim Artemisia dicitur, fruticosa est herba, Absinthio similis, maiora tamen & pinguiora folia habet, quę supernē ex nigro uirescunt, subter autem candidāt, crebrō etiam resecta sunt. Flos illi tenuis, & semen rotundū. Altera, folia tenuiora obtinet, flores exiguos, tenues, albos, & grauiter olentes. Porro *Sampfuchi* odorem cōfricata eius folia & flores referūt. Quę utiq; descriptio ita *Matricariā* uulgō dictam herbā exprimit, ut nemo non, nisi talpa cecior sit, hanc esse al-

Artemisia.

teram

C^{teram} Artemisiæ speciem uideat. Fruticosa enim herba est Matricaria, folijs quam sit Artemisia propriè dicta gracilioribus, floribus tenuioribus, per ambitum albis, (intus enim lutei existunt) grauius cum uniuersa herba olentibus. Hallucinant itaque qui Serapionis interpretem secuti, Dioscoridis Parthenium esse putant, ut suo loco abundè demonstrabimus. Tertia *μονόκλων*, hoc est, unicaulis dicta, simplici caule confurgit, folijs minutim scissis. Caulis in summo floribus luteis & tenuibus abundat. Hæc odoris iucunditate priorem uincit. Quæ sanè descriptio pulchrè herbam Tanacetum appellatam hodie, deliniat, ita ut tertiam esse Artemisiæ speciem nemo dubitare debeat, aut saltè iure queat. Tagetes Indica caule exurgit rubescente, ramulis multis brachiato, folijs tenuibus, minutim scissis, & grauius odoratis, floribus in summo caule luteis, & croci ferè colorem referentibus, elegantia nulli alteri cedentibus.

Parthenium non est Matricaria.

Tanacetum.

LOCVS.

Prima nascitur in aquosis, incultis, asperisque locis. Altera in hortis, locis siccis & lapidosis. Tertia in aquarum ripis, atque uinearum aggeribus passim prouenit, unde Germanicè appposito uocabulo *Keinsfarri* uocatur. Indica Tagetes non nisi sata prouenit in Germania.

TEMPVS.

Singula genera tria æstate, potissimè cum uua maturefcit, tunc enim abundant floribus, colliguntur. Indica paulò tardius in nostra regione floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & modicè desiccant, & sunt, quod ad calefactionem attinet, ordinis secundi: quod uero ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sunt etiam modicè tenuium partium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Excalfaciunt & extenuant. Feruefacte profunt ad infessus muliebres, ducendos ^D menses, secundas, & fectus. Vteri præclusionem atque inflammationè iuuant, lapides frangunt, & urinæ suppressionem tollunt. Herba ipsa imo uentri illita copiosa, menses mouet. Succus eius cū myrrha subactus & admotus, ex utero elicit quæcuncq; & infessio. Bibitur etiam coma trium drachmarum pondere eorundem ducendorum gratia. Si quis stomacho laborans Artemisiam leptophyllon contuderit probè cum oleo amygdalino, & ueluti malagma confecerit, stomachoq; impo fuerit, sanabitur. Neruorum quoque dolore si quis affectus fuerit, ac succum eius cum oleo rosaceo miscens inunxerit, curabitur.

EX GALENO.


Ad renum calculos mediocriter, & ad uteri fomentationes profunt.

EX PLINIO.

Artemisia priuatim sceminarum malis medetur. Eandem quoq; secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, bestiam uel ullam, ne solem quidem. Bibitur & hæc ex uino aduersus opium. Alligata priuatim potens traditur, potaue aduersus ranas. Alligatam qui habet uiator, negatur lassitudinem sentire.

APPENDIX.

Præter dictas facultates usu compertum est, flores Tanaceti pueris ex uino uel lacte datos, mirificè ex uentre lumbricos pellere, ideoq; Germanis herba lumbricorū, ut paulò antè diximus, appellata est hæc Artemisiæ species.



APARINE

Klebkraut.

B

C

NOMINA.

Errant qui putāt legendū esse ὀμφαλόκαρπον, nam Dioscoridis & Pauli exemplaria castigatio omnia habent ὀμφαλόκαρπον. Cui sanē lectio nō ratio ipsa subseribit, cū sic nominata sit ab umbilici specie, quā fructus eius refert. Quare cum altera lectio ratione omni destituta sit, immeritō ab Orosio Hispano Hermolaus, Marcellus, et Ruellius Dioscoridis interpretes ὀμφαλόκαρπον legētes taxantur.



APARINE, ὀμφαλόκαρπον, ὀφιλάνθρωπον græcè, Aparine latinè, Klebtraut Germanicè nominat. Omphalocarpus ab umbilici similitudine, quam semē eius refert, rectè dicta est. Philanthropos autem uox humanitatis amoris & comitatus illi imposita est, quod blanda, comis, & hospitalis herba sit, nec aliter prætereuntiū uestes apprehendat, quàm solent amici & hospitaliores à se discedentes comprehensa ueste retinere, aut si id nequeant, aliquandiu sequi. Quam appellationem pulchrè Germani exprimentes, Klebtraut nominant: est enim illis kleben / quod latinis tenaciter adhærere. Officinæ & herbarij nōnulli Aspergulam hodie uocant: rectius tamen una detrита litera nominarent Asperulā, quod asperitate sua attingentiū uestimentis pertinaciter hæreat.

Omphalocarpus.
Philanthropos.

FORMA.

Ramulos habet Aparine multos, exiguos, quadrangulos, & asperos. Folia per ambitum orbē uel Rubiæ modo per interualla, circumposita. Flores albos. Semē durum, candidum, rotundum, à medio, umbilici modo, leniter cōcauum. Ipsa herba uestibus adhærescit.

LOCVS.

Nascitur in frumentario agro, aut hortis circa sepes & maceries.

TEMPVS.

Colligitur æstate dum femine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Aparine modicè extergit & desiccatur, habetq; nonnihil tenuium partium: unde fatis constat hanc aliquam etiam caloris in se portionem habere.

D

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Aparines seminis, caulium & foliorum succus cum uino potus, phalangiorū & uiperarū moribus auxiliatur. Infusus doloribus aurium medetur. Herba ipsa cum axungia trita coacta, strumas discutit.

EX PLINIO.

Efficax Aparine contra serpentes, semine potō ex uino drachma: & contra phalangia. Sanguinis abundantiam ex uulneribus reprimunt folia imposita. Succus auribus infunditur.

DE ACANTHO CAP. XV.

NOMINA.



Branca ursina.

Marmoraria.
Dioscoridis locus emendatus.

KANΘΟΣ, ἄκανθα Græcis, Acanthus siue Acantha Latinis dicitur. Officinæ à similitudine, quam eius folia cum anterioribus urforum pedibus habent, Brancā ursinam uocant. Ad quam etiam similitudinem respicientes Germani, Bernflaw oder Berntauß nominant. Illud non prætereundū esse putauī, hanc herbam olim etiam Romanis Marmorariam esse dictam: quæ uox in omnibus Dioscoridis exemplaribus deprauata est, ac in Mamolariam detorta: quod eius folia columnarū maximè Corinthiarum capitulis insculpebantur, quarum identidem tam scapi quàm uertices marmore splendebant. Antiqui etiam Acantho pateras pingebant.

GENERA.

Duo Acanthi genera damus. Primum quidem legitimam Acanthum nominauimus, quod scilicet descriptioni per omnia respondeat. Germanis dicitur Welsch bernflaw. Alterum Germanicā, quod nimirum in Germania officinæ omnes pro Acantho hanc usurpent herbam, Germanis simpliciter Bernflaw uocatur.


FORMA.

ACANTHVS
VERA.

Welsch bernflaw.



E 2



ACANTHVS
GERMANICA.

Leütsch bernflaw.

A FORM A.

Folia habet multò quàm Lactuca latiora & longiora, Erucae modo incisuris diuisa, nigricantia, pinguis, leuia. Caulem leuem, binum cubitorum, digitali crassitudine, ex interuallis sub ipsum usq; uerticem foliolis quibusdam oblongis ueluti nucamentis, aculeatis, ex quibus candidus promitur flos. Semen illi est oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radices subsunt glutinosae, mucosae, rubentes, longae. Haecenus Dioscorides. Si autem ueri Acanthi picturam diligenter spectare uolueris, huic descriptioni prorsus quadrare uidebis, ita ut nulla sit nota quae illi non ad amissim respondeat. Neque impedit quod Acantha spinam significet, spinosa enim & haec quidem herba est, sed mollibus duntaxat spinis, ideoq; à Vergilio mollis Acanthus dicitur. Germanicam tamen Acanthum ad Dioscoridis picturam non penitus accedere, est euidentissimū. Potest tamē in prioris inopia, huius etiam cōmodus esse usus, ut ex ijs quae paulò pōt dicemus, patebit.

L O C V S.

Nascitur uera in hortis, petrosis & humentib locis. Germanica in hortis & pratis undique.

T E M P V S.

Colligitur in aestate dum floribus & semine abundat, Iunio praecipue & Iulio mensibus.

T E M P E R A M E N T V M.

Folia Acanthi mediocriter digerentem facultatem obtinent. At radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium. Hanc uim Acantho etiam Germanico inesse, gustus abunde monstrat. Folia enim eius modicē amara, radix autem subacris est.

V I R E S. EX DIOSCORIDE.

B Acanthi radices uitis & luxatis illitae profunt. Potae urinam mouent, & aluum sistunt. Tabidis, ruptis, conuulsis, mirē utiles sunt.

E X P L I N I O.

Radices Acanthi uitis luxatisq; mirē profunt. Item ruptis, conuulsis, & phthisin metuentibus incoctae cibo, maximē pūfana. Podagris quoq; illinuntur tritae & calefactae calidis.

A P P E N D I X.

Etsi nostrae Brancae ursinae facies picturae Acanthi non undiquaq; respondeat, tamē eius radicem eandem habere cum Acanthi ueri radice facultatē est euidentissimum. Cum enim gustu subacris sit, necesse est ut exiccer, incidat, & tenuium sit partium. Errant itaq; nostrae aetatis medici, qui neglecta prorsus radice, folijs tantum utuntur, quae quidem mediocriter discutere ualent.

DE SPINA ALBA CAP. XVI.

N O M I N A.



ΚΑΝΘΑ λευκή graecē, Spina alba latinē, Officinē Bedegarim seu Bede- Bedeguar. guar Penno nomine appellant, Germani Weißdistel/oder Stachtraut. Nomen herba haec ab albis folijs seu lacteis maculis, quibus folia con- Spina alba una de dista. sperfa sunt, accipit.

G E N E R A.

Quamuis Dioscorides Spinæ albæ duntaxat unum faciat genus, tamen cū plures inueniantur apud nos herbæ quae descriptioni respondent, plura etiam ut illius statuamus genera necesse est. Vnum itaq; genus est, quod hodie uulgò Carduus Mariæ dicitur, Germanis uero Mariendistel oder Scharwendistel nominatur. Nos spinam albam hortensem, quod nimirum in hortis tantum proueniat, appellauimus.

c mus. Alterum genus syluestre est, proximè ad Dioscoridis deliniationē accedens, ideoq; à Germanis *Weißwegdistel* uocatur. Cæterum uidimus herbam peregrinā siccam, quæ syluestri, quod ad formam attinet, per omnia respondebat, quæ haud dubiè uera spina alba erat, & descriptioni prorsus cōueniebat. Picturam eius, quod uiridi destituebamur, dare non potuimus.

FORMA.

Folia albo Chamæleonti similia habet, angustiora tamen & candidiora, subdensa, subasperaue, & aculeata. Caulem binos cubitos excedentē, digiti magni aut minoris crassitudine, subalbum, intus cauum. In cacumine eius caput est aculeatum, Echino marino non ab simile, minus tamen & oblongū. Flores purpureos, in quibus semen Cnici forma, sed rotundius. Quæ descriptio in uniuersum quadrare uidetur herbæ quæ uulgò *Carduus Mariæ* appellatur. Folia siquidem Chamæleonti non dissimilia, angustiora, candidioraq; (albis enim maculis undiq; cōspersa, unde tam Græcum quàm Latinum, adde etiam Germanicum nomen *Weißdistel*/ut diximus, illi impositum est) subdensa, subasperaue, & minimè mollia, & mirum in modum aculeata sunt, ita ut contrectata immodicè pungant. Caulis eidem supra bina cubita altus, digiti maioris aut minoris crassitudine, & inanis. In summo uertice Echino marino haud dissimile caput aculeatum obtinet. Flores denique purpureos, in quibus semen Cnico simile, sed rotundius habet, id quod ex utriusq; seminis collatione pulchrè deprehendes. His accedit, quod facultates quas albæ Spinæ Dioscorides tribuit, similes sint ijs quæ *Carduo Mariæ* à nostris hodie herbarijs assignantur, ut ex sequentibus innōtescet clarius. Syluestri sic quadrat descriptio ut nihil magis. Nam, ut cætera omittā, radix desiccatoria est & modicè adstringens, atque adeo genuinas Spinæ albæ facultates obtinet.

D

LOCVS.

Nascitur in montibus & syluosis locis. Hodie in hortis passim etiam plantatur, ut alia quædam *Carduorū* genera. Syluestre in locis incultis & arenosis prouenit.

TEMPVS.

Colligenda est herba in æstate dum semine pregnans est. Floret autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius desiccatoria est, & modicè adstringens. Semen uero tenuis essentia, & calidæ facultatis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix huius pota, sanguinē excreantibus, stomachicis & coeliacis prodest. Vrinam cit. Oedematis illinitur. Decocto eius dentes in dolore colluuntur. Semen potum conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Ferunt etiam quod amuletum ex eo uenenatas bestias abigat.

EX GALENO.

Radix coeliacis & stomachicis succurrit. Sanguinis reiectiones cohibet, & oedemata illita contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluantur. Semen potum ijs qui conuelluntur prodest.



SPINA ALBA
HORTENSIS,

Barien distel.



SPINA ALBA
SYLVESTRIS.

Weißweddistel.



ASPARAGVS

Spargem.



NOMINA.



Asparagus unde
dicitur.

ΣΠΑΡΑΓΟΣ græcè, Asparagus latinè uocatur. Officinæ extrita priore litera Sparagum nominât, Germani Spargen. Sic autem potissimū altitilis satiusq; de quo nobis hic sermo est, nominatur, eò quod coliculos hos, qui prima germinatione prodeunt è terra, præcipuos habeat.

FORMA.

E radiculis thyrsus primum exilit, cacumine in torulos turbinato, quod tandem increfcens explicatur in pregrandes ramos, quibus insunt folia capillamenti modo, & ut Fœniculi tenuata, quæ per uetustatem occalescunt in spinulas. Florem fundit paruulum, quo decusso bacca dependent primum uirides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus refertæ. Radices spongiosæ, longæ & rotundæ.

LOCVS.

In hortis seritur & plantatur, inq; nōnullis locis lapidosis sponte prouenit.

TEMPVS.

Thyrso primū cum uer appetit emicante uiret, spica tum cibus expetita. Recentes hos thyrsulos in uoluptatem gulæ uerterunt helluones. Hodie decoctus in iure Asparagus, aceto, sale, & oleo conspersus, magno gulæ delectamento comeditur, & in principum delicijs est. Semen suo legitur tempore, nimirum ætate.

TEMPERAMENTVM.

Abstergendi facultatem habet Asparagus, idq; citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem.

VIREs.

EX DIOSCORIDE.

Asparagi coliculi cocti & comesti aluum molliunt, & urinam mouent. Radicum uero decoctum, difficultati urinæ, regio morbo correptis, nephriticis, ischiadicis: cum uino autem idem decoctum phalangiorum moribus auxiliatur. Si decoctum super dente retineatur, eius dolori medetur. Facit ad eadem omnia semen etiam potum, Ferunt mori canes decoctum eius bibentes.

EX GALENO.


Renes ac iecur infarctu liberat Asparagus, & maximè herbæ ipsius radices & semen. Quin & dentiū dolores sanat siccitatis nomine, quam uel maximè dentes requirunt.

EX PLINIO.

Utilissimus stomacho cibus, ut traditur, Asparagi. Cumino quidem addito inflationes stomachi coliq; discutunt. Idem oculis claritatē adferunt. Ventrem leniter molliunt. Pectoris & spine doloribus, intestinorumq; uitijs profunt. Vino cum coquuntur addito, lumborū & renum dolores mitigant. Venerem stimulant. Urinam cient utilissimè, præterquã quod uescam exulcerant, Radix quoq; plurimorum prædicatione trita, & in uino albo pota, calculos exturbat. Quidam ad uuluae dolorem, radicem cum uino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit. Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus negant.

EX SIMEONE SETHI.

Asparagus olerum omniū maximè nutrit. Proinde si quis dicat eius naturā positam esse mediā inter olera & carnes, non procul à uero aberrabit, propter nutriendi facultatem plantarū & carniū, quæ similiter se habet. Urinam quoq; cit, & obstructions iecoris & renum aperit: id quod manifestū ex eo, quod urinæ odorem in suum transmutat, ut hunc qui aliquantulū eius ederint, sentiant. Neq; quispiam admiretur illum statim urinæ suam qualitatem indere; nam & rubea tinctorum si manibus contineatur, urinam in suum colorem transmutat: quod paradoxum etiam esse uidetur, ut extrinsecus impositum urinam tingat. Asparagi colicis & renum affectibus, qui à pituita proueniunt, auxiliantur: semen genitale augent, & celerius quàm reliqua olera in sanguinem mutantur. Menses ciunt. Cordis palpitationib; succurrunt: dentibus profunt: sed nō semper stomacho boni sunt, propterea garo & oleo conditis, cum mediocriter cocti sunt, ijs uti oportet.



ANONIS

Sawhechel.

DE ANONE CAP. XVIII

NOMINA.



ΑΝΩΝΙΣ, ἢ ἄνωγος Græcis: Anonis & Ononis Latinis appellatur. Vulgus herbariorū Restam bouis, quod in opere arantes boues subinde sistat, nominare solet. Nonnulli Remoram aratri, quod altis & duris radicib. in agris aratrum remoretur, appellant. Sunt qui Acutellam uocent, quod suis scilicet spinis ingredientium pedes pungat & offendar. Germanis *Harwechel* nuncupatur, & *Dchsenbrech*/ quia crebris inter folia aculeis, haud secus ac instrumentum hoc quo mulieres linum carmināt, & à crassiore purgant stuppa, horreat: uel quod ligone ad aculeatam hanc herbam eruendam & extirpandam cum in altum agitur, & sese propagat, opus sit. Equites Germani *Staltraut*/ eò quod decoctum eius meiere nequeuntib. equis offeratur, uocant. Binominis autem antiquis est scriptoribus, una tantum litera mutata. Sunt enim qui Ononim, ut Theophrastus & Galenus: sunt etiam qui Anonim, ueluti Dioscorides & Plinius, nominent. Anonis haud dubiè à non iuuando, quod nullo iuuamine polleat, dicta est. Siquidem aratoribus inimica est, uiuaxq; nimis fruges opprimit, suisq; aculeis nocet. Ononis uero, quod asinos, quos Græci *ἄνος* uocant, sese terentes ad illam scabentesq; iuuet. Complures quoq; Graij herbam sic appellari prodiderunt, quod in ea se uolutes, spinis eius dorsum libenter affricent & scabant. Officinis prorsus ignota, & inusitata.

Restam bouis.
Remora aratri.
Acutella.

Anonis cur
dicta.
Ononis unde.

FORMA.

Ramos habet palmares, aut maiores, fruticosos, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarū multis, capitula rotunda. Folia exigua, tenuia ceu Lentis, ad Rutæ, aut focnarij Loti figuram accedentia, subhirsuta, odorata, nec iniucundè olentia. Ramuli acutas spinas, spiculis acuminatis similes, solidasq; gerunt. Radice candida nititur. Theophrastus toto caule foliatam esse tradit, ut ueluti coronam ex interuallis tota species repræsentet. Florem quoque illi esse minutulum, & in siliqua non undique septum scribit. Quæ sanè singula pulchrè picturæ respondent, & Anonim esse hanc herbam quam Restam bouis hodie herbarij nominant, euidenter, nulla reclamante nota, ostendunt. Nam hæc ramos spargit fruticosos, palmo longiores, frequentibus cinctos articulis, à quibus alæ funduntur. Capitula exerit orbiculata, folia Lentis parua, ad Rutæ uel pratensis Loti figurā accedentia, hirsuta, iucundum odorem expirantia, inter quæ nocentiores, & mucronatæ cuspidis aculei quasi spicula subrigunt. Flos ferè Pisi dilutiore micat purpura, in siliqua non undique septus. Radix in nigro candicans.

LOCVS.

Nascitur culto solo, pingui, & glutinoso, præcipuè autem in segetibus & aruis, inimica agricolis, uiuaxq; supra modum. Cum enim altam lætæm uenæcta tellurem fuerit, protinus in altum agitur, & singulis annis, surculis in latus emissis, rursus anno postero deorsum uersus acta pluribus ramis luxuriat, ideoq; runcanda & radicitus extirpanda uenit.

TEMPVS.

Æstate germinare incipit, à frugibus perficitur, autumno sui incrementi finem faciens, Floret autem Iulio mense, & Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Ononis radix tertio quadantenus ordine exalfacit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Antequam spinosa sit sale conditur, & est cibus gratissima. Radix eius calefacit, et extenuat, cuius cortex cum uino potus urinā ciet, calculos rumpit, crustasq; abstergit. Decocta radix in posca dentium dolorem collutione mitigat. Huius decoctum potum, hæmorrhoidas sanare creditur.

EX GALENO.

Radiciſ cortex maximè utilis eſt, habens quippiã abſterſoriũ & inciſorium. Proinde non tantum urinas ducit, ſed & lapides confringit. Eadem facultate & cruſtas cõfeſtim detrahit. Vtuntur quoq; ea ad dentium dolores in poſca decoquentes, & collui decocto eius iubentes.

EX PLINIO.

Radix decoquitur in poſca dolori dentium. Eadem cum melle pota, calculos pel- lit. Comitialibus datur in oxymelite, decocta ad dimidias.

DE ANISO CAP. XIX.

NOMINA.

ANIΣON græcè, Aniſum latinè uocatur. Officinis nomen genuinum re- tinuit, germanicè *Eniſ* appellatur.

GENERA.

Aniſum caule, folio, flore, Apio par eſſe uidetur. Caulem nanque te- nuer ſtriatum, rotundum, multisq; ramulis brachiatum obtinet. Folium ubi pri- mum enaſcitur, rotundum, ſed deinceps Apij modo diſſectum. Florem candidum, muſcarium ſceniculi. Tota herba, haud aliter quàm ſemen, odorata eſt.

LOCVS.

Ex Syria originè habet, iam autem paſſim ſatum in Germania hortis prouenit.

TEMPVS.

Iunio ac Iulio menſibus floret, ſemineq; prægnans eſt.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & deſiccatur in tertio ordine.

VIRE.

EX DIOSCORIDE.

B Aniſum in uniuerſum calefacit, exicat. *ἄπνοον* rectius mea ſententiã interpreta- bitur pro eo quod eſt, facile ſpirare facit. Oris halitum iucundioſiorem facit. Anody- num eſt, dolorè muſcæ leuat. Urinã cit. Diffundit. Hydropicis potum ſitum arcet. Pro- deſt ad uenenata animalia, & inflationes. Aluum, & album ſceminariũ profluuium ſiſtit. Lac ad mammas elicit, & Venerem ſtimulat. Suffitum naribus capitis dolo- rem ſedat. Tritum, cumq; roſaceo inſtillatum, aurium medetur rupturis.

EX GALENO.

Aniſi ſemen maximè utile eſt, acre & ſubamarum, ut propè ad urentium acce- dat caliditatem. Proinde & urinam cit, & digerit, atq; uentris inflationes ſedat.

EX PLINIO.

Aniſum aduerſus ſcorpiones ex uino bibitur, à Pythagora inter pauca laudatũ, ſiue crudum, ſiue decoctum. Item uiride aridumue, omnibus quæ cõdiuntur, que- que intinguntur deſideratũ. Panis etiam cruſtis inferiorib. ſubditum. Saccis quoq; additur. Cum amaris nucibus uina cõmendat. Quin ipſum oris halitum iucundio- rem facit, fetoremq; tollit manducatum matutinis cum Smyrneo, & melle exiguò. Mox uino collutum uultum iuniorem præſtat. Inſomnia leuat ſuſpenſum in pului- no, ut dormientes olfaciant. Appetentiã ciborum præſtat. Dolores capitis leuat ſuf- fitum naribus. Epiphoris oculorũ radicem eius tuſam imponit Iollas: ipſum cum croco pari modo & uino, & per ſe tritum cum polenta, ad magnas fluxiones, extra- hendaq; ſi qua in oculis inciderint. Narium quoq; carcinòdes conſumit illitum ex aqua. Sedat anginas cum melle & Hyſſopo ex aceto gargarizatũ. Auribus inſundi- tur cum roſaceo. Thoracis pituitas purgat toſtum, cum melle ſumptum melius. Cũ acetabulo Aniſi nuceſ amaras quinquaginta purgatas tere in melle ad tuſim. Præcipuum autem eſt ad ructus, ideo inflationib. ſtomachi & inteſtinorũ tormini- bus, & cœliaci medetur. Singultus & olfactum decoctũ potumq; inhibet. Potum

F ſomnum



ANISVM

Enß.

A somnum concitat. Calculos pellit. Vomitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorum vitijs, nervis quoque quibus succinctum est corpus, utilissimum. Prodest eius & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud utilius ventri & intestinis putant, ideo dysentericis & tenasimis datur tostum. Dalion herbarius dedit bibendum cum anetho parturientibus. Phreneticis quoque illinunt recens cum polenta. Sic & infantibus comitialia vitium aut contractionem sentientibus. Pythagoras quidem non corripit vitio comitiali in manu habentes, ideoque quamplurimum domi ferendum, Parere quoque facilius olfactantes, Solimenes contra omnes durities ex aceto usus est. Semine eius potio, lassitudinis auxilium viatoribus spondit. Strangulationes uulvae, si manducetur & linatur calidum, uel si bibatur cum castoreo in aceto & melle, sedat. Vertigines à partu cum femine cucumeris & lini pari mensura trinum digitorum, uini albi tribus cyathis, discutit. Vrinam ciet. Venere stimulat, Cum uino sudorem leniter præstat. Vestes quoque à tincis defendit.

EX SIMONE SETHI.

Prodest ad uetustos ex frigore iecoris affectus, & ad spirandi difficultatem quæ ex pituita proficiscitur. Flatus qui in uentriculo sunt, digerit. Obstructiones tollit, & lactis copiam facit.

DE ACTE CAP. XX.

NOMINA.



κ τ Η Græcis, Latinis Sambucus nominatur. Reliqua nomina dicemus paulo post, ubi huius genera indicabimus. Sambucus porro uidetur ab authore appellata, cui nomen Sambyx fuit: uel à fabuca musico instrumento, quod alij pectida nominant, alij magadin. Atque hinc est quod Sabucus potius quam Sambucus, si Serenio Quinto credimus, scribendum sit.

Sambucus unde dicta.

GENERA.

B Duo eius genera. Vnum arborefcit, quod priuatim officinæ Sambucum, Germani Holder à concavitate uocant. Alterum Græcis χαμαικόκκη, quasi humilis, & co-actæ breuitatis Acte nominatur, Latinis Ebulus, Germanis Artich / uel niderer holder.

χαμαικόκκη. Ebulus.

FORMA.

Sambucus in arborem assurgit, uirgis harundinum modo rotundis, subcauis, can dicantibus, proceris. Folia tria, aut quatuor, aut quinque, aut sex, aut septem per interualla circa uirgas obtinet, niuis iuglandis similitudine, graueolentia, pluribus incisuris, in summis ramis siue caulibus umbellas rotundas ferentia. Flores albos, fructum acinumue Terebinthi in nigro purpureum, racemosum, succosum, & uinosum. Ebulus humilis minorque est, herbaceo generi propius accedens, quadrangulo caule, densis geniculis. Folia ex interuallis circa singulos geniculos Amygdalæ similia alæ instar expanduntur, per ambitum serrata, longiora, graueolentia. Umbellam in summo fert Sambuco similem, flores itidem & fructum. Radice nititur longa, digitali crassitudine.

Sambuci.

Ebuli.

LOCVS.

Vtrumque genus in opacis, asperisque potissimum locis, & iuxta aquas emicat. Ebulus uero in agris etiam quibusdam prouenit.

TEMPVS.

Parum ante Solstitium æstiuum floret Sambucus. Tardius autem Ebulus, Iulio nimirum & Iulio mensibus. In Augusto uero baccas suas profert.

TEMPERAMENTVM.

Sambucus uterque calefaciendi ac desiccandi facultatem habet, id quod amaritudo, & adstrictio modica abunde monstrant.



64

SAMBUCVS

Goldcr.



EBVLVS

Attich.

F 3

C

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eadem utrisq; facultas, & par usus, exiccās scilicet, aquā educens, stomacho nocens. Folia olerum modo decocta, pituitam & bilem purgant. Quinetiā teneri caules in olla cocti, eadem præstant. Radix in uino decocta & in cibis data hydropicis auxiliatur. Eodem modo pota uiperarum morsibus subuenit. Vuluas emollit & aperit: & quæ circa eas sunt affectiones, decocta cum aqua in fessione corrigit. Fructus cum uino potus eadem efficit. Illitus capillos denigrat. Folia recentia ac tenera cum polenta illita inflammationes mitigant. Ambustis etiam, & canis morsibus illita succurrunt. Profunda & quæ in cauernas dehiscunt ulcera agglutinant. Podagricis, cum taurino hircinōue adipe illita, auxiliantur.

EX GALENO.

Vtraq; Sambucus, & arborefcens & herbacea, exiccandi, conglutinandi, modicēq; digerendi facultatem obtinent. Paulus Aegineta hæc adiicit: Potē & manducatæ aquam per aluum educunt.

EX PLINIO.

Vtriusq; decoctū in uino ueteri, foliorū, uel feminis uel radicis, ad cyathos binos potum stomacho inutile est, aluo detrahēs aquā. Refrigerat etiam inflammationē, maximē recentis ambusti: & canis morsum cum polenta, mollissimis foliorū illitis. Succus cerebri collectiones, priuatimq; membranæ quæ circa cerebrū est, lenit infusus. Acini eius infirmiores quàm reliqua: tingunt capillū: poti acetabuli mensura, urinam mouent. Foliorū mollissima ex oleo & sale eduntur ad pituitam bilemq; detrahendam. Ad omnia efficacior quē minor. Radicis eius in uino decoctæ duo cyathi poti, hydropicos exinaniunt: uuluas emolliunt foliorū decocto insidentū. Caules teneri minoris Sambuci in patinis cocti, aluum soluunt. Resistunt folia serpentū ictibus in uino pota. Podagris cum seuo hircino uehementer profunt cauliculi illiti. Idemq; in aqua macerantur, ut ea sparsa pulices necentur. Foliorū decocto si locus spargatur, muscæ necantur. Boa appellatur morbus popularū, cum rubent corpora, Sambuci ramo uerberatur. Cortex interior tritus, ex uino albo potus, aluum soluit. Ebuli fumo fugantur serpētes. Tenerum cum folijs tritum, ex uino potum, calculos pellit, Impositum testes sanat.

DE AMMI CAP. XXI

NOMINA.

AMMI Græcis, Ammi Latinis, Ameos officinis corruptē, Germanis Amey appellari potest.

FORMA.

Ammi caule rotundo & herbaceo cōstat, surculis multis & exiguis: folio oblongo, angusto, per ambitū incisuris diuiso: flore paruo, candido, umbella Anethi; semine exiliori multo quàm Cuminū, gustu Origanū præ se ferente, acri & subamaro: radice candida & multifibra. Esse autem hanc herbam uerum Ammi, feminis in gustu sapor, qui subamarus & acris est, omniū maximē ostendit: talem enim in eo sapore Galenus requirit. Origanū etiam gustu referre uidet. Quibus accedit antiqui & manuscripti herbarij testimoniū, cuius pictura & descriptio satis docent, hanc herbam esse Ammi genuinū. Inter cætera enim semen Ammios piper gustu referre, ideoq; à nonnullis piperulā dictā esse ait. Id quod certe uerissimum esse cōperies, si semen gustaueris: miram enim huic acrimoniā inesse senties.

LOCVS.

Nusquam in Germania sua sponte nascitur. Satum tamen facile & magna copia prouenit, sic ut deinceps extirpari uix queat.

TEMPVS.

Augusto mense floret, ac deinceps ubi defloruit, semen abundē producit.

TEMPERA-

Ammi uerum.





67

AMMI

Ammi.

F 4

C

TEMPERAMENTVM.

Ammi semen in calefaciendo desiccandoq; ex ordine tertio intenso existit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vis femini excafactoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē, uenenatorū morsus cum uino potum. Menstrua ciet. Miscetur derodentib. ex cantharidibus confectis medicamentis, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle illitum tollit. Colorem potum & inunctū in pallorem mutat. Suffitum cum uua passa aut resina uulvas purgat.

EX GALENO.

Herbæ quam uocant Ammi, semē maximē est utile. Facultatis est excafactoriæ & desiccatoriæ, tenuiumq; partium. Sed & gustu subamarū est, & acre. Et clarum est quod digerat, & urinam moueat.

EX PLINIO.

Inflationes & tormina discutit. Vrinam & menstrua ciet. Sugillata & oculorum epiphoras mitigat. Cum lini semine scorpionū ictus in uino potum drachmis duabus: priuatimq; cerastarum cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque bibentium similiter mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat. Tradunt facilius concipere eas, quæ odorentur id per coitum.

DE ARO CAP. XXII.

NOMINA.



D

Pes uituli.
Serpentaria
minor.

Sacerdotis uirile.

PO N, ἡ ἀρίστρον græcè, Arum & Aris latinè dicitur. Officinè corrupto, ut solent, uocabulo Iarum appellat. Quidam, quod folium effigie bubuli uestigij prodeat, Pedem uituli uocarunt. Alij, quod dracunculū æmuletur, sola magnitudine discrepans, Serpentariā minorem appellant: neq; id sanè temerè. Videtur enim Aron esse Dracunculus minor, cui Dioscorides folia *uossesiliū*, hoc est, Hederæ similia esse dicit, quæ prorsus Ari sunt, nisi quod paulò sint longiora. Plinius etiam Aro eas facultates tribuit, quas Dioscorides Dracunculo minori. Vt hinc conijcere liceat, Arum cum Dracunculo minori miscuisse ueteres. Vulgus, quod pistillum promit exerti ferè genitalis effigie, Sacerdotis uirile nominat. Id quod & Germani nostri faciunt, qui sua lingua *Pfaffenpint* nuncupant. Aliàs Aron, & ob uehementem acrimoniam, *teutschen Ingber* uocant.

FORMA.

Folia emittit Dracunculo similia, sed longiora & minus maculata: caulē dodrantalem, purpurascētē, pistilli figura, à quo croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo similis, quæ quod minore acrimonia est, cocta comeditur. Hæ utiq; delineationes ad amussim, nulla reclamante nota, nostro Aro cōueniunt. Siquidem folia promit Dracunculi, longiora, & pauciorib. maculis resperfa, caulem dodrantem altum, in purpuram leniter tendentem. Ante seminis partum, sagaci nature artificio dignum, erumpit inuolucrum & cucullum, quod mucronata in turbinem uaginula pistillum complectitur, & suo fouet sinu. Verum ubi fructu prægnans faciscit in hiatum, solida pistilli facies dilutiore purpura rutilans emergit, & anfractu penitus tandem patente, primum uiridia, dein crocea spectantur semina, quæ in coronæ modum concinnè contexta, imam eius partem ambiunt. Radicem etiam obtinet albam, ad Dracunculi radicem accedentem, ut pictura graphice monstrat. Neque obstat quod Galenus radicem Ari elixam mandari scribat, nostri autem tam acris sit ut uix gustari ob miras & diutinas, quas in lingua ac palato excitat puncturas, possit, tantum abest ut edendo esse queat. Siquidem Galeno libro secundo de alimentorum facultatib. teste, non parem in omnibus regionibus acrimoniam obtinet, sed in nonnullis minimam, ut Cyrenis. Et Plinio quoque lib. xix.

Obiectio dis-
soluio.



ARVM

Pfaffenpflanze.

c lib. xix. cap. v. teste, in Aegypto Aron nascitur radice mollioris naturæ, quæ etiam cruda editur. In quibusdam, ut Germania nostra, maximam. Verba Galeni paulò post in facultatum cōmemoratione citabimus. Hinc discendū erit, multa nobis in scriptoribus rei herbariæ, primo statim obtutu pugnantiã uideri, quæ, si ad cœli regionumq; diuersitatē respexerimus, nihil prorsus pugnantiæ aut absurditatis habebunt. Quod nisi diligenter animaduertas, multas gentinas herbas pro adulterinis abijcias necesse erit. His accedit quod Galenus nō simpliciter dicat mandī Ari radicem, sed elixam. Non est autem mirum si acria etiam edendo fiant, si elixentur. Bis enim aut ter in aqua decocta, Galeno lib. ij. de aliment. facul. cap. ultimo teste, acrimonia spoliatur. Porrò si ista sciolis quibusdam haud satisfecerint, dicendū planè erit Arum Germaniæ nostræ esse Arisaron, quod gustu, Dioscoride & Galeno autoribus, acrius est. Quamuis ego cum Ruellio, diligentissimo earum rerum inquisitore, Arisaron ab Aro differre haud putem, quod scilicet forma utriusq; eadem sit. Cuius etiam rei fidem facit ipsa nomenclatura, quæ utriusq; retinuit appellationem: duobus tandem uocabulis in unum coalescētibus, dici cœpit Arisaron. Apud ueterrimos enim Aris primum; dein posterioribus, copulatis unà nominibus, Arisaron confictum est nomen.

LOCVS.

Nascitur in syluis, locis umbrosis, humidis & frigidis.

TEMPVS.

Folia statim in Martio, inter primas herbas ueris exiliunt, in Junio dispereunt, ita ut haud facilè hoc nomine herba ipsa reperiri queat. Semen Iulio & Augusto mensibus reperitur, primùm, ut diximus, uiride, mox croceum.

TEMPERAMENTVM.

D Arum Galenus in calefaciendo & desiccando primi ordinis esse statuit. Et locutus est de Aro qui non uehementi acrimonia pollet. Nostrum haud dubiè in tertio ordine calidum & siccum est, ob multam, qua præditum est, acrimoniam.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix, semē, & folia Ari eadem Dracunculo uires habent. Radix priuatim cum fimo bubulo illita podagricis prodest, Dracunculi more reponitur. In totū, ob mtiorem eius acrimoniam edendo est.

EX GALENO.

Arum terrena essentia cōstat, sed calida: proinde extergendi facultatē possidet, uerum non ualentē, sicut Dracontii. Radices eius maximè sunt utiles. Siquidē comestæ crassitiem humorū mediocriter incidunt, ad eò ut excreationib. ex pectore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontii. Et in libro secundo de alimentorū facultatibus sic de Aro scribit: Ari radix rapi modo manditur. Quibusdam autem in regionibus acrior nascitur, ut Dracontio ferè similis sit. Dum rectè parare uoles, prioris decoctionis aqua effusa, repentè in alteram calidam inijcere oportet, ut in Brasica & Lente dictū est. Cyrenis cōtrā quàm in nostra regione planta se habet: nam illic minimū medicamentosi, minimūq; acrimoniæ habet, ad eò ut uel rapis utilior reputetur: idcirco radicē quoq; in Italiã cōportant, ut quæ absq; ut putrescat aut regerminet, longo tempore perdurare possit. Perpicuū uero est alendis corporibus hanc accōmodatiorē esse. Si quis autem in thorace acpulumone collectos crassos lentosq; humores extussire studeat, acrior ac medicamētosior magis cōueniet. In aqua elixa estur cum sinapi aut aceto, ex oleo & garo. Quinetiã cum obsonijs, & sale, & ijs quæ caseo cōstant, sumitur. Haud uero obscurū est, succum eius qui in iecur ac uniuersum corpus diffunditur, quo uno animal nutritur, crassiore esse, idq; maximè quum radix, quemadmodū sunt quæ Cyrenis aduehuntur, medica ui caruerit. Apud nos nanq; in Asia, plerq; Ari radices acriores sunt, & medicamentosam iam uim obtinent.

EX PLINIO.

A Aron miris laudibus extulere Græci, primum in cibis † foeminarum præferen- † aliàs foeminā.
 tes, quoniam mas dulcior esset, & in coquendo lentior, pectorisq; uitia expurgaret:
 aridum in potione inspersum, aut ecligmate, urinam & menses cieret. Sic & in oxy-
 melite potum, stomacho: interaneis exulceratis ex lacte ouillo bibendum, ad tuf-
 sim in cinere coctum ex oleo dedere. Alij coxere in lacte, ut decoctum biberetur.
 Epiphoris elixum imposuere: item sugillatis, tonsillis. Ex oleo hæmorrhoidum
 uitio infudere, lentiginis ex melle illinentes. Laudauit Cleopantus & pro anti-
 doto contra uenena, pleuriticis, peripneumoniacis quoque & tussientibus. Semen
 intritum cum oleo aut rosaceo infundens, aurium dolori Dieuches. Cleopantus
 tussientibus aut suspiriosis & orthopnoicis, & purulenta excreantibus, farina per-
 mixtum in pane cocto dedit. Diodotus phthisicis è melle ecligmate, & pulmonis ui-
 tijs, ofsibus etiam fractis imposuit. Partus omnium animalium extrahit naturæ citra
 cumlitum. Succus radicis cum melle Attico, oculorum caligines, ac stomachi uitia
 discutit. Tussim decocti ius cum melle. Vlcerata omnium generum siue phagedæne
 sint, siue carcinomata, siue serpant, siue polypi in naribus, succus miræ sanat. Folia
 ambustis profunt ex uino & oleo cocta. Alium inaniunt ex sale & aceto sumpta.
 Etiam luxatis cocta cum melle profunt. Item articulis podagricis cum sale, recentia
 uel sicca. Hippocrates ad collectiones cum melle imposuit. Ad menses trahēdos se-
 minis uel radicis drachmæ duæ in uini cyathis duobus sufficiunt. Eadem potio si
 à partu nō purgantur, & secundas trahit. Hippocrates & radicem ipsam apposuit.
 Dicunt & in pestilentia salutarem esse in cibis. Ebrietatem discutit. Serpentes nido-
 re cum crematur, priuatimq; aspides fugat, aut inebriat, ita ut torpentes inuenian-
B tur. Perunctos quoq; Aro ut laureo oleo fugiunt, ideo & contra ictus dari potu in
 uino nigro putant utile. In folijs Ari caseus optimè seruari traditur.

APPENDIX.

Posteriores medici Aron discutiendi, extenuandi, extergendiq; facultatem habe-
 re tradunt: ideoq; tumoribus aurium, ficubus, strumis, scirrhisq; mederi, faciei de-
 formitatem cutisq; auferre, eius denique radicem in puluerem redactam supercre-
 scentem in uulneribus carnem minuere scribunt. Id autem posse præstare, acrimo-
 nia ipsa uehemens quæ gustu sese exerit, abundè monstrat. Dioscorides etiam Ari-
 faron acrimonia haud exigua præditum scribit, ideoq; illitum nomas sistere, colly-
 riaq; efficacissima ex eo cōtra fistulas fieri. Deniq; radicem cuiuscunq; animalis pu-
 dendo impositam, id corrumpere tradit. Plinius quoq; Arisaron ulceribus mederi
 manantibus, item cōbustis & fistulis, scriptum reliquit. Præterea cōmixtum colly-
 rio nomas sistere ait.

Recetiores quas
 facultates Aro
 tribuant.

DE ARCIO CAP. XXIII.


NOMINA.



ΠΡΕΙΟΝ, ἢ πρῶσιον, ἢ πρῶσις Græcis, Personatia Latinis dicitur. Offici-
 næ Lappam maiorem, uulgo Bardanam uocat, Germani Groß Elet. Lappa maior.
 ten. Personatia hac quondam ad personas utebatur, quoties in theatris Personatia una
 alijs uel locis qui cognosci à populo nollent, egisse quidpiā uolebant. Est
 enim foliorū eius tanta amplitudo, ut tota humana facies ijs tegi possit: atque hinc
 haud dubiè tam Græci quàm Latini, nomen illi Protopij & Personatiæ indiderūt.

FORMA.

Personatia folia Cucurbitæ similia habet, maiora tamen, duriora, nigriora & hir-
 suta. Caulem subcandidum, interdum nullum. Radicem grandem, candidā intus,
 foris nigram, Ex qua descriptione nemo nō intelligit, Personatiā esse eam herbam
 quam



PERSONATIA

Grosß fletten.

A quam hodie vulgus Bardanam uocat, quæ folio constat omnium lapparum maxi- *Bardana:*
mo, parte auersa herbido, aduersa cano, caule in purpureo albicante, grandibus lap-
pis, quæ transeuntium uestibus adhærent, in quibus flos purpureus nascitur, non
euidens, sed occultus, intra se germinans, radice grandi, intus candida, foris atra.

LOCVS.

Nascitur ubiq; potissimū circa margines pratorum, & agrorum.

TEMPVS.

Mense Iulio lappas cum floribus suis producit Personatia.

TEMPERAMENTVM.

Digerit simul & desiccatur, sed & adstringit non nihil.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Personatiæ drachmæ pondere cum pincis nucibus pota, sanguinē & pu-
rulenta excreantibus auxiliatur. Articulorū quoq; dolores, qui ex membrorū fra-
ctiōibus collisionib; sue fiunt, trita & illita sedat. Quinetiam folia uetustis ulceri-
bus utiliter illinuntur.

EX GALENO.

Arcium, quod Profopida uocat, cuiusq; folia Cucurbitæ simillima sunt, nisi qua-
tenus tum maiora, tum duriora, discutit simul & desiccatur, sed & adstringit medio-
citer; quamobrem folia eius ueteribus ulceribus mederi possunt.

EX APVLEIO.


B Personatiæ herbæ succus cum uino ueteri in potionem datus, omnes morsus ser-
pentium mirificè sanat. Eiusdem folijs cinges febricitantē, & statim febrem mitigat,
caloremq; sanat. Vulnus, etiam si cancer erit, cum aqua decoctionis foliorū eius fo-
ueto: deinde ipsam cum nitro & axungia, cum aceto tere, & in panno inducito &
imponito. Ad canum rabidorū morsus radix cum modico sale trita imponit mor-
fui, & statim eger liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, urinam
prouocat, & uesicæ dolorem tollit. Puluis feminis eius cum uino optimo per qua-
draginta dies datus, ischiadicos mirabiliter sanat. Folia trita cum albumine oui &
imposita, ambuga mirificè curant.

EX L. COLVMELLA.

Venena uiperæ pellit super scarificationē ferro factam herba Personatia trita &
cum sale imposita. Plus etiam eiusdem radix contusa prodest contra serpentes. Ex
uino bibitur duūm denariorum pondere. Strumis radix eius medetur: item cum
axungia operitur folio suo imposita.

DE ASCYRO CAP. XXIII

NOMINA.

 ΣΚΥΡΟΝ, ἢ ἀσσυροειδὲς græcè, Ascyron latinè nominatur. Officinis igno-
tum, Germanicè *Warthow*/id est, durum scenum appellatur. Græci à *Ascyron eius*
cōtrario, huic herbæ nomen imposuisse uidentur, σκῦρῶ enim illis aspe- *dictum.*
ritatem significat. Pulchrè igitur ad Græcam appellationem Germani-
ca alludere uidentur.


FORMA.

Hyperici species est Ascyron, magnitudine differens, maioribus ramis, frutico-
sius, puniceo colore rubens. Flores fert luteos, semē Hyperico simile, odore resinæ,
quod cum atteritur digitos ferè cruentat.

LOCVS.

In cultis & asperis locis prouenit.

G. TEMPVS.



ASCYRVM

Barthow.

TEMPVS.

A Aestate, potissimum uero Iulio & Augusto mensibus, floret.

TEMPERAMENTVM.

Essentia tenue est, ideoq; calefacit & desiccât.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen Afcyri potum in hydromelitis heminis duabus, ad ischiadicos prodest do-
lores; biliosa enim multa excrementa ducit. Sed assidue dari oportet donec conua-
lescant. Præterea illitum ad ambusta conducit.

EX GALENO.

Semen eius purgatoriũ. Foliorum uero facultas modicè extergens & desiccans,
ut & ambusta sanare credantur. Cæterum in uino austero decocta, uinum ipsum
magnum uulnerum glutinatorium efficiunt.

EX PLINIO.

Vfus feminis ad ischiadicos, potus duabus drachmis in hydromelitis sextario.
Aluum soluit, bilem detrahit. Illinitur & ambustis.

DE ANDROSAEMO CAP. XXV.

NOMINA.



ΑΝΔΡΟΣΑΙΜΟΝ Græcis, Androsæmon pariter Latinis dicitur. Offici-
nis incognitum. Germanis *Kunrath*/quasi græcè dicas Thrasibula, no-
minatur. Dicitur Androsæmon, quod aut coma, aut floribus eius tri-
tis, hominis sanguinem referat.

*Androsæmon
unde dictũ.*

FORMA.

B Differt ab Hyperico & Afcyro Androsæmon. Frutex est prætenuib. ramis, sur-
culosus, puniceo colore rubentibus uirgis, folijs triplo quadruplòue maioribus
quàm Rutæ, quæ contrita sanguineum succum remittunt. Alarum caua habet plu-
ra, in summo alarum auium modo pennata expansæ, circa quas flosculi pusilli lu-
tei. Semen in calyce, nigro papaueri simile, ueluti punctis depictum distinctumue.
Coma trita resinofum odorem reddit.

LOCVS.

Locis iisdem quibus Afcyron provenit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccât.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Androsæmi semen tritum, potumq; duarum drachmarum pondere, biliosa alui
excrementa ducit. Ischiadicis autem potissimum medetur, sed à purgatione aquam
sorbere oportet. Herba illita ambusta sanat, & sanguinem compescit.

EX GALENO.

Easdem cum Afcyro facultates obtinet.

EX PLINIO.

Vfus ad purgandam aluum tusæ cum semine, potèq; matutino, uel à coena dua-
bus drachmis in aqua mulla, uel uino, uel aqua pura, totius potionis sextario. Tra-
hit bilem, prodest ischiadicis maximè. Sed postera die, capparum radicem resine per-
mixtam deuorare oportet drachmæ pondere, iterumq; quadridui interuallo idem
facere. A purgatione autem ipsa robustiores uinum bibere, infirmiores aquã. Im-
ponitur & podagris, & ambustis, & uulneribus, cohibens sanguinem.



ANDROSAEMON

Kunrath.

A

NOMINA.



ΠΚΕΥΘΟΣ, ἡ ἀπὸ τοῦ ἰσ, græcè, Juniperus latinè uocatur. Officinæ latinam appellationem retinuerunt. Germanicè Weckholder / Kramatber / id est, turdorum bacca uocatur; quod fructibus eius turdi pinguescant.

Juniperus autem dici uideatur, quod iuniores & nouellos fructus pariat: sola enim ferè arborum foetus suos in biennium prorogat, qui ne maturefcunt quidem, nouis superuenientibus.

Juniperus unde dicta.

GENERA.

Juniperus Dioscoridi duplex est, maior & minor, sola arboris & seminis magnitudine inter se differentes. Minor humilis est, sessilibus in terra ramulis, baccis minoribus, radicibus summo cespite fulis. Maior altius adolefcit, & in iustam arboris magnitudinè exurgit, caudice procero, cortice fragili, ligno fuluo, odorato, latioribus ramulis, aculeorum aceruo stipatis, baccis alteri similibus, maioribus tamen.

FORMA.

Vtriusque facies horrida, coma uirent perpetua, spinaq; potius quàm folio, sed herbacea uestiuntur. Cortex illis membranèus, fragilis, nec difficulter fatiscens, materies fulua, quæ si ignibus dicatur, non iniucundū fumum expirat, qui odoris sua uitate grassantia pestilentia cōtagia depellit. Ex ea etiam, ut recentiores Græci tradunt, æstiuis temporibus lachryma thuris odorem atque colorem æmulans sudat, quæ caloris officio durata, coæt in gummi. Arabum familia, non sine magna cōfusione nominum, Sandaracham appellat. Officinæ uero Vernicem uocant. Baccas ferunt primum uirentes, deinde per maturitatem nigras, quæ biennio antequam maturefcant in ramis pendent. Hinc sunt qui baccas in ijs esse ternas eodem tempore dicant, anni proximè exacti nondum maturas, & tertij ante præsentem iam maturas, tertias nouas & recentes. Cæterum nō defunt qui nostram Juniperū non genuinam putēt, quod bacca eius ad Dioscoridis magnitudinè, quæ nucis est ponticæ aut fabæ, non accedant. Sed cogitent locum in causa esse cur minores producantur: ut plurimum enim omnia quæ in Germania proueniunt, ijs quæ in Græcia nascuntur minora sunt. Nobis etiam Juniperi grana aliunde allata uisa sunt, quæ nucis auellanæ quantitatem æquabant; ob id ut magnitudinem ac formam eorundem etiam exprimeret pictor, curauimus.

Sandaracha Arabum. Vernix.

Obiectionis dissolutio.

B

LOCVS.

Amant Juniperi montes, & maritima loca, in planisq; & cultis nasci reculant,

TEMPVS.

Autumno fructus Juniperorū decerpuntur, sed ad bimatum prorogati.

TEMPERAMENTVM.

Juniperus calida & sicca, utrinque tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus; uerum in hoc primi fuerit ordinis. Vernix calefacit & exiccat secundo recessu.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Acris utraque est, calefacit, & urinam mouet. Incensæ suffitu serpentes fugant. Earum fructus, hic quidem fabæ, aliis uero nucis ponticæ magnitudine inuenitur, rotundus, odoratus, in mandendo dulcis, & subamarus. Modicè calefacit & adstringit, stomacho utilis. Potus ad uitia thoracis, tusses, inflationes, tormina, & uenena, prodest. Vrinam cit. Conuulsis, ruptis, & uulæ strangulationibus confert. Folia acria obtinet Juniperus, ideoq; tam ipsa quàm eorum succum ex uino contra uiperarum morsus illini & bibi prodest. Cortex præterea crematus & cum aqua illitus, lepras eximit, Ramentū in uero ligni deuoratum, interficit.



Baccæ Juniperi maioris.

IVNIPERVS
MINOR.

Wechholder.

EX GALENO.

Iuniperi fructus iecur renesq; expurgat, nimirum crassos & glutinosos humores extenuando, eaq; de causa salubribus medicamentis immiscetur. Per exiguum corpori humano alimentum ex eo apponitur. Assatim sumptus hic fructus stomachū mordicat, caputq; calefacit: ex quo illud quandoq; implens, dolore diuexat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit. Vrinam ciet mediocriter.

EX PLINIO.

Vtraq; excalfacit & extenuat. Accensa serpentes fugat. Semen stomachi, pectoris, laterisq; doloribus utile. Inflationes languoresq; discutit, tussis concoquit & duritias. Illitū tumores sistit: item aluum, baccis ex uino nigro potis: item uentris tumores illitis. Miscetur & antidotis oxyporis. Vrinās cit. Illinitur & oculis in epiphoris. Datur conuulsis, ruptis, torminibus, uuluis, ischiadicis cum uino albo potum pilulis quaternis, aut decoctis uiginti in uino. Sunt & qui perungant corpus e femine eius in serpentum metu.

VERNICIS VIRES EX RECENTIORIBVS GRÆCIS.

Profluentem e naribus sanguinem sistit, si ex candido oui liquore trita temporibus & fronti illinatur. Eadem uomitionē ex polline thuris & oui albo excepta suppressit. Item profluentem aluum cum eisdem illita firmat. Stomachum in biliosos uomitus effusum, deuorata in ouo sorbili polenta eius cohibet, cruentamq; alui proluuiem retinet. Destillationes suspendit suffitæ nidor, arcetq; ne præcipites ad ima decumbant. Pituitam quæ in stomacho aut intestinis coijt, digerit. Humorē etiam coërcet, qui pernix a cerebro deuoluitur. Tineas & cætera uentris animalia necat. Vliginosos fistularum sinus indita resiccat. Menstruos continet fluxus. Grauedini suffitus eius auxiliatur. Hiantibus manuum & pedum rimis illitū succurrit. Et in summa Succini pollet uiribus, sed paulo efficacioribus: quæ si desit, duplo pondere in uicem substituitur.

DE ALCEA CAP. XXVII

NOMINA.



ALKEA Græcis, Alcea Latinis uocatur. Officinis ignota. Vulgares herbarij & Empirici Simeonis herbam, Germani nostri Sigmarstraut/oder Sigmundswurz, & Hochlenchten appellant.

Simeonis
herba

FORMA.

Syluestris maluæ species est Alcea, folia Verbenacæ modo secta habens, caules ternos aut quaternos, corticem Cannabi similem obtinentes, Florem exiguum Rosæ similem, Radices albas, latas quinque aut sex, cubitales.

LOCVS.

Nascitur in pingui loco, nec sicco.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Ex emplasticorum medicamentorū numero esse Alceam, & folia, quæ glutinosum quid ac lentorem quendam præ se ferunt, & radix ipsa quæ glutinosa, dulcis, & modicè adstringens apparet gustantibus, abunde monstrant. Hinc satis constat Alceam extra omnem insignem tum caliditatē, tum frigiditatem siccare, ac planè emplasticorum consistentiam obtinere. Vide Galenum lib. iiii. de simpl. medi. facult. cap. iiii. & sequenti.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Alcæ radices in uino aut aqua potæ, dysentericis & ruptis medentur.



ALCEA

Sigmanskraut.

EX PAVLO.

Alcea syluestris maluae genus est. In uino pota dysenteriae & rupturis medetur, potissimum ipsius radix.

EX PLINIO.

Vfus radice Alceae ex uino uel ex aqua, dysentericis, aluo citae, ruptis & couulsis.

APPENDIX.

Celebratur ad caliginem oculorum ab Empiricis, ita ut non desint qui credant radicem Alceae e collo suspensam, aciem oculorum supra modum acueri, & tucri posse.

DE ADIANTO CAP. XXVIII.

NOMINA.



ADIANTON, ἢ πολυτριχον, ἢ καλλιτριχον, ἢ ἐβρόστρονον graece: Adiantum, Polytrichum, Callitrichum, Cinnamalis, Terre capillus, & Supercilium terre

latine appellatur. Officinae hodie Capillum Veneris uocant, quo etiam

Capillus Veneris.

nomine appellari Latinis Apuleius testatur. Germani Swawenhar /

Adiantum unde dictum.

uel Juncus Swawenhar. Adiantum nomen ab euentu accepit, quod folium eius per-

fusum aqua *3 saluere*, id est, non madeat, sicco semper simile, ut autor est Theo-

phrastus libro septimo de Plantarum historia, cap. xiiij. Id quod minimè intel-

ligendum erit de mersione longiore in aqua: nam diutius mersum ac irrigatum, æ-

que ac alia herbae madescit. Quare rectius de imbre descendente e caelo, cuius stil-

licidium folijs eius non insidet, ut testis est in Theriacis Nicander, accipiendum uen-

nit. Vel, quod magis arridet, ab interioribus puteorum parietibus, & fontium margi-

nibus quas coronat, dictum est Adiantum, quod nimirum quasi sitiens illorum

aquas, quas tamen odit & respuit, quaerat. Polytrichon autem quasi multicomum,

Polytrichon.

quod capillos multos ac denso faciat, eiusque defluuia expleat. Callitrichon uero

Callitrichon.

quasi pulchricomum, quod capillos tingat, pulchrioresque reddat. Nec alia ratione ca-

Capillus Veneris cur dicta.

pillus Veneris haec herba dicta est, quam a speciosis reddendis capillis: nec alio no-

mine Veneris uox adiecta est, quam quod haec pulchricoma pingat. Hinc patet

Pharmacopola- rum error.

maximus pharmacopolarum nostri temporis error, qui sub tribus nominibus, una

& eandem duntaxat herbam significantibus, tres diuersas herbas designatas esse pu-

rant. Aliam enim Polytrichum, aliam Callitrichum, quam tamen corrupto uocabu-

lo Gallitrichum uocant: aliam etiam Capillum Veneris esse herbam existimant. Qua-

Ruta muraria non est Adiantum.

les autem herbae sint, Polytrichum, & Gallitrichum illis nominatae, suis locis osten-

FORMA.

Folia albicantia Coriandro similia habet, in summo incisuris diuisa. Caules ex

quibus nascuntur prodeuntque, nigros, admodum tenues, dodrantaes, nitentesque.

Necque florem, necque semen creat. Folijs uero Coriandri iam quidem erumpentis, uel


paulo antea enati, necdum caulescentis, quae quidem in infima eius parte quodam-

modo lata sunt, & in extremitatibus incisa, constare Adiantum sciendum erit. Ex

qua nimirum descriptione manifestissimum est, eam herbam qua fere omnes Officinae

pro Capillo Veneris utuntur, & quam nos a muris in quibus prouenit, Germanice

Locis opacis, palustribusque, & humentibus muris, & prope fontes nascitur. In Germania



ADIANTVM

Krautbar.

A Germania tamen nostra, quod sciam, non prouenit; copiose autem in Narbonensi Gallia, & Italia,

TEMPVS.

Aestate uiret, bruma non marcescit.

TEMPERAMENTVM.

Adiantum in caliditate quidem & frigiditate symmetrum est, uerum desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius herbe potum, asthmaticis, difficultate spirandi laborantibus, ictericis, lienosis, & urinae difficultatibus auxiliatur. Calculos conterit, & aluum cohibet. Venenatorum moribus, & stomachi fluxionibus cum uino potum prodest. Menses cit & secundas. Sanguinis reiectionem sistit. Cruda herba ad uenenatorum morsus illiniunt. Alopecias capillis explet. Strumas dissipat. Furfures & achores cum lixiuio exterit. Cum ladano, myrthino & fusino, aut hyssopo & uino, capillos defluentes continet. Decoctum eius cum lixiuio & uino abstergit. Gallinacos & coturnices cibis eorum additum pugnaciores facit. Seritur & magna utilitate circa ouilia.

EX GALENO.

Extenuat Adiantum & discutit. Alopecias capillis uestit, strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum. Viscosorum crassorumque ex thorace pulmoneque ex creationibus non mediocriter confert, & uentris fluxiones sistit.

EX PLINIO.

Vide infra caput de Trichomane.

DE VITE VINIFERA CAP. XXIX.

NOMINA.



ΜΡΕΛΟΣ οινοφόρος ἡ ἀμπελὸς græcè, Vitis uinifera & fatiua seu culta latine appellatur. Germanicè Weinreb. Vitis autem, quod inuitetur ad uas parandas, dicta esse primo uidetur.

Vitis unde dicta.

GENERA.

Innumera uitium reperiuntur genera, quæ singula persequi superuacaneum esse uidetur. Si quis tamen illa disquirere desiderat, rei rusticæ scriptores, Pliniumque libro xiiii, naturalis historię, qui diligentissime de his scripsit, legat.

FORMA.

Vitis caduca est, & nisi sit fulta, fertur ad terram. A radice eius caudex unus contortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multiplici cortice cingitur, rimoso, flagellis longè lateque uagantibus, quibus se quasi suis manibus erigit, & quicquid nata est complectitur. Sarmētis, folijs latis, & in extremitatibus incisis, lasciuientibus. Floribus fructum ambientibus lanugineis. Uua compluribus acinis aceruata, qui interdum purpureo, nonnunquam roseo, aliquando uiridi colore fulgent. Semini- bus tunica clausis.

LOCVS.

Passim & in multis Germaniæ nostræ regionibus nascitur: & uix hortum inuenies in quo non proueniat.


TEMPVS.

Floret solstitio uitis, autumno autem uas maturas profert.

TEMPERAMENTVM.

Omnium partium uitis temperamentum ex facultatum enarratione patefcet. Uua tamen immaturæ & acerbæ frigida & sicca sunt; maturæ uero calidæ & humidæ in primo gradu, autore quidem Simeone Sethi,

VIRES



VITIS VINIFERA

Weinreb.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

A Vitis uiniferæ folia capreoliq̄ trita & illita capitis dolores, stomachiq̄ inflammations & ardorem cum polenta mitigant. Folia etiam per se imposita, utpote quæ refrigerant & adstringunt. Succus ex ipsis potus dysentericis, sanguinem expuentibus, stomachicis, & citra laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua capreoli & poti, eadem efficiunt. Lachryma uero eius quæ ueluti gummi in caudicibus cōcrescit, pota cum uino calculos pellit. Illita lichenas, scabies & lepras sanat. Oportet tamen locum antea nitro cōfricasse. Eadem cum oleo frequenter inuncta, pilos denudat: potissimum ichor, aquosusue humor, qui ex incensis uiridibus sarmentis exudat. Hic etiam myrmecias inunctus eijcit. Cinis sarmentorū & uinaceorum circa sedem quæ antea ablata amputatæ sunt condylomata & thymia, cum aceto illitus sanat. Confert luxatis & uiperarū moribus. Lienis inflammationibus cum rosaceo & ruta, & aceto illitus. *Vua* recens quæ uis aluum turbat, & stomachū inflat. Minus horum particeps quæ aliquandiu decerpta pependit, quod in ea copia humoris exaruerit. Stomacho accōmodata est, appetentiāq̄ cibi excitat, & imbecillis cōuenit. Quæ autem in uinaceis, aut uinario uase seruata sunt, ori & stomacho gratae sunt. Aluum sistunt, uescam tamen & caput tentant. Profunt sanguinē excreantibus. Similes ijs sunt quæ in mustum cōiectæ sunt. Quæ uero sapa aut musto cōditæ, stomachum magis infestant. Reponunt & cœlesti cum aqua prius passæ factæ, minusq̄ uinosæ fiunt, siticulosis, ardentibus & longis febribus utiles. Vinacei carum reconditi, inflammationis, duris, turgentibusq̄ mammis cum sale illinuntur. Vinaceorū decoctum dysentericis, cœliacis, & fluxui muliebri infusum cōfert. Ad inflexiones quoq̄ ac dysenteres assumitur. Nuclei acinorum adstringunt, stomacho grati. Tosti autē & triti & pro farina illiti, dysentericis, cœliacis & stomacho resolutis profunt. *Vua* autem passa alba magis extenuat. Caro illarum comesta, arteriæ, tussi, renibus ac uesciq̄ confert. Estur in dysenteria per se cum nucleis, Admixta milij & hordei farinæ & ouo, ac cum melle frixa, & per se etiam sumpta, atque cum pipere cōmanducata, ad capitis pituitam purgandam ualet. Testium inflammationes sedat, cum fabarum & cumini farina illita. Epinyctidas, carbunculos, fauos, & in articulis putredines & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita, sanat. Podagræ cum opopanace illita auxiliatur. Mobiles ungues illita celeriter adimit. Vini facultates tu ipse ex Dioscoride, Galeno, & Plinio pete: superuacaneum enim, imò tegdio plenum esset eas in uniuersum omnes cōmemorare.

EX GALENO.

Vitis fatiuae & culte ad similes facultas est syluestri, sed ad omnia imbecillior. Vitis uero syluestris racemi, extergendi uim obtinēt, ut ephelus & nauos, & id genus quæcunq̄ in cutis superficie fiunt, curare possint. Habent uero & adstrictionem quandam ipsi, & extrema germina, quæ & sale condiri assolent. Plura de uuis habet idem Galenus lib. ij. de aliment. facul. cap. de uuis.

EX SIMEONE SETHI.

Vua plus nutriunt reliquis oporis, minus tamē ficis: neq̄ mali succi sunt, si maturæ fuerint exquisitè. Tamen his nō robusta, nec densa, sed laxa & flaccida caro gignitur. Maximum quidem harum bonum, ait Galenus, quod celeriter subeunt, atque ideo si retineantur, lædunt: nec enim tunc probè cōcoquuntur, sed crudum gignunt humorem, qui non facile in sanguinē transmutetur. Nucleorum natura, sicca & quodāmodo adstringens est. Pertranseunt igitur omnia intestina, non alterati. Pensiles uero uuae, neq̄ sistunt uentrem, neque proritant, cæteris autem facilius cōcoquuntur. Neq̄ uuarum parua est in dulcedine, & austeritate, & aciditate differentia. Dulces quidem calidiores habent succum, austeræ uero & acidæ frigidum Aluum subducunt dulces, & maximè quando humidæ fuerint. Omnium itaq̄ tutissimus usus est quādo carnosæ fuerint & maturæ, & mediocriter quis ipsas assu-

H mat.

mat. Vuæ quæ albæ sunt, magis subducunt aluum quàm nigræ. Omnes uero ciborum appetentiã excitant, & uenerem. Conuenit cum eduntur membranã & nucleos expuere, quod difficulter cõficiantur. Quæ immaturæ sunt, uentrem sistunt, & stomacho bonæ. Caliditatem à flaua bile ortam sedant. Minus uero nutriunt. Oportet autem nõ solum uuas, sed etiam omnes fructus molli cortice præditos humidos, ante reliquos cibos apponere.

DE ACONITO CAP. XXX.

NOMINA.

Aconitum cuius dicitur.



KONITON Græcis, Aconitum Latinis dicitur. Sic autem Theophrasto lib. ix. de Plantarũ historia teste, non ἀκόνιτον, id est, à cautibus, sed ab Aronis Periandynorũ pago, ad Heracliam Ponti sito, uocatum est. Alij quod uis eadem in mortem esset, quæ cotibus ad ferri aciem detrahendam, statimq; admota uelocitas sentiretur. Sunt qui aliam ob causam, quam referre minimè necessarium duco, sic nominatum fuisse existiment.

GENERA.

Pardalianches. Duo Aconiti sunt genera: unum Græcis Pardalianches dictum, quod pardĩ eo necentur. Vocatur etiam Scorpionium, quod radicẽ Scorpionis similem habeat. Vulgus herbariorũ Vuam uersam, & uulpinã, Germani *Wolffsbeer* / & *Dolwurz* nominant. Alterum *Lycostonon* Græcis dicitur, quoniam deuoratum lupos confestim interficit. Vulgus *Lupariam*, Germani *Wolffswurz* appellant.

FORMA.

Pardalianches descriptio.

D

Pardalianches folia habet tria aut quatuor *Cyclamino* uel *syluestri Cucumeri* similia, minora tamẽ, & subaspera. Caulem dodrantalem. Radicem scorpionis caudæ similem, alabastrĩ modo nitentem. Ex hac descriptione omnibus liquidò apparet, herbam eam quam *Vuam uersam* aliqui nominant, cuiusq; hic picturam exhibemus, primum esse Aconiti genus: habet enim tria aut quatuor folia, eaq; *Cyclamini* specie. Caulem palmi altitudine, & radicem incuruam, scorpionum caudæ similem, alabastrĩq; modo splendentẽ. Quibus etiam accedit quod manuscriptus & uetustissimus herbarius planissimè eam herbã quam hic damus pro Aconito pingat. Germanica etiam nomenclatura fatis indicat hanc herbam ob suam facultatẽ perniciosam esse Aconiti speciem. *Lycostonon* Platani folia habet, magis tamen incisã diuisãue, longiora & nigriora. Caulem ueluti *Filix*, cubiti altitudine, aut maiorẽ: pediculum glabrum. Semen in siliquis aliquatenus longis. Radices cirris marinarum squillarum similes, nigras. Vnde iterum constat *Lupariam* uulgò appellatam, esse alteram Aconiti specie: ea enim folia Platani, quæ *Cici* aut *Vitis* folijs similia sunt, multas habentia diuisuras, obtinet. Caulem *Filici* similem, pediculũ glabrum. Florem oblongum, luteum, post quem longæ proueniunt siliquæ, in quibus est semen. Radices etiam nigras, ut nemo subinde quin uerum sit Aconitum dubitare possit.

Lycostonon.

Luparia.

LOCVS.

Primum Aconiti genus passim in nemoribus & collibus quibusdam nascitur: alterum autem in montium uallibus altissimis. Magna autem illius copia est circa montem haud ultra unum lapidem à *Tubinga* situm, quem Germanica uoce *Sarrenberg* nominant.

TEMPVS.

Aconiti primum genus Maio mense potissimum erumpit. Alterum autem æstate, Junio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.


Erosione & putrefactione enecant Aconita, ideo toto genere letalia sunt.

VIRES



ACONITUM
PARDALIANCHÉS


Dolkowitz.



H 2

ACONITUM
LYCOCTONON

Wolffwurtz.



VIRES EX DIOSCORIDE.

Ferunt Aconiti primi radicem scorpioni admotam eum resolueret, & è diuerso admoto elleboro excitari. Ocularibus medicamentis dolorem tollentibus miscetur. Enecat pardos, fues, lupos, & feras omnes, carnibus impositum & obiectum. Alterius radice ad luporum uenationes utuntur. Insertæ carnibus crudis, & à lupis deuorata, eos enecant.

EX GALENO.

Aconitum Pardalianches putrefaciendi facultatem obtinet & letale est, itaq; in cibo potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendū colliquandūque quædam extra corpus, aut circa sedem, idoneum est. Herbae uero radix ad hæc utilis est. Alterum similem priori facultatem habet, sed peculiariter lupos, sicut illud pardos, interficere consuevit.

EX PLINIO.

Constat omnium uenenorū ocyssimum esse Aconitum, & tactis quoq; genitalibus sceminini sexus animalū, eodem die inferre mortem. Hoc tamē in usus humanæ salutis uertere, scorpionū ictibus aduersari experiendo aconitum datum in uino calido. Ea est natura ut hominē occidat, nisi inuenit quod in homine perimat: cum eo solo colluctatur, uelut pari intus inuento. Sola hæc pugna est cum uenenū in uisceribus repererit: mirumq; exitialia per se ambo cum fuerint, duo uenena in homine cōmoriuntur, ut homo supersit. Imò uerò etiam ferarum remedia antiqui prodiderunt, demonstrando quomodo uenenata quoque ipsa sanarentur. Torpescunt scorpiones Aconiti tactu, stupentq; pallentes, & uinci se consentent. Auxiliatur eis elleborum album, tactu resolvente: ceditq; aconitum duobus malis, suo & omnium. Tangunt carnes aconito, necantq; gustatu earum pantheras, ob id quidam Pardalianches appellauere.

Legendum enim πῦρ τῆς ἐκείνης σὺ μὲν ἔχει, ἔχει non πῦρ τῆς σὺ μὲν ἔχει, ut habet exemplar Aldinum: stipulantibus huic lectio ni Actio, Paulo, & antiquo interprete Latino.

DE ARISTOLOCHIA CAP. XXXI

NOMINA.



ARISTOLOXIA Græcis, Aristolochia Latinis, barbaris & officinis corrupta uoce Aristologia, quemadmodū etiam Germanis Wolwurz / & Osterlucey nominatur. Dicta autem est Aristolochia, quod ἀρίστη τοῖς νοχῶν, id est, optima puerperis sit, utpote quæ remoratos menses, hærentes fecundas, & reliquias omnes à partu expellat.

Aristolochia uide dicta.

GENERA.

Aristolochiæ Dioscorides & alij Græci tria esse genera statuunt. Vna est que rotunda & scemina dicitur. Altera longa & mascula. Tertia Clematidis, quasi dicas farmentaria, appellatur. Harum certe nullam præter longam officinæ Germaniæ nostræ agnoscunt. Nam qua sub Aristolochiæ rotundæ nomine utuntur herba, minimè genuina est, ut paulò post euidentissimis argumentis ostendemus. Plinius tribus ijs generibus addit quartum, ac Pistolochiā uocat, quæ certè ea est quam nostræ officinæ Aristolochiam rotundam, & Germani Runde Wolwurz falso appellant, ut in eius descriptione fusius docebimus.

Germania officine solam longam Aristolochiā agnoscunt.

Pistolochia que.

FORMA.

Aristolochia rotunda folia Hederæ similia habet, cum acrimonia odorata, subrotunda, tenera, cum multis in una radice germinibus: farmenta illi sunt oblonga, flores candidi, pileolis similes, in quibus quod rubet grauiter odoratū est. Radix illius rotunda, rapo similis. Ex ijs quidem uerbis sole clarius sit Aristolochiā rotundam officinarum, & qua cōmuniter omnes utuntur, non esse eam quam Dioscorides atque alij ueteres pingunt. Hæc enim non Hederæ folia, sed Rutæ potius, maiora tamen habereprehenditur. Neque etiam odorata, necq; subrotunda sunt. Grauis

Aristolochia rotunda.



ARISTOLOCHIA
ROTVNDA

Pang-hokwurtz.



PISTOLOCHIA

Runde holwurtz.

Radix rotunda & solida.

H 4

C etiam qui ex floribus exhalat odor, in nostræ Aristolochiæ floribus nusquam apparet. Radix denique etsi rotunda sit, tamen quia concaua est, globiçq; formam obtinet, rapo, quod solidum est & oblongum, similis dici non potest. Non latet tamen interdum etiam reperiri eius generis radices prorsus rotundas ac solidas, ut altera pictura monstrat: uerū cum reliquæ Dioscoridis notæ absint, legitima Aristolochia esse haud potest. His accedit, quod manuscripti herbarij pictura planè hanc Aristolochiā Hederæ folia habere doceat, ut hinc etiam euidentissimū sit nostram nō esse genuinā. Aristolochia longa, folia quàm rotunda longiora habet. Ramulos tenues, altitudine dodrantales. Florē purpureū, grauiter odoratū, qui cum defloruerit pyro similis sit, Radicē digiti crassitudine dodrantalē, aut longiorē. Tam huius uero quàm prioris radix colore buxæ, gustu amara, & odore uiroso est. Hæc sanè descriptio non abhorret à nostra Aristolochia, quæ Hederæ etiam folijs cōstat, ramulisçq; tenuibus. Neçq; obstat quod hæc non purpureos, sed luteos potius flores habeat: nam ut in Symphyto magno uberius dicemus, non ubiq; terrarum, earundem etiam herbarum flores similes esse, euidentissimū sit in Boragine, & Consolida maiore hodie nominatis herbis. Quamuis autem lutei sint, grauiter tamen odoratos esse constat. Dein ubi flos nostræ etiam Aristolochiæ defloruerit, tum pyro similis sit, ut pictura etiam pulchrè monstrat. Sed hic obtrudet nobis quispiam Dioscoridem, qui Gentianæ radicem Aristolochiæ longè similem, crassamçq; esse scribit: huius autem nostræ nedum digiti crassitudinē obtinet, tantum abest, ut quantitate Gentianæ radici similis esse queat. Respondeo, hæc quidem uera esse, sed nihil mirum esse si apud nos minor reperiatur: uariatur enim in una etiam & eadem herba iuxta regiones diuersas radicū magnitudo. Sic uisa est nobis radix Aristolochiæ rotundè multò quàm sit maximus digiti maior & crassior. Hæc tamē in Italia pro uenerat. Neçq; dubiū est quin nostræ etiam radix maior futura sit ubi cultus, & terra apta admodum accesserit. Nam ut Theophrastus lib. i. de histo. plant. cap. v. auctor est, quædam ob culturam diuersa efficiuntur, atque à sua natura discedunt. Sic Malua in altum se attollit, & arborefcit, atq; in longitudine & crassitudine instar hæræ grandescit. Quid multa: cum nostra maxima etiam prædita sit amaritudine, tutò illa pro uera & genuina, nihil obstantibus floribus luteis, & radice minima, uti licebit. Clematidis ramulos habet tenues, folijs subrotundis, minori Semperuiuo similibus, plenos: flores Rutæ haud dissimiles. Radices longiores, tenues, corticem crassum habentes, & odoratum. Pistolochia à Plinio lib. xxv. cap. viij. ijs pingitur uerbis: Est & quæ Pistolochia uocatur, quarti generis, tenuior quàm tertia, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrhizon cognominant. Ex ijs autem uerbis nemo nō intelligit, Aristolochiam rotundam uulgo uocatam, esse Pistolochiam: hæc enim supra modum tenuis, uel ut apertius dicam, tenera herba est. Radix etiam multis capillamentis uestita, crassioris etiam iunci magnitudine, atque adeo concaua, ut pictura monstrat. His accedit, quod hæc quæ rotunda uocatur cauis ulceribus proffit, quam etiam facultatem Pistolochiæ, ut paulò post patebit, Plinius tribuit. Et quid multis opus est uerbis: nomē ipsum abundè docet esse Pistolochiam: creditur enim, quamuis reuera non sit, esse Aristolochia hodie quoçq; haud secus quàm Plinij temporib. Hæc, ut totam eius faciem teneas, caulem habet rotundum, leuem, folia Rutæ hortensis, latiora tamen, flores ferè Branthemi, purpureos: illa candidos, ut pictura quæ utrosque unà completitur, pulchrè monstrat, quibus abeuntibus, siliquas profert refertas semine atro, lentibus haud dissimili: radices, ut ostensum est, hæc rotundam & cauam, illa uerò rotundam, at omni tempore solidam obtinet, colore subcroceam.

LOCVS.

Vera rotunda, quod sciam, nusquā in Germania nostra nascitur. Longa passim in uineis, ac hortis alijs prouenit. Pistolochia in syluis & locis umbrosis.

T E M P V S.

A Longa Iunio & Iulio mensibus floret. Pistolochia in Martio & Aprili, quo praeterito statim etiam disperit.

T E M P E R A M E N T V M.

Cum supra modum amaræ & subacres sint Aristolochiæ, calidas & siccas esse in secundo, uel, quod magis credibile est, in tertio ordine rectè statuemus.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Rotunda contra alia uenena ualet. Longa uero drachmæ unius pondere cum uino pota & illitæ, duersus serpentes & letalia. Menfes, secundas & fetus omnes in utero consistentes cum myrrha & pipere pota pellit. In pello subdita eadem potest. Rotunda ad eadem omnia ad quæ prædicta conducit: ampliusq; asthma, singultui, rigori, lieni, ruptis, cõuulsis, laterisq; doloribus ex frigida aqua pota auxiliatur. Surculos & spicula extrahit. Squamas ossium illita educit. Putrescentia excarificat, & sordida ulcera expurgat. Caua cum Iride & melle explet. Exerit gingiuas & dentes. Creditur & Clematidis ad eadem prodesse, efficacia tamen prædictis minor inferiorq; est.

E X G A L E N O.

Aristolochiæ radix ad medicaciones utilissima est, amara & subacris. Sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Aliarum uero duarum Clematidis uocata magis odorata est: itaque ea ad unguenta utuntur unguentarij: sed ad sanationes infirmior. Longa uero minus quidem tenuis est quàm rotunda, sed nec ipsa inefficax, uerum abstergendi & calefaciendi facultatem possidet, minus tamen quàm rotunda abstergit atque digerit: sed non minus calefacit, imò fortassis etiam plus. Itaque in quibus usus est mediocriter abstergere, cõmodior est longa, quemadmodum in carnis exulcerationibus, & in uteri fomentationibus. In quibus autem crassum humorem ualidius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Quapropter dolores ab obstructione aut crassitie crudorum flatuum natos magis curat rotunda, & surculos extrahit, & putredines sanat, & sordida ulcera repurgat, ac dentes gingiuasq; candidas efficit. Auxilio est asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiam conuulsisq;, ut si quod aliud medicamentum, idõnea est.

E X P L I N I O.

B Valent radice tantum. Rotunda contra serpentes. Oblonga in summa tamen gloria est etiam modo. A conceptu admota uuluis in carne bubula, mares figurat, ut traditur. Quæ Pistolochia & Polyrhizos cognominat, cõuulsis, contusis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua, utilissima esse tradit. Semine pleuriticis & neruos confirmare, excalfacere. Putrida ulcera exest, sordida expurgat, uermesq; extrahit Aristolochia. Clauos in ulceribus natos, & infixæ corporis omnia, præcipue sagittas, & ossa fracta, cum resina, Caua ulcera explet per se, & cum Iride: recetia uulnere ex aceto.

A P P E N D I X.

Et si nostram Aristolochiã rotundam nõ genuinam esse dixerimus, tamen ob id in medico usu non repudianda erit. Quum enim habeat & in folijs & in radice acrimoniam, eamq; non leuem quidem, si genuina desit, sine omni discrimine illa uti licebit ad omnia ea ad quæ uera usurpatur.



VITIS ALBA

Stieckwurtz.

NOMINA.



ΜΡΕΛΟΣ λευκή, ἢ Βρυονία, ἢ Φιλοθρουm græcè: Vitis alba, Pfilothrum latine appellatur. Officinis & herbarijs Bryonia. Vulgus Viticellam nominat. Germanicè Sticwurz/Schießwurz/Raswurzgel/Hunds türbß/Römischcrüb/Wilder zitwan/Teüfelskirß uocatur. Vitis alba uero dicta, non quod uitis sit, sed quod uiti similis existat. Sic etiam Viticella. Pfilothrū, quod ex eius acinis coria depilari ac cōfici possint. Bryonia uero à βρύω fortè, quod est pullulo atque adeo extollo, & exalto, eò quod in adiacentes sibi frutices scandens se exaltet atq; latè pullulet.

Bryonia.

vitis alba cuius dicta.

Pfilothrum unde.

Bryonia.

FORMA.

Sarmenta, folia, capreoli, satiuæ uiti similia sunt, hirsutiora tamen omnia. Propinquis fruticibus se implicat capreolis apprehendens. Fructum habet racemosum, rubentem, quo coria depilant. Radix alba, crassa & magna.

LOCVS.

Passim in sepibus & senticetis nascitur, eosq; quos prope se nanciscitur frutices scandit, ut eleganter in carmine suo Columella cecinit, dicens:

*Quæq; tuas audax imitatur Nyse uites,
Nec metuit senteis: nam uepribus improba surgens
Achrados, indomitas bryonias alligat ulmos.*

TEMPVS.

Floret tota æstate in bonam usq; partem autumnii, in quo fructum producit, qui primum uiridis est, dein ubi maturitatem consecutus fuerit, rufus esse incipit.

TEMPERAMENTVM.

Prima germina subamaram & modicè acrem adstrictionem habent. Radix autem desiccata & moderatè calefacit.

VIRES.

EX DIOSCORIDÈ.

Bryoniæ in prima germinatione asparagi elixi manduntur, urinam & aluum cientes. Folia, fructus & radix, acrem uim habent: eapropter chironijs, gangrænicis, phagedænicis, & tibias putrefacientibus ulceribus cum sale illita auxiliantur. Radix abstergit corpus & erugat. Vitia faciei, uaros, lentigines, & cicatrices nigras, cum eruo, terra chia, & fcnograeco emendat. Ad eadem prodest decocta in oleo usquedum liquefat. Sugillata tollit, & digitorū pterygia compescit. Cum uino illita inflammationes discutit, & abscessus rumpit. Ossa extrahit, trita & illita. Miscetur aptè medicamentis quæ exedendo sunt. Bibitur comitalibus drachmæ pondere quotidie per annum. Attonitis & uertigine laborantibus consimiliter assumpta prodest. Cōtra uiperarum ictus pota drachmīs duabus prodest. Fœtus necat. Mentem aliquando subturbat. Cit urinam pota. Edeigma ex ea fit cum melle, quod præfocatione oppressis, tussientibus, latera dolentibus, & ruptis datur. Apposita utero, fœtus & secundas trahit. Lienem trium obolorum pondere ex aceto triginta diebus pota consumit. Illinitur utiliter cum fico ad eadem. Ad infessus decoquitur: uuluas siquidem purgat, & abortum facit. Vere ex radice eius exprimitur succus, bibiturq; cum aqua mulsa ad eadem, pituitam ducens. Fructus eius ad pforas & lepras illitus & inunctus facit. Lactis abundantiam efficit succus eius fructus, si cum tritico decocto forbeat.

EX GALENO.

Vitis albæ, quam etiam Bryoniã uocant, prima quidè germina ab omnibus pro more per uer eduntur, utpote edulitū stomacho eò quod adstringat gratū. Habent etiam amaram & modicè acrem adstrictionē, quare urinã moderatè mouent. Radix autem abstergentem nonnullam, desiccantem & tenuium partium, ac moderatè ca-


rate calidam uim obtinet, quamobrē & lienes induratos liquefacit tum epota, tum foris cum ficibus imposita. Pforam etiam ac lepram sanat, Racemosus eius fructus pelles tingentibus utilis est.

EX PLINIO.

Bryoniae asparagi decocti in cibo aluum & urinam cient. Folia & caules exulcerant corpus: utique ulcerum phagedænis, & gangrænis, tibiaramq; tedio cum sale illinuntur. Semen in uua raris acinis dependet, succo rubente postea croci. Nouere id qui coria perficiunt: illo enim utuntur. Pforis & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit coctum cum tritico, potumq;. Radix numerosis utilitatibus nobilis: contra serpentium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie, uarosq; & lentigines, & fugillata emendat, & cicatrices. Eademq; præstat decocta in oleo. Datur & comitialibus potus. Item mente comotis, & uertigine laborantibus, drachmæ pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquanto, purgat sensus. Illa uis præclara, quod ossa infracta extrahit in aqua imposita, ut Bryonia: quare quidam hanc albam Bryoniam uocant. Suppurationes incipientes discutit, ueteres maturat & purgat. Cit menses & urinam. Eclegma ex ea fit suspiriosis, & cōtra lateris dolores, uulsis, ruptis. Splenem ternis obolis pota triginta diebus cōsumit. Illinitur eadem cum fico & pterygijs digitorum. Ex uino secundas sceminarum apposita trahit: & pituitam, drachma pota ex aqua mulla. Succus radice colligi debet ante feminis maturitatem: qui illitus per se & cum eruo, lactiore quodam colore, & cutis teneritate mangonizat corpora: serpētes fugat. Tunditur ipsa radix cum pingui fico, erugatq; corpus, si statim bina stadia ambulentur. Aliàs urit, nisi frigida abluat.

DE AMPELOMELAENA ▶ CAP ▶ XXXII ▶

NOMINA.

D  **M**PEΛOZ μέλαινα Græcis, Vitis nigra Latinis nominatur, Officinis in cognita. Germanis Waldreben/oder Lynen/oder Lenen uocat. Nigra uero uitis dicta est à radice nigra, & quod uitis similitudinē obtineat.

Vitis nigra unde dicta.

FORMA.

Folia Hederæ similia habet, magis tamen ad Smilacis folia accedentia, cui & caules similes obtinet: maiora tamen eius folia quam illius sunt. Clauiculis hæc etiam arbores amplectitur. Semen racemosum, initio herbaceum, cum maturuit deinde nigrum. Radicem foris nigram, intus buxei coloris. Ex qua deliniatione omnibus cōstat herbam hanc cuius picturā exhibemus, esse uitem nigram. Folijs enim Hæderæ, maioribus tamen, Smilaci proximioribus, caulibus quoq; cognatis. Clauiculis suis arbores perinde atque adminicula comprehendit. Semen racematim coheret, inter principia uirens, post maturitatem nigrescens. Radix foris atra, intus buxeo colore nitet. Flores eius, quod omisit Dioscorides, sunt candidi, & odorati, quibus decidentibus semen subnascitur plumis quasi uestitum, aut barbæ canæ effigiem præbens

LOCVS.

In frutetis & dumetis potissimum nascitur.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, Augusto uero semen profert.


TEMPERAMENTVM.

Idem quod uitis alba temperamentum habet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius caules in prima germinatione olerum modo manduntur, urinæ & menses ducendis utiles. lidem lienes minuunt. Comitialibus, uertiginosis, & resolutis accōmodati sunt. Radix eadem præstat quæ uitis albæ, minus efficax tamen. Folia cum

lia cum



VITIS NIGRA

Linnaeus.

I

lia cum uino illita ad iumentorum ceruices exulceratas conducunt. Quinetiam luxatis eodem modo imponuntur.

EX GALENO.

Viti albæ ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

EX PLINIO.

Asparagi eius in cibo urinæ ciendæ, lienique minuendo utiles. Radix ossa infracta efficacius extrahit quàm suprâ dicta. Cæterum eidem peculiare est, quod iumentorum ceruicibus unice medetur. Aiunt si quis in uilla extruxerit, fugere accipitres, tutasque fieri aues uillaticas. Aliter eadem in iumento homineque flegma aut sanguinem qui creatur, talos circumligata sanat.

DE AMARANTO CAP. XXXIIII.

NOMINA.



Amarantus un-
de dictus.

MAPANTOZ Græcis, Amarantus Latinis dicitur. Medicis & herbarijs nostræ ætatis ex amore & anthos dictionem cõponi credentibus, Flos amoris uocatur. Hanc appellationem usurpantes Germani, *Storamor* nominant, aliàs *Samatblim* / & *Tausentstõhn* appellatur. Amarantus autem non alio nomine dici cepit, quàm quod flos eius nunquam marcescat. Hinc est quod puellæ hyemales sibi corollas ex eo cõficiant: id quod Erfordiæ, ubi non solum æstate, uerumetiam hyeme gestant coronas, fieri potissimū solet.

GENERA.

Duplex est Amarantus: unus luteus, qui Dioscoridi *ἐλχυσσον*, Galeno Amarantus, officinis & imperitis *Stichas citrina*, uel ut ipsi loquuntur, *Sticados citrinum*, Germanis *Xheinblimen* / quod in regionibus quæ Rheno adiacent, potissimum uero quæ intra Spiram & Vuormaciã sunt, proueniat: oder *Worrenblim* / oder *Jüngling* appellatur. Helichryson dictum, quod ad solis repercussum comantibus, in orbem florum folijs, fulgorem auri præ se ferat. Alter purpureus, qui hodie Flos amoris uulgo, & Germanis *Storamor* / oder *Samatblim* uocatur, ut paulò antè à nobis dictum est.

FORMA.

Amarantus lu-
teus.

Amarantus luteus qui Helichryson alio nomine dicitur, uirgam habet tenuem, uirentem, rectam, solidamque. Folia angusta ex interuallis, Abrotono similia. Coma orbicularem, auri modo fulgentem. Umbellam rotundam, ueluti corymbos arefcentes. Radicem tenuem. Ex qua descriptione planum fit eam herbam quam hodie officinæ solocissimo utentes *Stichada citrinam* nominant, esse Helichryson. Est enim herba furculosa, exilibus ramulis, folio ut Hyssopus angusto, gustu amaro, & instar Abrotoni albicante: coma orbiculari, auri modo splendente: umbella rotunda ueluti corymbos arefcentes: radice gracili. Et ut paucis dicam, non est nota quæ illi non aptissimè quadret. Purpureus uero pedali altitudine surgit, caule purpurascente, folijs Ocymo similibus, maioribus tamen & longioribus, spica purpurea, uerius quàm flore, inodora, qua nihil gratius aspectu cernitur.

Amarantus pur-
pureus.

LOCVS.

Nascitur in asperis, sabulosis, siccis & conuallibus locis luteus. Alter autem in hortis & siccilibus seritur.


TEMPVS.

Helichrysum Iunio & Iulio mensibus floret. Amarantus uero purpureus æstate, potissimū autem Augusto mense.

TEMPERAMENTVM.

Luteus calidus & siccus haud dubiè est, id quod amaritudo in gustu & facultates eius abundè demonstrant, Purpureus autem recentiorum herbariorū sententia frigidus est & siccus.

VIRES.



AMARANTVS
LVTEVS.

Rheinblumen.

I 2



AMARANTVS
PVRPVREVS

Samatblum.

VIRES EX DIOSCORIDE.

A Coma Helichrysi cum uino pota difficultatibus urinæ, serpentium ictibus, coxendicum doloribus, & ruptis auxiliatur. Menses ducit, & sanguinis grumos in uesica aut aluo cum oxymelite pota liquefacit. Destillationem trium obolorum pondere cum uino diluto albo ieuno data compefcit. Reponitur etiam cum uestibus, quas ab erosione integras seruat. Vnde iterum colligere licebit, herbam quam *Rheinblumen* uocant, esse Helichrysum, quod illam hac facultate ut uestes à tincis tueatur præditam esse, omnibus in confesso est.

EX GALENO.

Amarantus, luteus nempe, facultatis est incidentis & extenuantis. Quapropter coma eius cum uino pota menses educit, & sanguinis grumos liquare creditur, non solum in uentre, sed & in uesica. Sed tunc potius illam cum mulso bibere conuenit, Omnes uero simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho tamen aduersa.

EX PLINIO.

Heliochrysum ciet urinas è uino pota, & menses. Duritias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur. Contra serpentium ictus & lumborum uitia bibitur. Sanguinem cõcretum uentris ac uesicæ absomit cum mulso. Folia eius trium obolorum pondere sistunt profluuia mulierum in uino albo, Vestes tuetur odore non ineleganti.

APPENDIX.

Recentiores purpureum Amarantum uehementer siccare tradunt, ideoq; cum uino sumptum alui fluxiones sistere scribunt; sed, ut aiunt, stomacho aduersatur. Lutei floribus in uino decoctis, ad lumbricos educendos utuntur: & ad pediculos enecandos in lixiuio coctis.

DE AQUILEGIA CAP. XXXV.

NOMINA.



VAE Aquilegia uulgò ab omnib. appellatur herba, ea Germanis *Ackley* / *Agley* / & *Ageley* nominatur. Quo uero nomine Græcis aut Latinis medicis uocata sit, nobis nondum constare potuit. Non esse enim Græcorum *Aegilopa*, ut non solum uulgares herbarij, uerumetiam magni nominis medici putant, notius est quàm ut demonstrari à me debeat. Nam nihil in uniuersa *Aegilopis*, quæ alterum *Auenæ* genus est, historia reperitur, quod ad *Aquilegiam* referri queat. Neque enim tam ab anguilla cancer, quàm *Aegilops* ab *Aquilegia* disidet; ut hoc nomine errare toto cælo euidentissimū sit, qui *Aegilopa* esse *Aquilegiam* arbitrantur.

Aquilegia non est Aegilops. Aegilops quid.

FORMA.

Folia *Chelidoni* maioris habet, sed paulò rotundiora, ac molliora. Caulem cubitalem, & interdum proceriorem, in cuius summo flores purpurei sunt, ex caudis quibusdam ueluti muliebres oculi propendentes. His decidentibus capitula subnascuntur, haud secus atque in *melanthio*, in quibus semen atrum est. Radix eius crassa.

LOCVS.

Nascitur passim in hortis, & pinguibus quibusdã pratis. Inuenitur etiam in montibus syluosis, & interdum in petris & muris.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

In gustu dulcedinem quandam præ se ferre uidetur, ut hoc nomine mediocriter calidam



AQUILEGIA

McGeley.

A calidam esse, ac modicè digerendi uim habere uerisimile sit.

VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Recentiores omnes, tum herbarij, tum medici, Aquilegiæ omnes Aegilopis facultates tribuunt, at quàm rectè ipsi uiderint. Neque enim uerisimile est herbe que subacris non est, tantam discutiendi inesse facultatem posse. Quum uero modicè digeratur & exiccet, scabiei & fistulis, potissimum si illi farina cõmiscetur triticea, conferre potest.

DE ALLIARIA CAP. XXXVI.

NOMINA.



ONDVM constat quo nomine ueteribus Græcis & Latinis herba hæc appellata sit. Vulgò tamen, eò quòd trita eius folia ingratum ac planè aliaceum odorem redolent, Alliaris & Alliaría nominatur. Germanicè Knoblochkraut/oder Leuchel/oder Saßkraut. Pandectarum autor Pedem asininum uocat.

Alliaria unde dicta.

Pes asinini.

FORMA.

Folia eius cum primum emicant subtrotunda sunt, uiolæ similitudine, aliquantulum tamen maiora. Adulta autem in angulos exeunt. Herba ipsa bicubitali proceritate confurgit, caule tereti, folijs Vriticæ, nisi quod leuiores sunt, parcius fimbriata, & à pediculo latiora, Allij odoratu cum teruntur, flore lacteo alboue, exili in siliquis femine, atro colore, radice oblonga, eiusdem cum folijs odoris.

LOCVS.

B Passim propter sepes & agrorum margines prouenit.

TEMPVS.

Folia statim primo uere, atque adeò Martio ipso erumpunt. Floret autem æstate, atque deinceps semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Quum prorsus suboleat Allium, necesse est ut temperamento eodem prædita sit. Calefacit igitur haud dubiè & desiccatur, non tamen perinde atque Allium in excessu quarto.

VIRES.

Easdem propè Allij facultates habere uel hinc conijci potest, quod nonnulli in iuribus tortiuisq; succis pro Allio substituunt. Proinde corpus calefacere, crassos humores in eo extenuare, glutinosos incidere potest. Omnia tamen hæc minori quàm Allium efficacia. Semen eius cum aceto emplastri modo mulieribus strangulatu uteri laborantibus impositum, & uulvæ admotum prodest, ac easdem excitat. Et summatim, omnia quæ Nasturtij semen, sed minori efficacia, potest.



ALLIARIA

Knoblochkraut.

NOMINA.



ΚΑΛΥΦΗ, *nivida* Græcis, Vrtica Latinis nuncupatur. Officinæ latino nomine utuntur, Germanis *Nessel* appellatæ. Acalyphe uero dicta est, Athenæo autore, quod iniucundo sit tactu, & pruriginem cieat. Cnide autē, quod uellicet, pungat, ac suo morfu sensum laceffat, à uerbo *κνιζειν*, quod pungere & uellicare significat. Vrtica ab urendo, quod pruritum pustulasq; igni similes excitet.

Acalyphe una de dicta. Cnide.

Vrtica.

GENERA.

Dioscorides duo facit genera. Vnam asperam, quam hodie Romanam uocant: & est ea quam pictam damus. Huius quidem semine in officinis utendum, non alterius quæ passim in sepibus ac dumetis nascitur. Germanicè *Melschnessel* appellatur. Alteram minus asperam, quam ob id mollem nominat. Hanc nondum uidere potuimus. In Germania nostra præter hæc genera, alia duo inueniuntur. Vnum maius, quod germanicè *Heyternessel* nominat: alterum minus, germanicè *Brennessel* uel *Habernessel*/ quod nimirum in auena nascatur, appellari solet. Harum etiam picturas adijcere placuit, quod non profus inefficaces esse putemus, quandoquidem haud secus atq; Romana pungere uideantur.

Vrtica romana.

Vrtica nostra maior.

Vrtica minor.

FORMA.

Romana caule est rotundo & aspero, syluestrior etiam & asperior, latior & nigrior folijs, semine haud dissimili in globulis quibusdam semine lini, sed minore. Altera priori similis est, nisi quod non similiter aspera est, tenuiusq; semen habet.

LOCVS.

Romana apud nos non nisi sata prouenit, non secus atque mollis uocata urtica. *Romana.* Vulgares passim in dumetis ac sepibus gignuntur.

TEMPVS.

Semen melsibus colligi oportet.

TEMPERAMENTVM.


Subtilium est partium, & temperaturæ siccae, non tamen tantum habet caliditatis ut iam mordicet.

VRES. EX DIOSCORIDE.

Vtriusq; folia cum sale illita canis moribus, gangrænis, malignis ulceribus, cancris, sordidisq; luxatis, tuberculis, parotidibus, phygethils, & abscessib. medentur. Lienosis cum cerato imponuntur. Profluuia sanguinis ex naribus cum succo trita & imposita sistunt. Cum myrrha trita & imposita menses mouent. Recentia admota uteri procidentias emendant. Semen cum passo potum uenerem stimulat, & uulvas aperit. Cum melle linctum orthopnceas, pleuritidas, & peripneumoniã iuuat. Ea quæ in thorace sunt educit. Miscetur & exedentibus medicamentis. Folia cum conchulis decocta aluum molliunt, urinasq; mouent. Cum ptisana decocta ea quæ in thorace sunt educunt. Decoctum foliorum cum exiguo myrrhæ potum menses elicit. Succus gargariflatus, uam inflammatam reprimat.

EX GALENO.

Herbæ semen & folia, nam hæc potissimū in usum adhibentur, digerentis sunt facultatis, adeo ut tubercula & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuofum obtinent, quo & uenerem extimulant, maximè ubi cum passo semen bibitur. Porro quod non uehementer calefaciat, sed admodum tenuium sit partium, testatur crasforum uiscosorumq; humorum ex thorace & pulmone educio, tum quod partes quas contigerit pruriant. Cæterum flatuofum eius, cuius particeps esse dicta est, dum concoquitur, nascitur: non enim actu flatuosa est, sed potentia. Ventrem autem mediocriter subducit ipsa duntaxat absterfione, ac ueluti titillatione, non purgatione



VRTICA
ROMANA

Welschnessel.



VRTICA
MAIOR

Geyternessel.



VRTICA
MINOR

Brennessel.

A gatione, Gangrenosa & cancrofa, & in totum quæ exicari citra mordacitatem poftulant, ea conuenienter fanat.

EX PLINIO.

Urtica plurimis fcetet remedijs. Semen eius Cicutæ contrarium effe Nicander affirmat. Item fungis, & argento uiuo. Apollodorus & Salamandris cum iure decoctæ teftudinis. Item aduerfari Hyofcyamo, & ferpentibus, & fcorpionibus. Quin illa ipfa amaritudo mordax, uuas in ore, procidentesq; uuluas, & infantium fedes, tactu refilire cogit. Lethargicos expergifci tactis cruribus, magisq; fronte. Eadem canis morfibus addito fale medetur. Sanguinem trita naribus indita fiftit, & magis radice. Carcinomata & fordida ulcera, fale ammixto: item luxata. Sanat & panos, parotidas, carnesq; ab ofibus recedentes. Semen potum cum Sapa, uuluas ftran-gulantes aperit, & profluua narium fiftit impositum. Vomitiones in aqua mul-fa fumptum à coena, faciles præftat, duobus obolis. Vno autem in uino potu, laf-fitudines recreat. Vuluæ uitijis toftum, acetabuli menfura. Potum in fapa, refiftit ftomachi inflationibus. Orthopnoicis prodeft cum melle, & thoracem purgat eo-dem edigmate. Et lateri medetur cum femine lini: addunt Hyffopum & piperis aliquid. Illinitur lieni. Difficilem uentrem toftum cibo emollit. Hippocrates uul-uam purgari potu eo pronunciat. Dolore leitari tofto acetabuli menfura dulci po-to, & imposito cum fucco maluæ. Inteftinorum animalia pelli cum hydromelite & fale. Defluuia capitis, femine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagri-cis plurimi cum oleo uetere, aut folia cum urfino adipe trita imponunt. Ad eadem radix tufa cum aceto, non minus utilis. Item lieni. Et cocta in uino difcutit panos, cum axungia uetere falfa. Eadem pfilothrum exiccat. Condidit laudes eius Pha-nias phyficus, utiliffimam cibus coctam conditamue profeffus arteriæ, tuffi, uen-tris deftillationi, ftomacho, panis, parotidibus, pernionibus: cum oleo sudorem, coctam cum conchulis ciere aluum, cum ptifana pectus purgare, mulierumq; men-fes cum fale, ulcera quæ ferpunt cohobere. Succus quoque in ufu eft. Expreflus illi-tusq; fronti fanguinem narium fiftit, potus urinam ciet, calculos rumpit. Vuam gargariffatus reprimit. Si quadrupedes fcetum non admittant, urtica naturam fri-candam monftant.

DE APHACE CAP. XXXVIII

NOMINA.



ΦΑΚΗ Græcis, Aphace Latinis, uulgò Sylueftris uitia, & Os mundi, Germanis Wildwicen/oder S. Chriſtoffelſtraut uocatur. Alia eft ab Aphaca Theophrasti, quæ fylueftrium olerum genus eft, de qua fuo loco plura dicemus.

FORMA.

Exiguus frutex eft, lenticula altior, tenuioribus folijs. Quæ nafcuntur in ea fi-liquæ lente maiores, terna aut quaterna femina nigriora & minora continent.

LOCVS.

In aruis fpon-te nafcitur.

TEMPVS.

Maior mense floret, & fubinde fermen in filiquis producit.


TEMPERAMENTVM.

Moderati caloris eft, ualentius autem deficcatur.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Semina adstringendi uim habent, quapropter ftomachi & alui fluxiones tofta, fracta, & decocta lentis inftar fiftunt.

K EX GALE-



APHACE

Wild wicken.

EX GALENO.

Aphace facultatem obtinet adstrictoriam, sicut & ipsa lenticula. Sed & similiter ut lenticula edi solet; cæterum ægrius quàm illa concoquitur. Aluum retinet.

EX PLINIO.

Natura ei ad spissandum efficacior quàm lenti. Reliquo usu eodem effectus habet. Stomachi aluiq; fluxiones sistit semen decoctum.

DE ANDRACHNE CAP. XXXIX.

NOMINA.



ΑΝΔΡΑΧΝΗ Græcis, Portulaca Latinis & Officinis, Germanis *Burzeltraut* Portulaca. dicitur, corrupta tamen uoce, cum efferendum esset *Portzeltraut*/ac si porcellorū herbam dicerent. Alias *Sawbon* iisdem appellatur.

GENERA.

Portulaca in duas distribuitur species: unam hortensem, & alteram syluestrem, Portulaca hortensis. Syluestris. quæ non est tertium Aizoi genus, ut aliqui seducti mendosis Dioscoridis exemplaribus credunt. Nam quod pleriq; nomina harum duarum plantarū cōfuderint, factum subinde est ut multa adulterina, quæ scilicet tertij generis Aizoo debentur, capiti de Portulaca syluestri inserta sint, quæ omnia prorsus expungenda ueniunt, ut paulo post clarius mōstrabimus. Hortensem Germani simpliciter *Burzeltraut*/syluestrem uerò *wild oder ackerburzel* uocant.

FORMA.

Hortensis caules habet crassos, pingues, teretes, in altum erectos, lentè uergentes in puniceū, folia pinguia, à tergo candida, flores exiguos luteos, semina nigra in herbaceis calycibus cōtenta. Syluestris folia oleæ obtinet, minora tamen multo, numerosiora & tenera, rubentes cauliculos ab una radice multos in terra sessiles, qui cōmanducati succo abundāt, glutinosiq; & sapore falsi sunt. Hæc est genuina apud Dioscoridē Portulacæ deliniatio, reliqua uero omnia sunt adulterina, & ab imperi to aliquo rerū, ex capite de tertio Aizoo excerpta, & huic sine omni iudicio inserta.

LOCVS.

Prouenit in hortorum areolis, uineis, & alijs cultis locis, hortensis. Cæterum syluestris in petrosis & incultis etiā nascitur.

TEMPVS.

Junio & Iulio potissimū mensib. carpenda folia & flores: semen uerò sequentib.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat utraq; quidem in tertio ordine à temperatis ac medijs, humectat uero in secundo: quare uiribus etiā non distant. Hinc quæ in Dioscoride leguntur non sunt propriæ, sed Aizoi tertij generis, & à sciolo aliquo temerè Portulacæ syluestri attributæ.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Portulaca uim habet adstrictoriam. Cum polenta illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, & aliarum partiū, stomachi ardoribus, erysipelatis, & uescicæ doloribus auxiliatur. Cōmanducata dentium stuporē, stomachi & intestinorū æstuationem fluxionesq; sedat. Renes erosos & uescicā adiuuat. Veneris impetus exoluit. Pari effectū & succus eius prodest potus, & in febris etiā ualens. Contra rotundos lumbricos, sanguinis excreationē, dysenterias, hæmorrhoidas, profluuiā sanguinis percocta efficax. Contra Sepis morsus. Ocularibus medicamētis utiliter cōmiscetur. Intestinis fluxione laborantibus, aut uulua erosionē affecta infunditur. Contra dolores capitis ex uestione cum rosaceo aut oleo ex alto destillatur. Exanthemata in capite cum uino exerit, Vulneribus ad syderationem spectantib. ex polenta illinitur.



PORTULACA
HORTENSIS

Wurzelkraut.



PORTULACA
SYLVESTRIS

Wild purtsel.

C

EX GALENO.

Portulaca frigida & aquea temperamento est, paucae cuiusdam austeritatis parti ceps. Proinde fluxiones reprimat, maxime biliosas & calidas, cum eo quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Hac ratione & aestuantes, ut si quid aliud, adiuuat, tum ventris osculo imposita, tum totis hypochondrijs, potissimum in heceticis febribus. Praeterea dentium stuporem sanat, nempe quae ab acidorum contactu asperè exiccata fuerant, leniens atq; replens, utpote cum viscosam habeat humiditatem. Similiter uero & succus eius. Itaq; non foris modo impositus, sed epotus quoq; refrigerat. Hoc sanè & toti herbae comestae accidit. Quoniam autem adstringit, utiliter dysentericis editur, & in muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad haec multò quidem efficacior est herbae succus.

EX PLINIO.

Portulacae memorabiles usus traduntur. Sagittarum uenena, & serpentium haemorrhoidum & presterum restringit, pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Item hyoscyamo potu, è passuloq; expresso succo. Cum ipsa non est, semen eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum uitrijs, capitis dolori, ulceribusq; in uino tusa & imposita. Reliqua ulcera cum melle comanducata sanat. Sic & infantium cerebro imponitur, umbilicoq; prociuo. In epiphoris uero omnium, fronte temporibusq; cum polenta. Sed ipsis oculis, è lacte & melle. Eadem, si procident, prodest, folijs tritis cum corticibus fabae. Pustulis cum polenta & sale, & aceto ac cera. Et ulcera oris, tum moremque gingiuarum comanducata cruda sedat. Item dentium dolores. Tonsillarum ulcera succus decoctae. Mobiles dentes stabilit comanducata. Cruditates sedat, uocemq; firmat, & sitim arcet. Cervicis dolores cum Galla & Lini semine parimensura sedat. Mammarum uitia cum melle aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachum in acetarijs sumpta corroborat. Ardentibus febribus imponitur cum polenta. Et alias manducata refrigerat etiam intestina. Vomitiones sistit. Dysenteriae & uomicis datur ex aceto, uel bibitur cum Cumino. Tenasmiis autem cocta, & comitialibus cibo uel potu prodest. Purgationibus mulierum, acetabuli mensura in sapa. Podagris calidis, cum sale illita, & sacro igni. Succus eius potus renes iuuat & uescas. Ventris animalia pellit. Ad uulnere dolores, ex oleo cum polenta imponitur. Neruorum duritias emollit. Venerem inhibet, Venerisque somnia. Praetorij uiri pater est, Hispaniae princeps, quem scio propter impatibiles uuae morbos, radicem eius filo suspensam è collo gerere, praeterquam in balneis, & ita liberatum incòmodo omni. Quinetiam inueni apud autores, caput inde litum destillationem toto anno non sentire. Oculos tamen hebetare putatur.

DE ASPHODELO CAP. XL


NOMINA.

Affodillus.  ΣΦΟΔΕΛΟΣ Graecis, Asphodelus Latinis, Officinis corrupta uoce Affodillus, Germanis Goldwurz nominatur.

GENERA.

Duo Asphodeli genera. Duo esse Asphodeli genera, utcumq; uno contentus sit Dioscorides, testatur Plinius libro xxi. cap. xvij. marem nimirum & foeminam. Mas proprie Albucus nominatur, foemina uero Hastula regia, quod scilicet dum floret prorsus regij sceptri effigie referat, Germanice Goldwurz. Marem depingit Dioscorides, & radicem eius acrem atque adeo cibo inutilem esse tradit. Foeminae Theophrastus libro vij. de historia plantarum cap. xij. & Hesiodus mentionem facere uidentur, quandoquidem eius usum in cibo quotidianum fuisse scribant. Hoc enim de mare dici haud posse, radicis mirifica acrimonia facit. Galenus etiam libro secundo de ali.

Hesiodus foeminae mentione fecisse uidetur.



ASPHODELVS
FOEMINA

Soldwurtz weible.

K 4

c dealiment, facult. Asphodelon foeminam cognouisse uidetur, dum scribit, Asphodeli radicem Scyllæ radici, magnitudine, figura & amaritudine quadantenus similem esse. Hæc enim de Dioscoridis Asphodelo uerè dici non possunt, cuius quidè radix non Scyllæ, sed Pæoniæ potius similis est. Denicq; non est ut foeminæ amara, sed acris. Neq; obstat quod nostra Hastula regia tantâ amaritudinẽ, quantâ ei Galenus tribuit, non habeat. Nam neq; ea quam Hesiodus suo carmine tantopere celebravit, tanta prædita fuit amaritudine: aliàs enim citra cocturâ multam, cuius tamẽ ille non meminit, cibo quotidiano idonea esse non potuisset. Et certè ut Aron non in omnibus regionib, parem acrimoniã obtinet, ita nec Hastula regia parem amaritudinem omnibus in locis sortitur. Adeò ut dubium non sit Hesiodum de nostra Asphodelo, quæ foemina est, loquutũ esse. De femina autem loquutũ esse Hesiodũ, cõfirmat quod alibi tradat in syluis nasci Asphodelũ. Quod certè de ea quam foeminam fecimus, rectè dici potest, quando raro alibi quàm in syluis nascatur. Sententiã nostram firmare uidetur Apuleius ille, qui in libro suo de herbis inscripto, seorsim & Asphodelum, & Hastulam regiam describit.

FORMA.

Asphodelus mas. Asphodelus mas folia habet Porro maiori similia. Caulem leuem in summo florem ferentẽ, Anthericũ uocatum. Radices sublongas, rotundas, glandibus similes, gustu acres. Nos marem hac uice habere nõ potuimus. *Foemina.* Foemina folia habet oblonga, angusta, leuiter lenta, Plantagini minori non dissimilia: caulem leuem, in summo non unum, sed plures flores pingues retrorsum incuruos, plenos puniceis maculis, radicem itidem bulbosam, capillis Allij instar multis sub bulbo enascentibus, comatam, gustuq; glutinosam.

D

LOCVS.

Mas non prouenit in Germania nisi in hortis culta & plantata. Foemina uero in montibus & syluis sua sponte ac copiose nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense florent.

TEMPERAMENTVM.

Maris radix calida & sicca est. Foemine folia cum amara nõ nihil sunt & acria, itidem calida & sicca esse, quemadmodũ etiam radicem, constat.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Radices Albuçi uim calefaciendi obtinent, urinas & menses potæ mouent. Late ris doloribus, tussibus, cõuulsionibus, ruptionibus, drachmę pondere ex uino potę medentur. Cõmanducata astragali mensura uomitiones adiuuat. A serpente demorsis datur utiliter trium drachmarũ pondere. Illinire autẽ oportet morsus folijs, radice, & floribus cum uino. Item ulcera sordida, & depascentia. Mammarũ quoq; & testium inflammationes, tubercula & furunculos, decocta in uini fæce radice: ad recentes autẽ inflammationes cum polenta. Radicis succus, adiecto uetere uino dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquam utile fit oculis medicamentũ. Ad purulentas aures per se, & cum thure, melle, uino & myrrha tepesfactus prodest. In contrariam aurem per se infusus dentium dolorẽ mitigat. Cinis è radice cremata illitus, alopecias capillis explet. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitum exulceratis pernionibus, & ambustis igni conducit. Dolori aurium instillatus auxiliatur. Candidam uiriliginem linteo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen & flores in uino poti, scolopendræ & scorpionum uenenis egregiè aduersantur. Aluum quoque deiciunt.

EX GALENO.

Asphodeli radix utilis est, perinde atq; Ari, Afari & Dracontij, Extergetis siquidem &

A dem & discutientis facultatis. Vtæ tamen cinis calidior, & exiccantior, magis tenuium partium, & ad discutendum potentior efficitur, propterea & alopecias sanat. Inest itaq; ei extenuandi facultas, atq; obstructa demolendi, ueluti etiam Dracontio. Ideoq; ipsius coliculus arquatis tanquam summum præsidium exhibetur.

EX PLINIO.

Defectis corporib; & phthificis constat bulbos eius cum ptisana decoctos aptissime mederi, panemq; ex his cum farina subactum saluberrimum esse. Nicander et contra serpentes & scorpiones, uel caulem uel semen, uel bulbos dedit in uino tribus drachmis: subtrauitq; somno contra hos metus. Datur & cõtra uenenata marina, & contra scolopendras terrestres. Folia quoq; illinuntur uenenatorũ uulneribus ex uino. Bulbũ neruis articulisq; cum polenta tusa illinuntur. Prodest & concisis ex aceto lichenas fricare. Item ulceribus putrescentib; ex aqua imponere. Mammæ quoq; & testium inflammationib;. Decocti in sæce uini, oculorũ epiphoris supposito linteolo medentur. Folijs in quocunq; morbo decoctis magis medici utuntur. Item ad tetra tibiæ ulceræ, rimasq; corporũ quacunq; in parte, farina arefactorũ. Succus quoq; ex tusa expressus, aut decoctus, utilis fit corporis dolori cum melle. Idem odorẽ corporis iucundũ affectantibus, cum Iri arida & sale exiguo. Folia etiam supradictis medentur, & strumis, panis, ulceribus in facie, decocta cum uino. Cinis è radice alopecias emendat, & rimas pedum. Decoctæ radicis in oleo succi, perniones & ambusta. Et ad grauitatem aurium infunditur. A contraria aure in dolore dentium, Prodest & urinæ pota modicè radix, & menstruis, & lateris doloribus. Item ruptis, conuulsis, tussibus, drachmæ pondere in uino pota. Eadem & tromitiones adiuuat cõmanducata. Semine sumpto turbatur uenter. Chryfermus & Parotidas in uino decocta radice curauit. Item strumas, admixta cachry ex uino.

B Quidam aiunt, si imposita radice pars eius in fumo suspendatur, & quarta die soluat, una cum radice arefcere strumam. Sophocles ad podagras utroq; modo, cocta crudaq; usus est. Ad perniones decoctã ex oleo dedit, & suffusus felle in uino, & hydropicis. Venerem quoq; concitari cum uino & melle perunctis, aut bibentibus, tradiderunt. Xenocrates & lichenas & pforas, radice in aceto cocta tolli dicit. Item si cocta sit cum hyoscyamo & pice liquida, alarum quoq; & feminum uitia. Et capillum crispiorẽ fieri, raso prius capite, si radice ea fricetur. Lapides renum in uino decocta atq; pota eximit. Hippocrates semen eius ad impetus lienis dari censet. Iumentorũ quoq; ulcera ac scabiem, radix illita, aut decoctæ succus ad pilum reducit.

APPENDIX.

Animaduertendũ facultates à Dioscoride & Galeno cõmemoratas, Albuco seu Asphodelo mari conuenire, huius enim radix gustu acris est. Quæ uero à Plinio recensentur, hæ partim mari, partim sceminæ debentur. Focming, cuius radix & folia glutinosa & amara sunt, ulcera glutinandi, scabiem, rimasq; corporum, & si quæ similes sunt facultates conueniunt, quas periti methodi simplicium medicamentorũ facile discernent. Experientia etiam quotidiana testatur, huius usum esse in ulceribus malignis salutarem. Quæ autem mari sint tribuendæ, ex Dioscoride, Galeno, & gustu quiuis deprehendere poterit. Nos in transcurso tantum parum attentos monere uoluimus, ne indiscriminatim & promiscuè utriq; generi has facultates inesse putarent.



ATRIPLEX
HORTENSIS

Wolten.



ATRIPLEX
SYLVESTRIS

Wild molten.

NOMINA.

Atraphaxis
quare dicta.



Chrysolachan
non.

ΤΡΑΦΑΞΙΣ, ἢ χρυσολαχάνου Græcis, Atriplex Latinis & Officinis, Germanis *Molten* oder *Miltten* nominat. Atraphaxis Atticis d literam in t mutare frequenter amantibus, dicta est, quod ἀδρωσ αἰψῆς, id est, statim in amplitudinē adolecat. Siquidem octavo à fatu die profilit, confestimq̄ incremento proficere uidetur. Fidem celeris augmētī facit eretum in confinio ceteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eam nasci quicquam tradūt, nisi languidum. Chrysolachanon uerò, id est, aureum olus dixerunt, à luteo quem proferit flore.

GENERA.

Duo Atriplicis sunt genera, satiuua seu hortensis, & syluestris. Satiuua simpliciter Germani *Molten* / syluestrem uerò cum adiectione aliqua, *Wild molten* / oder *Ackermolten* / oder *Klein scheißmilten* nominant.

FORMA.

Atriplex hor-
tensis.

Hortensis caulem fundit quadratum, ramis brachiatum, quibus primum flores lutei exigui, dein foliatum semen & obductum cortice promitur. Radicem unam habet in altum descendentem, non glabram, sed fibris quibusdam capillatā. Syluestris tam luxuriosa proceritate prodit, ut quaternos saepe cubitos excedat: caule ut hortensis anguloso, ramoso, & purpurascente: folio hortensi non admodum dissimili, potissimum quod ad colorem attinet: flore luteo exiguo, semine race matim congesto, radice simplici in altum descendente, ex qua se multæ promunt.

LOCVS.

Hortensis non nisi fata prouenit, Syluestris sua sponte nascitur. Vtraque autem ad asiduo humore satuari amat.

TEMPVS.

Vtraque Iunio & Iulio mensibus floret, deinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Atriplex humida in secundo ordine, frigida autem in primo. Hortensis tamen syluestri humidior frigidiorq̄ existit.

VIREs.

EX DIOSCORIDE.


Estur olerum modo elixum. Aluum mollit. Crudum uel coctum illitum panos discutit. Semen eius potum cum aqua mulla morbum regium sanat.

EX GALENO.

Atriplex celeriter, ob lubricitatē, uentrem permeat. Parum autem omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatem. Phlegmonis & phygethli quidē incipientibus, crescentibus, & mollibus adhuc, ac ueluti feruentibus, hortensis: uigentibus uero, declinantibus, & indurescentibus cōmodior est syluestris. Semen eius abstergentis est facultatis, proinde ad morbum regium ex iccoris obstructione prognatum utilis est.


EX PLINIO.

Coquit difficillimè. Addidere Dionysius & Diocles, plurimos gigni ex eo morbos, nec nisi mutata saepius aqua coquendum: stomacho cōtrarium esse, lentiginis & papulas gignere. Hippocrates uuluarū uitijis id infundi cum Beta. Lycus Neapolitanus cōtra cantharidas bibendū dedit. Panos, furunculos incipientes, duritias omnes, uel cocto uel crudo illini utiliter putant. Item ignem sacrum, cum melle, aceto, nitroq̄. Similiter podagrīs. Vngues scabros detrahare dicitur sine ulcere. Sunt qui morbo regio dent semen eius cum melle, arterias & tonsillas nitro addito perfricent, aluum moueant, cocto aut per se, aut cum malua, aut lenticula concitantes uomitones, Syluestri capillos tingunt, & ad supradicta utuntur medicina.



ATRACTYLIS
MITIOR

Wilder feldsaffran.



ATRACTYLIS
HIRSUTIOR.

Cardobenedict.

EX SYMEONE SETHI.

Ventrem quidem cit, prodest ad caliditatem iecoris, ac ictericis, & calidam temperaturam habentibus succurrit. Cōmodissima autem biliofis. Cum malua illita, inflammationes sedat.

DE ATRACTYLIDE CAP. XLII

NOMINA.



ΤΡΑΚΤΥΛΙΣ, ἢ λωινὸς ἄγρια Græcis: Atractylis, Cnicus syluester Latinis dicitur. Atractylis autem ideo dicta, quod ea antiquæ mulieres profuso utebantur: ἀτρακτὸς enim fufus est Græcis, Syluestris uero Cnicus, quia Cnico urbano similis est.

Atractylis unde dicta.
Syluestris cnicus.

GENERA.

Syluestris Cnici seu Atractylidis, Plinio lib. xxi, cap. xv. & Theophrasto libro vi, cap. iij, autoribus, duæ sunt species, Vna mitior, & Cnico satiuo similior. Hanc propriè Græci Atractylida, Latini uero fufum agrestem, aut colum rusticam, quod eius caule rigido admodū & exili, ueteres mulieres pro colu, ut dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamū syluestrem appellant. Germanicè itaq; uocatur wilder feldsaffran/ ut hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamū, & Crocum hortensum nomināt. Altera hirsutior, caules & folia Soncho nō asperæ similia habens, quæ Officinis omnibus & uulgo Carduus benedictus nuncupatur. Germanicè Cardobenedict/ Bounwurz/ oder gesegneter distel uocatur.

Atractylis proprie dicta.

Cartamū syluestris.

Carduus benedictus.

FORMA.

Spina est Cnico similis, in summo autem uirgularū folia multò longiora habēs, caulem magna ex parte nudū, asperumq; quo etiam mulieres profuso utuntur. Capitula in cacumine aculeata, florē pallidū, radicē tenuem, inutilem. Ex qua sanè descriptio omnib, perspicuū esse putamus, spinā quam pictā exhibemus esse Atractylida, quod Cnico satiuo similis admodū sit, & in cacumine uirgularū folia quàm Cnicus longiora habeat, caulem deniq; magna ex parte nudū, autumnī potissimū tempore, quo folia sua sponte decidūt, & minimè leuē, sed asperū striatūq; obtineat. Idem etiam rigidus & exilis est, ut fusi usum præbere queat. Summitati quoq; eius capitula insident spinosa, flos illi pallidus, radix tenuis: & in summa, nulla est nota quæ huic non respondeat. Carduum autem benedictum uulgò nominatum esse alteram Atractylidis speciem, ex Theophrasti & Plinij uerbis ostendi potest: hirsutus enim est, caulibus Soncheis, humi ferè reptantibus: propter sui enim mollitiem ueluti sessilis caducusq; solo procumbit, semine minuto, frequenti, amaro, & pilis barbaso, quod molli lanugine operitur. Flos ei pallidus luteusue.

Atractylis proprie dicta.

Carduus benedictus.

LOCVS.

Mitior Atractylis in aruis & montibus, hirsutior autem in hortis iam passim prouenit.

TEMPVS.

Prior Augusto mense apparet, eius tamen semen ante autumnum non maturefcit. Posterior citius nascitur, eius tamen semen ferò etiam ad maturitatē peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Gustu cum amaræ sint spinæ hæ, euidentissimū est calido & sicco temperamento esse præditas, id quod ex earundem etiam facultatibus colligi potest.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Atractylidis folia, coma & semen trita cum pipere uinoq; pota, contra scorpionū ictus profunt. Sunt qui dicant à scorpionibus percussos quandiu teneant eam herbam, non sentire dolorem, deposita uero, dolore affici.

EX GALENO.

Atractylis aut Cnicus syluestris. Hæc planta ex spinarū est genere. Facultatē habet desiccandi, & modicè digerendi.

L 2 APPEN-



ANGELICA
SATIVA.

Zam angelick.



ANGELICA
SYLVESTRIS.

Wild angelick.

L 3

C

APPENDIX.

Prima spina in sanandis ulceribus & fistulis diuturnis efficacissima est. Altera quam Cardum benedictum uocant, obstructions interiorum uiscerum tollit, urinam mouet, calculum frangit, ulcera, potissimum pulmonis, sanat. Percussis à feris uenenatis medetur. Negant etiam pestis experiri contagia, qui aut cum cibo, uel potu praesumpserit. Iam quoque correptis magno fore remedio sibi uulgius persuasit. Ex quibus etiam omnibus sit perspicuum, eandem quas ueteres Atractyli tribuerunt, utranque spinam habere facultates. Item herbam quam Cardum benedictum uocant, contra serpentum & scorpionum morsus ualere omnibus in confesso est: quam sane facultatem cum Atractyli etiam assignet Dioscorides, consequitur ab eadem diuersam non esse. Recentiores Cardum benedictum contra capitis uehementissimos dolores, uertiginem, memoriam amissam, in cibo aut potu sumptum ualere tradunt. Item ad putrescentia ulcera, mammarum potissimum, si in puluerem reductus inspergatur.

DE ANGELICA CAP. XLIII

NOMINA.

Angelica non est
Smyrnon, neque
Silphion.



Sancti spiritus
radix cur dicta.

NON QUID ueteribus cognita fuerit haec herba, & quo nomine appellata sit, nondum scire licuit. Neque enim Smyrnon est, quod scilicet umbellam Anethi & semen rotundum, aliaque multa quae descriptio requirit, non habet. Silphion etiam esse haud poterit, quod folia Apij habere minime deprehendatur. Recentiores autem uno ore omnes Angelicam, & Sancti spiritus radicem, à suauissimo eius radicis odore, quem spirat: aut ab immensa contra uenena facultate, appellant. Germanis *Angelick/oder des Heiligen geysts wurz/oder Brustwurz* uocatur.

GENERA.

Hortensis.
Syluestris.

Duo eius herbae inueniuntur genera. Una enim mitior est, cuius quidem radix ualde odorata, à Germanis *zam Angelick* nominatur. Altera syluestris, eius radix suauis odore restituitur, & à Germanis *wilde Angelick* nominatur.

FORMA.

Caulem profert duum cubitorum, concuum: folia oblonga, per ambitum serrata, subnigra: flores in purpura candidos, semen latum, foliaceum: radicem crassam & multam, foris nigricantem, intus candidam.

LOCVS.

Mitior in hortis plantata prouenit, & in montosis etiam nonnullis locis, perinde atque syluestris.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefacientem & desiccatoriam uim in tertio ordine ei assignant herbarij recentiores.

VIRES.

Aperit, extenuat, discutit, ut recentiores perhibent. Vnicè uenenis aduersatur. Pestilentiae popularum sauiantis arcet contagia. Corpora à lue pestifera uindicat, si tantum, ut affirmant, in ore teneatur. Per hyemem ciceris magnitudinem cum uino, per aestatem ex stillatitio rosarum liquore sumpsisse satis est. Nec sensurum eo die contagionem pollicentem, quo quis deuorarit: nam urina & sudore uenenum abigit. Lentitiam pituitae digerit, quapropter tussi, quam frigus attulerit, medetur. Crassa quae in thorace coierint, discutit. Herba ipsa in uino & aqua cocta uulnera interna glutinat. Coecretum sanguinem resoluunt, stomachum esu corroborat. Cor recreat. Pituitam uentriculi deiecit, fastidia



LOLIVM

Ratten.

L 4

c fastidia ciborum discutit, & elanguescentē inuitat appetentiam. Rabiosi canis mor-
su, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum ruta & melle folia indantur, dein cocta
in uino bibantur. Libidinem extinguit ore ieiuno sumpta. Lasitudines reficit, tho-
racem expurgat. Supra febricitantis caput imposita, fertur ad se feruorē elicere. Va-
lere contra fascinoles adfirmant, si quis eam secum gestarit.

DE AER A CAP XLIIII

NOMINA.

Officinaum
error.



ἸΡΑ, ἢ θύρα, ἢ ῥόδον Græcis: Lolium Latinis dicitur. Officinæ nōnul-
læ, non sine magno errore, pro Melanthio seu Nigella utuntur, ut non
temerè etiam Pseudomelanthion dici queat. Germanis *Katten / oder*
Kornmegele appellatur.

FORMA.

Pseudomelan-
thion est Lo-
lium.

Folio constat angusto, Theophrasto lib. viij. de plantarū historia, cap. vij. teste,
pingui & piloso, flore subpurpureo, semine exili in siliqua hispida, uel ut Plinius
ait, in cortice aculeato. Ex qua siquidem descriptione satis perspicuum fit omnibus,
Pseudomelanthion hoc esse Lolium: folia nanq; Porri habet, oblonga, hirsuta, flo-
rem purpureū, semen in pilosa, longa, angulata, ac per interualla striata siliqua. Et
ut paucis singula complectar, hordeo, cuius ut reliquarū frugum pestis & uitium
est, tota effigie non dissimile est.

LOCVS.

Non solum in triticea & hordeacea, sed in omni ferè alia segete per se prouenit.
Frugum acerba pestis, ideoq; à Vergilio infelix appellatum.

D

TEMPVS.

Iunio mense floret, & subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat & calfacit efficaciter, ut propinquum sit acribus magis quàm Iris: sed
non est perinde ut illa tenuium partium, uerum multum abest. Secundum hoc po-
nat ipsum quispiam in principio tertij ordinis excalefacientium, in fine uero secun-
di exiccantium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lolium molitum nomas, putredines, & gangrenas cum raphanis & sale illitum
compescit. Feras impetigines, & lepras cum sulphure uiuo & aceto sanat. Strumas
quoque cum fimo columbino & lini semine in uino decoctum discutit. Quæ agrè
maturantur rumpit. Decoctū ex aqua mulsā & illitum, ischiadicis prodest. Si cum
polenta, aut myrrha, aut croco, aut thure suffitum, conceptiones adiuuat.

EX PLINIO.

Lolium molitum ex aceto coctum impositumq; sanat impetigines, celerius quo
sæpius mutatum est. Medetur & podagris, alijsq; doloribus cum oxymelite. Cura-
tio hæc à cæteris differt. Aceti sextario uno dilui mellis uncias duas iustum est: ita
temperatis sextarijs tribus, decocta farina Lolij sextarijs duobus usque ad crassitu-
dinem, calidumq; ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa
fracta. Magis etiam cæteris purgat ulcera uetera, & gangrenas. Cum raphano &
sale & aceto lichenas. Lepras cum sulphure uiuo. Et capitis dolores cum adipe an-
ferino imposita fronti. Strumas & panos concoquit cum fimo columbino, & lini
semine decocta in uino.


APPENDIX.

Iam cōmemoratas facultates huic etiam herbæ, quā Germani *Katten* nomināt,
recentio.



ASCLEPIAS

Schwalbenwurtz.



c recentiores tribuunt. Mirificè enim hanc in sanandis impetiginibus, alijsq; scabiei generibus cōmendant. Item in uulneribus glutinandis, ac fistulis curandis, compescendoq; sanguine, eius esse usum tradunt, ut hinc etiam liqueat hanc ipsam à Lolio non esse diuersam.

EX SYMEONE SETHI.

Vim æqualem Iridi obtinet.

DE ASCLEPIADE CAP. XLV

NOMINA.



ΣΚΛΗΡΙΑΣ Græcis, Asclepias Latinis, herbarijs Hirundinaria, Officinis Vincetoxicum, Germanis Schwalbenwurz appellatur. Asclepias autem ab Aesculapio antiquo medicinæ autore nominata est. Hirundinaria uerò à siliquis quas producit, quæ dehiscētes plumosum semen ostendunt, atque adeò hirundinis effigiem referūt. Vincetoxicū, uel rectius *υικιντοξινον* haud dubiè dicta est, quod illi insignis aduersus uenena uis sit, ut paulò post fusius docebimus.

Asclepias unde dicta.
Hirundinaria.
Vincetoxicum.

FORMA.

Ramulos profert longos, in quibus folia longa Hederæ similia. Radices numerosas, tenues, odoratas, Flores grauius olentes. Semē Securidacæ seu Hedyari. Ex qua deliniatione nemini non perspicuū sit Vincetoxicū appellatā herbā, esse Asclepiada. Fruticosa siquidē herba est, caulem obtinens rotundū, leuem, tenuem, ac ferè iuncē, ramulis longis, folio hederaceo, sed oblongiori, in uiridi nigricante, floribus exiguis, candidis, aut uerius in albo pallefcentibus, grauius odoratis, ex quibus sili quæ oblongæ fiunt, quæ dehiscētes semen plumosum Securidacæ simile, hoc est, D rufum & latum ostendunt, radicibus multis, exiguis, tenuibus, & odoratis, adeò ut nulla sit prorsus nota quæ illi non respondeat aptissimè. His accedunt locus natalis & facultates, quæ singula cum Asclepiade illi communia sunt, quemadmodū ex ijs quæ statim subiiciemus manifestissimum fiet.

LOCVS.

Prouenit in montibus asperis, altis ac arenosis. Copiosissimè autem nascitur in monte haud procul à Tubinga sito, in quo olim arx posita fuisse fertur.

TEMPVS.

Augusto mense floribus abundat, ac subinde semina in folliculis oblongis, formam hirundinis cum dehiscunt referentibus, profert.

TEMPERAMENTVM.

Asclepias, Paulo teste, calida, sicca, & tenuis substantiæ est. Quo sanè temperamento Hirundinaria etiam prædita existit: amara siquidē & parum glutinosa eius est radix, folia uero aliquam præ se ferunt adstrictionem: ut iterum euidenter appareat, Hirundinariam esse Asclepiada.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Radices cum uino potæ, torminibus, & uenenatorū morsibus subueniunt. Folia uero illita maleficis in mammis & utero uitij opitulatur.

EX PAULO.


Torminibus in uino pota competit. Illita uero uenenatorum morsibus, & malignis mammarum & uteri uitij succurrit.

EX PLINIO.

Radices torminibus medentur, & contra serpentium ictus non solum pota, sed etiam illita profunt.

APPENDIX.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mensū prouocationē utuntur, & ad rabidi



APIOS

Erdnüssen.



c rabidi canis morsum, uenenisq; potenter resistere affirmāt, unde etiam haud teme-
vidrix toxici. re *vidrix toxici* ab iisdem appellata est. Hydropicis etiam radicem in uino macera-
 tam & subinde coctam, mirificè auxiliari tradūt. Flores præterea foliaq; siccata, mox
 trita, uulneribus utiliter inspergi aiunt. Sordida etiam ulcera purgare, & ad cicatricē
 perducere, genitaliumq; uitij & rupturis egregiè mederi docent. Quæ in uniuersum
 omnes facultates cum ijs quas Asclepias obtinet pulchrè quadrant, ut eandem
 esse Hirundinariam uocatam herbam, nullus deinceps dubitare debeat.

DE APIO CAP. XLVI.

NOMINA.

Apios cur dicti.*Ischas.**Chamæbalanos.*

ΠΙΟΣ, ἡ ἴσχος, ἡ χαμβάλανος Græcis: Apios, Raphanus syluestris Lati-
 nis dicitur. Officinis incognita. Germanis *Erduß/Erctelen/Erdsel-*
gen/ & Erdmandel appellatur. Apion uero dixerunt Græci, quod ra-
 dicis extremum in pyri formam turbinatur. Eadem etiam ratione *ischas*
 & *chamæbalanos* ab iisdem nominata est, quod in ficus, uel glandis effigiem radi-
 cis extremū turbinetur. Quapropter non ineptè Latinis etiam *glans* aut *ficus*, seu
carica syluestris nominabitur.

FORMA.

Ramulos duos aut tres iunceos, tenues, rubentesq; profert, qui supra terram pa-
 rum se attollunt. Folia rutæ similia, longiora tamen, & uirentia. Semen exiguū. Ra-
 dicem Asphodelo similem, & ad pyri figuram accedentem, rotundiorē tamen, &
 liquore plenam, intus candidam, foris nigro cortice tectam. Hæc Dioscorides. Alij
 D adijciunt Apion habere tenues capreolos, florem Piso nō dissimilem, sed longè mi-
 norem. Quæ singula satis declarāt herbam cuius picturam exhibemus, esse Apion:
 ramulos enim magna ex parte duos, uel ternos, imò ut Theophrastus ait quater-
 nos, & interdum plures emittit, iunceos, tenuesq; & infima parte rubentes, qui su-
 pra terram parum se extollunt. Folia quoque Rutæ habet, at longiora & uirentia.
 Semen etiam exiguum. Radicem denique Asphodelo mari similem, & ad py-
 ri effigiem accedentem: quod tamen nō de tota radice, quæ longissima est & tenuis,
 intelligendum uenit, sed de extremis eiusdem, hoc est, nucibus seu glandibus ab ea
 dependentibus, pyri aut ficus formam habentibus, qualibus etiam Pæoniae fœmi-
 næ radix assimilatur. Succosa quoq; radix est, intusq; candida. Quibus omnib. ac-
 cedunt flores Piso similes, & mirificè odorati, minores tamen: nec non capreoli te-
 nues. Cōueniunt etiam uires, ut ex sequentibus patebit, ita ut prorsus nulla sit no-
 ta quæ reclamare uideatur.

LOCVS.

Prouenit in frumentaceis agris, hordeaceis potissimū, tritici & zææ, quos inter-
 dum fues, ductæ cupiditate eius radices, seu rectius nucum ex radice dependentiū,
Panis porcinus prorsus euertunt. Atque hinc est quod panis porcinus à quibusdam nominetur.

cur dictus.

TEMPVS.

Floribus abundat odoratis admodum Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Apios temperatura calida est & sicca mediocriter, id quod ex gustu facilè depre-
 henditur.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Pars radices superior sumpta, uomitione bilem pituitamq; extrahit. Inferior per
 aluum. Tota uero utrinque purgationes mouet. Succus eius sesquiboli pondere
 hauustus, utraque parte, hoc est, supra & infra purgat. Cum uero liquorem collige-
 re uolueris, tundito radices, coniectisq; in craterem aqua plenum misceto, tum pen-
 na collectum qui supernabit liquorem siccato.

EX PLINIO.

Succus purgat utraque parte fescuibolo in aqua mulsâ. Sic & hydropicis datur acetabuli mensura.

APPENDIX.

Experientia testatur nuces has nauſeam atque ad eò uomitionem ciere, si quis illis uescatur.

DE ASTERE ATTICO CAP. XLVII

NOMINA.



ΣΤΗΡ ἄστρος, Βουβώνιον Græcis: Aster atticus, Inguinalis Latinis dicitur. *Inguinalis.*

Officinis ignota herba. Germanis Sterntraut cōmodè appellari potest. Asteris autem nomen, non à foliorum in caulibus, sed in floribus potius figura & situ, accepit. Si quidem foliorum in huius herbe flore numerus & forma, stellam præ se ferunt, uel ut Plinius ait, capitula per ambitum diuisa folijs pusillis, stellæ modo radiata sunt. Errant itaque qui singula folia in caulibus stellæ formam representare putant. Bubonium & Inguinalis, quod inguinum præsentaneum sit remedium, dicta est. *Aster unde dicta.* *Inguinalis quare appellata.*

FORMA.

Cauliculus lignosus, purpureū & luteum in summo florem habens, ueluti Chamæmeli capitulum, undique per orbem incisuris diuisum, foliolis stellæ similibus. Quæ uero circa caulem sunt folia, oblonga & densa hirsutaue. Ex qua quidem deliniatione omnibus perspicuum fit, herbam cuius picturam exhibemus esse Asters atticum. Nam caulis eius lignosus est, folijs uestitus oblongis & densis, in cacumine flos illi purpureus & luteus, stellæ modo radiatus, qui subinde in pappos abit: radix fibris multis capillata.

LOCVS.

Nascitur in collibus, montibus altis, & syluis.

TEMPVS.

Augusto mense ut plurimum floret, durantiq; in magnam autumnii partem eius flores.

TEMPERAMENTVM.

Mixtæ est potentia, uti rosa: refrigerat enim, non tamen uehementer, & digerit atque exiccat, quod scilicet illi amara insit qualitas.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Aestuanti stomacho illita cōfert. Succurrit etiam oculorum inflammationibus, bubonibus, & procidenti sedi. Tradunt partem in flore purpuream, si bibatur ex aqua, angina correptis, & puerorum comitialibus opitulari. Recens inguinum inflammationibus illita prodest. Sicca sinistra manu dolentis decerpta, inguini adalligata doloribus liberat.

EX GALENO.

Non tantum illitum, sed etiam suspensum bubonas sanare creditur. Habet uero quiddam etiam digerens, ut mixtæ sit facultatis, uerum id non adstringit.

EX PLINIO.

Bibitur aduersus serpentes. Sed ad inguinum medicinam sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cinctus alligari. Prodest & coxendicis dolori adalligata.

M DE AGRO-



ASTER
ATTICVS.

Sternkraut.

NOMINA.



ΑΡΩΣΤΙΣ Græcis, Gramen Latinis, Germanis *Grass* appellatur. Gramen uero dictum est, quod geniculatis internodijs mirificè serpat, à gra *Gramen unde dictum.* diendo, uel à gignendi fecunditate: siquidē crebrò ab ijs nouas spargit radices.

FORMA.

Geniculatis per terram serpit ramulis, & ab ijs dulces geniculatasq; radices spargit. Folia eius acuminata, dura, & ut parue arundinis lata, quæ iumenta bouesq; pascunt. Ex quibus uerbis planum sit omnibus, plantam hanc, cuius picturā damus, esse ueri graminis genus: geniculatis enim ramulis per terrā serpit, & ab ijs dulces, geniculatas, & exiguas admodum ac tenues radices spargit. E dodrantalibus etiam ramulis circa unumquenq; geniculū bina folia acuminata, dura ac lata emittit. Floribus deniq; ad gramē Parnasi accedere uidetur: candidi enim sunt, & quinis distincti folijs, & his ipsis dissectis: quibus decidentibus folliculi rotundi lini instar, femine pleni exiguo, ut Parnasi gramen, prodeunt. Adeò ut nemo sit qui non uideat illi per omnia graminis respondere notas. Quare reprehensione digni sunt, qui Eurasiā esse putant.

Error quorundā septuagintariorum.

LOCVS.

Parsim nascitur in umbrosis locis, & dumetis.

TEMPVS.

In fine ferè Aprilis floribus suis candidis & elegantibus ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Radix graminis mediocriter frigida & sicca est, mordacitatē quandam exiguam, & partium tenuitatem obtinens. Herba uero ipsa in primo quidem excessu refrigerat, in humiditate uero & siccitate moderata. Semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso uero desiccatorium, & tenuium partium & subacerbum.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Graminis radix trita & illita uulnera conglutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, & urinæ difficultatibus. Calculosa etiam uesicæ excrementa cōminuit.

EX GALENO.

Radix cruenta ulcera glutinat. Cæterū mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen frangere lapides assolet, si quis ipsam decoquens bibat. Semen autem alterius quidem imbecillum est, eius uero quod in Parnaso nascitur, urinam ciet, & fluxus uentris & stomachi reficcat.

EX PAULO.

Gramen Parnasi maximè utile est, siccatur, modicè refrigerat, tenuiū partiū, & subacerbum, eoq; uulnera cruenta glutinat, & decoctū eius uesicæ calculos confringit.

EX PLINIO.

Decoctum gramen uulnera conglutinat, quod & ipsa herba tusa præstat: tuerq; & ab inflammationib; placat. Decocto adijcitur uinum ac mel: ab aliquibus & thuris, & piperis, & myrrhæ tertiæ portiones. Rursusq; coquitur in aëreo uase ad dentiū dolores & epiphoras. Radix decocta in uino, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus, ulceribusq; uesicæ. Calculos frangit. Semen uehementius urinā impellit. Aluū uomitionesq; sistit. Priuatim autē draconū morsibus auxiliatur. Sunt qui genicula nouē uel unius, uel è duabus tribusue herbis, ad hunc articulorū numerū inuolui lana succida nigra iubeāt, ad remedia strumę panorūm ue. Ieiunū debere esse qui colligat. Ita ire in domū absentis cui medeat, superueniētiq; ter dicere, Ieiunio ieiunū medicamentū dare, atq; ita alligare, triduoq; id facere. Quod è graminū genere septē internodia habet, efficacissimè capiti cōtra dolores adalligat. Quidā propter uesicæ cruciatus decoctū ex uino gramē ad dimidias è balneis bibi iubent.

Superstitiosum.



GRAMEN.
Straß.

NOMINA.



ΑΛΟΗ Græcis, Aloë Latinis appellatur. Officinæ ueterem appellationē retinuerunt. Germani destituti peculiari nomenclatura, pariter Latinis Aloën uocant. Sunt qui hanc à crassis folijs, & similitudine quam cum Semperuio habet, Semperuiuum marinum nominent,

*Semperuiuum
marinum.*

FORMA.

Scyllę folium habet Aloë, crassum, pingue, modicè latum, rotundū, repandumq̃. Folia utrinq̃ gerunt ex obliquis aculeos raros, & breues. Caulem profert Antherico similem, florem album, semen Asphodelo simile. Graui est tota herba odore, & gustu amarissima. Radice una, pali in terram adacti specie. Nostra pictura non nisi radicem & folia ob oculos ponit, reliqua hoc tempore habere non potuimus. Dabimus autem operam, modò Deo sic uisum fuerit, ut aliquando integræ plantę picturam studiosis exhibere liceat.

LOCVS.

Nascitur copiosissima in India, præpinguisq̃, unde succus quoq̃ defertur. Prouenit etiam in Arabia Asiãq̃, & in maritimis aliquot locis, & insulis, ut in Andro. Nunc in aliquot hortis Germaniæ nostræ plantatur.

TEMPVS.

Neque florem neque semen in stirpe nobis uidere contigit, quare de ijs quo nimirum proueniant tempore nihil certū monstrare possumus.

TEMPERAMENTVM.

Aloë calefacientiū est primi ordinis intensi, aut secundi remissi, tertij autem exicantium.


VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Duo sunt succi concreti genera. Vnum arenosum, quod sedimentū purissimæ aloës uidetur (hoc officinis Caballinū uocatur.) Alterum iecinoris modo coactum (Succotrinū barbari appellāt.) Eligito purā quæ nihil doli sensit, sine calculis, splendentem, subruffam, friabilē, iecinoris modo concretā, facillè liquecentē, eximie amaritudinis. Reprobato autem nigram, & fractu contumacē. Est aloë uis adstringere, fomnum cōciliare, exiccare, corpora densare, aluum soluere, & stomachū purgare. Pondere cochleariū duorū in aqua frigida, aut tepida pota, sanguinis excreationes sistit. Regium morbū purgat tribus obolis ex aqua, aut drachmę pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut cocto melle excepta, aluū soluit. Trium drachmarū pondere perfectè purgat. Mixta alijs purgatorijs medicamentis, stomacho minus noxia ea reddit. Siccata & insparfa, uulnera glutinat, & ulcera ad cicatricem perducit, compescitq̃. Priuatim autem exulceratis genitalib. medetur, & rupta infantium præputia agglutināt. Condylomata, rimasq̃ sedis cum passo mixta sanat. Sanguinis eruptiones ex hæmorrhoidibus factas compescit. Digitorum reduuias ad cicatricem perducit. Lioues & sugillata cum melle delet. Palpebrarū scabrities, angulorumq̃ pruriginēs lenit. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inuncta. Capillos fluentes cum uino compescit. Tonfillis, gingiuis, & omnibus oris ulcerib. ex melle & uino prodest. Torretur oculorum medicamentis in testa pura & candente, rudiculaq̃ subinde uersatur donec equaliter torreatur. Lauatur ut quod est arenosissimum subsidat, tanquam inutile, & leue & pinguisimum assumatur.

EX GALENO.

Hæ herba non admodum apud nos prouenit: & quæ in magna nascitur Syria aquosior est, & facultatis imbecillioris: attamen usque ad eò desiccare potest, ut uulnera conglutinet. At in regionib. calidioribus, qualis est Cœlesyria & Arabia, multo est melior. Optima uero Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentū cognominatū aloë, ad plurimas res propter siccitatē mordicationis expertem utile. Est autem nō simplicis naturæ, sed, ut indicio est gustus, adstringit simul



ALOE
Moett.

A & amara est. Adstringit quidem mediocriter, sed uehementer amara est. Subducit & uentrem, utp[ro] utra ex numero medicamentorū quæ Græci ab excernendo stercore uocant *ἐκκορητικὴ*. Verum & ipsius facultatis misturam attestantur particularia eius opera: nam & gratum stomacho est medicamen, ut si quid aliud, & sinus glutinat. Sanat & ulcera quæ ægrè ad cicatricē duci possunt, & maximè quæ in ano sunt & pudendo. Iuuat etiam eorum inflammationes aqua liquata, & uulnera ad eundem modum glutinat. Congruuit similiter utenti & ad inflammationes in ore, naribus, & oculis. In summa, repellere & discutere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat, quantum uidelicet ulceribus puris non sit molestum.

EX PLINIO.

Natura Aloës spissare, densare, & leuiter calcare. Vfus in multis & principalis, aluum soluere, cum penè sit sola medicamentorū quæ per se id præstant. Confirmat etiam stomachū, adeo ut non infestet ulla uis contraria. Bibitur drachma. Ad stomachi uerò dissolutionē, in duobus cyathis aquæ tepidæ uel frigidæ, cochlearis mensura, bis tēre in die ex interuallis, ut res exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea sumatur cibus. Capillū fluentem continet cum uino austero, capite in sole contra capillū peruncto. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti imposita, ex aceto & rosaceo. Dilutiorq[ue] infusa, oculorū uitia omnia sanari ea conuenit. Priuatim pruriginēs & scabiem genarū, item insignita ac liuida, illita cū melle, maximè Pontico: tonsillas, gingiuas, & omnia oris ulcera. Sanguinis excreationes, si modicæ sint, drachmæ pondere ex aqua, si minus, ex aceto pota. Uulnerū quoq[ue] sanguinē, & undecunq[ue] fluentē sistit per se, uel ex aceto. Aliàs etiam est uulnerib[us], utilissimā, ad cicatricē perducens. Eadē inspergit exulceratis genitalibus, uirorum cōdylomatis, rimisq[ue] sedis, aliàs ex uino, aliàs ex passo, aliàs sicca per se, ut exigit mitiganda curatio, aut coercēda. Hæmorrhoidū quoq[ue] abundantiam leniter sistit. Dysenterię infunditur. Et si difficiliter concoquantur cibi, bibitur à cœna modico interuallo. Et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuoratur pilulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina, ad purganda interiora. Digitorū pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, ut quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa, pennaq[ue] subinde uersatur, ut possit æqualiter torrerī.

DE BECHIO CAP. L.

NOMINA.



B H X I O N Græcis, Latinis Tussilago aut Farfaria dicitur. Sic uocata quod *Βηχίς*, hoc est, tusses iuuare credita sit. Herbarijs & officinis hodie Ungula caballina appellatur. Germanis *Koshib/oder Brandlattich*/quod scilicet equinæ ungu læ persimilis sit, & ambustis medeatur.

Bechion unde dictum.
Ungula caballina.

FORMA.

Folia hederæ habet, sed maiora, sex aut septē à radice prodeuntia, supernè uirentia, inferiore autem sui parte albida, plures angulos habentia. Caulem palmum altum. Florē uere prodeuntē pallidū, quem unā cum caule cōfestim abijcit. Inde nō nulli existimauerūt sine caule hanc herbā nasci. Radix illi tenuis est, quæ minimè inutilis esse potest, quandoquidē illius, ut ex sequentib[us], patebit, in rumependis thoracis abscessibus, & eijciendo ex utero emortuo foetus uis sit. Subesse itaq[ue] errorē in Dioscoride manifestissimū est, ubi radicē Tussilaginis *ἀγροσύ* esse inquit, quem tamen nemo interpretū, quod sciam, animaduertit. Hoc etiam adijciendū duxi pro confirmanda Dioscoridis descriptione, & confutanda erronea quorundam sententia, flores Tussilaginis esse fugacissimos: ijs enim enatis breui uigor uitaq[ue] durat, longissimāq[ue] mora triduum aut quadriduum, post quod ilico tempus flaccescen-

Bechion non nascitur sine flore.

Dioscoridis locus emendatus.



TVSSILAGO

Roshib.

Ates in pappos euanescent, & caduci marcent, ita ut non nisi uere sese forte fortuna ferant obuiam, quo potissimum tempore flos & caulis sine folijs uident. Quapropter qui herbam ipsam hoc tempore non cōspexerunt, & tam subitam floris & caulis iacturam haud animaduuerunt, sine utriusq; nasci crediderunt. Nos tamen & florem & caulem sepius oculis contemplati sumus, ideoq; ut utriusq; pictura accederet diligenter curauimus.

LOCVS.

Nascitur prope fontes, & in aquosis locis.

TEMPVS.

Flores uere, & in Aprili colligunt: ab hoc enim tempore, ut paulò antè diximus, nusquam apparent. Folia & radix tota æstate durant.

TEMPERAMENTVM.

Folia Tussilaginis uirentia aqueæ substantiæ admisionem habent, ut hac ratione frigida & humida dici possint. Sicca uero acriora sunt, ideoq; calida.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Tussilaginis folia trita cum melle illita, ignibus sacris, & inflammationibus cunctis medentur. Eadem sicca incensa, eos qui sicca tussi & orthopnoea infestantur, quum fumum per infundibulum hianti suscipiunt ore, sanant. Abscessus thoracis rumpunt. Eadem radix suffita potest, scetumq; emortuum in aqua mulla cocta & pota eijcit.

EX GALENO.

Bechium ideo nuncupatum est, quod *Bixes*, id est, tusses & orthopnoeas iuuare creditum sit, si quis uidelicet folia arida aut radicem in prunis accendens, ascendentem inde fuliginē inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut sine molestia noxæ ue omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia uiridia partes cruda inflammatione obfessas illitu extrinsecus adiuuant, propter aquæ humiditatis admisionem, qua omnia uirentia tenera, alia plus, alia minus participant. Nam sicca Bechij folia acriora sunt, quàm ut inflammatione laborantibus partibus conueniant.

EX PLINIO.

Tussilaginis aridè cum radice fumus per arundinem haustus aut deuoratus, ueterem sanare dicitur tussim: sed & in singulos haustus passum gustandum est.

DE BUGLOSSO CAP. LI.

NOMINA.

BΟΥΡΑΝΣΣΟΝ Græcis: Buglossum, Bubula lingua, Bouis lingua Latinis, quod scilicet eius folia bubulæ linguæ similia sint: officinis & herbarijs Borrage, Germanis *Burzettsch* dicitur. Alia uero herba est quæ Borrage. hodie Buglossa uulgo nominatur, ut suo loco indicabimus.

FORMA.

Buglossum Verbasco simile est, folium habens in terram depressum, asperum, nigris, bubulæ linguæ non dissimile. Florem cœruleum, speciosum. Quæ nimirum descriptio ita hodie uocata Borragini herbæ quadrat, ut nemo non, nisi talpa cæcior sit, ueterum esse Buglossum uideat. Qui tamen eius rei plura argumenta desiderat, ea quæ libro primo, cap. xxxiiij. nostrorum Paradoxorū produximus, legat, & nihil puto deinceps dubitabit.

LOCVS.

Nascitur in planis & sabulosis locis. Passim etiam hodie in hortis seritur, ob id olitoribus optimè cognitum.

TEMPVS.

Carpitur Iulio mense.

TEMPERA-



BVGLOSSVM

Borragen.

Buglossum calidi humidique temperamenti est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folium Buglossi in uinum deiectum animi letitiam efficere creditur. Aiunt quæ tres caules emittat si cum radicibus & semine tota teratur, & in potu detur, contra tertianos rigores prodesse: ad quartanas uero quæ quatuor. Horum autem decoctio in uino fiat. Herbam abscessibus etiam utilem esse ferunt.

EX GALENO.

Buglossum uinis iniectum lætitiæ & hilaritatis causa esse creditum est. Sed & ijs qui ob faucium asperitatem tussunt, in melicrato coctum conuenit.

EX PLINIO.

Buglossum præcipuum quod in uinum deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosynum. Buglossum inarescente, si quis medullam e caule eximat, dicatque ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessione, aiunt à febre liberari.

EX SYMEONE SETHI.

Buglossum urinam cit, & sitim sedat. Caules eius cocti & crudi comesti iecoris affectibus profunt. A uiatoribus ex eo conficitur zupapion, & est utile.

DE BUPHTHALMO CAP. LII

NOMINA.

BΟΥΦΘΑΛΜΟΝ Græcè, Buphthalmū Latinè. Hodie oculus bouis aut uaccæ, & Cotula non foetida herbarijs uocatur. Germanis *Kindsaug* / *oder Kisaug*. Buphthalmum autem non alia ratione dixerunt ueteres, quàm quod eius flores oculi imitentur formam, & boum potissimū oculis similes sint. Germanicè etiam *Kindill* / hoc est, uaccinum anethum dicitur, quod scilicet uerum Anethum eius folia referre uideantur.


Cotula non foetida.
Buphthalmum cur dictum.
Anethum uaccinum.

FORMA.

Buphthalmum caulem tenerum emittit, folia feniculo similia, flores luteos Anthemide maiores, oculorum figura, unde & nomen traxit. Hæ siquidem notæ adambulsim conueniunt herbae quam uulgus herbariorum Cotulam non foetidam uocant: caules siquidem eius teneri, folia feniculo similia. Nec te moueat quod à Dioscoride Buphthalmo lutei flores tribuuntur, Cotulæ autem non foetidæ albi sint: ad discum enim mediūmue Dioscorides respexit, quod luteum est, non ad ambitum, in quo folia radiata candida, ut in Chamæmelo, existunt. Quod dicimus, confirmant quæ Galenus lib. vi. de simpl. medic. facul. in hunc modum scribit: Buphthalmi, inquit, flores colore Anthemidis floribus simillimi sunt, sed multo maiores. Serapion quoque florem eius magis luteum flore Chamæmeli esse ait. Si itaque Anthemidis floribus simillimi sunt, nec nisi sola magnitudine differunt, & Anthemidis propriè dictæ flores in medio lutei, & per ambitum candidi existunt, necesse est ut Buphthalmi etiam flores tales sint, ut scilicet candida illorum folia, luteum medium cingant. Quid multa? Buphthalmi flores ab Anthemidis floribus non nisi sola magnitudine differunt: grandiores enim Buphthalmi flores quàm Anthemidis conspiciuntur, reliqua facie quam simillimi. Quod igitur ad colorem attinet, in nullo uariant. Iam dictis accedit, quod Serapionis interpres sub Cotulæ nomine Buphthalmum deliniat. Denique congenerem esse planè herbam Buphthalmum cum Anthemide Dioscoridis tractandi ordo abundè docet, quum constet illum tres herbas sibi admodum similes, Chamæmelū nempe, Partheniū, & Buphthalmū, uno in loco describere. Vnde iterum palnū fit Buphthalmū esse Cotulā non foetidam, quod scilicet Chamæmelo prorsus similis sit, excepto duntaxat flore, qui in illa maior est.

Obiectionis solutio.

LOCVS.



BVPHTHALMUM

Rindsaug.

L O C V S,

In campis & circa oppida nascitur.

T E M P V S,

Carpitur Iulio Augustoq; mensibus, & durat etiam usq; ad autumnū mediū.

T E M P E R A M E N T V M,

Flores Buphthalmi acriores sunt Chamemeli floribus, ob id illis sunt calidiores.

V I R E S, E X D I O S C O R I D E.

Buphthalmi flores cum cerato triti, oedemata & durities discutiunt. Ferunt post exitū à baln eo potam, regio morbo correptis coloris bonitatē tractu temporis red dere.

E X G A L E N O.

Buphthalmi flores Anthemidis floribus uehementius discutiunt, adeò ut & durities ex cerato mixti sanent.

E X P L I N I O.

Buphthalmos cum cera scirromata discutit.

D E B E L L I D E CAP LIII

N O M I N A.

BELLIS neq; à Dioscoride, neq; à Galeno, nec alijs etiam Græcis, quod sciam, descripta est, ideoq; græco nomine destituitur. Latinam itaq; dumtaxat appellationem habet, & Bellis siue Bellius, autore Plinio, nominatur.

G E N E R A.

Duorum est generum, maioris & minoris discrimine insignis. Minor Bellis est ea quam officinæ Consolidam minorem appellant. Hæc iterum duum est generum. Quædã enim hortensis & domestica est Bellis, hanc Germani *Monatblüm* le/oder rote blümle nominant. Altera syluestris, quam uulgius herbariorum Primulam ueris, quod scilicet uere inchoante mox erumpat, Germani autem *Wasslieble* & *Kleinzeitlöfle* nuncupant. Maiorem officinæ nõnullæ Consolidam mediam, quod credatur uulnera glutinare, Germani *Genßblüm* uocant. Nos aliam Consolidam mediam infra describemus.

F O R M A.

Minor hortensis, syluestri, præter florem qui rubicundus est, per omnia similis est. Constant uero flores ij interdum simplici, interdū multiplici foliorum cõtextu, ut pictura affabrè ostendit. Syluestris, Plinio lib. xxvi. cap. v. teste, flore cõstat albo, aliquatenus rubente, quinquagenis ternis, interdū etiam quinquagenis quinibus barbulis circinato, folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissimè ferrato. Neq; obstat quod Plinius lib. xxi. cap. viij. Bellio luteum esse florē tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum mediū ue floris, quod sanè luteum est, respexit. Hinc est quod à quibusdam Plinij locus ita legatur: Luteum & Bellio, ut subaudia tur semen. Maior Bellis procerior assurgit, folio non admodum diuerso, altioribus duntaxat crenaturis laciniato, coliculis tenuibus, surculosis, cubitū altis, flore priori non dissimili, maiore, paucioribus tantum barbulis, & in uniuersum candidis, medium luteum in orbem concinnè cingentibus.

L O C V S.

Pasim in pratis uterque nascitur Bellius. Iam & in hortis feritur, sed flore multiplici, barbularum stipatu densiore.

T E M P V S.

Minor primo statim uere apparet, & tota ferè æstate durat. Maior autem in Maio mense floret, quo etiam tempore carpi debet.

T E M P E R A M E N T V M.


Bellius uterque calidus & siccus est, id quod ex Plinio colligi potest, qui illorum

N ad dif-



BELLIS MINOR
HORTENSIS.


Wonnatblum.



BELLIS MINOR
SYLVESTRIS.

Stapflebert.

N 2



BELLIS MINOR

Senfblüm.

A ad discutiendas strumas usum esse scribit. Acetosus tamen sapor quem in gustu minor præ se fert, aliquam frigiditatis in ea portionem esse monstrat. Quicquid tamē sit, exiccare Bellios euidentissimum est.

VIREs.

Quotquot hodie uiuunt uulnerariā herbam Bellium esse nouerunt, ualetq; potissimū in capitis fractura admota. Succus etiam herbæ utiliter uulneratis bibitur. Laudatur etiam herba ad membrorum resolutionem, quam Græci paralyfin uocant; itemq; ad podagras, ischiada, & aduersus strumas,

DE BRATHY CAP. LIIII.

NOMINA.



ΠΑΘΥΣ ἢ ἰσὶ Βολγυθρον Græcis, Sabina uel Sauina Romanis, Senenbaum Germanis dicitur. Officinæ nomen uetus retinuerunt.

GENERA.

Duūm est generum Sabina. Vnum quod hic pictum exhibemus: alterum Tamaricis folia habens.

FORMA.

Primi generis Sabina folijs Cupresso similis est, spinosior tamen, graui odore, acris & feruens. Arbor breuis, & in latitudinem magis se fundens & explicans. Topiarius itaq; frutex est, immortalī coma uirēs, patulo fastigio, iuniperi similitudine.

LOCVS.

Parsim in hortis nascitur.

TEMPVS.

Quouis tempore colligi potest, potissimū autē autumno dum semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excalfaciētū & desiccantiū, & ex numero eorum quæ uel maximē tenuiū sunt partium.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Prioris folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Vtriusq; folia nomas sistunt. Inflammationes illita mitigant. Cum melle illita nigritias repurgant, itemq; sordes & carbunculos abstergunt. Cum uino pota sanguinem per urinam ducunt, foetumq; excutiant. Idem apposita & suffita præstant. Miscentur unguentis excalfaciētibus, priuatim Gleucino.


EX GALENO.

Sabina ex numero est fortiter exicantiū, idq; secundum tres qualitates quas in gustu præ se fert similiter Cupresso, nisi quod ea acrior est, & ut sic dicā, magis aromatica, seu odorator. Igitur huius quam modo dixi qualitatē est particeps, nempe acrimoniæ cōsistentis in calido temperamento, præterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris quā in Cupresso. Siquidē quanto magis acrimonia superat, tanto etiā potētius digerit. Itaq; glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam utriusq; illi tantum inest, ut etiam tendat, & inflammationē afferat. At putredinibus similiter Cupresso accōmodari potest, maximē ijs quæ maligniores fuerint, & diuturniores. Nam hæc citra noxam medicamenti uehementiam perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item soluit. Porrò ob essentiæ partium uel tenuitatem mentes quoq; prouocat, ut si quid aliud. Et sanguinem per urinas mouet. Foetum etiam uiuentem interficit, & mortuum eiicit. Unguentis inditur, & potissimū Gleucino, & in multas antidotos iniicitur. Quidam uero etiam Cinnamomi uice duplum eius adijciunt: est enim extenuandi & digerendi facultatis, si pota fuerit.

EX PLINIO.

Sabina à multis in suffitus pro thure assumitur. In medicamentis uero duplicato

N 3 pondere



SABINA

Seuenbaum.

A pondere eisdem effectus habere quos cinnamomum traditur. Collectiones minuit, & nomas compescit. Illita ulcera purgat. Partus emortuos apposita extrahit & suffitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle & uino pota, regio morbo medetur. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari tradunt.

DE BATO CAP. LV.

NOMINA.



BATOS Græcis, Rubus aut fentes Latinis uocatur. Aliquibus Mora uaticana, corrupta uoce, eius fructus dicuntur, cum dicendum esset mora uacinia. Nam in hodiernum usque diem Græci mora illa à *Bάτος, Βόττιος* *uol. Βαττιος* cognominant. testis Galenus libro sexto, de compos. medica. secundum locos, cap. primo. Vergilius in Bucolicis unius literæ immutatione uacinia uocauit, inquit: Alba ligustra cadunt, uacinia nigra leguntur. Eclog. ij. A nostræ ætatis medicis barbaris & herbarijs mora bacci appellantur, cum illis dicendum esset mora bati. Theophrasto libro ij. de plantarum historia, cap. xvij. Chamæbatos, quasi dicas humilis rubus, appellatur, Germanicè *Bromber*.

FORMA.

Rubum omnes nouerunt, ubique enim uestibus prætereuntium sese affigit, remoramq; uiatoribus injicit. Caulem habet minacibus ac pungentibus spinis & aculeis uestitum. Folia incisuris diuisa, nigricantia ab uno latere, altero candentia. Florem initio rubescentem, dein candidum profert, quo abeunte fructus exit, qui cum maturuerit moro persimilis fit nigrescens, auibus gratus, nec hominibus insuauius cibus. Inest illi succus sanguineus, & ueluti cruore atro manus inficiens.

LOCVS.

Pasim in dumis prouenit Rubus, qui protinus quàm paulò accreuit, retro uergit in terram, atque ita radicatur, iterumq; ex se nascitur.

TEMPVS.

Diuersis temporibus folia, flores & fructus Rubi colliguntur. Folia nanque in uere: flores estatis initio, Junio nimirum & Iulio mensibus; fructus autem ubi iam maturuerit per messes & extrema æstate decerpitur.


TEMPERAMENTVM.

Rubi folia, germina, flores, fructus & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia potissimùm & recens nata plurimum in se habeant aqueæ substantiæ, parum uero adstringant. Eadem ratione & germina. Est itaq; eorum temperies ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. Fructus autem, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi temperati calidi, qui dulcis est. Proinde eam ob rem, & propter modicam adstrictionem, elui non insuauius est. At immaturus à frigida terrea substantia uincitur, ac proinde acerbus est, & exiccatorius. Vterq; autem siccatus reconditur, ualidius quàm recens deficcans.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Rubus adstringit & desiccatur. Capillos tingit. Ramorum eius decoctum potum aluum sistit, & sceminarum profluvia cohibet. Presteris morsui utile. Gingiuas firmat. Oris ulceribus folia cōmanducata medentur. Cohibent herpetas, & in capite achoras, oculosq; procidentes, condylomata & hæmorrhoidas, illita folia sanant. Cardiacis & stomachi doloribus trita & imposita subueniunt. Succus ex caulibus, folijsq; eius expressus, & in sole coactus, efficacius omnibus iam dictis medetur. Fructus eius optimè maturi succus, ad oris medicamenta cōuenit. Sistit & aluum in media maturitate comestus, Flos quoq; eius in uino potus aluum sistit.



RVBVS

Bromber.

EX GALENO.

Folia & germina Rubi si mandantur, aphthas & alia oris ulcera sanant. Quin & alia uulnera glutinare ualent. Flos eius eandem fructui immaturo facultatem possidet: utraq; ad dysenterias, & uentris profluuiam, eiusq; robur deperditum, & sanguinis exuptiones, idonea remedia. Radix praeter adstrictionem non paucam in se habet substantiam tenuem, propter quam etiam in renibus lapides comminuit.

EX PLINIO.

Nec Rubos ad maleficia tantum genuit natura, ideoq; ex eis mora uel hominibus, cibos dedit. Vim habent siccandi, adstringendiq;, gingiuis, tonfillis, genitalibus accommodatissimi. Aduersantur serpentium sceleratissimis, haemorrhoidi & presteri, flos & mora. Scorpionum uulnera sine collectionum periculo iungunt. Vrinam ciunt. Caules eorum tunduntur teneri, exprimiturq; succus, mox sole cogitur in crassitudinem mellis, singulari remedio contra mala oris, oculorumq; sanguinem excreantes, anginas, uulvas, sedes, coeliacos, potus aut illitus. Oris quidem uitijis etiam folia comanducata profunt, & ulceribus manantibus, aut quibuscunq; in capite illinuntur. Cardiaci uel sic per se imponuntur a mamma sinistra. Item stomachi doloribus, oculisq; proidentibus. Instillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosaceo cerato. Calculorum ex uino decoctum praesentaneum est remedium. Item per se in cibo sumpti cymae modo, aut decocti in uino austero, labantes dentes firmant. Aluum sistunt & profluuiam sanguinis. Dysentericis profunt. Siccantur in umbra, ut cinis crematorium uam reprimat. Folia quoque arefacta & contusa, iumentorum ulceribus utilia traduntur. Mora que in ijs nascuntur, uel efficaciorum stomachicis praebere quam satiuam morus. Eademq; compositione, uel cum hypocisthide tantum & melle bibuntur in cholera, & a cardiacis, & contra araneos. Inter medicamenta quae styptica uocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in uino ad tertias partes, ut colluantur quo oris ulcera, & sedis foueantur, tantaq; uis est ut spongiae lapidescant.

DE BALLOTE CAP. LVI.

NOMINA.

BΑΛΛΟΤΗ, ἡ μέλαν περιστομὴ Græcis, Ballote Latinis, Officinis Marrubiū nigrum, aut Marrubialtrum, aut Prasiū fetidum dicitur, Germanis *Marrubium nigrum* *schwarz Andorn/oder Andorn weible*. Marrubium a similitudine foliorum, nigrum a caulis colore, qui niger est Marrubij respectu, dicta Ballote est.

FORMA.

Caules ex se mittit Ballote quadrangulos, nigricantes, subhirsutos, ab una radice complures. Folia Marrubio similia, maiora tamen, subrotunda, pilosa; per interualla in caule disposita, Apiastro similia, graueolentia, unde aliqui Apiastrum eam uocarunt. Flores in rotæ speciem caules circumiacent. Theophrastus etiam lib. vi. cap. ij. de historia plantarum, Balloten folio herbido, ferratori, incisurisq; profundioribus & conspectioribus discreto constare scribit. Vnde liquidò constat hanc quam pictam damus esse ueram Balloten, quod illa sit herba fruticosa, quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis ferè, folio Marrubij, sed maiore, piloso, cingente per intercapedines caulem, odore graui, orbiculato florum purpureorum ambitu, qui scapos uerticillatim obducunt.

LOCVS.

Nascitur propter uias, domos, sepes, cœmiteria, & alijs umbrosis in locis.

TEMPVS.



BALLOTE

Schwartz andorn.

TEMPVS.

Floret in fine Iunij mensis, & in initio Iulij, quo sanè tempore carpi cōmode potest.

TEMPERAMENTVM.

Amara & acris est, ideoq̄ calefacit in secundo ordine iam completo, aut tertio remisso: desiccatur autem in tertio.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius folia cum sale illita, canis moribus medentur. Feruenti cinere flaccescencia, condylomata reprimunt, sordida q̄ ulcera cum melle purgant.

EX PAVLO.

Ballote, quod alij Marrubium nigrum dicunt, acris est & absterforiæ facultatis. Illitum cum sale canis moribus medetur.

EX PLINIO.

Vis eius efficax aduersus canis morsus, ex sale folijs tritis imposita. Item ad condylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & sordida ulcera cum melle.

DE BATRACHIO CAP. LVII.

NOMINA.

BATRACHION Græcis, Batrachium & Ranunculus Latinis dicitur. Apuleius Sceleratā nominat. Vulgus medicorum perperam Pedem corui uocat. Sunt etiam qui Flammulam, ab urendi facultate, appellant. Germani *Hanensius*. Batrachion autem siue Ranunculus dicta est haud dubie, quod limitibus humidis opacisq̄ marginibus ranarum more lætetur; aut quod aquis ubi ranæ degunt potissimū, gaudeat, aut quia inter eius frutices ranæ frequenter inueniantur. Agreste uero Apium seu Apiastrum, quod folijs apium emuletur. Scelerata, eo quod comesta noxia sit; uel, quod magis arridet, quia ualidi sceleratitq̄ mendicantes sibi crura & lacertos hac ipsa dilaniant, quò possint impudentius stipem extorquere, atque hac impostura pecuniolam aucupari.

*Scelerata.**Flammula.**Ranunculus una de dictis.**Agreste apium.**Scelerata.*

GENERA.

Plura sunt Ranunculi genera, Dioscorides uero & Galenus quatuor potissimū esse tradunt. Primum duplex est: huius enim generis Ranunculus quidam syluestris est: & hic iterum duabus discriminatur differentijs. Vnus enim luteos flores profert, & Germanis *weisser Hanensius* dicitur. Alter uero purpureos, qui mihi, quod sciam, nondum uisus est. Quidam autem hortensis, qui nisi cultura accedat prouenire haud solet. Hic iterum duplex est. Vnus qui simplici florum textura consistat, Germanicè *vingesülter garten hanensius*. Alter multiplicē foliorū in floribus cōpagem obtinet, ideoq̄ Germanis *gesülter garten hanensius* dictus est. Alterum quod à foliorum similitudine quam cum Apij folijs obtinet, à nonnullis *έλινορ άρρηγορ*, id est, Apium syluestre, uel Apium risus cognominatur. Germani *Wasserhanensius* uocāt. Tertium genus exiguum est, ob id etiam Germanis *kleiner Hanensius* nominatur. Quartum etiam minimum, germanicè *Waldhenle* appositissima uoce appellatur: est enim inter reliquas herbas quæ germanicè Pedes galli uocantur, & minima, & non nisi in syluis ut plurimum prouenit, adeoq̄ composita uoce rectissimè *Waldhenle* nominatur, quasi dicas minima inter pedes Galli, & in syluis prognata. Estq̄ duū generum: unum quidem lacteo flore, alterum luteo, ut pictura docet. Primum autem quod lacteo flore ornatur, est id quod à Dioscoride pingitur, germanicè uocatur *Weiß waldhenle*. Alterum, *das gelb waldhenle*.

*Syluestris ranunculus.**Hortensis.**Apium syluestre.*

FORMA.


Primum Ranunculi genus folia Coriandro similia habet, latiora, uel ut Plinius ait, ad maluæ latitudinē accedentia, subalbida & pinguis. Florem luteum, interdū purpureum. Caulem non crassum, cubitali altitudine. Radicem paruam, albam, amaram,

Primum genus.



RANUNCULI PRIMA SPECIES SYLVESTRIS.

Weisser Hanenfuß.



RANUNCULI HORTENSIS
SIMPLICIS PRIMA SPECIES.

Ungefülter garten hanensfuß.



RANUNCULI PRIMA SPECIES
HORTENSIS MULTIPPLICIS.

Gefülter hancnsüß.




RANUNCULI
SECUNDA SPECIES.


Wasserhänenfüß.

RANUNCULI
TERTIA SPECIES.

Kleiner hancnsfuß.







RANUNCULI
QUARTA SPECIES LUTEA.

Selbſwaldheule.

A amaram, adnascencias Ellebori modo habentem. Caeterum effecit cultura, ut qui in limitibus simplici foliorum compage flores orientur, gemino quodam densoque ac multiplici foliorum stipatu nunc in hortis collucescant, quemadmodum pictura a fabre monstrat. Alterum genus lanuginosius, uel ut Plinius inquit foliosius, altiore caule, pluribus foliorum incisuris, copiosissimum in Sardinia, acerrimumque, quod iam Apium syluestre nominant. Tertium genus ualde paruum, graui odore, flore qui auri speciem refert. Quartum huic simile, flore autem lacteo aut luteo, radice longiore, & modo quodam nodosa, gustu acri.

Alterum.

Tertium.

Quartum.

LOCVS.

Primum genus Ranunculi syluestris lutei sine cultura circa fluuenta, & in limitibus pratisque humidis & uliginosis prouenit. Hortensis uero adhibito cultura in hortis nascitur. Alterum genus secus aquas & fontes gignitur, & apud Sardos copiosissimum. Ea si comedatur, uescitibus neruos contrahit, rictuque ora diducit, ut qui mortem oppetunt, uelut ridentiū facie intereant. Ob id Sardonius risus in prouerbium cessit. Et si autem nostra non perinde efficax sit atque ea quae in Sardinia nascitur, tamen hanc uehementissima etiam erodendi facultate esse praeditam, gustus ostendit. Tertium genus in pratis & campestribus passim prouenit. Quartum, ut Germanicum nomen palam demonstrat, syluis familiare est. Luteum uero in ualle supra & infra Bebenhusum monasterium iuxta aquas copiosissime nascitur.

Sardonius risus.

TEMPVS.

Primum genus hortensis Ranunculi lutei, statim inter initia Aprilis floret: Maio autem mense disperit, & nusquam subinde conspicitur. Secundum & tertium genus itidem tota aetate inueniri possunt. Quartum in uere, Aprilis nimirum mense, tantum apparet, quo sane tempore hoc ipso sylus, luci & nemora scatent, floribusque eius candicant.

TEMPERAMENTVM.

B Omnium tum radix, tum uniuersa herba uehementer calida & sicca est. Primum tamen generis syluestris lutei, non perinde ac reliquorum acris admodum est facultas.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Omnium folia & caules teneri si illinantur, exulcerandi, & crustas cum dolore creandi uim habent. Proinde scabros ungues & scabiem tollunt, & stigmata delent, myrmecias, acrochordonas & alopecias modico tempore illita sanant. Tepido eorundem decocto pernicioses fouentur. Radix sicca tritaque, sternutamēta naribus admota ciet. Dentium dolores adhibita lenit, eos tamen conterit.

EX GALENO.

Quatuor habet speciatim Ranunculus differentias. Omnes uero uehementer acrem facultatem possident, adeo ut cum dolore exulcerent. Hac itaque ratione si moderate utare, psoras & lepras excoriant, & ungues leprosos diuellunt, ac stigmata discutunt, & acrochordonas & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuant pauco tempore admota. Nam si diutius inhæreant, non excoriat solum cutis, sed & in crustam uritur. Atque igitur haec omnia caulibus & foliorum sunt opera, si illinantur uiridia. Porro radix arefacta sternutatoriū est medicamentū similiter alijs quae ualenter desiccant. Sed & dentium dolores iuuat, ut & eos, uehementer scilicet exiccando, frangat.

EX PLINIO.

Omnibus uis caustica, si cruda folia imponantur, pustulasque ut ignis faciunt. Ideo ad lepras & psoras utuntur, & ad tollenda stigmata, causticisque omnibus miscent. Alopecias imponunt, celeriter remouentes. Radix in dolore commanducata diutius, rumpit dentes. Eadem sicca concisa, sternutamentū facit. Nostri herbarij strumeam uocant, quoniam medetur strumis, & panis, parte in fumo suspensa.



LUPVVS SALICTARIVS.
Hopfen.

NOMINA.



BRYON Græcis recentioribus, Lupus salictarius Latinis, Lupulus officinis, uulgo Humulus uocatur. Aliquot Italiae rura, ad græcam appellationem alludentes, Brusculam, quasi Bryon scansile nominant, Germani Hopfen. Græci autem Bryon à Bryoniae similitudine haud dubie nominarunt. Lupus uero salictarius, quia subit scanditque salices, & arbuta omnia circumuoluendo se circumplectitur, appellatus est. Hinc quoque Lupus reptitius nonnullis nominatur.

Lupulus.

Humulus.

Bryon.

Lupus salictarius.

Lupus reptitius

FORMA.

Caules habet aculeatos, longissimosque. Folia uitis albæ, hispida, & nigriora. Flores cinereos seu candicantes, ac multis exilibus folliculis squamatim compactiles. Radicem subnigram, longam.

LOCVS.

Parsim & copiose in Germania nostra iuxta uepres & salicta prouenit, ex eaque ceruisiam potum, quo uini uice utuntur, Germani conficiunt. Ideoque in hunc usum in hortis plantatur.

TEMPVS.

Augusto mense floret & Septembri.

TEMPERAMENTVM.

Sunt qui refrigerare Lupulum dicant, alij temperamento medium esse putant. At utriusque, mea quidem sententia, falluntur: flores enim quorum potissimum usus est, calidos & siccos esse, odoris & grauitas, & immodica amaritudo testant. Antiquus etiam herbarius calidum & siccum in secundo ordine esse tradit. Denique constat radices quoque eius calidas esse.

VIRES.

EX RECENTIORIBVS.

Bilem utranque detrahit. Abscessus discutit. Pituam in aqua inter cutem per aluum ducit. Succus eius crudus haustus uentrem magis subducit, minus uero obstructions aufert. Coctus uero magis ab obstructions liberat, minusque uentrem subducit. Auribus instillatus eas à putredine uindicat, & à febre liberat. Radices obstructions tollunt, lienis potissimum & icteris.

DE VERO



VERONICA
M.A.S.


Erenbreißmennle.



VERONICA
FOEMINA.

Crenbeißweible.

NOMINA.

Veronica.  ET ERIBVS Græcis & Latinis cognita fuerit nec ne hæc herba, nondum constat. Vulgus autem herbariorū hodie Veronicam, Germani *Frenbreiß* oder *Grundheyl* / ob mirificam sanandi ulcera & uulnera facultatem nominant.

GENERA.

Duūm est generum Veronica; una mas, altera uerò fœmina. Discrimina earum ex descriptionibus patebunt.

FORMA.

Veronica mas herba est per terram serpens, cauliculo dodrantali & nonnunquā etiam longiore, rubescente & lanuginoso, folijs oblongis, nigris, hirsutis & ferratis, floribus in cacumine purpureis, semen in uasculis loculi speciem habentibus, radice tenui. Fœmina itidem per terram serpit caule lanuginoso, folijs rotundis instar herbæ quæ Centummorbia & Nummularia hodie uocatur, minimè in ambitu incisis, paulò quā maris uiridioribus, floribus in luteo purpureis, semine in uasculis rotundis, radice, ut mas, tenui.

LOCVS.

Nascitur incultis & syluestribus locis.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine abundat.

TEMPERAMENTVM.


Amaritudinem quandam & uehementem adstrictionem in gustu præ se fert, ut hinc calidam & siccam esse conijcere liceat.

VIRES.

Mirificè ad cruēta ac uetera uulnera & ulcera sananda confert. Scabiei denique & omnibus cutis uitijis medetur. Ferūt quondam huius herbæ adiuumento Regem Galliæ elephantia morbo correptum, à quodam uenatore sanatum esse, cum is ceruum à lupo uulneratum eius herbæ comestione, & assidua in illa uolutione, curasse seipsum animaduertisset. Tumores etiam, in quacunq; corporis parte fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recentiores huius usum unice commendant in febribus pestilentialibus, iecoris & lienis obstructionibus, potissimum uero pulmonis exulcerationibus.

DE BVLBO SYLVESTRIS CAP LX

NOMINA.

Cepa syluestris.  *Bulbi.* ΟΛΒΟΣ *εγρη* Græcis, Bulbus syluestris Latinis. Sunt quibus Cepa syluestris appellatur. Germanicè *Seld* / *wild* oder *ackerzwibel*. Bulbos autem nominant radices suis membranis tunicatas, siue pluribus capitulis coagmententur, uno folliculo omnes ambiente, siue quadantenus distinctiæ leparentur.

FORMA.

Herba est caule dodrantali, cauo, folijs porraceis, floribus lilij sinuatim emicantibus, speciosis, sex folijs è calatho stellatim radiatis, ex uiridi in luteum tendentibus, capillo intus croceo, capitulo floribus decidentibus triangulari, feminibus pleno, radice bulbosa ceu Allium, citra odorem glutinosa.

LOCVS.

In locis umbrosis, circaq; margines quorundam pratorū copiose prouenit. Quare in uallibus non procul à Tubinga iuxta monasteriū Bebenhusense sitis, & radice montis Auftriaci ad pratium tenue uocatum, Bulbus plurimus nascitur.

TEMPVS;



BVLBVS
SYLVESTRIS.

Feldzwibel.

P

C

T E M P V S.

Per initia ueris, Martio & Aprili mensibus erumpit, ac statim subinde euanescit. Semen non tantum in caulibus, uerumetiam iuxta radicem profert.

T E M P E R A M E N T V M.

Amara austeramque qualitate praeditos inueniet, non hunc, sed & alios bulbos, qui gustum exacte consulerit. Proinde hos abstergere simul & glutinare, & nimirum etiam exiccare posse, nemini non notum est.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Omnes bulbi acres sunt & calefaciunt, ueneremque stimulant. Linguae & tonsillas exasperant. Multum nutriunt, Carnes procreant, flatuque faciunt. Ad luxata, collisa, furculos, articularumque dolores illiti conducunt. Gangrenis & podagris cum melle, & per se, hydropicorumque tumoribus & canum moribus profunt. Cum melle pariter & pipere trito illiti, sudores cohibent, & stomachi dolores sedant. Furfures & achoras cum nitro tosto exterunt. Sugillata & uaros per se, aut oui luteo purgant, & lentiginis cum melle aut aceto. Fractis auribus cum polenta, & cotulis unguibus profunt. Ficos in calidis cineribus tosti, & cum maenarum capitibus crematis appositi, tollunt. Cobusti uero & Alcyonio permisti uicia cutis in facie, & nigras cicatrices in sole illiti emendant. Cum aceto elixi & in cibo sumpti adrupta faciunt. Cauere uero eorum in cibo copiam oportet, quoniam neruofas partes tentant.

E X G A L E N O.

Bulbi amaram austeramque uim manifestam obtinent, quamobrem elanguescentis stomachi aliquatenus auiditatem excitant. At uero neque ipsi inutiles sunt, quibus e thorace & pulmone pus expuendum erit, quanquam crassiore ac glutinosiore sit corporis substantia: etenim amaritudo crassitudini aduersatur, lenta crassaque nata incidere. Quapropter bis elixi uberius quidem alunt, sed ex creare uolentibus relucantur. Quapropter bis elixi uberius quidem alunt, sed ex creare uolentibus relucantur.
D Stabantur, utpote omni amaritudine exuti. Tum uero ex aceto, oleo garoque mixtis, esitare satius fuerit: nam ita magis oblectantur ac nutriunt, minusque inflantur, & facilius concoquuntur. Quidam horum cibo abunde & immodice usi, plane seminis auctam copiam, inque uenerem se esse promptiores senserunt. Hos quoque homines uarie apparant. Non enim solum aqua elixos, uerumetiam patinas ex ipsis uarie conditas instruunt. Alij quidam in sartagine frigunt, multi in craticula assant. Verum hi multam coctionem haud sustinent, admodum pauca contenti. Sunt qui nihil prorsus praecoquant: delectat namque eos amaritudo ipsa ac austeritas integra, quippe qui amplius ab ea ad cibum alluciantur: quanquam ad huiusmodi illecebra duo aut tres plus satis faciat. Si uero liberalius sic apparati sumantur, praesertim ubi, ut mos est, crudiores ingeruntur, amplius cruditatem generabunt. Quidam etiam non probe cocti, inflationes & tormina pariunt. Qui ad hunc modum esitantur, alimentum minime boni succi procreant. At plurimum decoctorum, aut bis etiam, succus crassior quidem ille erit, caetera uero melior ac alibilior reddetur.

E X P L I N I O.

Bulbi ex aceto & sulphure uulneribus in facie medentur: per se uero triti neruorum contractionem, & ex uino porrigines. Succum cum melle canum moribus. Erastro placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere tradit illitos cum melle. Alij si e naribus fluat, Coriandrum & farinam adiungunt. Theodorus & lichenas ex aceto bulbis curat, & erumpentia in capite cum uino austero aut ouo. Et bulbos epiphoris idem illinit, & siclippitudini medetur. Aequale uicia quae sunt in facie, eorum rubentes maxime in sole illitis, cum melle & nitro emendant. Lentiginem cum uino, aut cum cumino coctis. Uulneribus quoque mire profunt per se, aut, ut Damion, ex mulfis, si quinto die soluuntur. Iisdem & auriculas fractas curat, & testium pituitas. In articularum doloribus miscet farinam. In uino cocti illiti uentri, duritiem praecordiorum emolliunt. Dysentericis in uino ex aqua caelesti temperato dantur. Ad con

uulsa

A uulsa intus cum Silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorē tusi illinuntur. Neruis utiles. Ideo & paralyticis dantur iuxta in pedibus. Qui sunt ruffi ex his, citissimè sanant cum melle & sale. Venerem stimulant. Syluestres interaneorū plagas & uitia cum Silphio pilulis deuoratis sedant. Et fatiuorum semen contra phalangia bibit in uino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentū ictus. Semen antiqui bibendum infanientib. dabant. Flos bulborum tritus crurum maculas uarietatesq; igne factas emendat. Elixos asis minus utiles adijciunt esse, & difficilè concoqui ex ui uniuscuiusq; naturæ.

APPENDIX.

Hic quem pictum damus Bulbus, facultatē emolliendi & discutiendi duros tumores habet. Humidis denique & depascentibus ulceribus tostus calido cinere, & cum melle tritus atque admotus prodest.

DE BICIO CAP. LXI

NOMINA.

BIKION Græcè, Vicia Latine nominatur. Officinæ non sine maximo errore ea pro Orobo utuntur. Germani alludentes ad græcam appellationem, Wickem simpliciter, uel cum adiectione *zam wickem* uocant. Vicia autē, ut Varroni placet, dicta est à uinciendo, quod item ut uitis capreolos habeat, quibus sursum uersus serpit.

FORMA.

Cubitali altitudine surgit, folijs Aphaces, angustioribus tamen, flore Pisi, minutis nigricantibusq; in siliquis seminibus, quorum quidem figura non rotunda est, sed, similiter lenti, latiuscula.

LOCVS.

Sicca loca maximè amat, inter autem segetes copiose prouenit.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Medium tenet caliditatis & siccitatis, ualidius tamen siccatur, in secundo nimirum ordine.

VIRES. EX GALENO.

Semina hæc non solum insuauia, sed concoctu etiam difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est, quum huiusmodi naturam obtineant, alimoniam quoq; quæ ex ipsis in corpus permanat, improbi crassiq; succi esse, idoneam ad humoris melancholici generationem.



VICIA

Vickn.

NOMINA.



BITTON Græcis, Blitum siue Blitus Latinis uocatur. Officij hanc herbam cum Beta cōfundunt non sine magno errore. Germanis *Wasser dicke* dicitur. Blitum nomen inde traxit, quod iners & fatuum olus esset, sine sapore aut acrimonia ulla. Nam *βλίτος* stolidos & ignauos Græci dixerunt. Sichodie græca imitatione *fo cordes*, & nullius momenti homines, bliteos appellamus. Ita Plautus in Truculento bliteam meretricem nominauit.

officinarum error.

Blitum unde dictum. βλίτος.

FORMA.

Blitum non pingitur à Dioscoride, sed ab Hermolao Barbaro, homine non minus docto quàm diligente, in suo Corollario ijs uerbis describitur: Blitum erumpit ocysimè, folijs betaceis, sine acrimonia fatuis & insipidis, semine ut Beta corticeo, copioso, racemoso, ut *Attriplex*. Radice non una, non in rectum tendente, sed multiplici, obliqua, & proluxa. Ex quibus utiq; uerbis omnibus perspicuum fit, herbam quam depictam damus esse Blitum. Hæc siquidem ocysimè erumpit, atq; in altum tollitur, foliaq; Betacea prorsus habet. Insipida denique & sine acrimonia. Semen eius ut *Betæ corticeum*, copiosum, racematim singulis ramis insidens. Radice non una nititur, sed multiplici ac longa, non in rectum, sed obliquum tendente. Rectio rem tamen & magis descriptioni respondentē si quispiam protulerit, non grauabimur nostram mutare sententiam, ut qui probè perspectum habeamus in ijs herbis quæ à Dioscoride non descriptæ sunt, facillimè aliquem in tanta rerum penè omnium caligine aberrare posse.

LOCVS.

Et si sponte sua interdum herba hæc proueniat, tamen ut de Blito etiam tradunt, si culto solo semel nata fuerit, ipsa se per multa secula feminis deiectione reparat, ut etiam si uelis uix possit aboleri, sic semel nata pluribus annis restibili fertilitate prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate & autumno, semineq; prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Blitum frigidum & humidum in secundo ordine.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Blitum oleris uice in cibum uenit. Aluo utile est, nullam tamen medicamento-
sam uim obtinet.

EX GALENO.

Aquosum est olus, ac uti quis non absurdè dixerit qualitatis expers, & insipidum: quapropter non ex solo oleo garoq; sed addito aceto sæpius meliusq; assumitur. Non nihil etiam ad leuigandam aluum momenti affert, uerum id ipsum perquam exiguum est, quoniam nulla ipsis acris nitrosæ adest qualitas, quæ aluum ad excretionem irritare possit. Liqueat etiã quod minima ab ipso alimonia in corpus dimanet.

EX PLINIO.

Blitum iners uidetur ac sine sapore aut acrimonia ulla. Vnde cōuicium sceminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile est. Ventrem adeò turbat, ut choleram faciat aliquibus. Dicitur tamen aduersus scorpiones potum è uino prodesse, & clauis pedum illini. Item lieni & temporum dolori ex oleo. Hippocrates menstrua sisti eo cibo putat.



BLITVM

Walter,

NOMINA.



ΒΥΝΙΑΣ Græcis, Romanis Napus, Germanis *Stectrüß* appellatur. *Napus.*
 Buniadis autem appellationē à tumente figura quam præ se fert, Græ- *Bunias quare*
 ci deduxerunt. Nancq; radix Napi buniadis in amplitudinē excrefcit, & *dictus.*
 in rotundum extuberat, Clivos siquidem, colles, uerrucosaq; loca *Bovos* *Bovoi.*

nominant.

GENERA.

Napi buniadis, quem Galenus & alij ueteres in Raporum censum reponunt,
 duo sunt genera. Vnum satiuum, quod forma proximē ad Brassicam tertiæ speciei *Napus Buniadis*
 accedit, radicemq; oblongiorem obtinet. Germani huius generis Napos, *Cruck en* *satius.*
stectrüß nominant. Alterum syluestre, quod folijs suis Erucae non dissimile est, *Syluestris.*
 radice ampliore, & rotundiore. Germanicē *Wassstectrüß* appellantur eius ge-
 neris Napi.

FORMA.

Folia habet Rapi, leuiora, Erucae modo laciniata, caulem cubitalem, interdum
 altiorem, rotundum, flores luteos, Brassicæ proximos, semen in siliquis, radicem
 oblongam.

LOCVS.

Bunias gaudet frigidis locis.

TEMPERAMENTVM.

Cum easdem quas Rapum uires habeat Bunias, necesse est idem etiam ut obti-
 neat temperamentum. Est itaq; Napus bunias in secundo ordine calidus, & in pri-
 mo humidus.


VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Radix Buniadis elixa, flatus creat, minus tamen quàm Rapum nutrit. Semen
 eius potum letalia uenena inefficacia reddit. Miscetur antidotis. Radix etiam eius
 fale conditur.


EX GALENO.

Easdem quas Rapa uires obtinent. Vide itaque caput de Rapis.



NAPVS BVNIAS
SATIVVS.

Turnen Steckrüben.



NAPVS BVNIAS
SYLVESTRIS.

Nassteckrüben.

C

NOMINA.

Botrys unde
dicta.

ΒΟΤΡΥΣ Græcis, Botrys Latinis appellatur. Officinis & uulgaribus herbarijs incognita. Germanis haud ineptè Traubentraut nominabitur. Botrys uerò dicta est à semine, quod racematim ramulis adnascitur.

FORMA.

Herba tota est lutea, fruticosa, sparsa, multaꝝ alarum caua habens. Semen totis ramulis adnascitur. Folia Cichorio similia obtinet, totaꝝ ualde odorata est, ideoꝝ uestibus apponitur. Ex qua quidem descriptione omnibus manifestum fit, herbam cuius picturam exhibemus esse legitimã Botryn: uniuersa enim herba ad luteum colorem uergit, fruticosa est, & multis stolonibus fusa, folijs Cichorij, odoratis, semine circa ramulos totos in racemos collecto nascente. Quid multa: nulla est prorsus nota, quæ illi non appositissimè quadret.

LOCVS.

Nascitur circa profluentes aquas & torrentes. In Germania tamen, quod equidem sciam, non nisi fata prouenit.

TEMPVS.

Augusto & Septembri ad maturitatem maximè peruenit: quibus etiam mensibus, ut Ruellius annotauit, uenalis herba per Parisiensium urbem defertur. Odoris enim gratia Galli uestimentis, pannis, & linteis curiose interponunt. Apud Germanos tamen eius herbæ nulla est gratia, quod illis hæctenus ignota fuerit.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse Botryn amaritudo eius quæ gustui occurrit, facilè monstrat. Item uis eius incidendi, quæ illi propter calorem, tenuitatemꝝ inest.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.


In uino pota orthopnceas lenit.

EX PAVLO.

Planta est admodum odorata, quæ cum uino pota non nisi recta ceruice spirantibus auxiliatur.

EX PLINIO.

Medetur orthopnoicis.



BOTRYS

Traubenkraut.

NOMINA.

Hæc herba non
est Pycnocomō.
Barba capricur
dicta.



VO nomine ueteribus Græcis & Latinis hæc herba uocata sit, nobis nondum compertum est. Neque enim Pycnocomon est, quòd à descriptione illius prorsus abhorreat. Quare Barbam caprinā interea donec certius nomen nacti fuerimus, nuncupabimus, à florum nimirum figura, quæ caprinam barbam referre uideatur. Germanicè *Wald geißbart* / ut eam segregaremus ab altera eiusdem nominis, quæ non in syluis, ut hæc ipsa, nascitur, sed in pratis & senticetis, appellare nobis placuit.

FORMA.

Caulem habet tricubitalem, angulosum, folia Castaneæ aut Corylo similia, in ambitu serrata, flores candidos, exiguos, racematim compactos, instar barbæ canæ dependentes, radicem nigram, lignosam, intus candidam. Flores eius in iulos abeunt.

LOCVS.

Prouenit in obscuris syluis, & uallibus nonnunquam minus apricis.

TEMPVS.


Floret Iunio mense, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse hanc herbam facillè ex gustuprehenditur: miram enim amaritudinem, in radice potissimum, gustata exhibet.

VIREs.

Abstergit haud dubiè expurgatq; & quæ in uenis est crassitiem incidit. Quamobrem menses ducit, educendoq; ex thorace, & pulmone puri auxiliatur. Et in summa, siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam continetur eiusmodi, expurgat. Hac utiq; ratione & morbo comitali competit. Extrinsecus illita & imposita, tumores ex pituita ortos discutit.



BARBA CAPRI.

Waldgeißbart.

NOMINA.

Blattaria unde
dicitur.

VM Græcis autoribus cognita hæc herba fuerit, nondum cōpertum habeo. Plinius certè libro *xxij. cap. ix.* Blattariam nominat. Inuenit autem nomen hoc Latinum, à colligendis in se blattis. Ideoq; cōuenientis imo nomine Germanis appellabitur *Schabentrant*.

FORMA.

» Plinius loco iam citato Blattariam sic pingit: Blattaria est similis Verbasco herba, quæ sæpe fallit pro ea capta, folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Ex qua pictura satis constat, herbam cuius picturam damus esse Blattariam: sic enim Verbascum mentitur, ut pro eo sæpius ab imperitis decerpatur. Et sunt non pauci herbarij, qui hac similitudine decepti, eam inter Verbasci genera connumerent. Folia tamen, quæ minimè sunt hirsuta & candida, sed potius uiridia, faciliè ab hoc errore paulò attentiores reuocare possunt. Plures deniq; cauliculos habet, flores item luteos, ad Verbasci flores proximè accedentes. Folliculos quoque lini instar, in quibus semen continetur.

LOCVS.

Nascitur iuxta aquas, & fluminum ripas.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Vehemens amaritudo eius satis docet esse calidam & siccam.

VIRES. EX PLINIO.

Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Romæ Blattariam uocant.

APPENDIX.

D Non plura de huius herbæ facultatib; apud probatos autores inuenio, sed haud dubiè si quis ea uti uoluerit, eadè quæ alia amara, in corpore nostro efficere potest. Quæ qualia sint, ex capite præcedente faciliè intelliges.



BLATTARIA

Schabenkraut.

Q₂

NOMINA.

B P Ω Μ Ο Σ Græcè, Auena Latinis ac Officinis, Germanis Haberū dicitur.

FORMA.

Folijs & culmo Tritico similis, geniculis intersecto. In summo uerò fructum habet ueluti locustas duplici crure diuarcatas, in quo semen includitur, Radicem copiosam.

LOCVS.

Parsim in Germaniæ agris nascitur, ac iumentorum potius quàm hominum pabulum existit.

TEMPVS.

Seritur Martio mense, metitur autem Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Auena ut medicamētum refrigerat, Galeno autore: ut alimentum uerò, eodem teste, calefacit sufficienter. Vtroque uerò modo exiccat.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.


Semen eius haud secus quàm hordeum ad cataplasmata utile. Puls etiam ex ea fit cohibendæ aluo accommodata. Succus eius in forbitione acceptus, tussientibus prodest.

EX GALENO.

Auena ut medicamentum similem hordeo uim obtinet. Nam illitum desiccatur, & digerit mediocriter, & sine morfu, Nonnihil etiam adstrictionis obtinet, ut uentris profluvia iuuet.

EX PLINIO.

D Semen utile ad cataplasmata atque hordeum & similia, Prodest tussientibus succus, Auenæ farina in aceto tollit næuos.



AVENA

Gabern.

Q 3

NOMINA.

Vua crispa cir-
dicia.

ETERIBVS ne Græcis & Latinis frutex ille cognitus fuerit, me ignora-
re adhuc ingenuè fateor. Quare cum nomen aliud quo hunc appellare-
mus in promptu non esset, uulgarè & qua omnes hodie herbarij utun-
tur nomenclaturam usurpare uoluimus. Vuam autem crispam fruti-
cem hunc dixerunt ab intortis fereq; in circulum uersis (crispa alij uocant) folijs, &
acinis quos producit. Quo etiam respicientes Germani nostri, *Krusßbeer* / oder
Krüselbeer uocant. Latinius fortè uua intorta nuncuparetur.

FORMA.

Frutex est ramulis multis, aculeatus, rectoq; spinarū mucrone horridus, folijs in
tortis ac circumdatæ rotunditatis, Apij modo dissectis, flore ex herbido purpura-
te, acinis candicantibus, & splendentibus, primum acerbis, à maturitate dulcibus.
Ex ijs abunde constare putamus, fruticem hunc cuius picturā exhibemus, non esse
primam, ut nonnulli arbitrantur, Rhamni speciem. Nam etsi cætera respondeant,
tamen folia quæ rotunda & minimè oblonga sunt, ut Rhamni, repugnare manife-
stè uidentur. Possent tamen citra aliquod uitæ discrimen Rhamni generibus annu-
merari, quod scilicet uiribus illi similis admodum sit, quas etiam illi suo loco adscri-
bemus.

LOCVS.

In frutetis & sepibus nascitur, non tamen passim. Nusquam autem copiosius
quàm Tubingæ luxuriat, ubi circa omnes ferè sepes sese profundit.

TEMPVS.

Veris statim initio frutex ille pubet, primum hoc tempore folia, dein flores, ac
non diu post acinos seu baccas acerbitate gratas profert.

TEMPERAMENTVM.


Haud dubiè idem quod Rhamnus temperamentum obtinet. Vt enim hic ad-
stringit & refrigerat, sic etiam illa. Refrigerat autem in primo completo, aut secun-
do incipiente, desiccatur uerò in secundo.

VIRES. E DIOSCORIDE.

Folia ignibus sacris & herpetis illita auxiliantur. Fertur & ramos eius foribus &
fenestris appositos ueneficiorū arcere maleficia. E quibus Dioscoridis uerbis satis
liquet, Vuam intortam non hoc tantum nomine sepibus apponi ut easdem mu-
niat, atque adè alienorum ingressum prohibeat, uerum etiam ut ueneficia ab hor-
tis propulset. Vt hinc quoq; colligere liceat, eiusdem cum Rhamno esse facultatis.

E GALENO.

Herpetes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Porrò ad hæc teneris uten-
dum est folijs.



VVA CRISPA

Krißelbeer.

Q4

C

NOMINA.



VO nomine ueteribus tum Græcis cum Latinis appellatæ sint hæ plantæ, me ignorare ingenuè fateor. Puto autem illis planè fuisse incognitas, quod de ijs ne uerbum quidem apud eosdem scriptum inueniatur. Hodiè Balsamines nomine uocant. Causam indicabimus paulò pòst. Germani ad latinam nomenclationem alludentes, Balsamirant/haud (arbitror) ineptè appellabunt.

GENERA.

Prima Balsamine. Duo Balsamines genera damus. Primam, quam nos certioris discriminis gratia marem fecimus, Ligures Padani Balsaminā uocāt, Hierosolymitanū pomum *Hierosolymitanum pomum.* *Mirabile pomum.* truria, Mirabile Gallia, uulgus Itolorum Charantiam, quoniā septi modo in hortis fenestrisq; per cancellos opere topiario facilè digeratur. Alteram, quam sceminā nominauimus, Itali neutro genere Balsaminū appellāt, priori quidem quod ad fructum attinet similis, nisi quod minor est, in alijs dissimilis: nec enim folijs, neque etiam floribus respondet. Vtraq; planta uisu pulcherrima est, ut hoc saltem nomine pingi meruerint. Etsi præstet etiam harum habere picturas, ut de ijs plura inuestigandi posteris occasio aliqua sit.

FORMA.

Primæ. Prima tenuibus prælongisq; flagellis ultro citroq; reptantibus euagatur, folijs Vitæ albæ seu Bryoniæ, articulatoribus, exilibus pampinis ex alarum sinu prodeuntibus, quibus illigantes sese cancellatim uicinis implicant pergulis: flore cucumeris ex albo in luteum languescēte, turbīnato utrinq; fructu, carnosa cute, & per uersus uerrucosa, ac rigidioribus bullis intumescēte, cucumeris syluestris pusilli similitudine, puniceus maturo color, cartilago intus punicea uel lutea, sanguineusq; succus. *D* Pomum maturitate dissilit, inanitasq; contracto patet, semina intus pomi formam referentia continens. Altera caulem habet crassissimū, Portulacæ asimilem, in herbaceo colore rufescentē, folia Salicis, in ambitu incisis, flores magnos, purpureos, instar Consolidæ hodiè regalis uocatæ herbæ caudatos, fructum priori non dissimilem, primo herbaceū, dein pallidum luteūmue, pilosum, qui maturitate dissilit, inanitasq; contracto apparet, semina intus aliquot lenticulæ ferè figura continentē.

LOCVS.

Non nisi fatæ in Germania proueniunt, Sed iam in multorum hortis plantatæ nascuntur.

TEMPVS.


Floribus & fructibus prægnantes sunt Augusto & Septembri mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod Telephium temperamentū, potissimum alteram, obtinere arbitror. Quare in secundo ordine intenso, aut certe principio tertij exiccare, nec insigniter calefacere, primo nimirum ordine, est uerisimile.


VIRES.

Balsamine uox unde nata. Ex primi generis Balsamines seminibus oleum exprimitur, ad uulnera, quod in Corollario suo annotauit doctissimus Hermolaus, præcipuum. Nonnulli pomum oleo prius imbutum aliquot dies insolant, deinde uel fimo, uel terra tantisper obruunt, dum prorsus intabuerit, sic Balsami uires glutinandis uulneribus adsciscere pollicentur, inde tractum Balsaminæ uocabulum. Quid multa? in uulneribus sanandis Telephio non inferiores esse conijcio, hincq; Balsaminas appellatas. Nos tamen de ijs peculiarem experientiam nullam habemus. Poterunt itaque alij, si lubet, earundem uirium facere periculum.



BALSAMINE
PRIMA.

Balsamkraut meule.



BALSAMINE
ALTERA.

Balsamkraut weiblich.

NOMINA.



ΑΥΚΥΡΡΙΖΑ Græcis, Dulcis radix Latinis, Liquiritia officinis, Germanis Süßholz dicitur. Nomen tum apud Græcos, tum etiã Latinos à dulcedine, qua radix eius prædita est, inuenisse notius est, quàm ut dici debeat. Theophrastus nono de plantarũ historia libro, Scythicam nominauit radicem, quod in Scythia circa Mæotim paludem plurimum proueniat. Sunt etiam qui *ἀδύλον* uocent, quod sitim retenta in ore arceat.

Liquiritia.
Glycyrrhizaum
de dicta.
Scythica radix.

FORMA.

Breuis frutex est, ramos binũm cubitorum altitudine spargens, in quibus folia densa, Lentisco similia, pinguiã, tactuq; glutinosa. Florem fert Hyacintho similem. Fructum pilularum Platani magnitudine, asperiozem tamẽ, siliquas Lentis modo rubefcentes, breuesq; habentẽ. Radices illi sunt longæ, colore buxæe ut Gentianę, subacerbæ, sed dulces, quæ Licij modo in succum coguntur & densantur. Hæc delinatio ita Liquiritiæ hodie uocataẽ quadrat, ut nulla penitus sit nota quæ in illa non reperiatur. Fruticosa enim est, ramos bicubitales emittens, folijs lentiscinis, densis, pinguibus, tactuq; sequaci lentore glutinosis. Flore Hyacinthi, fructu pilularũ Platani crassamento, sed asperiore, siliquas Lentis figura, & breues habente. Radicibus prælongis, buxæo colore, & dulcibus.

LOCVS.

Plurima & optima in Cappadocia ac Ponto nascit. Multa præterea nec ignaua aliquot Germaniẽ nostræ locis, Pabenbergenfi præfertim agro, IOACHIMI nostri Camerarij, uiri doctissimi, patria, producitur. Et hodie nusquam ferẽ nõ feritur in hortis. His quæ semel comprehenderit, tam pertinaci fertilitate cohæret, ut uix unquam possit radicibus extirpari, tam restibili fecunditate regerminat.

Pabenbergenfis
ager Glycyrrhi-
za fecundus.
Ioach. Camerari-
us.

TEMPVS.

Carpitur Septembre mense, quando semine prægnans est, aut Vergiliarum occasu. Flores suos Iulio mense profert.

TEMPERAMENTVM.

Natura eius nostræ temperaturæ familiaris est: nam tale monstratum est esse id quod dulce est. Sed quum adstrictio quædam adiuncta sit, uniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidẽ potissimum caliditatis fuerit, quam proximẽ ad symmetrum temperaturæ accedens. Porro quum etiam dulcis sit, humida quoq; sit oportet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Succus radicis ad arteriæ exasperationes utilis est, oportet autem ut linguæ subditus eliquescat. Ardori stomachi, & ad iecinoris thoracisq; uitia prodest. Vesicæ scabiem, & renum uitia cum passo potus emendat. Idem eliquatus sitim restinguit. Vulneribus prodest circumlitus. Cõmanducatus stomacho succurrit. Radicum recentium decoctum ad eadem conuenit. Radix uero sicca in puluerem trita, pterygijs commodissimẽ inspargitur.

EX GALENO.

Huius fruticis radicem succus in primis utilis est, similiter ut eius radices dulcis, simulq; modicẽ adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nõ solum in arteria, uerum etiam scabra uesica, idq; temperaturæ mediocritate. Quoniam autem temperie quoque humidum est quod modicẽ dulce est, iure sanẽ sitim arcens medicamentum est, nimirum modicẽ humidum, simul & natura humana frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum illitu idoneum esse remedium.

EX THEO-



GLYCYRRHIZA

Gussoltz.

EX THEOPHRASTO.

Dulcis & Scythica radix utilis ad fufpiria, & tuſſim ſiccã, atq; in totum thora-
cis laborantis medicamento cõmoda redditur. Quin & ex melle ulceribus mederi
poſteſt. Sitim quoq; extinguit, ſi teneatur in ore. Qua de cauſa tum ea, tum Hippa-
ce, Scythas decem & duodecim dies degere, & uitam prorogare affirmant.

EX PLINIO.

Radiciſ uſus in ſubditis decocta ad tertias, cetero ad mellis craſſitudinẽ, aliquan-
do & tuſa. E quo genere & uulnerib. imponitur, & faucium uitijſ omnib. Item
uoci utiliſſimo ſucco, ſic ut ſpiſſatus eſt linguaẽ ſubdito: item thoraci & iecinori. In
ore habentes ſitim non ſentiunt: ob id quidam Adipſon appellauerunt eam, & hy- Adipſon.
dropicis dedere ne ſitirent. Non parum auxiliij confert iſ qui perpetua ſiti excru-
ciantur: ideo cõmanducata & ſtomatice eſt, & ulceribus oris inſpergitur, ſæpe &
pterygijs. Sanat ueſicæ ſcabiem, renum dolores, condylomata, ulcera genitalium.
Dedere eam quidam potui in quartanis, drachmarum duarum pondere, & pipe-
re, hemina aquæ. Cõmanducata ſanguinem ſiſtit ex uulnere. Sunt qui & calculos
ea pelli tradiderunt.

DE GALEOPSI CAP LXXI

NOMINA.



ΑΛΗΘΥΣ, ἢ γαλεόβλοϋ græcè: Galeopſis, Vrtica labeo latinè, uulgo
& officinĩſ Scrophularia maior, Ficara, Millemorbia & Caſtrangula Scrophularia
maior.
dicitur. Germanicè *Kraunwurz/Sauwurz/groß feigwarzentraut.*

Appoſitè autem Galeopſis appellatur, nomine ex græco & latino com- Galeopſis cur
diſta.

poſito, quod eius flores prorfus galeæ aſpectum referant. Aut ſi græca cum lati-
nis componi haud poſſunt, γαλιόψις cum ψ & non ς, ut habent multa exemplaria,
ſcribendum erit, ut idem ualeat ac muſtelæ aſpectum referens: flores enim nõ diſ-
ſimiles eſſe capiti illius animalis uidentur. Et ita legendum eſſe Plinius etiam teſta-
tur, qui Galeopſin hanc nominat herbam. Scrophulariam autem à curandis ſtru-
mis, quas ſcrophulas uocant recentiores, dixerunt.

FORMA.

Totus cum ſuo caule & folijs frutex Vrticæ ſimilis eſt, læuiora tamen habet fo-
lia, & cum teruntur grauiter odorata. Flores illi tenues, & purpuſcentes. Huius
deliniationis notæ in uniuerſum omnes, nulla prorfus reclamante, herbæ quam
uulgiſ Scrophulariam maiorem nominat, conueniunt. Frutex enim eſt qui ad hu-
mani corporis ferè longitudinem interdum aſurgit, foliaq; Vrticæ habet, ſed læ-
uiora, & quæ trita grauem fundunt odorem, Flores tenues, atque purpuſcentes.
Reſpondet etiam locus natalis, ut ex ſequentibus patebit. Eſſe autem ueterum Ga-
leopſin uulgiſ Scrophulariam maiorem, præter ea quæ iam diximus, manuſcriptus
quoque codex euidenter oſtendit, in quo pictura ita Scrophulariam refert, ut ne-
mo ſit qui eam non agnoſcat. Huc accedit quod in deſcriptione, quam ex Dioſcori-
de deſumpſit, aperte teſtatur Scrophulariam maiorem alio nomine dictam eſſe Ga-
leopſin & Galeobdolon. Neque facultates diſcrepant, ſed utrarunq; ſimiles ſunt,
adeò ut haud dubiè ueterum Galiopſis, recentiorum herbariorum ſit Scrophula-
ria maior.

LOCVS.

Nascitur circa ſepes, ſemitasq; & in areis ædificiorum paſſim.

TEMPVS.

Colligitur Iunio & Iulio menſibus, tum enim potiſſimum floret.

R

TEMPE-



GALEOPSIS

Braunwurz.

TEMPERAMENTVM.

Deficcatur, extenuatur, & discutitur, adeoque partium est tenuium, id quod amaritudo quam in gustu prae se fert, satis indicat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia, succus, caulis & semen, duritias, carcinomata, strumas, parotidas & panos disijciunt. Oportet autem bis die cum aceto tepidum cataplasma imponere. Fouetur & decocto eius utiliter. Ad nomas, gangraenas, & putrescentia cum sale illita profunt.

EX PAVLO.

Galeopsis, quam alij Galeobdolon appellant, urticae similis herba est, maiorem tamen laeuorem habet, & odorem grauem. Scirrhusos tumores dissipat & emollit. Item ad nomas cataplasmatibus modo illita confert.

EX PLINIO.

Galeopsis folia caulesque, duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos & parotidas discutunt. Ex usu est & decocto succo fouere. Putrescentia quoque & gangraenas sanat.

APPENDIX.

Recentiores etiam Scrophulariae tribuunt facultatem sanandi ulcera putrescentia, & mariscas. Succum eius mederi deformitati faciei iam fere elephantice tradunt, ut inde satis constet a Galeopsi non diuersam esse. Semen in expellendis & enecandis lumbricis esse efficax adijciunt, id quod ab eius amaritudine non abhorret.

DE GALLIO CAP. LXXII.

NOMINA.

ΓΑΛΛΙΟΝ, ἢ γαλλέριον, ἢ γαλλάριον Grecis, Gallion Latinis. Officinis, ut multae aliae optimae herbae, neglecta & incognita est. Germanis Unser lieben frauen weg / oder wal / oder bertsro dicitur. Nomen inuenit ex eo quod uim coagulandi, ac spissandi lactis habeat.

Gallion unde dictum.

FORMA.

Ramulos rectos, & folia Aparinae simillima habet. Florem in summo luteum, tenuem, frequentem, ualde odoratum.

LOCVS.

Nascitur in aruis & humidis palustribusue locis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.


Gallium siccum est & subacre.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Flos eius ambustis illinitur, & sanguinis profluvia cohibet. Idem cerato rosaceo miscetur, insolaturque donec albescat, & sic lassitudines recreat. Radix uenerem stimulat.

EX GALENO.

Gallium inde adeo nomen sortitum est suum, quod lac coagulet. Facultatem obtinet exiccatoriam & subacrem. Flos eius sanguinis profluuijs competere uidetur, & ambustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.



GALLIVM

Unser frauen wegstro.

NOMINA.



ΑΗΧΩΝ, ἢ Βλήχων Græcè, Pulegium Latinè uocatur. Officinæ latinum nomen retinent. Germanicè Poley. Blechona autem appellarūt, quod *Blechon.* gustatum à pecore cum floret, balatum concitet. Id quod Plinio lib. xx. cap. xiiij. autore, de syluestri uerè dicitur. Pulegiū uerò, quod eius flos recens incensus pulices interficiat.

GENERA.

Plinius & Apuleius duo Pulegij faciunt genera, alterum fœminam, alterum mare; nec alia ratione differre scribunt, nisi quod mas candidum, fœmina uerò purpureum florem habeat. Dioscorides Pulegium masculum, quod satium alio nomine in Dictamni descriptione uocat, duntaxat depingit. Syluestre autem secundam Calaminthæ speciem facit, quam Latini propriè Nepetam nominant, ut suo loco dicemus. *Satium Pulegium. Syluestre.*

FORMA.

Pulegium mas seu satium, cuius hic picturā damus, fruticosum affurgit, & ad cubiti altitudinem increfcit, maximè si sit quo sustentetur: folijs Sampfychi, surculis hirsutis, rubicantibus, & per interualla purpureo flore orbiculatim coronatis.

LOCVS.

Prouenit locis cultis & aquosis: semelq; satum diutina durat ætate.

TEMPVS.

Carpitur dum floribus prægnans est, id quod Iulio & Augusto mensib. accidit.

TEMPERAMENTVM.

Pulegium quum acre & subamarum sit, ualde tum excalefacit, tum extenuat, **B** ideoq; in tertio ordine calidum & siccum esse statuunt.

VIREs.

EX DIOSCORIDE.


Extenuat, calefacit, & cōcoquit. Potum menses, secundas, & fœtus trahit. Cum melle & aloë potum, ea quæ circa pulmonem sunt, educit, & conuulsis auxiliatur. Nauseas stomachiq; morsus cum posca potum lenit. Atram bilem per aluum educit. Cum uino potum uenenatorum morsibus succurrit. Defectos animo cum aceto naribus obiectum recreat. Siccatum & in puluerem tritum crematumq; gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflammationes omnes mitigat. Podagris per se confert usquedum rubescat cutis. Cum cerato uaros tollit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius pruriginis si eo lauantur sedat. Inflationes, duritias, & conuersiones uulvæ in defelsionibus iuuat.

EX GALENO.

Pulegium calefacere abunde magnum est testimonium, quod illitum rubrificat, & quod, si quis diutius toleret, exulceret. Extenuare uerò satis indicat, quum humida, crassa & lenta ex thorace & pulmone excreatu facilia faciat, mensesq; moueat.

EX PLINIO.

Magna societas cum Mentha, ad recreandos defectos animo, Pulegio cum surculis suis in ampullas uitreas aceti utrisque deiectis. Qua de causa dignior è Pulegio corona uertigini quàm è rosis, cubiculis nostris pronunciata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur leuare. Quin & olfactu capita tueri contra frigorum æstusq; iniuriam, & à siti traditur: neque æstuate eos qui duos è Pulegio surculos impositos auribus in sole habeant. Illinitur etiam in dolorib. cum polenta & aceto. Nauseas cum sale & polenta in frigida aqua pota inhibet. Sic & pectoris ac uentris dolorem. Stomachi autem ex aqua item rossiones sistit, & uomitiones cum aceto & polenta. Intestinorum uitia melle decocta & nitro sanat. Vrinam pellit ex uino, &



PVLEGIUM

Poley.

A si aminæum sit, & calculos, & interiores omnes dolores, ex melle & aceto sedat. Menstrua & secundas, uulvas conuersas corrigit, defunctos partus eijcit. Comitialibus in aceto cyathi mensura datur. Si aquæ insalubres bibendæ sunt, tritum inspergitur. Salitudines corporis si cum uino tradatur minuit. Neruorum causa & in contractione, cum sale, aceto & melle confricat opisthotono. Bibitur ad serpentium ictus decoctum. Ad scorpionum, in uino tritum, maximè quod in siccis nascitur. Ad oris exulcerationes, ad tussim efficax habetur. Flos recentis incensus, pulices necat odore. Xenocrates Pulegij ramum lana inuolutum, in tertianis ante accessionem olfactandum dari, aut stragulis subijci, & ita collocari ægrum, inter remedia tradit.

EX SYMEONE SETHI.

Pulegium attenuat & calfacit uehementer, quapropter humida & crassa in thorace, & in pulmone humida & glutinosa iuuat, & ut excreentur efficit. Cum uino albo coctum & potum, calidumq; syncerum menses prouocat. Extrinsecus illitum ischiadicis, & alijs partibus frigore affectis auxiliatur.

DE GENTIANA CAP. LXXIIII.

NOMINA.



ENTIANA græcè, Gentiana latinè appellatur. Nomen apud omnes officinas retinet. Germanicè *Enzian* / oder *Bitterwurz* nominatur. Sic à Gentio Illyriorum rege, qui in bello primus eius uires reperit, dicta est.

Gentiana
de dicta.

FORMA.

B Folia Gentianæ iuxta radicem erumpunt iuglandi aut Plantagini similia, subrubentia: sed quæ à medio caule, præsertim autem cacumine prodeunt, breuioribus incisuris secta sunt. Caulis illi inanis, leuis, digiti crassitudine, binum cubitorum altitudine, geniculis intersectus, ex maioribus interuallis folia proferens. Flores eius lutei primum calycibus conclusi, postea intumescens explicantur. Semen in calycibus obtinet latum, leue, glumofum, ad Spondilij semen accedens. Radicem mittit longam, similem Aristolochiæ longæ, crassam, & amaram.

LOCVS.

Nascitur in altissimis montium cacuminibus, umbrosis locis & aquosis. Plurima uerò & copiosissima sub Alpinis montibus in Illyrio, & in monte *Sarzenberg* haud procul à *Tubinga* sito.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimum mense, dein Iulio semen producit.


TEMPERAMENTVM.

Amaritudo immensa satis monstrat radicem eius esse calidam & siccam.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Gentianæ radix calefactoriam & adstringentem uim habet. Venenatorum moribus succurrit duarum drachmarum pondere cum pipere, ruta & uino pota. Succus drachma, laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis & cõuulsis opitulatur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita fcetus eijcit. Vulneraria est, imposita ut lycium, uulneribusq; sinuatim depascentibus, potissimum succus, medetur. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyrij acris miscetur succus. Radix alphas abstergit. Contusa radix diebus quinque aqua maceratur, postea in eadem decoquitur, dum aquæ radices superflent emineantur: deinde ubi refrixerit aqua linteolo percolatur, iterumq; decoquitur, dum mellis crassitiem contrahat; demum in uase testaceo reconditur.



GENTIANA
Cuzian.

EX GALENO.

Radix Gentianæ herbæ admodum efficax est quum opus est extenuatione, purgatione, absterfione, obstructionis liberatione, Nec mirum si hæc possit, quum in pensè amara sit.

EX PLINIO.

Vfus in radice & succo. Radicis natura est excafactoria, sed prægnantibus non bibenda. Præcipuè aduersus angues duabus drachmis cum pipere & ruta, uini cyathis sex, siue uiridis siue sicca pota prodest. Tanta huic uis est, ut iumentis etiam nõ tulsientibus modo, sed ilia quoq; trahentibus auxilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua pota. Farina eius ex aqua tepida fabæ magnitudine pota, interancorum uitij occurrat. Radix trita uel decocta, à ruptis, conuulsis, & ex alto deiectis potatur.

DE GLYCYSIDA CAP. LXXV.

NOMINA.



ΑΥΚΥΣΙΑΗ, ἡ παωνία Græcis, Pæonia & Casta herba Latinis dicitur. Nomē Pæoniæ in officinis seruat. Germanis Peonienblüm / Königsblüm / Sichterwürg / Benignenros / Venedischros / Benedictenros / Pfingstros uocatur. Glycysida porro dicta est, quod grana mali punici acinis similia habere uideatur. Nam sidia mali punici grana à Bæotis nominantur, Pæonia ab eius inuentore, medicinæ peritissimo, Pæone appellata est.

Glycysida una de dicta.

Pæonia cur dicta.

GENERA.

Duo eius genera sunt, mas & fcemina. Mas in uulgaribus herbarijs *Viniuenwurg* / fcemina uero *Peonienblüm* / alijsq; nominibus Germanicis paulò antè commemoratis nuncupatur. Idem, magno errore, Pæoniam à Pionia differre putant, atque adeo diuersis etiam capitibus, inò & uiribus distungunt. Ferendus tamen is error esset nisi utriq; etiam herbæ, hoc est, Pæoniæ & Pionie, duplex genus assignarent, marem nimirum & fceminam, cum tamen sub una Pæoniæ nomenclatura, utrunq; genus Dioscorides & alij ueteres complexi sint.

Error herbariorum.

FORMA.

Caulis duorum ferè dodrantū altitudine nascitur, multas propagines habens. Mas Iuglandi nuci folia similia obtinet: fcemina uero Smyrni modo diuisa. Summo caule siliquas quasdam Amygdalis similes profert, in quib. quum aperiantur, grana rubra, multa, exigua, punici mali acinis similia inueniuntur, in medio nigra, purpurea, quinq; aut sex. Radix maris digiti crassitudine, dodrantali uero longitudine, gustu adstringens, alba. Fceminae propagines sobole sue ceu glandes septem aut octo, ut Asphodelus habet. Ex qua siquidem descriptione abundè liquet, Pæoniam quæ passim in hortis nascitur, & cuius hic picturam damus, esse fceminam, quod eius folia Smyrni modo sint laciniata, & quod radix septem aut octo uel tri glandibus constet. Reliquæ notę, potissimum quod in siliquis grana alia rubentia, alia nigra sint, utriq; generi cōmunes existunt.

LOCVS.


Nascitur in altissimis montibus, & passim hodie, fcemina potissimum, in hortis prouenit.

TEMPVS.

Maiò floret mense.

TEMPERAMENTVM.

Pæonia radicem habet leuiter adstringentem cum quadam dulcedine. Si uero plusculum dentibus mandas, acrimoniã item quampiam subamaram subesse percipies, id quod in radice etiam nostratis Pæoniæ, quam fceminã esse diximus, apprehendes.



PAEONIA
FOEMINA.

Peoniensblüm.

hendes. Pæoniæ uerò in uniuersum temperamentum tenuium est partium, exicatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulò calidius.

VIREs.

EX DIOSCORIDE.


Datur radix mulieribus à partu non purgatis. Cit menses Amygdalæ magnitudine pota. Ventris doloribus cum uino pota auxiliatur. Regio morbo correptis prodest, renum ac uesicæ doloribus. Decocta in uino & pota, aluum sistit. Seminis grana rubra decem aut duodecim pota in uino austero, nigro, rubentem fluxionē sistit. Stomachicis & erosionibus comesta profunt. A pueris pota & comesta, initiã calculorū eximunt. Grana nigra nocturnis suppressionibus, ephialtas nominant, uulua strangulationibus, & uteri doloribus in aqua mulsa aut uino quindecim pota, opitulantur.

EX GALENO.

Radix Pæoniæ menses cit ex mulsa Amygdalæ quantitate pota. Sanè tundere eam oportet ac cribare, & sic inspergere. Expurgat etiam iecur obstructū & renes. Sed hæc efficere nata est quæ acris & subamara est, quæ uerò quiddam etiam adstrictorium obtinet, fluxiones uentris sistit. Oportet autem tunc in austerorum uinorum quopiam eam decoctam bibere. Est omnino resiccatoria uehementer, ut non desperauerim eam ex collo pueris suspensam, meritò comitalem morbum sanare. Equidem uidi puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, *Historia.* ex eo quo gestabat radicem tēpore. Vbi autē forte fortuna quod à collo suspensum erat decidisset, protinus morbo correptus est: rursusq̄ suspensio in illius locum alio, inculpatè postea se habuit. Visum uerò est mihi satius esse denuò id certioris experientiæ gratia detrahere, id quum fecissem, ac puer iterum esset cōuulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus. Rationabile itaque erat aut partes quaspiã à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, ita affectos locos curare, aut aërem à radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam phlegmone affectam iuuat, & Nigella fricta palàm destillationes & grauedines desiccet, si quis eam in calidum linteum rarum liget, assidueq̄ calorem ex ea per inspirationem quæ per nares fit, attrahat. Quinetiam si compluribus linis, maximè marinæ purpuræ, collo uiperæ inieceris, illis uiperam præfocaueris, eaq̄ postea cuiuspiam collo obuinceris, mirificè profuerit tum tonsillis, tum omnibus ijs quæ in collo expullulant.


EX PLINIO.

Pæonia medetur Faunorum in quiete ludibrijs. Rubra grana rubentes menses sistunt quindecim ferè pota in uino nigro. Nigra grana uuluis medentur, ex passo aut uino totidē pota. Radix omnes uentris dolores sedat in uino, aluumq̄ purgat. Sanat opisthotonum, morbum regium, renes, uesicam, Matricem autem & stomachum decocta in uino, aluumq̄ sistit. Estur etiam contra malum mentis, sed in medendo quatuor drachmæ satis sunt. Grana nigra auxiliantur & suppressionib. nocturnis in uino pota quo dictum est numero. Stomacho uerò & erosionibus, & esse ea & illinire prodest. Suppurationes quoq̄ discutuntur recentes nigro semine, ueteres rubro. Vtruncq̄ auxiliatur à serpente percussis, & pueris contra calculos incipiente stranguria.




GERANIUM
PRIMUM.

Storckenschnabel.



GERANIVM
ALTERVM.

Daubenfuß.



GERANIVM
TERTIVM.

Ruprechtskraut.



GERANIUM
QUARTUM.

Kranichhals.



GERANIVM
QVINTVM.


Sottis gnad.



GERANIVM
SEXTVM.

Blitwurz.

S 3



Descriptio ciconiæ.
Geranium ualde
cautum.



EPANION græcè, Geranium latinè, uulgo & herbarijs Rostrum ciconiæ appellatur. Geranium autem à gruini capitis imagine, quæ summo eius plantæ capitulo inest, Græcis aptissima similitudine dictum est. Sic recentioribus à ciconiæ rostri effigie, Rostrum ciconiæ nominatū est.

G E N E R A.

- Primum genus.* Duo Geranij Dioscorides tradit genera. Primum quod longioribus rostris, & in mucronem acuminatis constat. Hoc hodie officinis & herbarijs Acus pastoris & Muscata, Germanis uerò *Storckenschnabel* dicitur. Alterum quod maluæ folia habet, Pes columbinus uulgo nominatur. Sunt qui turpiter aberrantes, Amomū esse existimant. Germanicè *Taubensfuß*, oder *Scharrenkraut* appellatur. Præter hæc duo alia adiecimus genera, inter quæ id quod tertium ordine est, folijs Artemisiæ tenuifoliæ uel Chærephyllo simile existit, herba Roberti & Robertiana à nonnullis, haud dubiè à superstitione aliqua Diui, qua superior ætas mirificè imbuta fuit, appellatur, germanicè *Ruprechtskraut*. Quartum folia obtinens laciniata, germanicè pro certiori discrimine *Kranichhals* uocari potest. Quintum, quod folia Ranunculi habet, gratia Dei nominatur, germanicè *Gottes gnad* / ab insigni in sanandis uulneribus effectu. Sextum, quod forma quarto generi simillimum est, nec ferè ab illo nisi sola magnitudine foliorū, florum & radice distat, germanicè *Blätterwurz* / à rubro colore aut mirifica in sistendo sanguinis profluuio facultate uocatur.

F O R M A.

- Primi.* Geranium primum caules habet à radice rubentes, lanuginosos, folia Anemones, diuisuris incisa, flores purpureos, & in cacumine caulium fastigia capitulis ciconiæ aut gruum cum rostellis longitudine acus emicantia. Radicē oblongā & subrotundā dulcemq̃. *Secundi.* Alterū ut præcedēs caules tenues, rubentes à radice statim, lanuginososq̃ obtinet, folia maluæ similia, candidiora, flosculos subpurpureos, capitella gruini capitis modo rostrata, radicem tenuem & oblongam. *Tertij.* Tertium, caules habet à radice rubescentes, lanuginosos, geniculatos, saporis & odoris iniucundi, folia Chærephyllo aut Artemisiæ tenuifoliæ similia, flores purpureos, capitella gruini capitis modo rostrata, radicem intus uiridem, & adstringentem. *Quarti.* Quartum, cauliculos itidem ut reliqua rubentem, lanuginosum, folia laciniata admodū, flores purpureos, ex quibus capitella gruini capitis instar rostrata, & in ijs semina *Quinti.* quinque nascuntur: radicem intus candidam, extrā subluteam. Quintum reliqua omnia magnitudine excedit, caules emittit oblongos, rotundos, modicè lanuginosos, à radice statim rubentes, folia Ranunculo similia, flores ferè cæruleos, capitella præcedenti Geranio similia, radicem crassam & longam, multis exiguis radiculis ue *Sexti.* luti capillamentis quibusdam fibratā. Sextum ramos habet tenues, lanuginosos, folia laciniata, tenuia, flores in summo purpureos, ex quibus, ut in quarto, capitella gruini capitis formam referentia proueniunt. Radicem extrā & intus rufam.

L O C V S.

Omnia Geranij genera in incultis proueniūt. Primum passim in campestribus, & nonnunquam inter segetes nascitur. Alterum in colliculis. Tertium in umbrosis locis & dumetis. Quartum in agrorum limitibus, & iuxta sepes. Quintū in pratis. Sextum in locis montosis & saxosis.

T E M P V S.

Primū statim inter initia ueris Aprili mense flores suos ostendit, & subinde per integram ætatem. Alterum, tertium, & quartum, Maio mense florent. Quintum Iunio & Iulio mensibus, quemadmodum etiam sextum.

T E M P E R A M E N T V M.

Omniū folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis est, quodammodo, atquea-

atque adeò discutiendi ui prædita, adstringunt ac siccant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Geranij primi in uino drachmæ pondere pota, uteri inflationes discutit. Secundum nullum habet in medicina usum.

EX PAULO.

Geranium quod folijs respondet Anemones, radicem habet esculentã, quæ cum uino drachmæ unius pondere sumpta, uteri inflationes dissoluit. Altera Geranij species in re medica inutilis est.

EX PLINIO.

Primæ Geranij speciei radix, reficientibus se ab imbecillitate utilissîma. Bibitur contra phthisin drachma in uini cyathis tribus bis die. Item contra inflationes, quæ & cruda idem præstat. Succus radicis auribus medetur, Opisthotonicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum.

APPENDIX.

Et si secundum Geranij genus à Dioscoride alijsq; nõnullis, tanquam nullius in medicina usus damnatũ sit, tamen posterior ætas quotidiana experientia in sanandis uulneribus & fistulis, eius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit: proinde eas herbas his ipsis in potu mirificè cõferre tradunt. Et certè nõ mirum est eandem uires olim fuisse ignoratas, cum & aliarum multarum plantarum facultates, quas constat esse hodie notissimas, ueteribus fuisse incognitas, notius sit quàm ut demonstrari debeat. Antiquus quoq; herbarius, prædictorum Geraniorũ folia magnam uim obtinere in glutinandis uulneribus, & articularum doloribus leniendis tradit. Primi autem radicem mouendi urinam facultatem habere ait, ideoq; calculosis, stranguriæ & difficultati urinæ prodesse. Tertium genus ad oris, mammillarum, pudendorumq; ulcera sananda unice cõducit. Reliqua similiter ad glutinanda ulcera mirificè profunt. Nullum uerò ad sanguinem undecunq; emanantẽ compescendũ præstantius sexto est: unde etiam Germani, ut comprehensum est, *Blitwurz*; hoc est, sanguinariam radicem appellare uoluerunt.

DE GONGYLE. CAP. LXXVII.

NOMINA.



ΓΟΓΥΛΗ, ἡ γογγυλίς Græcis, Rapum Latinis & Officinis, Germanis *Rüben* appellatur. Græci autem à figura eius, quæ plerunq; rotunda esse solet, uocabulum detorserunt. Namq; quod in rotunditatem coactum est, uel in orbem circumagitur, *γογγύλιον* dixerunt. Rapa uerò, quod ex terræ rure, quasi ruapa, Varrone teste, nominata est.

Gongyle quare dicta.

γογγύλιον. Rapa uide.

GENERA.


Rapi duo sunt genera. Vnum fatiuũ, quod simpliciter Germani *Rüben* uocant. Estq; id iterum duũ generum. Vnum candidum, quod Germani etiam *weißrüben* uocant: & alterum rubrum, *rot rüben* idem appellant. Alterum syluestre, quod uulguſ Rapunculum, quasi paruũ rapum, Germani *Rapunzelin* nominant.

Rapunculus.

FORMA.

Rapum fatiuũ caule & folijs raphano simile est: floribus uerò & siliquis, in quibus semen profert, Napis aut Brasicis. Syluestre frutex est cubitali altitudine, ramofum, in summo leue, folia nimirum leuia habens, digitali latitudine, aut maiora. Semen in calyculatis fert siliquis: dehiscentib. uerò seminũ in uolucris, alia intus capitũ specie est siliqua, in qua semina parua nigra sunt, sed quæ fracta intus albicent. Flos eius in purpureũ uergit colorem. Radix digitalis ferè est. Quæ deliniatio prorsus alludit ad hanc herbam quam uulguſ Rapunculum nominat: siquidem cubitalis est, fruticosa, ramofa, folio digitali, nigro in siliquis semine, quod cum frangitur album intus apparet. Flos etiam purpurei coloris est, radixq; digiti magna ex parte magnitudine constat.

Syluestre rapũ.



RAPVM
SATIVVM.

Weißrüben.



RAPVM
RVBRVM.

Rotrüben.



RAPVM
SYLVESTRE.

Rapunzeln.

LOCVS.

Satiuum solum putre & solutum desiderat, Syluestre in aruis nascitur passim.

TEMPVS.

Satiuum rapum floret æstate, ac siliquatur subinde. Syluestre autem uerno quidem tempore priusquam in caulem attollitur, acetarijs frequenter inferi solet, erutum radicibus cum folijs suis iam recens enatis, quo sanè tempore à pueris etiam agnoscitur. Deinceps uerò exit in caulem & adolefcit, ac Iunio mense flores, ac subinde semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Rapa calida sunt in secundo ordine, & humida in primo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Satiui rapi elixa radix nutrit, inflat, carnem flaccidam generat, uenerem stimulat. Decocto eius podagræ ac perniones fouentur. Ipsa etiam radix trita illita prodest. Si uerò quispiam in excuata radice rosaceum ceratum feruenti cinere liquefecerit, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti eduntur ciendæ urinae accommodi. Semen in antidota & theriaca, præsertim quæ dolores mitigare possunt, aptè additur. Potum uenenis aduersatur. Venerem concitat. Muria conditum, comestum minus nutrit, sed appetentiam excitat. Syluestre rapum miscetur medicamentis quæ ad detergendam faciem reliquumq; corpus, ex lupinorum, aut tritici, aut lolij, aut erui farina conficiuntur.

EX GALENO.


Rapi semen uenerem excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic & radix concoctu difficilis est, inflatq; & semen generat. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: ideoq; si quis ultra modum esitauerit, & maximè si perfectè conficere eam nequeat, crudum succum in uenis congeret. Adalui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quando bene fuerit percocta, ut quæ longam elixationem requirat, optimaq; sit bis decoctionem perpessa. Sin crudior ingeratur, concoctioni pertinacius resistet, pariet inflationes, & stomachum infestabit, nõnunquam etiam mordere illum non uerebitur.

EX PLINIO.

Rapo uis medica inest. Perniones feruens impositum sanat. Item frigus pellit è pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum tusum cum sale cuiuscunq; uitio pedum. Semen illitum & potum in uino, cõtra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis uero antidoti uim habere in uino & oleo. Democritus in totum ipsum abdicauit in cibis propter inflationes. Dioscles magnis laudibus extulit, etiam uenerem stimulari ab eo professus. Item Dionysius: magisq; si eruca condiretur. Tosta quoque articulorum dolori cum adipe prodest. Syluestri ad leuigandã albicandãque cutem in facie totoq; corpore, utuntur, mixta urina pari mensura. Eius succus circa mensem exceptus, oculos purgat, medetur caligini admixto lacte mulierum.

EX SYMEONE SETHI.

Admodum nutriunt rapa, urinam ciunt, inflant, genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illorum usus crassum humorem generat, & obstructions iecoris parit. Ventrẽ nec sistunt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum & haustum magna copia, uenerem suscitatur. Fertur quod si quis hoc ipsum semẽ cum Calamintha & Lemnia terra cõmixtum sumat, eo die neque ueneno, neque morfu uenenati animalis lædi, Appensum inguinum morbis peculiari quapiam proprietate medetur.



GINGIDIVM

Herbelkraut.

NOMINA.



ΓΙΓΙΔΙΟΝ græcè, Gingidium latinè, officinis Chærefoliū, Germanicè *Chærefolium.*
 Kerbeltraut dicitur. Chærefolium autem, græca uoce & latina coale- *Chærefoliū un-*
 ſcentibus in unum nomen, ob id dictum eſt, quod folijs luxuriet. Ne ta- *de dictum.*
 men uocabulorum uicinitas aliquam pariat cōſuſionem, imperitoq; le-
 ctori nomenclationū ſimilitudo imponat, ſciendum eſt officinarum Chærefolium
 diuerſum eſſe à Chærefolio Pliniū.

FORMA.

Herba eſt ſylueſtri Paſtinacæ ſimilis, tenuior tantum & amarior. Radicula ſub-
 candida, amaricante. Vnde ſatis liquet herbam quam hodie Chærefolium nomi-
 nant, eſſe Gingidiū. Nam erraticæ Paſtinacæ folium æmulatur, aliquanto tenuius,
 radicula ſubalba, amaricante, floribus candidis, ſemine in ſiliquis exiguis oblongo,
 anguſto & acuminato.

LOCVS.

Pæſſim hodie in hortis colitur.

TEMPVS.

Maiο mēſe floret, & ſubinde ſemen profert.

TEMPERAMENTVM.

Sicut guſtu amaritudinem & adſtrictionem præfert, ſic temperamento quoque
 ipſo caliditatem & frigiditatem. Secundum uerò utranq; qualitatem deſiccatoriū
 in ſecundo ordine eſt: unde iterum colligi poteſt, Chærefolium eſſe Gingidium,
 quod ipſum guſtui amarorem & adſtrictionem euidentiffimè repræſentet.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Crudum & coctum olerum modo eſui idoneum eſt. Editur etiam ſale cōditum
 ſeruatumue. Stomacho utile. Vrinam ciet. Decoctum eius cum uino potum, ueſi-
 cæ accommodum eſt.

EX GALENO.

Eſtur Scandicis modo. Stomacho mirè utile ſiue crudum, ſiue elixum libeat ſu-
 mere. Longioris decoctionis impatiens eſt. Nōnulli ipſum ex garo oleoq; eſitant.
 Alij uinum aut acetū adijciunt, ac multo ſic magis ſtomacho conducit. Cum aceto
 aſſumptum, faſtidioſos ad cibum inuitat. Perſpicuum uerò eſt hanc herbam medi-
 camentum magis eſſe quàm cibum, quippe quæ & adſtrictionis & amaritudinis
 non obſcuræ nec exiguæ particeps eſt.

EX PLINIO.

Coctum crudumq; ſtomachi magna utilitate eſtur. Siccat enim ex alto omnes
 humores eius.

APPENDIX.

Facultates iam cōmemoratas etiam Chærefolio ſuo tribuunt recentiores: ſcri-
 bunt enim mirificè conferre uentriculo, ciendisq; menſibus, & urinę in uino deco-
 ctum, ut iterum hinc conſtet à Gingidio non eſſe diuerſum.



GENISTA

Sinft.

NOMINA.

GENISTA Latinis rei rusticæ scriptoribus & Plinio nominatur. Officinis & barbaram sectantibus medicinam, Genesta & Genestra. Germanis *Ginsst* uel *Genist* appellat. Genistam autem uocant haud dubie quod genu modo flexilis ad nexus sit: uel, ut alijs placet, quia genibus medetur dolentibus. Alia autem est à Sparto, quod hoc uirgas habeat longas sine folijs, ut suo dicemus loco, illa autem minutis folijs scetet.

Genesta
Genista unde dicta.

Genista non est eadē cū Sparto.

FORMA.

Genista fruticat ramis herbaceis, scabris, folijs minutis scatentibus, flore luteo, apibusq; gratissimo, semine lenticulis haud ab simili, quod siliquis innascitur, radice sublutea.

LOCVS.

Perarida loca amat, ideoq; in syluis, & iuxta syluas nascitur.

TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mense, ac subinde in siliquis hirsutis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur in altero ordine, id quod amaritudo quā gustata refert, & eius facultates abunde docent.

VIRES. EX PLINIO.

Semen Genestæ purgat Ellebori uice, drachma & dimidia pota in aquæ mulsæ cyathis quatuor ieiunis. Ramis similiter cum fronde in aceto maceratis pluribus diebus & tuis, succum dant ischiadicis utilem, cyathi unius potu. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere clystere. Perunguntur eodem succo ischiadici, addito oleo. Quidam ad stranguriā utuntur semine. Genista tusa cum axungia, genua dolentia sanat.

APPENDIX.

Ex iam commemoratis uerbis perspicuum omnibus sit, Sparto & Genistæ, non obstante quod forma non nihil distent, eandem inesse facultatem: ut enim Spartum pituitam per superna & inferna purgare potest, sic etiā Genista. Hinc adeo sit ut eius feminis hodierno tempore contra podagram magnus sit usus. Vrinam etiam amaritudinis ratione mouet, & quia incidendi & extenuandi facultatem habet, lapidem tum in renibus, tum in uesica cōfringere, ut etiam recentiores tradunt, potest. Strumas denique atq; alios tumores discutere posse hōdem scribunt.

DE GENISTELLA ▶ CAP ▶ LXXX ▶

NOMINA.

PRIORI non admodum dissimilem herbam nonnulli Genistellam uocant, quod scilicet Genista exilior & humilior sit. Germanicè appellari potest, die *stechende Ginst*. Alij uocant *Erdsfrymen* / oder *klein streich-blumen*. Sunt qui non sine magno errore pro Genista utantur, quum facultatibus diuersis prædita sit. Sunt qui Rosmarinum aculeatum nominent, quod eius folia Rosmarino ferè similia sint.

Genistella.

Rosmarinus aculeatus.

FORMA.

Frutex est Libanotidis coronariæ, quam Rosmarinum uocant, penè folio, sed rigido ac pungente, flore luteo, pisco non dissimili, semine in exiguis siliquis rufo, radice sublutea.

LOCVS.

Nascitur in arenosis locis, secus uias.

T 2

TEMPVS.



GENISTELLA

Stechende Sinst.



TEMPVS.

Maiō mense flores luteos producit, quibus pastæ apes improbū mel conficiunt.

TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, si- mulq; citra mordacitatem exiccantem.

VIRES.

Semen eius serpētib; aduersari tradunt. Decoctum foliorum, profluuiū men- struorum sistit. Idem etiam potum uentris fluori succurrit. Et ut rem in pauca con- traham, idem Genistella quod Hippuris seu Cauda equina potest.

DE GNAPHALIO CAP. LXXXI

NOMINA.



ΓΝΑΦΑΛΙΟΝ Græcis, Centunculum aut Centuncularis herba Latinis nominat. Officinis ignota. Germanis *Ährtrant* appellat. Gnaphaliū uerò uocata est hæc herba, Galeno autore, à candidis mollibusq; eius fo- lijs, quibus *αὐτῆ γναφάλοιον*, hoc est, pro tomentis utuntur. Gnaphalion ita- que dicitur, quasi tomentitia. Centunculum autem dixerūt, quod centonibus cum tomento maxima sit cognatio. Germanicam nomenclaturam ab eius facultate ad- uersus dysenteriam illi inditam esse nemini non notum est.

Centunculum.
Centuncularis
herba.
Gnaphaliū qua
re dicitur.
Centunculus cuius
uocata.

GENERA.

Duū esse uidetur generum: unum enim paulò latioribus ac candidioribus fo- lijs constat: alterum uerò tenuioribus & minus candidis, quodq; flores in summi- tate ac cacumine tantum profert. Verum cum forma parum admodum, facultati- bus uerò nihil distent, nos una pictura genus utrunq; complexi sumus.

FORMA.

Candida & mollia Gnaphalium obtinet folia, atque adeò tomentitia, floresq; lu- teos, radicem uero capillatam ac tenuem, ut pictura ipsa monstrat.

LOCVS.

Vulgaris herba ubiq; scatens Gnaphalium, in locis siccis potissimum, interdum etiam pinguib; proueniens.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Adstringit atque adeò exiccet Gnaphalium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Gnaphalij folijs aliqui pro tomento utuntur, Tamen faciunt hæc ipsa in austero uino pota ad dysenteriam.

EX GALENO.

Folia Gnaphalij mediocriter adstringunt, ac proinde quidam id exhibent ex au- sterorum uinorum quopiam dysentericis.

EX PLINIO.

Datur in uino austero ad dysenteriam, uentris solutiones, mensesq; mulierum sistit. Infunditur autem tenasmo. Illinitur & putrescentibus ulcerum.



GNAPHALIVM

Rhürkraut.

NOMINA.



ΙΡΣΑΚΟΣ Græcis, Labrū ueneris, Carduus ueneris Latinis, Virga pastoris officinis, & Cardio fullonum dicitur. Germanis Katrendistel, Bībienstrel, Weberkarter. Dipfacci autē nomen à contrario inuenit, quoniam concauo alarum sinu rorem uel imbrem recipiat, quo uelut ad abigendas sitis iniurias abutitur. Labri ueneris nomenclationē à carinato foliorum habitu contraxit, quæ se anfractuosa sinuantia ambage, peluis uel lauacri speciem cōstituunt, & intra se humorē nunquam nō retinent. Virga pastoris haud dubiè dicta est, ob longas uirgas, quibus cardui ad poliendos pannos utiles insident, quas pastores fortè sumunt, & ea parte qua possit manu capi aculeis nudant, reliqua autem aculeata parte gregem ducunt. Carduus uerò fullonius cœpit appellari, quod ea rudes pannos uelut echino quodam expoliunt, detractisq; floccis concinnant. Errat mirum in modum Serapionis interpres, qui sub Virgæ pastoris nomine, Polygonon Dioscoridis deliniat.

Virga pastoris.
Dipfacci unde dicta.
Labrum ueneris
Virga pastoris.
Carduus fullonius.
Serapionis interpres perstringitur.

GENERA.

Duū est generum. Vnum quod à fullonibus in hortis plantatur, alterū quod sua sponte passim prouenit. Differunt inter se hac quidem ratione, quod primum folia latiora & profundius in ambitu incisa, flores candidos, echinataq; capitula magis aculeata habeat: alterum contrā angustiora & minus laciniata folia, flores purpureos, capitulaq; minus aculeata obtinet. Nos discriminis illius rationem habentes, primi generis appellauimus Dipfacum album, alterius uerò Dipfacum purpureum, ad florum nimirum respicientes diuersitatem.

FORMA.


Aculeatarum generis est hæc herba. Caulem habet altum, spinis horrentē, folia caulem amplectentia, lactuæ similia, in singulis geniculis bina, oblonga, aculeis armata, quæ in dorsi medio ueluti bullas intus & extrā spinosas habent, cōcauo quo se in geniculis cōiungunt sinu, quo aquæ, rores, & imbres asseruantur, unde Dipfacci quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singulis furculis capitulū unum echino simile inest, oblongum, aculeatum, quod postquam exaruerit candidū apparet. Dissectū per mediā medullam caput, uermiculos habet. Quod si itaq; contempleris eam quam herbarij hodie Virgā pastoris & Carduum fullonū nomināt herbam, offendes omnes huic notas respondere. Si quidem hæc pastoris uirga profert caulem binū cubitorū, imò qui sæpiusculè supra hominis altitudinē increscat, spinis horridum, geniculatū, folia lactuæ, in singulis geniculis bina, prælonga, aculeata, quorum toruli bullantibus turgent spinis, dorsoq; nocentibus aculeis rigent, carinato alarū sinu, qui peluis uel labri modo roris & imbris pluuij capax sit. Gnarræ laticis huius auiculæ, cum solis ardentissimus opprimit æstus, huc appelluntur ad satienda sitis desideria, illis facta bibendi potestate anfractu liberalem potum ministrante. Scaporum fastigia echinato minantur uertice, resupina hamulorū flexura, mucronibusq; leuiter uncinatis, quibus rude lanificiū aspero ductu læuigatur. Singuli echini è rotundo in oblongum quod antenus turbinantur, inter quorum spicula candicans aut purpureus emicat flos. His dissectis in medullo uermiculos identidem nobis in autumno quum exiccari incipit licet inuenire. Vermiculus autem albus est, qui per cavitatem echini dimouetur, & in caudicem transit. Hyeme etiam eundem uidere licebit antequam præ frigore moriatur. Imò etiam ueris initio in quibusdam uermiculi à nobis reperti sunt, partim uiui, partim mortui.

Vermiculi in echinis Dipfacci inueni.



DIPSACVS
ALBVS.

Weiß kartendistel.



DIPSACVS
PURPUREVS.

Braun Kartensichel.

C

LOCVS.

Nascitur humectis locis, iuxta riuos aquarum & fontes: quapropter nonnulli Dipfacon à Græcis nominatum esse arbitrantur.

TEMPVS.

Carpitur in æstate, Junio & Iulio potissimum mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Dipfaci spinæ radix ex secundo ordine exiccantium est, habetq; nonnihil absterforium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius radix cum uino decocta & tusa usq; dum cerati crassitudinē accipiat, imposita rimas fistulasq; sedis sanat. Oportet autem medicamentum hoc ærea pixide recondere. Ferunt præterea formicis & uerrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi & collo aut brachio appensi, quartanas sanare pro duntur.

EX PLINIO.

Sanat rimas sedis, item fistulas decocta in uino radice usq; dum sit crassitudo ceræ, ut possit in fistulam mitti. Item uerrucas omnium generū. Quidam & alarum, quas modo diximus, succum ipsi illinunt.

APPENDIX.

Aliæ facultates quæ à Serapionis interprete & alijs recentioribus illi conceduntur non sunt genuinæ, sed spurix, & Polygono adscribendæ.

DE DAPHNOIDE CAP. LXXXIII.

NOMINA.

D

Laureola.

Daphnoides un
de dicta.

ΔΑΦΝΟΙΔΕΣ græcè, Daphnoides latinè nominatur. Officinis & nostræ ætatis herbarijs, græcam imitantibus uocem, Laureola. Germanis zeidelpast / & zeidelpast nuncupatur. Daphnoides autem & Laureola, à Lauri forma & specie, quam in folijs & fructu refert, dicta est.

FORMA.

Frutex est cubitalis, ramos complures habēs lori instar flexiles, à medio sursum uersus foliosos. Cortex ramos uestiens admodum glutinosus lentusue est. Folia Lauro similia, molliora tamen, tenuiora, nec facile fragilia, os & fauces erodentia, incendentiq;. Flores candidi. Fructus ubi ematuruerit subniger, Radix inutilis. Que in uniuersum omnes notæ Laureolę hodie dictæ cõueniunt. Nec obstat quod Dioscorides suę Daphnoidi candidos tribuat flores, cum Laureola purpurascens potius habeat: solet enim color secundū diuersas regiones in eadem sæpè herba mutari, ut fustus in Symphyto maiore dicemus. Et certè nihil incõmodi erit si etiã Laureolæ flores quispiam candidos dixerit, cum albi coloris non minor quàm purpurei in ipsi portio reliceat. Verisimile quoq; est Dioscoridem ab extremo potius colore, quàm medio flores appellare uoluisse.

Objectionis dis
solutio.

LOCVS.

Nascitur in montanis & syluestribus locis.

TEMPVS.

Floret primo statim uere anteq; folia erumpunt. Fructū autē autumnoprofert.


TEMPERAMENTVM.

Calida est admodum & sicca.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Ducit per inferna pituitosa siccum aut recens Daphnoidis folium. Vomitus & mensēs cit. Cõmanducatum capitis pituitas elicit. Sternutamenta itidem mouet. Purgant etiam feminis eius pota grana quindecim.

EX PLI-



DAPHNOIDES

Zeilant.

C

EX PLINIO.

Daphnoides siue syluestris laurus aluum soluit, recenti folio uel arido drachmis tribus cum sale & hydromelite manducata, Pituitas extrahit foliū & uomitus, Stomacho inutile, Sic & baccae quinae denaue purgationis causa sumuntur,

APPENDIX.

officinarum
error.

Thymelæa non
est laureola.

Animaduertendū hoc loco mirum in modum errare officinas, propterea quod folijs Daphnoidis pro Mezereon, quæ tamen grecorum est Chamelæa diuersa ad modum a Daphnoide, utantur; & eius fructu pro cocco cnidio, quod fructum Thy melæ esse notius est quàm ut demonstrari debeat. Sic in manifestissimis cæcutire solent officinæ, pulchrè interim ad eos errores conuiuentibus medicis, non minus quàm illi rei herbariæ imperitis. Thymelæan uerò non esse laureolam hodie appellatam herbam, ex eo colligi potest, quod hæc ipsa, Dioscoride autore, linum nōnullis nominata sit, non alia quidem ratione, quàm quod satiui lini similitudinem referat, cui quàm dissimilis laureola sit, nemo non nouit. Sunt etiam qui ad hanc similitudinem respicientes, in hodiernum usque diem linum syluestre appellant.

DE DRYI CAP. LXXXIIII.

NOMINA.



QVÆ Græcis, Quercus Latinis & Officinis, Germanis Eychenbaum appellatur.

FORMA.

Notissima est arbor Quercus, procera, crassiore & asperiore caudice, ramosa, folijs profundè laciniatis, Glandes producit optimas, & grandissimas, gal-
D las item & uiscum. Radix eius latissimè circumiacentem terram amplectitur.

LOCVS.

Passim in syluis alijsq; locis nascitur.

TEMPVS.


Vere quidem germinat, sed tardius multis alijs arboribus.

TEMPERAMENTVM.

Deficcac, adstringit & excafcac paulò infra media, in genere scilicet eorum quæ tepida sunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Quercus omnis adstrictoriam facultatē habet, præsertim id quod inter corticem & caudicem membranæ simile clauditur; quinetiam membrana putamini glandis subiecta. Decoctū ex ijs datur dysentericis & sanguinè excreantibus, & in pel-
sis tritum contra fluxiones mulierum apponitur. Glandes idem possunt. Vrinam
ciunt, capitis dolorem, & flatus comestæ pariunt. Resistunt esitatae uenenatorum
ictibus. Decoctum corticis cum lacte bubulo potum, contra toxica prodest. Cru-
dæ autem tritæ & illitæ inflammationes leniunt. Ad malignas duritias, & malefica
ulcera cum adipe suillo falso cōueniunt. Galla fructus est quercus. Aliqua ompha-
citis appellatur, parua quidem, præ se ferens formam in digitis articularum, solida,
nullo foramine peruia. Altera leuis, plana, perforata. Eligi debet omphacitis quæ
efficacior est. Vtraq; uehementer adstringit. Carniū excrementas tritæ, fluxiones
gingiuarū & columellæ, atq; in ore aphthas reprimunt. Nucleus earum cauernis
dentium inditus, dolores sedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent, & uino
aut aceto, aut oxalme extinctæ, sanguinem reprimunt. Decoctum earum ad infes-
sus utile, contra uuluae procidentias, fluxionesq;. Capillos denigrat aceto aut aqua
maceratæ. Celiacis, dysentericis, cum uino aut aqua trita conuenienter illinuntur
aut bibuntur. Vtiles & obsonijs mixtæ, aut integræ in aqua præcoctæ, in qua ali-
quid co-



QVERCVS

Eichbaum.

V

c quid coquendum sit quod ipsis cōferat. In summa, galla utendum quoties opus est adstrictione & exiccatione.

EX GALENO.

Quercus omnes partes adstrictoriae facultatis participes sunt. Sed plus tamē que in trunci cortice membrana subest, tum que sub glandis putamine, ea uidelicet que fructus carnem conuestit. Quamobrē ad fluxum muliebrem, sanguinis expuitiones, uentrisq; diurnos fluxus, cōmodam esse credunt. Maximē uerō ea utunt de-cocta. Siquidem ego quandoq; glutinasse me uulnus memini securi inflictū, quum nullum ad manum esset medicamentū prāter ipsius Quercus folia. Terebam uerō in leui saxo, & uulnus cum circumiacentibus locis illinebam. Eandem folijs uim habet & fructus Quercus, eoq; medici nōnulli ad incipientes, & crescentes phlegmonas utuntur. Nam quæ iam uehementes sunt, adstringentibus haud indigent. Galla quæ omphacitis nuncupatur, admodum acerbum est medicamentū, plurimum terrenæ & frigidę substantię particeps, per quam desiccatur & reprimat fluxiones: ad hęc constringit contrahitq; partes laxas ac languidas, omnibusq; fluxionū affectibus strenuē resistit. Esto uerō tertij in desiccando, secundi autem in refrigerādo ordinis. Altera autem galla, flaua, laxa, & magna, exiccatur quidem etiam ipsa, sed tanto, quanto acerbæ qualitatis minus est particeps. Cocta itaq; ipsa per se, ac deinde trita cataplasmata non instrenuum est sedis phlegmonarū, ac prociuentiarum. Porrō coquenda est in aqua, si modica opus sit adstrictione: sin uehementiore in uino. Et si augere in super adstrictionem sit opus, uino etiam utare austeriore. Deniq; gallæ combustæ sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex uisione assumunt, suntq; ijs quæ ignem non expertæ fuerint, tum subtiliorum partiū, tum maiore desiccandi potestate. Ceterum quum ad sanguinis suppressionem præparare eas uoles, carbonibus impositas dum undequaq; candeat, aceto aut uino extinguere oportebit.

vsta acrimoniā
assumunt.

D

EX SYMEONE SETHI.

Glandes difficilis sunt coctionis, & ualde nutriūt, tardius descendunt, crudosq; humores generant, proptereaq; illarum usum deuitari præcipimus.

DE DAUCO CAP. LXXXV.

NOMINA.



ΔΑΥΚΟΣ græcē, Daucus latinē nominatur. Officinæ alijs & adulterinis herbis sub hoc nomine utuntur. Germanicas appellationes in generū explicatione indicabimus.

GENERA.

Diolcorides tria Dauci cōmemorat genera. Primum Creticum daucum uocat. Berwurß Germanis Berwurß, propter capillatam radicem, aut quia uteri dolorem, qui h̄c dem Berm̄ter appellatur, sanat. Alterum nomine peculiari caret, folijs Laserpitio simile, Germanis weiß Dirswurß dicitur. Tertium genus itidem nomine destituitur proprio, Germanis autem nonnullis schwarze Dirswurß nominatur.

FORMA.


Creticus daucus


Creticus daucus folia Fœniculo similia habet, minora tamē & tenuiora. Caulem dodrantalem, umbellam Coriandro similem. Flores candidos, & post hos semen acre, candidum, hirsutum, & in cōmanducando odoratum. Radicem crassitudine digitali, & longitudine dodrantali. Omnes huius descriptionis notę, herbæ quam Berwurß Germani uocant conuenire ad unguem uidentur, una duntaxat excepta: siquidem semen non est hirsutum. Sed quum omnia alia, atque adeo facultates etiam ipsę respondeāt, nō est cur una hæc nota nos impediatur, cur minus Creticū daucum credamus, aut saltem Germanicū qui Cretico per omnia respondeat. Vel si prorsus alicui non satisfaciunt, quæ diximus, dicat planē hanc herbam esse Sefeli Creticum,

DAUCVS
CRETICVS.

Wurzel.


V 2





DAVCI
ALTERVM GENVS.

Weiß hirtzwurz.



DAVCI
TERTIVM GENVS.

Schwartz hirtzwurtz.

- c Creticum, cuius etiam herbæ notæ omnes huic nostræ cōueniunt, neq̃ etiam facultates quas similes Dauco cretico habet, discrepāt. Alterum Apio syluestri, uel, ut antea diximus, Lasepfitio simile est: aromatū modo odoratum, acre, gustanti odoratum & feruens. Tertiū folijs Coriandro asimilatur, flore candido, capite & semine Anethi, in quo umbella erraticæ Pastinacæ similis est, semine oblongo plenum, sapore ut Cuminum acri.

LOCVS.

Primum in petrosis & apricis locis nascitur, nusquam uerò in Germania copiosius quàm in Martianæ syluæ quibusdam pratis prouenit. Reliqua duo genera in altis montibus gignuntur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent.

TEMPERAMENTVM.

Semen Dauci admodum calefacit & exiccat. Idem etiam, sed minori efficacia, facit herba.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium Daucorum semen calefaciendū uim obtinet. Potum menses, fœtus, & urinas mouet. Torminibus liberat. Tusses diutinas lenit. Succurrit phalangiorum morsibus cum uino potum. Oedemata illitum discutit. Ex alijs feminis tantū usus est, ex Cretico radicis etiam, quæ cum uino præsertim ad uenenata bibitur.

EX GALENO.

- Dauci semen efficax admodum tum uendæ urinæ medicamentū, tum pro-uocandis mensibus. Multum etiam discutere foris impositum ualet. Ipsa etiam herba eandem uim obtinet, semine tamen inferiorem, nimirum ob aqueæ humiditatis misturam.


EX PLINIO.

Vehementer urinam impellit. Creticum magis contra serpentes pollet. Bibitur è uino drachma una, datur & quadrupedibus percussis, aduersatur phalangio, capitis dolori medetur, tussi subuenit, stranguriæ medetur drachma feminis. Eius radix in uino pota, dysenteriam sistit. Contulsis & euersis potū duobus obolis in mulsi cyathis tribus subuenit, aut si febris adsit in aqua mulsa. Menses & secundas potum facillimè pellit. Calculos eijcit. Folia omnia tela infixæ corpori extrahunt.

DE DRACONTIO MAGNO CAP. LXXXVI.

NOMINA.


Serpentaria maior.
Dracunculus uir de dicta.
Colubrina.



PAKONTIA *μεγαλη, η δρακωντιου μεγα* Græcis, Dracunculus maior Latinis, nonnullis Serpentaria maior dicitur. Officinis ignota herba. Germani Schlangentraut uocant. Nomen autem à figura sumpsit: caulis enim glaber, purpureisq̃ respersus lituris, uersicolori facie, corpus anguinum representat & æquat longitudine. Vertex quoque sinuoso oris hiatu linguam exerens cruentam, caput exprimit. Atque hinc est quod ueteribus etiam Romanis Colubrina ac Serpentaria nuncupata sit: uel sic dicta, Plinio autore, quod è terra ad primas serpentium uernationes exeat, rursusq̃ cum hisdem se in terram recondat, nec omnino occultata ea appareat serpens.

FORMA.

Caulē habet glabrū læuumq̃, rectū, bicubitālē, baculi crassitudine, uersicolorē, ut angui similis uideat̃, purpureis etiā maculis abundat. Folia fert Rumicis inflexa, & plicata. Fructū in summo caule racemosum, coloris inter initia cineracei, postea q̃ maturuit crocei & punicei. Radicē grandē, rotundā, candidā, tenui cortice uestitā. Ex qua deliniatione omnib. perspicuū sit, plantā eam cuius picturā exhibemus, esse Dracunculū maiorē. Simplici enim caule attollit̃, binū cubitūm alto, leui glabrōue, recto, baculi crassitudine, uersicolorib, anguiū maculis uariiegato, purpureis etiā intercur-



DRACUNCVLVS

Schlangenkraut.

V 4

c intercurrantibus, lituris, ita ut planè serpentis habitum coloremq; mentiri uideatur. In uertice comoso folia prodeunt senu septenauè, crassiore pediculo digitorū modo propendentia, puniceis resperfa notis, Rumicis primi generis figura. E foliato scapi fastigio, uagina quædam foris herbacea profilit, in mucronem sensim turbinata, uelut erupturi partus inuolucrum, quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea feminis incremento distenta disilit in rimam, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensq; perit relicto cornu. Cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis primo uirentibus, dein croceo & puniceo colore rutilantibus. Radix denique magna, rotunda, alba, tenuiq; cortice uestita. Et in summa, nulla est prorsus nota, quæ reclamare uideatur.

LOCVS.

Nascitur in opacis sepibus.

TEMPVS.

Carpitur semen cum maturitate nigrescit. Radix per messem effoditur, hoc est, Iulio mense, aut initio Augusti.

TEMPERAMENTVM.

Dracunculus acris & amarus est, leuiculamq; quandam adstrictionem habet, ut calidam & siccam esse nullus dubitare possit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix calefaciendi uim obtinet. Tosta & elixa cum melle delincta orthopnoicis, ruptis, conuulsis, tussibus, & destillationibus prodest. Pota cum uino uenerem stimulat. Concisa & ex melle illita, ulcera maligna atq; phagedænica expurgat, præsertim cum uite alba. Ex ea & melle collyria ad fistulas, & scetus euocandos componuntur. Ad uitiligines cum melle efficaciter illinitur. Polypos & carcinomata abstrahit. Succus eius ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, albugines, caliginemq; utilis est. Odor herbæ radicisq;, recens cõceptos abortu uitiat. Idem præstant triginta grana eius in posca pota. Sunt qui eius succum cum oleo aurium doloribus infudere. Quinetiã folia eius, utpote adstringentia, uulneribus recentibus imposuere, in uino autem cocta pernionibus. Ferunt non feriri à uiperis eos qui folia manibus affricuerint, aut radicem gestauerint.

EX GALENO.

Dracuntium quiddam Aro per similem habet, tum folijs, tum radice. Acere etiam est & amarum, tenuiumq; partium. Obtinet quoque leuem quandam adstrictionem, quæ quandoquidem cum prædictis duabus qualitatibus, acris scilicet & amara, coniuncta est, medicamentum factum est, ut quæ maximè efficax. Nam radix uiscera omnia expurgat, crassos potissimū & lentos humores extenuas. Optimumq; remedium est contumaciū ulcerum, Expurgat extergetq; strenuè tum alia quæ extersionem desiderant, tum alphas cum aceto. Folia quoque, utpote similem facultatem habentia, ulceribus, uulneribusq; recens inflictis accommodata sunt, & quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant; nam quæ sicciora sunt, uiribus sunt acrioribus quàm ut uulneribus cõueniant. Creditum est caseum humidū si illis foris tectus reponatur, ob temperaturæ illorum siccitatē, à putredine cõseruari. Fructus ualentior est, nō folijs tantum, sed & radice: proinde & caneros, & polypodas eliquare creditus est. Succus quoq; eius uitia oculorum expurgat. Dracontij radicem bis teruè elixam, quo omnem exuat medicamentosam uim, in cibo interdum Ari modo exhibemus, quum crassi ac glutinosi thoracem pulmonemq; infestantes humores fortiore ui expellendi ueniunt.

EX PLINIO.

Omnino habentē Dracunculū serpentes fugiunt. Ideo percussis prodesse in potu maiore aiunt: ut & menses, si ferro non attingatur, sistat. Succus eius & aurium dolori prodest. Reliquas facultates in Ari descriptione offendes. Vident enim ueteres Arum cum Dracunculo minori miscuisse.

APPENDIX.

A Hæc est uera Serpentaria quæ officinis utendum erit, & minimè ea quam alio nomine Bistortam uocant. Nam uiribus planè ab ea quæ genuina est dissidet, ut suo etiã loco monuimus. Quare non est cur deinceps eandem medicamentis quæ thoraci expurgando adhibentur admisceantur medici, sed hanc potius, cuius picturam oculis subiecinus,

DE DAPHNE ALEXANDRINA

CAP. LXXXVII.

NOMINA.



AΦΝΗ ἀλεξανδρῖνα, ἢ ἰδαία Græcis: Laurus Alexandrina, aut Idæa Latini, officinis Vuularia, nonnullis Bonifacia, multis etiã Pagana lingua, Germanis *zäpflin* aut *hauchblatt* & *auffenblatt* dicitur. Theophrastus appellat *ἐπιφυλλοκάρου*, quod fructum super folijs ferat. Alexandri

vuularia.

Epiphyllocarpos.

Alexandrina

laurus cur dicta

Victoriala.

Idæa.

nam autem laurum dictam putamus, quod Alexander uictor ea usus fuerit. Hinc est quod Apuleius hanc Victorialam nominet, quod nimirũ uictores ea pro Lauro in triumphũ & uictoriæ signum uterentur: quanquam in eo capite Daphnoïda cum Victoriala confundat, Idæa uerò ab Ida monte, quo in loco speciosior & copiosior nascatur.

FORMA.

B Folia Rufco seu Myrto syluestri similia habet, maiora tamen, molliora & candidiora. Fructum in medijs folijs fert rubentem, Ciceris magnitudine. Ramos spargit à terra dodrantales, & aliquãdo ampliores. Radicem Rufco similem, maiorem tamen, odoratam, & molliorem. Ex qua sanè deliniatione satis perspicuum fit, eam herbam cuius picturam damus, esse Laurum Alexandrinã. Folio siquidem Myrti syluestris, sed ut Plinius lib. xv. cap. xxx. ait, acutiore, molliore, & candidiore, fructu inter folia rubro, magnitudine Ciceris, ramulis à terra sparsis dodrantalibus, radice syluestri, Myrto proxima, odorata & molli.

LOCVS.

Nascitur in locis montanis, & in Ida monte, ut cõprehensum est, speciosissima. Nunc adfertur ex inferiore Pannonia, atq; in nonnullis hortis plantata prouenit.

TEMPVS.

Fructum in æstate in mediõ folij, in geniculo alterius folij quod maiori supernascitur, profert.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod gustus euidenter monstrat. Siquidem gustantibus acris simul & subamara est.

VIRE.

EX DIOSCORIDE.

Radix eius pota pondere senum drachmarũ cum dulci uino, difficulter parientibus, & stillicidij urinæ laborantibus succurrit. Sanguinem quoq; menstrui elicit.

EX GALENO.

Pota tum urinas, tum menses prolicat.

EX PLINIO.

Celeres partus facit, radice pota trium denariõũ pondere, in uini dulci cyathis tribus. Secundas etiã pellit mensesq; eodem modo pota.

APPENDIX.

Recentiores in fauciuũ ulceribus, & humecta supra modum columella utuntur. Hinc est quod nonnulli appendant hanc herbam pueris, ut nimia illorum humiditas exicetur.



LAVRVS
ALEXANDRINA.

Zäpfflintrauc.

NOMINA.



ΕΦΗΜΕΡΟΝ, ἢ ἰεὺς ἀργία Græcis, Ephemeron, Iris syluestris Latinis dicitur. Cum autem Galeno, Paulo, & Dioscoride testibus, duo sint Ephemerigenera, alterum, quod Colchicon à natali solo dicitur, interficiens, de quo suo loco plura: alterum quod non letale est, & præcipuo nomine Ephemerū dicitur, hic de secundo, nempe non interficiente, nobis sermo duntaxat erit. Ephemerū autem

Ephemerigena
genera.

Ephemerum cuius
dictum.

Lilii conuallii.

nominatum est, non quod eadem die iugulet (nulla enim ei uis mortifera inest) sed quod flos illius confestim marcescat, nec longius uno & altero die cōmoretur. Vulgus & officinæ Lilium cōuallium, quod in opacis & lucis nascatur, appellant, Germani *Weyenblümle*.

FORMA.

Caulē & folia Lilio similia habet, tenuiora tamē. Flores candidos amarosq̃. Fructum mollē. Radicē unam digitali crassitudine, longam, adstringentē, odoratam. Quæ siquidē deliniatio ita herbę illi quam uulgus Lilium cōuallium nominat conuenit, ut nulla prorsus in ea sit nota, quæ ei nō respondeat. Caulem enim & folia Lilij habet, sed tenuiora. Flores candidos & suauiter olentes, gustu amaros. Fructum mollem, colore puniceum, asparagi fructui non dissimilem. Radicem singularem digiti minimi crassitudine, longam, adstringentem & odoratam. Nec obstat quod nunquam aut rarissimē apud nos reperiatur radix quę minimi digiti crassitudinem æquet. Dioscorides enim cum alicui herbę aut radici mensuram tribuit, id facit ut maiori parti indiuiduorū illius speciei quadret, nec adeo statam mensurā assignat, quin quandoq̃ infra aut supra hanc esse possit. Cui hoc etiā accedit, quod magnitudo secundū diuersas regiones in una eademq̃ herba sæpe uariatur, ita ut nihil mirū sit radices nostri Ephemerī, paulò quàm illius quas Dioscorides uidit minores esse.

Obiectio diluatur.

LOCVS.

Nascitur in syluis & umbrosis locis.

TEMPVS.

In Maio mense flores illius magna copia erumpunt, ac mox iterum euanescent atq̃ decidunt. Deinde Iulio mense fructus profertur Asparago haud dissimilis, ut dictum est.

TEMPERAMENTVM.

Mistæ est temperaturæ, Galeno teste, nempe repellentis & discutientis, quia scilicet radix adstringit, floresq̃ amari sunt.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Huius radix in dentium doloribus remedio est, si decocto eius colluuntur. Folia in uino decocta & illita cedemata & tubercula, quæ nihil adhuc puris cōtraxerunt, discutiant; *πύρον* enim & non *ύρόν* legendum, ut ex Galeno liquet.

EX GALENO.

Ephemerum non illud letale, quod etiam Colchicum nominant, sed alterum, quod & Irin agrestem uocant, folia & caulem Lilio similem obtinet, radicem oblongam, non rotundam ceu Colchicum; digiti autem potissimū crassitudine est, adstringens & boni odoris. Ex quibus palam fit quod mistæ sit facultatis, nempe repellentis, & halitu digerentis. Testificantur uerò id quæ particulatim ædit opera. Siquidē non ineffaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Folia tuberculorum tum augmento, tum uigori congruunt. Oportet autē in uino decocta prius quàm pus moueas illinere.

EX PLINIO.

Radicem unam digiti crassitudine obtinet, dentibus præcipuam cōcisam in aceto, de-



EPHEMERVM
NON LETALE.

Stagenblümle.

to, decoctamq̄ ut tepido colluantur. Et ipsa etiam radix mobiles sistit, cauis & ex-
sis imprimitur.

APPENDIX.

Recentiores roborare cor, iecur, cerebrumq̄ tradūt. Hinc est quod eius succum
aut decoctum syncopa, uertigine, morboq̄ comitali correptis, attonitis, & phrene-
ticis exhibeant. Cæterum incipienti elephantia, ne latius serpat, & altius radices a-
gat, uiam præcludere scribūt. Ocularij medici ad oculorum caligines discutiendas
eo etiam utuntur.

DE ELENIO CAP. LXXXIX.

NOMINA.



ELENION Græcis, Elenium & Inula Latinis, officinis Enula, rusticis
Campana, uulgo iunctis utrisq̄ uocabulis Enula campana dicitur. Ger-
manis *Alant*. Elenium autem ab Helenæ lachrymis, e quibus natum fa-
bulantur, quidam dictum esse uolunt. Alij quoniam cōtra serpentes ex
eo primum ab Helena remedium inuentum sit.

Enula campana
Elenium unde di-
ctum.

FORMA.

Caulem ex se mittit Elenium crassum, hirsutum, cubitalem, & aliquando ma-
iorem (interdum enim iustam hominis staturam altitudine æquat) angulosumq̄.
Huic supernè lutei flores insident, & in his semen Verbasco simile, tactu prurimum
excitans. Folia angustifolia Verbasco similia obtinet, lanuginosiora tantum & ob-
longa. Radicem subruffam, odoratam, magnam, subacrem, ex qua ad consitionem
Liliorum aut Ari instar, pingues propagines appendicæ sue auferunt. Hæ siquidē
notæ Enulæ campanæ uulgo dictæ pulchrè quadrant, neq̄ obstat quod nō in cun-
ctis græcis exemplaribus omnes illæ habeantur, cum in nonnullis, isq̄ probatissi-
mis saltem, legant. Sic Marcellus Virgilius Florentinus in suis quos edidit in Dio-
scoridem cōmentarijs testatur, sibi uisum esse antiquissimū ac probatissimū codi-
cem, in quo adhuc omnes seruentur. Et certè nihil absurdi cōmitteremus, si nonnul-
las Dioscoridē notas subtriciuissē dicamus, cum euidentissimū sit Inulam nō pascim
una forma præditam nasci, quando, eodem Dioscoride teste, in quibusdā locis cau-
lem haud emittat: in irriguis deniq̄ procerior & elegantior, quàm in siccijs, pro-
ueniat. Huc accedit quod aliàs sæpe notas etiam admodū necessarias prætermittat.

obiectio diluatur

Marcellus Flo-
rentinus.

LOCVS.

Nascitur montanis, umbrosis, & siccis locis. In hortis etiam pascim hodie plan-
tatur.

TEMPVS.

Radix æstate effoditur, & concisa siccatur. Floret Iulio mensē.

TEMPERAMENTVM.

Elenij radix non primo statim occurſu excalefacit, ac proinde non dicenda est ca-
lida & sicca exactè, ceu mel & piper album, sed cum recrementitio humore.


VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Radiciſ Elenij decoctū potum, urinam & menses ducit. Ipsa deniq̄ in eclegma-
te cum melle sumpta, tussis, orthopnceæ, rupturis, cōuulsionibus, inflationibus, ue-
nenatorum morſibus prodest, calefaciendi ui quam in uniuersum habet. Folia eius
in uino cocta ischiadicis utiliter illinuntur. Radix etiam Elenij in passo condita, sto-
macho utilis est. Siquidem salgamarij paululum siccata eam, mox decoctam, fri-
gida aqua demergunt, postremo in defrutum coniectam, ad usum recondunt. Ea
trita & pota sanguinem excreantibus auxiliatur.

EX GALENO.

Elenij radix maximè utilis est. Eclegmatis quæ faciunt ad educendos lentos &
X crassos



ELENIVM
Mant.

crassos qui sunt in thorace & pulmone humores commodè miscetur. Rubrificant quoque ea partes frigidis & diuturnis uexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum passiones, ischiadas uocant, & exiguæ assiduæque quorundam articulorū præ humiditate luxationes.

EX PLINIO.

Inula à ieiunis cōmanducata dentes confirmat, si ut eruta est, terram non attingat. Condita tussim emendat. Radicis uerò decoctæ succus tineas pellit. Siccata autem in umbra farina tusa, & conuulsis, & inflationibus, & arterijs medetur. Venenatorum morsus abigit. Folia ex uino lumborum dolori illinuntur.

Superstitiosum.

DE EUPATORIO CAP. XC.

NOMINA.



ΕΥΡΑΤΩΡΙΟΝ, ἡ ἑπτατόλειον græcè, Eupatorium & Hepatoriū latinè, officinæ Agrimonia dicitur. Germanis Sdermenig/Bruchwurz. Eupatorium ab Eupatore rege, qui illam primus inuenit, nominatam esse uolunt. Hepatorium uerò quoniam iecori præcipuè medeatur.

*Agrimonia.
Eupatorium cur
dicitur.
Hepatorium.*

FORMA.

Fruticosa est herba, unum, interdum alterum etiam scapum efferens, tenuem, lignosum, rectum, nigrum, hirsutum, cubitalem, aut etiam maiorem. Folia per interualla partibus potissimū incisa quinque, & aliquando pluribus, Quinquefolij uel Cannabís potius folijs similia, nigricantia, & ferræ modo in extremitatibus incisa. Semen à medio caule enascitur, deorsum inclinatū, hirsutum, adeo ut siccatum uestibus hæreat. Hæ deliniationes adamussim, nulla reclamante nota, herbæ quam uulgus & officinæ uocant Agrimonia conueniunt. Quapropter hanc uerum & genuinum esse Eupatorium facile deprehendet, qui singulas descriptionis partes diligenter expendet. Siquidem Agrimonia fruticosa est herba, scapum unum aut alterum obtinēs, lignosum, tenuem, rectum, nigricantem, hirsutum, cubitalem uel maiusculū. Folia ex interuallis Cannabina, aut Quinquefolio similia, quinquepartita uel plurifaria incisa, per ambitum serrata. E medio caule semen erumpit deorsum spectans, subhirsutum, ut resiccatum uestibus adhærescat. Proinde præfracta quadam ac immedicabili cæcitate captos esse eos iudico, qui hoc ipsum hodie non animaduertunt.

*Agrimonia est
uerum Eupato-
rium.*

LOCVS.

Nascit̃ passim locis montosis, campestribus etiam, pratis nempè, & circa sepes.

TEMPVS.

Carpitur in æstate, dum floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Eupatoriū herba tenuium partium, incidendī extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Inest ei & adstrictio modica.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Contrita huius folia & cum ueteri suillo adipe imposita, ulceribus difficilè cicatricem contrahentibus medentur. Semen aut herba in uino pota, dysentericis, iecinorosis, & serpentium morsibus auxiliatur.

EX GALENO.

Obstructiones iecoris expurgat, & robur huic uisceri addit.

EX PLINIO.

Semen dysentericis in uino potum auxiliatur unicè.



EVPA TORIVM

Gdermenig.

NOMINA.



AVDDVBIE Euphrasie herbæ nomen à græcâ linguæ imperitis phar
 macopolis deprauatum est, cum olim *ὑφροσύνη* dicta sit, quod nimirum
 oculos, quorum caliginem discutit, delectet. Ad quod nomen Germa-
 ni nostri pulchrè alludentes *Augenrost* / hoc est, oculorū solacium ap-
 pellant. Nonnulli hac quoque ratione moti ophthalmicam & oculariam nomi-
 nant. Officīe, ut ferè in omnibus alijs herbis, corruptâ uocem retinentes, Euphra-
 siam uocant. Etsi autem herba hæc græco & eleganti nomine donata sit, nihil ta-
 men de ea, quod sciam, apud ueteres Græcos & Latinos, nempe Dioscoridem, Pli-
 nium, Galenū, adde etiã recentiores, Aëtium, Paulum, & Actuarium scriptum
 reperitur. Cum uerò appellatio ipsa græcam testetur originem, uidetur sanè à Bu-
 glosso ueterum mutuata & desumpta esse. Vt enim hoc in uinum coniectum ani-
 mi læticiam parit, atque adeò *ὑφροσύνη* dictum est, ita etiã illa quia oculos iuuat
 & delectat, *ὑφροσύνη* appellari cœpit. Quam subinde uocem imperiti linguæ, ut di-
 ximus, deprauantes, in Euphrasiam uerterunt.

*ὑφροσύνη
cur dicta.*

ophthalmica.

FORMA.

Herba est parua, palmę unius longitudine, Hyssopo similis, cauliculis purpureis,
 folijs exiguis, per ambitum serratis, flosculis albicantibus, radice exigua & inutili.
 Nec obstat quod Hermolaus, immensæ eruditionis uir, libro tertio, capite decimo
 octauo sui Corollarij, luteolos esse dicit: is enim ad partem duntaxat florum respe-
 xit, quæ lutea esse euidenter apparet. Certè si flores Euphrasie exquisitè confide-
 res, neque prorsus luteos, neque in uniuersum etiã candidos esse deprehendes:
 tribus enim coloribus, nempe purpureo, candido & luteo, ut pictura ipsa ostendit,
 maculati sunt. Quum uerò potior florum pars candido colore constet, factum est
 ut ferè omnes herbã hanc depingentes, albos illi assignarint flores, nobis autem
 hos candicantes dicere placuit.

*Hermolaus Bar-
barus.*

LOCVS.

Nascitur in apricis collibus, & pratis ferè omnibus.

TEMPVS.


Inter autumnii initia magna copia erumpit.

TEMPERAMENTVM.

Quas particulatim facultates obtinet, abundè docent calidam & siccam esse
 herbam.

VIRE S.

Vtuntur ea ad oculorum caligines & suffusiones, uel per se imposta, uel ex ui-
 no decocta. Memoriam etiã oculorumq; aciem redacta in puluerem, & in uino
 albo pota, mirificè roborat, amissamq; reparat.



EUPHRASIA

St. Georgskraut.

NOMINA.



ΑΕΛΙΣΦΑΚΟΝ Græcis, Saluia Romanis & officinis, Germanis Salbey appellatur. Porro cum ipsa herba semper retorrida & exucca uideatur, factum est, ut Græcis Elelisphton, quasi in tabem redacta, uel in syderationem flaccescens dicta sit, ἐλελίφτην & σφοδρῆος uocibus in unam coalescentibus appellationē. Est autem σφοδρῆος, seu potius σφοδρῆλος, malum in plantis quum per æstatem & ardentissimū canis æstum ui solis altius penetrante, humorē quo nutriuntur deficiente, languent &arescunt. Latini syderationē nominant. Saluia autem dicta Latinis, quod ad multa, præsertim ad fecunditatē, salutaris sit.

Elelisphton un
de dicta.

σφοδρῆλος

Saluia cui uo-
cata.

GENERA.

Duo sunt Saluiae genera, quemadmodū etiam plebeij abundē nouerūt. Vnum quod priuatim Elelisphton dicitur, squalidius folio & scabrius, lacunosa facie præasperum, multo latius, quasi cultum senserit, ad eō ut domestica aut hortensis Saluia dici possit. Nos euidentiori distinctione usi, Saluiam maiorem nominauimus. Germanis etiam groß oder breyt Salbey uocatur. Alterum folio leuius & cōtractius, quasi syluestrem ob id referat figurā, syluestris Saluia appellari potest, minus etiam squalore oblitū est. Nos Saluiam minorē diximus. Germani creütz Salbey / oder Klein Salbey / oder spitz Salbey / edel Salbey nominant. Dioscorides utrunq; genus sub uno Elelisphtaci nomine complexus est, quod scilicet facultate nihil distent, sed idem prorsus efficiant.

Saluia maior.

Saluia minor.

FORMA.

Frutex est oblongus, ramosus, quadrangulus & candidas uirgas habens. Folia mali Cotonei effigie, oblongiora tamen, asperiora, & crassiora, quæ sensim attritarum uestium modo hirsuta, subalbida, uehementer odorata, sed uirosa sunt. Semē in summis caulibus syluestri Ormino simile gerit. Hæc descriptio, nulla prorsus reclamante nota, cum herba quam Saluiam uulgo uocant quadrat: nanque ea fruticosa est, rugosis folijs, extritarum latenter uestium asperitatem scabritiamue referentibus, incanis, uehemēter odoratis, purpureo in spica flore, in aquilini rostri speciem falcato, semine syluestris Ormini, ut pictura graphicē monstrat.

LOCVS.

Nascitur in locis asperis, & utrunq; genus hodie passim in hortis inuenitur.

TEMPVS.

Carpitur in Iunio & Iulio mensibus, quando nimirum floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Elelisphtacos euidenter excalfacit, ac leuiter adstringit.


VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Foliorum ramorumq; decoctū potum urinam cit, menses foetusq; extrahit. Pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur, Capillos denigrat. Vulneribus herba utilis est, sanguinemq; compescit. Ferina tetraue ulcera purgat. Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum cum uino, si eo abluantur, sedat.

EX AETIO.

Tradunt quidam suffitam Saluiam menses immoderatē fluentes, & omnino muliebri profluuio compescere. Agrippa sacram herbam uocauit, quam prægnantes mulieres si fluidæ laxæq; fuerint, utilissimē comedunt: cōtinet enim conceptū uitalemq; reddit: ac si succi huius heminam cum modico sale quarto à secubitu die mulier potauerit, deinde uiro misceatur, proculdubio concipiet. Aiunt in quodam Aegypti loco post sæuas pestilentias ab his qui supersunt, ad eum succum bibendū mulieres cogi, plurimosq; inde produci foetus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem



SALVIA
MAIOR.

Gros Salbey.



SALVIA
MINOR.

Creutz salbey.

c expuentibus succi Saluiae cyathos duos, ieiunis cum melle bibendos, & sanguis illico cohibet. Tabidis pilulae in hunc modum parantur. Spicae nardi, Zingiberis singul. drach. ij, seminis Saluiae affati triti & cribrati drach. viij. Piperis longi drach. xij, cum succo Saluiae pilulas conficito, & mane ieiunis drachmam unam exhibeto, eodemque modo in uespere, ac postea aquae purae quippiam propinato.

EX PLINIO.

Menses Saluia cit & urinas. Pastinacae marinae ictus sanat. Torporem autem inducit percusso loco. Bibitur cum Absinthio ad dysenteriam. Cum uino eadem comorantes menses trahit. Abundantes sistit decocto eius potu. Per se imposita uulnerum sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si in uino decoquatur, pruritus testium sedat. Partus emortuos apposita extrahit, item uermes aurium. Ad tussim laterisque dolores bibitur. Contra scorpiones eadem & dracones marinos efficacex. Contra serpentes quoque ex oleo perungi ea prodest.

DE ERPYLLO CAP. XCIII.

NOMINA.

Serpyllum unde dictum.



ΠΡΥΛΛΟΝ graece, Serpyllum latine. Officinae latinum nomen retinuerunt. Germanice Quendel / Kinlin / Hünerköl appellatur. Serpyllum autem, ut autor est Varro, ab eo quod serpat tam Graecis quam Latinis dictum est, quonia si qua eius particula terram attingit, inibi radices demittit. Est enim ut Theophrastus libro sexto de plantarum historia, capite septimo ait, proprium quoddam eius ramulorum incrementum, quippe cum possit in quantum uoluerit quispiam longitudinem trahi, adiecto illi pedamento aliquo, aut si prope sepes plantetur, aut ex altiore loco aliquo deorsum demittatur: sic enim in longum protrahuntur: & ab hac planta in ramulis eius natura, quod in longum serpit, Graeci & Latini peculiariter Serpyllum nominauerunt.

GENERA.

Serpyllum hortense.

Syluestre.
Zuyēy.

Duo eius genera. Hortense, quod germanice heymischer Quendel dicitur. Syluestre, quod priuatim Zygis uocatur, quod forte eo iugarentur uites. Zuyēy enim Graecis interdum idem quod Latinis ligare & uincire significat. Germanice simpliciter Quendel dicitur. Nos syluestris tantum Serpylli picturam damus.

FORMA.

Hortense.

Syluestre.

Plinij erratum.

Hortense non dissimile est Origano, potissimum quod ad folia & ramulos ipsos attinet, quos candidiores tantum habet, odore tamen prorsus Sampsyllum representat. Repit humi, & in rectum non attollitur. Syluestre contra humi non serpit, sed rectum exilibus ramulis & lignosis attollitur, Rutae folijs plenis, angustioribus tamen. Flosculos habet subpurpureos, gustu acres, odore iucundo, radicem multifidam. Plinius secus quam Dioscorides hortense serpyllum nequaquam, syluestre uero humi serpere asserit, adeo ut subesse in hoc mendam uerisimile sit: res enim ipsa & uiuae herbarum imagines satis testantur, Dioscoridis sententiam esse ueriores. Dioscoridi subscribit Aëtius. Neque mirum est magis humi reptare cultum, quod infirmius humoris copia est, atque adeo ramis inualidioribus stare nequit, quam syluestre, quod illo rigidius ac lignosius existit.


LOCVS.

Hortense non nisi fatum prouenit, & Columella teste, neque pinguem, neque stercoreatum, sed aprium locum desiderat, ut quod macerrimo solo nascatur. Syluestre autem in petris, collibus, & montibus plerisque copiosissime nascitur, ita ut eo quasi uestriri uideantur.

TEMPVS.

Syluestre tota aestate floret, hortense autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERA-



SERPYLLVM

Guendel.

C

TEMPERAMENTVM.

Serpyllum gustu acre est, ob id calidum ualde, ita ut menses & urinam moueat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Syluestre efficacius & maiori calefaciendi ui quàm hortense, atque ad usum medicinae aptius. Menses trahit, & urinam cit potum. Torminibus, ruptis, conuulsis, iecinoris inflammationibus auxiliatur. Aduersus reptilia potum & illitum. Capitis dolores sedat coctum adiecto rosaceo, & aceto madefactū. Maximè uero lethargo & phrenitidi cōuenit. Sanguinis uomitum sedat succus eius quatuor drachmis cum aceto potus.

EX AETIO.

Serpyllum ita calefacit ut menses & urinam ducat. Huius genus duplex, Syluestre efficacius calidiusq; hortensi, atq; omnino usus eius in medicina præfertur. Prodest torminibus, cōuulsionibus, rupturis, inflammationib; iecinoris, reptilibusq;. Potum ac illitum capitis dolores sedat. Madefactum autem aceto ac decoctum admixto rosaceo lethargicis, & diutinam phrenitum patientibus summopere cōgruit. Præterea drachmæ unius pondere ex aceto bibitum, sanguinis eiectiones cōpescit.

EX PLINIO.

Aduersus serpentes efficax, maximè Cenchrin & Scolopendras terrestres ac marinas & scorpiones, decoctis in uino ramis folijsq;. Fugat & odore, cominus si uratur, & contra marinorū uenena præcipuè ualet. Capitis doloribus decoctū in aceto illinitur temporibus, ac fronti cum rosaceo. Item phreneticis, lethargicis, contra tormina & iecinorum dolores. Folia obolis quatuor dantur ad lienem ex aceto. Ad cruentas excreationes teritur in cyathis duobus aceti & mellis.

EX PLINIO VALERIANO.

Serpyllum calidum, simul nobis utile medicinae usus ostendit. Capitis dolores coctum ex aceto & rosaceo temporari ac fronti illitū mitigat. Serpentes & omnia animalia uenenata adustum nidore repellit, ideo & messoribus in cibo miscetur, ut si fatigatos fortè somnus opprefferit, tutè quiescant contra animalia quæ hoc tempore uenenatis hausibus sequere consueuerunt. Contusi puluis ex scrupulis xij. in aqua datus tormina emendat, urinæ difficultates resoluit, lienis quoq; iniuriæ idem puluis ex aceto mixtus occurrit. Nec minus cruentis excreationibus subuenit, ex duobus cyathis mellis & aceto temperatus.

DE ELYMO. CAP. XCIIII.

NOMINA.

Panicum quare
dicitur.



ΕΛΥΜΟΣ Græcis, Panicum Latinis, Germanis Heydelpfenich/oder Senich dicitur, Panicum autem à paniculis in quibus semen est, Latini appellauerunt.

FORMA.


Milij similitudine prosilit, denis ut plurimum folijs luxurians, culmo penè in surculum extenuato, nutante, rubido panicularū fastigio, prædensis acruato granis, aliàs purpureis, aliàs rufis, nigris aliàs, item & candidis.

LOCVS.

Satum facile quouis ferè loco prouenit, leuem autem & solutam terram potissimum desiderat. Nec in sabuloso duntaxat solo, sed in arena quoq; nascit, modo humidum coelum, uel riguum solum sortiatur.

TEMPVS.

Quadragesimo die postquã satum est absolui, ut omnia æstiuæ, inter omnes conuenit.



PANICVM

Panicum.

Y

c uenit, Quocunq; igitur tempore fatum fuerit, ubi semine pragnans erit, tum carpendum uenit.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat, praesertim si foris illinatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Milij similitudinem refert, eodemq; modo in panes defingitur, & ad idem accommodatum est, minus tamen quam Milium nutrit & adstringit.

EX GALENO.

Panicum facultate pauci nutrimenti, & exicatoria. Siftit quoq; non nihil uentris fluxus, ceu ipsum etiam Milium. Panis itaq; eius exigui est alimenti & refrigerans. Constat insuper praeridū & instar arenae aut cineris friabilem esse; caret enim penitus pinguedine & lentore. Iure igitur aluum humentem desiccatur. Agricola farina huius cocta admisto adipe suillo & oleo uescuntur. Panicum in omnibus Milio cedit, insuauius esu, concoctu difficilius, uentremq; magis coercet, minusq; nutrit. Huius farinā interdum cum lacte coctam, rustici ueluti triticam esitant. Clarumq; est id edulij tanto quam illud per se solum assumptū melius esse, quanto lac huius feminis natura ad boni succi procreationē, aliaq; omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, cōcoctionem, uentris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoq; ipsam in edendo suauitatem & uoluptatem. Hoc nanq; semen nulla gratia aut iucunditate commendatur.

EX PLINIO.

Panicum Diocles medicus mel frugum appellauit. Effectus habet quos Milium. In uino potum prodest dysentericis. Similiter ijs quae uaporanda sunt exal factum imponitur. Siftit aluum in lacte caprino decoctum, & bis die haustum. Sic prodest & ad tormina.

DE ERICA CAP. XCV.

NOMINA.

EPIKH Graecis, Erica Latinis, Heyd Germanis dicit. Officinis inusitata.

FORMA.

Erica fruticosa arbor est Tamarici similis, multo tamen breuior. Eius flore utentes apes, reprobū mel conficiunt, Plinius lib. xxiiij. cap. ix. fruticem esse scribit non multum à Tamarice differentem, colore Rosmarini, & penè folio. Id quod uerè de ea Erica, cuius nos picturam damus, dicitur. Theophrastus etiam Rosmarino similem Ericam facit. Habet flores in candido purpureos.

LOCVS.

In montibus & syluis locisq; arenosis nascitur.

TEMPVS.

Autumno floret sola ferè in syluis.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est Erica, id quod in gustu amaritudo satis docet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Ericae coma & flores illita serpentium moribus medentur.

EX GALENO.


Discutiendi facultate praedita est Erica: flore eius potissimū & folijs utendum.

EX PLINIO.

Ericen aduerfari serpentibus tradunt.

APPENDIX.

Recentiores herbarij praeter iam commemoratas, alias facultates addunt, nimirū florum decoctum lumborū ac uentris dolores lenire posse. Succum ex folijs florisq; elicatum, oculis imbecillibus guttatim instillatum, aut foris inunctū cōferre.



ERICE

Heyden.

C

NOMINA.



Rapistrum non
est sylvestris E-
ruca.
Erysimon unde
dictum.

Irion quare no-
cata.

ERYSIMON græcè, Irion latinè uocatur. Officinis nostris incognita. Vulgares herbarij non ineptè Sinapim sylvestrem, nonnulli etiam Rapistrū, Germani *Hederich* & *Wilden* sensu appellat. Sunt qui perperam, eo quod gustu Erucam imitatur, sylvestrem Erucam nominant. Alia enim est Eruca sylvestris ab ea quam Rapistrum nominant herba, ut suo loco dicemus. Erysimon quidam *ἀπὸ τῶν ἐρσίμων* nomen mutuatum esse credunt, id est, à multiplici foliorum sectione: nam Erucæ modo laciniata cōspiciuntur. Alij ab oleris præstantia dictum uolunt, quasi *ἐρίμιον*, quod est preciosum & nobile. Mihi *ἀπὸ ἐρσίμων* potius dictum esse uidetur, quod ob suam caliditatem maxima trahendi facultate prædita sit. Latini autem Irionem ab irruendo dixerunt, quod ignea ui, & feruido sapore irruat in gustum.

FORMA.

Folia habet sylvestri Erucæ similia, caules lori modo flexiles, flores luteos. In cacumine siliquas corniculorum figura, ut Fœnigræci graciles, in quibus semina continentur parua, Nasturtio similia, gustu feruido. Hæ utique notæ in uniuersum omnes, herbæ illi quam pictam hic exhibemus adamussim quadrant.

LOCVS.

Nascitur passim propè urbes, domorum areas, rudera & hortos.

TEMPVS.

Per integram æstatem floret, autumno autem semen in siliquis profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Erysimi haud secus quàm Nasturtij calcacit & exiccat. Herba etiam ipsa arefacta similem semini uim obtinet. Humida tamen ac uiridis, multo semine inferior est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Erysimi semen thoracis fluxionibus purulentis, tussientibus, regio morbo, coxendicum doloribus linctum cum melle confert. Bibitur etiam contra letalia uenena. Ex aqua aut melle illitum, occultis carcinomatibus, duritijs, parotidibus, testium ac mammarum inflammationibus prodest. In uniuersum extenuat & calefacit. Mitius ad eclegmata fiet, si aqua madefiat & torreatur, aut linteolo illigatum circumlita pasta peraffetur.

EX GALENO.

Irionis semen sicut gustu Nasturtio simile apparet, ita facultate igneum est & ex calefactorium. Porro ubi in eclegmate uti ex usu est, præstat aqua præmaceratum torrere, aut linteolo illigatum subindeq; crustæ pistoriæ inuolutū assare. Vitale est cum eclegmatis ad promouendas crassorum lentorumq; in thorace & pulmone humorum expuitiones. Quin & parotidas induratas, atq; duritias mammarum & testiculorum ueteres iuuat. Refert Dioscorides, quod cum aqua & melle illitum, occultis profit cancris.

EX PLINIO.


Vtilissimum tussientibus cum melle, & in thoracis purulentis excreationibus. Datur & regio morbo, & lumborū uitijs, pleuriticis, torminibus, cœliacis. Illinitur uerò parotidum & carcinomatū malis. Testium ardoribus ex aqua, aliàs ex melle. Infantibus quoq; utilissimum. Item sedis uitijs & articularijs morbis cum melle & fico. Contra uenena etiam efficax potum, Medetur & suspiriosis. Item fistulis cum axungia ueteri, ne intus addatur.



IRION

Gederich.

Y 3



HELXINE
CISSAMPELOS.

Mittelwind.

NOMINA.



Ἡελξίνη νουσίμπηλο Græcis, Helxine cissampelos & Conuoluulus Latinis nominatur. Vulgus herbariorum & officinæ, Volubilem mediam & Vitalem appellât, Germani Mittelwinden/oder Weingartenwinden. Rectè autem Cissampelos dicitur: in uineis enim potissimum nascitur, & folio hederaceo. Conuoluulus uerò, quod crebra reuolutione uicinos fructus & herbas implicet.

Vitalis.
Cissampelos quare dicitur.
Conuoluulus.

FORMA.

Folia habet Hederae similia, minora tamen. Ramulos exiguos circumplectentes quodcumq; contigerint. Folia deniq; eius scansili ordine alterna subeunt. Flores primum candidos Liliij effigie, dein in puniceum uergentes, profert. Semen angulosum in folliculis acinorum specie.

LOCVS.

In uineis nascitur, unde etiam ei appellatio Cissampeli, ut diximus, indita est.

TEMPVS.

Aestate, potissimum autem Iulio & Augusto mensibus, floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse ex uiribus quas illi ueteres tribuunt, facile conijcere licebit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius potus, aluum subducendi facultatem obtinet.

EX GALENO.

Helxine, quæ & Cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem habet.

DE HEPTAPHYLLO CAP XCVIII

NOMINA.



Ἑπτάφυλλον græcè, Septifolium latinè, uulgò Tormentilla nominatur. Sunt ex recentioribus qui perperam Bistortam uocent. Germanicè Tormentill/ Rotheil wurz appellatur, Heptaphyllon autem à septenario foliorum numero dicta est.

Tormentilla.

Heptaphyllon unde dictum.

FORMA.

Quinquefolio simillima est, nisi quod septem non quinque habet folia, utrinque lanuginosa, exigua, parua, ferrata, caulem certis ferè interstitijs ambientia, flores luteos, radicem puniceam ac modicè intortam. Ex hac descriptione omnibus constare puto, herbam nostris Tormentillam dictam, non esse Dioscoridis Quinquefolium. Hoc enim, ut reliqua omittam, radicem non intortam, sed rectam & oblongam habet. Plinius etiam libro xxv. capite ix. herbam Quinquefolium incipere & desinere cum uite scribit. Tormentilla autem non maturè prouenit, sed cum uites iam florent. Accedit quod hæc in montosis & syluestribus incultisq; hoc uerò pratis, cultis & aquosis in locis potius prouenit. Apuleius etiam utranque herbam seorsim describit.

Tormentilla nõ est Quinquefolium.

LOCVS.


Nascitur montosis, ut diximus, locis ac syluis.

TEMPVS.

Serò ac cum iam uites florent herba hæc apparere incipit.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores iudicant hanc herbã in tertio ordine frigidam & siccam esse. Ceterũ non esse frigidam, potissimũ in tertio ordine, facultates eius abundè declarant. Gustus etiam adstrictionẽ illam tanta frigiditate prorsus carere palàm ostendit. Quare cum easdem quas Quinquefoliũ facultates habeat, idem etiam temperamentũ ob-



HEPTAPHYLLVM

Tormentill.

stineat necesse est. Erit itaq; radix desiccatoria ex tertio ordine, nullatenus tamē manifesta caliditate participans.

VIRES EX APVLEIO.

Heptaphyllo herba trita & cū oleo mixta pedes perunges, & tertio die dolorē tollit. EX RECENTIORIBVS.

Facultatem obtinet glutinandi uulnera. Farina herbae uel radice ex succo Plantaginis propinatur in difficultate urinæ. Eadem respersu uulnera ad cicatricem perducit. Cum albo oui subacta & figlino decocta, datur cholericis. Foliorū uis deplo-ratis fistulis instillatur, neq; non oculis ad discutiendas nubeculas. Ad putrescentia oris ulcera herba & radix cōmanducata, & in ore retenta ualēt. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurismataq; sanat. Et ut antea diximus, facultates ferè eadē quas Quinquefolium obtinet. Quapropter uenenis resistit, dysenterias, & omnes sanguinis eruptiones compescit.

DE ERUCA CAP. XCIX.

NOMINA.



YZOMON Græcis, Eruca Latinis, officinæ latinum nomen retinuerūt, Germanis Weis senff appellatur. Euzomos autem Græcis, quoniam iura cōmendet, habeatq; in eisdem peculiarē gratiam dicta est. Erucam uerò ideo nominatam uolunt quod erodat: hæc enim ubi degustaueris, os & linguam fatis acriter uellicat.

Euzomos unde dicta. Eruca.

GENERA.

Duplex est Eruca. Vna hortenſis seu ſatiua, quæ Germanis *zam weis senff* dicitur. Altera ſylueſtris, iſdem *wilder weis senff* appellatur.

FORMA.

Sesquipedali thyſo conſurgit ſatiua, folio longo, anguſtoq; in profundas ſed rariores crenas laciniato, guſtu præter modum acri, floribus pallidioribus, ſemine in ſiliquis rapi, uel ſinapi, firmo, radice candida. Sylueſtris folio ſatiuæ ſimili, ſtrictiore tamen & minore, flore luteo.

LOCVS.

Satiua in hortis naſcitur. Sylueſtris Hiſpaniæ familiaris: propè tamen aquas prorenit magna copia. Quæ autem apud nos creditur eſſe ſylueſtris Eruca, ea non eſt ſed Eryſimon, de qua quidem herba ſuo in loco abundè ſcripſimus.

TEMPVS.

Satiua tota æſtate floret: ſylueſtris autem circa Calendas Iunij potiſſimum erumpit: alio enim tempore uix reperitur.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentum Erucæ idem cum temperamento Eryſimi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cruda Eruca ſatiua largius comēſta uenerem ſtimulat. Idem poteſt ſemen eius, quod urinam cit, coctionē adiuuat, aluumq; bonum efficit. Vtuntur ſemine ad condimenta. Quod ut plurimo tempore ſeruetur, aceto uel lacte maceratum, & in paſtillos digeſtū recondunt. Sylueſtris ſemine homines in Hiſpania ſinapis uice utuntur. Eſt autem ad ducendam urinam efficacior, & multo quàm ſatiua acrior.

EX GALENO.

Olus hoc per quā manifeſtè calefacit, adeò ut nō facile ſolum abſq; iunctis Lactuæ folijs edatur. Quinetiam genitale ſemen augere creditur, & in uenerem ſtimulos addere. Caput magis dolore afficiet ſi ſolum edatur.

EX PAVLO.

Eruca temperamento Eryſimo ſimilis, flatulenta eſt, ob quod ad uenerem inſtigat. Semen eius urinam quoq; mouet. Cæterū ſylueſtris, domeſtica ualentior eſt.

EX PLL



ERVCA
SATIVA,

Sam weiß senff.



ERVCA
SYLVESTRE.

Wild weiß scuff.

C

EX PLINIO.

Eruca diuersa est quam Lactuca naturae; concitatrix ueneris: idcirco iungitur illi ferè in cibis, ut nimio frigori par feruor immixtus temperamentum aequet. Eius semen scorpionum uenenis & muris aranei medetur. Bestiolas omnes innascentes corpori arceat. Vitia cutis in facie cum melle illitum. Lentigines ex aceto. Cicatrices nigras traducit ad candorem cum felle bubulo. Aiunt uerbera subituris potum ex uino, duritiam quandam contra sensum induere. In condiendis obsonijs tanta est suauitas, ut Graeci euzomon appellauerint. Putant subtrita Eruca si foueant oculi, claritatem restitui. Tusim infantium sedari. Radix eius in aqua decocta, fracta ossa extrahit. Tria folia syluestris Erucae sinistra manu decerpta, & trita in aqua mulla, si bibantur, uenerem stimulant.

DE EUPATORIO ADULTERINO CAP. C.

NOMINA.



Officinarum
error.

Eupatoriū adul-
terinum.

VM herba haec ueteribus Graecis & Latinis cognita fuerit, & quo nomine ab ipsa appellata sit, mihi nondum constare ingenuè fateor. Officinae tamen ferè omnes pro Eupatorio uero, cum tamen non sit, haud sine magno errore utuntur. Hinc cum nomen aliud non esset quo illam appellaremus, Eupatorium adulterinum nominare placuit. Germanicè Kunigund frant/hoc est, herba S. Kunigundi uocatur, & Wasserdoest/ ab Origanii similitudine, & quod iuxta aquas proueniat. Alijs Wirgentlee/ quod uulnerati cerui sibi hac medeantur herba.

FORMA.

Eupatoriū adul-
terinum non est
Hydropiper.

D Caulem edit rotundum, purpureum, geniculatum, solidum & hirsutum, circa quem alae panduntur, folia longa, Canabinis ferè similia, amaraque. Flores in summo paruos coaceruatos, in candido purpurascens, tandem in pappos tenues abeuntes. Radicem multis fibris capillatam & inutilem. Errant haud dubie qui herbam hanc Dioscoridis Hydropiper esse putant. Nam etsi ferè tota eius herbae facies, floribus demptis, Hydropiperis deliniationi respondeat, tamen quia nulla prorsus piperis in folijs aut floribus acrimonia apparet, non est cur Hydropiper dici possit aut mereat.

LOCVS.

In fluminum ripis, alijsque locis humidis nascitur: potissimum uero iuxta residues aquas, aut tardo fluxu prorepentes.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu uehementer amara est, ut calidam & siccam esse in secundo ordine, aut in medio tertij non sit dubium.

VIRE S.

Haud dubie herba haec abstergit, expurgatque, & quae in uenis est crassitiam incidit: quamobrem menses & urinas mouet, educendoque ex thorace pulmoneque puri auxiliatur, aliasque facultates amari saporis, quas recenset Galenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvij. obtinet. Potest itaque obstructions iecoris & lienis aliarumque partium corporis soluere. Ex recentioribus sunt qui hanc Vulneraria esse tradunt, neque temere; id ipsum enim posse, siccitas eius testatur. Suffitum praeterea eius herbae, uenenatas fugare feras ipsa scribunt. Euidensissimum uero est hanc etiam contra uenena esse admodum efficacem.

DE ERE-



EVPATORIUM
ADVLTERINVM.

Rumigunt Franc.

Z

NOMINA.

C



PEBINOOS græcè, Cicer latinè, officinæ latinum nomen retinuerunt, germanicè *zyffer* nominatur.

GENERA.

Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum & nigrum. Nos ex ijs tribus nigri tantum picturam damus. Differunt potissimum in floribus; hoc enim ut cernis purpureos, album uerò candidos flores producit.

FORMA.

Cicer fatiuum caule est lignoso, obliquo, folijs exiguis, multis, circinatis, flore albo uel purpureo, siliquis rotundis, radice tenui & non admodum longa.

LOCVS.

Pullo crassoq; solo gaudet.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atq; subinde in siliquis semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est primo in ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.


Cicer fatiuū bonam facit aluum, urinam cit, inflationes parit, cutis colorem commendat, menses & foetus educit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium & myrmecias. Ad scabiem, achoras, impetigines, ulcera concretia & maligna, cum hordeo & melle. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrunq; cit urinas, dato cum Rosmarino contra regium morbū & cutem subeuntes aquas eorum decocto. Lædunt autem uesicam exulceratā & renes. Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna singula earum capita eminentiasue singulis Ciceribus tangere, deligataq; in lintheolo semina illa post se abijcere, ut acrochordones decident.

EX GALENO.

Cicer legumen est flatuosum quod nutrire potest, aluo mouendæ habile, ciendæ uring idoneū, & semini generando aptum. Prolicet uerò & menses. Porrò quod uocatur arietinum, cæteris efficacius urinam prouocat. Decoctum eius calculos renem confringit. Reliquum autem Cicerum genus quod Orobiaū uocant, eadem uir poller, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Lienem & iecur, & renes expurgant, scabiesq; & impetigines extergunt. Parotidas & testes induratos discutunt. Maligna etiam ulcera cum melle sanant.

EX SYMEONE ANTIOCHENO.

Cicera difficulter concoquunt & excrementa gignunt. Venerem stimulant, magisq; quàm fabæ nutriunt, obstructions tollunt, & menses educunt. Habent salis simul & dulcem qualitatem, & ob saluginem uentrem mouent, propter dulcedinem autem urinam. Inflationes quoq; faciunt, & lac gignunt, extergendiq; facultatem obtinent. Nigra medicamentoſam uim habent; urinam enim uehementissimè mouent, & calculos renū & uesicæ frangunt. Nullum uero legumen sic ut Cicera, præcipuè autē nigra & parua, lapides frangere potest. Id uerò magis eius ius, quod tamen uesicæ morbis supra cætera legumina officit. Cicera uerò rubra calidiora & crasiorū sunt partium quàm alba. Omnia autem urinam ducunt. Madefacta nocte una in aqua & sumpta, lumbricos eiiciunt, sed qui utitur sex ieiunet horas oportet. Imposita ut cataplasma parotidibus, molliunt & discutunt tumorem. Farina horum aceto subacta, & scabiosis inuncta prodest. Ius eorundem ictericos iuuat, & urinam albam reddit. Oportet uerò ijs neque ante cibum, neque post uti, sed in medio.




CICER
NIGRVM.

Schwarz Kÿbern.

Z 2

NOMINA.

Buglossum syl-
uestre.
Echion quare
dictum.



ΕΧΙΟΝ, ἢ ἀλκιβιάδιον Græcis, Echion & Alcibiacū Latinis dicitur. Offici-
nis ignotum. Vulgares herbarij syluestre Buglossum nominant, quos
sequentes Germani wild Schsenzungen appellant. Echion autem di-
ctum uolunt, quod contra ferarum ictus sit utile. Alij quod florescit ca-
pitulis asperæ similibus. Rectius Dioscorides, quod semina uiperino capiti similia
habeat.

FORMA.

Folia obtinet oblonga, aspera, tenuia, Anchusæ proxima, minora tamen & pin-
guia. Habet & aculeos exiles folijs adiacentes. Cauliculos tenues multos, & utrin-
que foliola tenuia, pennata, nigra, minora proportione ad cacumen caulis. Iuxta fo-
lia flores purpureos, in quibus semē est uiperino capiti simile. Radix digito exilior,
subnigra. Ex qua sanè deliniatione sole clarius fit, herbam cuius picturam hic exhi-
bemus esse Echion. Folia enim habet prælonga, hirsuta, tenuia, ad Anchusam acce-
dentia, minora tamē pinguiacq̃, tenuibus spinis horridula, cauliculos tenues, nume-
rosos, minutaq̃ folia utroq̃ latere dependentia, nigra, in summo caule minuscula,
inter quæ purpurei flores emicant, in quibus semina uiperarum capitulis similia in-
sident, à ceruice paulatim in rostellum extenuata, tu midiore superna parte, in qua
quædam prominulæ quasi sedes oculorū apparent, id quod ego hîsce oculis non
semel, sed iterum atq̃ iterum conspexi. Radix digito tenuior nigricat.

LOCVS.

Vbiq̃ ferè ad itinera, & in asperis locis nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidum esse citra tamen insignem siccitatē inde conijcitur, quod lactis procrea-
tricem facultatem obtinet. Medicamenta enim, Galeno libro quinto capite uigesi-
mo de Simpl. med. facul. teste, quia pituitosos humores calefacientia in sanguinem
uertunt, lac procreare solent.


VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Radix non solum ijs qui à serpentibus morfi sunt succurrit pota cum uino, ue-
rū etiam præsumentes eam ne feriantur facit. Idem præstant folia & semen. Se-
dat etiam dolores lumborum, & cum uino aut sorbitione sumpta lac proritat.

EX PAVLO.

Echion spinosa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cum uino pota
auxiliatur, sed præsumentes quoq̃ percuti non patitur.



ECHION

Wild oxsenzungen.

Z 3



APIVM
PALVSTRE.

Wasser eppich.

DE ELEOSELINO CAP CIII

271

NOMINA.



ΕΛΕΟΣΕΛΙΝΟΝ, ἢ ἑλεοσελίνον Græcis, Apium palustre & rusticum Latinis, Germanis Wasser eppf/oder Eppich/oder bauren eppich nominatur. Sic dictum Græcis, quod in paludibus & aquosis locis proueniat.

Apium palustre
Eleoselinon un-
de dictum.

FORMA.

Apio fatiuo maius est, caule tenero, concauo, folio molli, raro nechirsuto, simile Apio sapore, odore, floribus, semine & radice.

LOCVS.

Nascitur in paludibus & aquosis locis.

TEMPVS.

Iulio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod Apium fatiuum temperamentum obtinet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eadem omnia quæ fatiuum potest.

EX PLINIO.

Eleoselino uis priuata contra araneas.

DE ELLEBORO ALBO CAP CIIII

NOMINA.



ΑΛΕΒΟΡΟΣ λευκός Græcis, Elleborus candidus, & Veratrum album Latinis, officinis pariter Latinis Elleborus albus, Germanis weiß niefwurß appellat. Elleboron autem Græci dictum uolunt, quod cibū corporis eripiat, Album à radice uocarunt, quæ nigri respectu candida est.

Elleborus cur
dictus.
Albus quare cor-
gnuminatus.

FORMA.

Plantagini similia folia obtinet, aut Betæ syluestris, breuiora tamen, nigriora, & colore rubentia. Caulem palmi altitudine, cauum, quum sicari incæperit corticibus seu tunicis inuolutum. Radices illi subsunt numerosæ, tenues, ab exiguo & oblongo capite cepearū modo prodeuntes. Quod autem Dioscorides dicit colore rubere folia, id de costis eorum intelligendum erit.

LOCVS.

Nascitur in montanis locis frigidis & asperis.

TEMPVS.


Radices eius per messem legendæ sunt.

TEMPERAMENTVM.

In tertio ordine est excalefacientium & exiccantium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Optimus habetur qui mediocriter extensus est & albus, fragilis, carnosus, non acuminatus, iuncusq; aut quum frangitur puluerulentus, exilem interiorem medullam habens, gustu non admodum feruens, neq; saliuã confertim ciens. Huius scemodi autem strangulat. Purgat uomitionib; uaria educens. Miscetur collyrijs, quæ claritati oculorum officientia purgare possunt. Menses ducit, & fetus in utero appositus enecat. Sternutamenta cit, & mures interficit, cum melle & polenta subactum. Carnes simul coctum minuit. Datur ieiunis per se & cum Sesamo, aut Pisanæ succo, aut Alicæ, aut mulla, aut pulte, aut lenticula, aut alia forbitione. Pani cōpinlitur & torret. Apparatus & uictus ratio ab ijs tradita est, qui de ratione & modo dandi eius, dicato priuatim opere, scripserunt. Potissimum autem Philonidi Siculo ab Enna subscribimus. Longum enim esset ei qui de medica materia agit, curandi quoq; rationem docere. Dant autem aliqui cum copiosa forbitione, aut suc-



ELLEBORVS
ALBUS.

Weiß nieswurtz.

A co multo, aut modicum cibum dari præcipientes, statim Elleborum offerunt, præfertim ijs in quibus suspecta timendæue erit strangulatio, aut corporis imbecillitas imminet: tuto enim ea sic peragitur purgatio, quod non intempestiuè medicamentum corporibus cibo munitis accedat. Sedi etiam balani ex Elleboro subditæ cum aceto, uomitiones eliciunt.

EX GALENO.

Elleborus extergentis simul & excalfacientis facultatis est. Quamobrem ad alpos, impetigines, scabies, leprasq; accõmodus est. Quinetiam si in fistulam callo induratum infundatur duobus tribusue diebus, callum detrahit. Dentibus si cum aceto colluantur prodest.

EX PLINIO.

B Candidũ ueratrum uomitione, causasq; morborũ extrahit: quondam terribile, postea tam promiscuum, ut pleriq; studiorũ gratia ad prouidenda acrius quæ commentabant, sæpius sumptitauerint. Carneadem responsurũ Zenonis libris: Drusum quoq; apud nos, tribunorũ popularium clarissimũ, cui ante omnis plebs adstans plausit, optimates uerò bellum Marsicum imputauerẽ, constat hoc medicamento liberatũ comitali morbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam, ut diximus, Sesamoides admiscet. Italia ueratrum uocat. Farina eius per se & mixta radicule qua lanas diximus lauari, sternutamentũ facit, somnumq;. Leguntur autem tenuissimæ radices breuesq; ac ueluti decurtatæ etiam hæ. Nam summa quæ est crassissima, cepis similis, canibus tantum datur purgationis causa. Antiqui radicẽ corticemq; carnosissimũ eligebant, quò tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis spongijis opertam turgescentemq;, in longitudinẽ sindebãt. Deinde fila in umbra siccabãt, ijs utentes. Nunc ramulos ipsos à radice sua grauissimi corticis, ita dantes. Optimũ quod acre gustu, feruensq; in frangendo puluerem emittit. Optimum præterea quod celerrimè mouet sternutamenta, sed multo terribilius nigro, præcipuè si quis apparatus poturorũ apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, intempestiuus somni uires, singultus infinitos, aut sternutamenta, stomachi dissolutiones, tardiores uomitus aut longinquiores, exiguos aut nimios. Sed antiquorum uitium erat, quod propter hos metus parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Themison binas nõ amplius drachmas donauit. Sequentes & quaternas dedere, claro Herophilũ præconio, qui Elleborum fortissimi duobus similitudini æquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire. Præterea mirum inuentum est, quod incisum forficulis, cortex remanet. Hoc inano, medulla cadit. Hæc in nimia purgatione data, uomitiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne nubilo detur die, quippe impatientes cruciatus existunt. Nam ætate potius quàm hyeme dandum, non est in dubio. Corpus septẽ diebus præparandũ cibis acerbis, abstinentia uini, quarto & tertio die uomitionibus, pridie cocnæ abstinentia. Album è dulci datur, aptissimè uerò in lacte aut pulte. Nuper inuenere dissectis raphanis inserere Elleborum, rursusq; comprimere raphanos, ut transeat uis, atq; eo lenimento dare. Reddi post quatuor ferè horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis. Medetur in morbis comitalibus, uertigini, melancholicis, insanientibus, lymphaticis, elephantig albæ, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, incipientibusq; tympanicis, stomachicis, spasticis, clinicis, ischiadicis, quartanis quæ aliter non desinant, tussi ueteri, inflammationibus, torminibus redeuntib. Vetant dari senibus & pueris. Item mollibus & scemineĩ corporis animeq; exilibus, aut teneris, & sceminis minus quàm uiris. Item timidis, aut si exulcerata sint præcordia, uel tumeant, minimeq; sanguinẽ excreantibus, uel latere uel faucibus. Medetur extra corpus eruptionibus, pituitæ cum axungia illitum. Item suppurationi ueteri. Mures polenta admixtũ necat. Muscæ quoq; necantur albo trito, & cum lacte sparso. Eodem & phthiriasis emendatur.



ELLEBORVS NIGER ADVL
TERINVS HORTENSIS.

Christwurz.



ELLEBORVS NIGER
 DVLTERINVS SYLVESTRIS

Reißkraut.

DE ELLEBORO NIGRO ADVLTE-
RINO. CAP. CV.

NOMINA.

Elleborus niger
adulterinus cur
dictus.



HERBAM hanc cuius picturam damus non esse uerum Elleborum facile constabit, si eam ad descriptionē referas. Verum quum magna pars hodie medicorum pro Elleboro nigro, neq; tamen citra summam efficacitatem, utatur, adulterinum nigrum Elleborum appellare placuit. Germanis *Christwurz* dicitur, non alio sanè nomine quàm quod circa seruatoris nostri *CHRISTI* natalem diem flores, modo calido in loco sita sit herba, producat. Cæterum etsi genuinus Elleborus non sit, tamen non admodum ab illo abludiva descriptio, nec uiribus multo inferior est, ut in alterius inopia huius usus citra errorem esse possit.

GENERA.

Duo eius esse genera deprehendimus. Vnum quod officinæ hodie Elleborum nigrum, Germani uerò *Christwurz* / ut diximus, nominant. Nos certioris discriminis causa, Elleborum nigrum adulterinum hortensem appellauimus, quod scilicet sua sponte, & nisi plantatum sit, in hortis non proueniat. Alterum quod syluestre sit, & sponte sua nascitur, Elleborum nigrum adulterinum syluestrem nuncupauimus, Germanis *Leüßtraut* dicitur.

FORMA.

Hortensis caulem, uel potius pediculum, habet oblongum & folijs nudum, nisi in summo, ubi folia oblonga, angusta, pluribusq; diuisuris incisa, atque adeò in ambitu ferrata producit. Florem habet herbacei coloris. Radices tenues, nigras, ueluti à capitulo ceparum pendentes. Syluestris priorì non admodum dissimilis est, nisi quia caulem obtinet crassiorē, foliaq; minora. Florem etiam etsi herbaceū habeat, tamen è medio eius, folliculi, aut siliquæ duæ aut tres, in quibus semen est, exeunt.

LOCVS.

D Hortensis, ut dictum est, passim in hortis nunc prouenit: syluestris in montibus asperis, lapidosis ac sublimibus.

TEMPVS.

Hortensis hyeme, circa *CHRISTI* nimirum natalem, ut comprehensum est, floret. Syluestris autem uere & initio æstatis.

TEMPERAMENTVM.

Quum experientia testetur Elleborum nigrum adulterinum, potissimū hortensem, eandem quam genuinus habere facultatē, idem etiam obtineat temperamentum necesse est. Calidus itaq; & siccus in tertio ordine erit.

VIRE S.

Purgat perinde atq; genuinus inferiorem uentrem, pituitam & flauam bilem ducens. Prodest comitiali morbo laborantibus, melancholicis, insanientibus, articulorum doloribus correptis, & resolutis. Menses in pefso subditus trahit. Foetus necat. Porrò cum illis etiam insit extergendi uis, alphos, impetigines, scabiem, leprasq; curant. Erodentibus medicamentis cōmiscuntur. Ideoq; syluestris non temerè, quod pediculos interficiat, *Leüßtraut* à Germanis meis dicitur. Non uero pediculos tantum, uerum etiam oues & alia animantia comestus necat.



HELXINE

Tag und nacht.

a



C

NOMINA.



Helxine unde dicta.

Perdicion.
Vrceolaris.
Muralis.
Parietaria.

ΛΞΙΝΗ, ἢ ὠψήθριον græcè, Helxine & Vrceolaris latinè nominatur. Officinæ uocant Parietariam, & dempta una litera Paritariã. Vulgus Muralium & Muralem. Germani Tag vnd nacht/S. Peterstrant/oder Glasstrant. Helxine autem ab aspero semine quod tenaci nexu uestibus adhæret, dicta est. Perdicium uerò, quod ea perdices præcipuè uescantur. Vrceolaris autem, quod detergendis uitreis, urceolis uasisq̃ efficac sit. Muralis & Parietaria, quod muros ac parietes natales locos sibi fecerit.

FORMA.

Cauliculos habet tenues, subrubentes, folia Mercuriali similia, hirsuta, circa caules ueluti exigua semina, aspera, uestibus adhærentia. Hæc sanè pictura sic plantæ illi respondet, ut nulla prorsus sit nota quæ illi non adamussim conueniat. Est enim fruticosa, cubitalis, cauliculis tenuibus, leniter rubescentibus, folijs Mercurialis herbæ, hirsutis, floribus purpureis minutissimis, exili per ambitum eius semine, aspero, uestibus adhærente, radice subrubra, fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, muris, macerijs, parietibus & uinetis. Nunc in hortis etiam plantata prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Facultas Perdicio inest abstergendi & cōstringendi cum humiditate subfrigida.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia refrigerandi cōstringendiq̃ uim obtinent. Quare illita sacros ignes sanant, condylomata, adusta, incipientes panos, inflammationes omnes, & cedemata. Succus eius ceruffæ mixtus, ignibus sacris & ijs quæ serpunt malis utiliter illinitur. Iungitur podagris cum cerato Cyprino, uel seuo hircino. Diuturnas tusses adiuuat, cyathi mensura absorptus. Contra inflammatas tonsillas gargarissatus & illitus prodest. Aurium quoq̃ dolores cum rosaceo infusus iuuat.

EX GALENO.

Vim habet abstergendi & paulatim cōstringendi ac refrigerandi. Quare phlegmonas omnes inter initia, & in augmento usq̃ ad statum sanat, maximè calidas. Quinetiam incipientib. phygethils cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoq̃ eius ad dolores phlegmonosos mediocriter profuerit. Gargarizandū item nonnulli exhibent ad paristhmia. Aliqui etiam medicorum ijs qui diutina tussi uexantur, illam exhibuerunt. Certè euidentis extergendi experimentum præbet & in uasis uitreis.

EX AETIO.

Exterit alopecias & impetigines priuatim assiduè illita. Sedis hæmorrhoidas aperit, fistulis medetur, & sinus cohibet trita & cum modico sale apposita.

EX PLINIO.

Hæc inficit lanas, sanat ignes sacros, tumores, collectionesq̃ omnes & adusta. Panos succus eius cum psimmythio, & guttura incipientia turgescere. Item ueterem tussim cyatho hausto. Et omnia in humido. Sicut tonsillas & uarices cum rosaceo. Imponitur & podagris cum caprino seuo ceraq̃ Cypria.

APPENDIX.

Monendi sunt hoc loco medici ut rectum Helxines usum discant. Nam hæcenus non rectè eam in frigidis uitijs pro fomento usurparunt, cum refrigerandi cōstringendiq̃ uim habeat. Cæterum cum abstergendi quoque illi facultas inest, potest etiam calculosis, & ijs qui difficultate urinæ laborant exhiberi, potissimum si aliquid

aliquid consimilem facultatem obtinens ei admisceatur. Sic Aëtius sedis hæmorrhoidas aperire tradit, si trita cum sale, cui etiam abstergendi uis inest, apponatur. Quare qui calculosis hanc herbam propinant, curent ut aliquid quod abstergendi facultatem habeat, commisceant.

DE ERYTHRODANO CAP. CVII.

NOMINA.

EΡΥΘΡΟΔΑΝΟΝ græcè, Rubia latinè uocatur. Officinæ Rubeam tinctorum appellant. Germanicè Rôte nominat. A rubore radice, quolanae & coria tinguntur, factum illi utrunq; nomen est.

Rubia curuocata.

GENERA.

Dioscoridi & alijs duo Rubiæ sunt genera. Altera enim satiuæ est, altera uerò sponte prouenit, & syluestris existit: nec esse uidetur alia quàm quæ à nostris Stel-laria uocatur.

Satiua.

Syluestris.

FORMA.

Caules satiuæ quadranguli, longi, asperi, similes Aparinæ, multo tamē maiores robustioresq; folia per interualla in singulis geniculis habentes, stellarū modo in orbem circūiacentia. Fructus rotundus, per initia uiridis, mox ruber, postea cum maturuit niger. Radix tenuis, longa, rubra. Syluestris itidem caules quadrangulos, ut diximus, emittit, folia per interualla in singulis geniculis stellarum instar in orbem circumiacentia, flores candidos, radicem tenuem, longam & rubram, adeò ut suo colore tingere etiam uideatur.

LOCVS.

Nascitur in plerisq; nunc Germaniæ locis, agro potissimum Argentoracensi & Spirensi. Seritur autem propter emolumentū quod ex ea questuosisimū sentitur.

TEMPVS.

Aestate colligitur fructus, & subinde etiam effoditur radix.

TEMPERAMENTVM.

Calida est in secundo ordine, & sicca in tertio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Radix urinam ciet, qua de causa regio morbo laborantibus cum aqua mulsa auxiliatur: item ischiadicis & resolutis. Vrinam multam & crassam ducit, nonnunquam etiam sanguinem. Bibentes quidem quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus uenenatorū morsus succum cum folijs bibere prodest. Semen ex oxymelite potum, lienem absumit. Apposita radix, fetus, menses, & secundas trahit. Albas uirilignes ex aceto illita sanat.

EX GALENO.

Rubia tinctorum radix acerbæ & gustu amara est. Itaque quæcunq; agere diximus ubi eiusmodi coierint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspiciet: quippe quum & lienem & iecur expurget, & urinam crassam copiosamq; ac nonnunquam etiam sanguinolentam moueat. Quin & menses ciet, ac mediocriter quæ extersionem postulant, extergit: proinde uirilignes albas cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis & resolutis in potu cum melicrato exhibeant.


EX PLINIO.

Erythrodanum, quam nos Rubiam uocamus, qua tinguntur lanae, pellesq; perficiuntur, in medicina urinam cit, morbum regium sanat ex aqua mulsa, & lichenas ex aceto illita: & ischiadicos & paralyticos, ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix semenq; trahunt menses, aluū sistunt, & collectiones discutunt. Contra serpentes rami cum folijs imponunt. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum.



RUBIA
SATIVA.

Röce die gum.



RUBIA
SYLVESTRIS.

Röte die wild.

a 3

C

NOMINA.

Semen cur di-
ctū Zea.
Ζείδιωπος
ἀγροα.



EIA Græcis, Zea & Semen Latinis, uulgo & Italis Spelta dicitur. Semen autem Latini à præstantia frugis appellarunt. Hinc est quod Homerus etiã hanc celebrauerit dicens, Ζείδιωπος ἀγροα. Quib. sanè uerbis innuit aruum Zeam largiens, non ut nonnulli arbitrantur quod uitam donet, Plinio autore.

GENVS.

Duo Zea Dioscorides facit genera. Vnum cuius grana in singulis tunicis seu glumis gemina, quod Græcis eã ob causam *Δίκουκος* cognominatur. Germanis hoc genus *Speltz*/oder *Dinkelhorn* uocatur. Alterum simplicis est grani, & germanice nominatur *Einhorn*/oder *S. Peters horn*.

FORMA.

Primum genus. Primum genus culmo, geniculis & spica tritico simile est, duobusque utriculis iunctis duo grana simul fert. Alterum. Alterum culmo & spica est breuioribus, grana singula in singulis tunicis duplici ordine seu uersu dispositis proferens, ac in summitate aristis suis planè hordeum refert.

LOCVS.

Lætum pingueq; solum desiderat.

TEMPVS.

Iunio mense floret, Julio autem maturitatem consequitur.

TEMPERAMENTVM.

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeũ, quatenus ad calefaciendi & refrigerandi facultatem attinet, placide uero exiccat.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

D Zea magis nutrit quàm hordeum. Ori suauis est, Digesta in panificia minus quàm triticum alit.

EX GALENO.


Zea uniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici & hordei: itaq; ex illis cognoscatur.

EX PLINIO.

Zea farina efficacior hordeacea uidetur, trimestris mollior. Ex uino rubro ad scorpionum ictus tepida, & sanguinem excreantibus. Item arteriæ. Tussi cum caprino seuo aut butyro. Ex Fœnogræco mollissima omnium. Ulcera manantia sanat, & furfures corporis, stomachi dolores, pedes & mammas cum uino & nitro cocta.

EX SYMEONE SETHI.


Zea facultatem habet proximam tritico, Est uero facilis concoctionis, boniq; succi: ad hæc etiam emplastica existit.



ZEAE PRL
MVM GENVS.

Speltz.

a 4



ZEAE ALTE-
RVM GENVS.

Einhorn.

NOMINA.



ΕΡΙΓΕΡΩΝ Græcis, Senetio Latinis, officinis inusitata, Germanis *Gründkraut* dicitur. Græcis autem Erigeron quasi uernus senex nominatur, seu citò uel uerè senescens, quod celeriter in pappum & lanuginem abeat. Itaque compositione nominis, tempus simul quo floret, & floris mox deflorescentis euentum, indicare uoluerunt Græci, ut quo tempore quærenda, & quibus notis inuenienda esset omnes scirent. Non igitur senectutis ratio aliqua in ea est, sed canescentes humani capilli modo post florem eius pappi, ut à senectute denominaretur, effecerunt. Eam etiam ob causam Romani Senetionem illam uocauerunt.

Erigeron cur dicta.

Senetio.

FORMA.

Herba est cauliculo cubitali, subrubro, folijs continuis, in extremitatibus Erucae modo incisuris diuisis, sed minoribus multo: floribus luteis, celeriter scissis deflorescentibusue, & in pappos deflorescentibus: unde & Erigeron dicta est, quod uere scilicet capilli modo flores canescant. Radice inutili. Omnes hæc Dioscoridis notæ, herbæ quam Germani *Crengwurcz* & *Gründkraut* nominant, respondere deprehenduntur. Siquidem cauliculus est illi cubitalis, subruber, folia continua habens, per extremitates Erucae instar laciniosa, minora tamen. Flores lutei, qui scissi statim in lanuginem abeunt. Errant toto cœlo qui Senetionem Nasturtium esse garrunt.

Senetio non est Nasturtium.

LOCVS.

Nascitur passim in sepibus, & circum oppida.

TEMPVS.

Vere erumpit, quo etiam tempore, ut dictum est, canescit, & durat ferè tota æstate eius herbæ prouentus.

TEMPERAMENTVM.

Erigeron, Paulo Aegineta autore, mixtam temperaturam obtinet: refrigerat enim & modicè discutit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus refrigerandi uim obtinent, quapropter cum exiguo uino, aut per se illita folia, testium sedisq; inflammationes sanant. Cum manna, tum reliquis uulneribus, tum neruorum quoque medentur. Idem præstant pappi per se ex aceto illiti, uerum recentes epoti strangulant. Totus autem caulis in aqua decoctus, & cum passo potus, stomachi dolores à bili contractos persanat.

EX PLINIO.

Lanugo eius cum croco & exiguo aquæ frigida trita illinitur epiphoris. Tosta cum mica salis strumis. Erigeron quoque cum farina thuris & uino dulci, testium inflammationes sanat.



SENETIO

Creutzwurtz.

NOMINA.



ΔΥΟΣΜΟΣ, ἢ μένθον græcè, Menta latinè dici. Officinæ nomen latinum retinuerunt. Germanicè Mînz uocatur. Hedyosmon Græci, quod suauem spiret odorem, nominauerunt. Menta autem dicta est, quod odore suo mentem excitet, aut quod grato, ut ait Plinius, odore mentis percurrat.

Hedyosmon una
de dictum.
Menta.

GENERA.

Mentæ in uniuersum duo sunt genera. Vna enim satiuæ & hortensis est: altera syluestris & fera. Satiuæ iterum quatuor præcipua sunt genera. Vna est quam Germani Deyment simpliciter, uel Krauß Deyment uocant. Altera, quam isdem Krauß Balsam. Tertia, quæ isdem Balsammînz appellatur, & vnser Frauwen mînz / oder spîz mînz: à nostræ ætatis herbarijs Romana uel Saracenica. Quartam Germani quidam Herztraut / nonnulli Balsamtraut uocant. Per me tamen licebit has species, quandoquidem facultatibus similes sint, ut cuius placue rit nominare. Nobis autem ut certius discernentur prædictis nominibus appellare placuit. Syluestris, quæ Latinis Mentastrum uocatur, & uulgo equina Menta, germanicè Rosmînz / wilder Balsam / oder wild mînz dicitur. Non ignoramus plures esse Mentæ species, nos tamen eas duntaxat quas uidimus, pictas exhibemus.

Satiuæ genera.

FORMA.

Satiua prima caulem habet quadrangulum, à radice lentè punicaentem, & lanugine pubescentem, folium ferè rotundum, serratum, molle & odoratum, flosculos purpureos internodia geniculatim coronantes, uerticillato semper ambitu. Altera priori per omnia similis est, nisi quod illi subpurpureus flos circa cauliculorum fastigia spicatur. Tertia folio longiore & acutiore constat, flosculis purpureis colliculorum cacuminib. spicatim insidentibus. Quarta itidem longioribus folijs est, floribusq; purpureis internodia geniculatim, haud secus quàm in prima, caules coronantibus. Mentastrum uerò folijs lanugine canescentibus, atque hirsutioribus, Silymbrio procerius, odore magis uiroso, flosculis spicatim colliculorum fastigia coronantibus.

Prima.

Secunda.

LOCVS.

Satiuæ passim in hortis proueniunt. Amant apricum locum, nõ pinguem, non ftercoratum, humidis facilius adolefcunt. Syluestris autem, quæ Mentastrum alio nomine appellat, uliginosis gaudet locis, passimq; irrigua hoc Mentaastro pubent.

TEMPVS.

Florent omnes mense Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Vtraq; tam hortensis scilicet quàm syluestris, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine excalescentium. Infirmior tamen est hortensis, minusq; calefacit. Exiccat autem in secundo ordine: illi enim ex cultura aliquid humiditatis accedit.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.


Calefaciendi, adstringendi atque exiccandi uim habet Menta hortensis. Proinde sanguinem sistit succus eius cum aceto potus. Lumbricos rotundos enecat. Venerè concitat. Singultus, uomitiones, choleramq; sedant duo aut terni surculi cum acidi granati succo poti. Cum polenta illita abscessus discutit. Imposita fronti, capitis dolores mitigat. Mammæ quæ tendunt, aut lacte turgent, compefcit. Cum sale canum morfib. illinitur. Aurium doloribus eius succus cum aqua mulla subuenit. Mulieribus ante coitum admota, conceptioni resistit. Linguæ scabritiem confricata leuigat. Lac coire densariq; in caseum non sinit, immerfis in eo folijs. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem usum habet, Syluestris in sanitate deterioris usus est quàm satiuæ.

EX GA-



MENTA

Kraus deyment.



MENTA HORTENSIS
SECUNDA.

Kraus balsam.

b



MENTA
HORTENSIS TERTIA


Unserer fratwen münztz.



MENTA
HORTENSIS QUARTA

Gerztraut.

b 2



MENTASTRUM

Rosmüntz.

EX GALENO.

Menta fatiua ad uenerem mediocriter excitat, id quod omnibus inest quæ humiditate semicocta & flatuosa participant. Deniq; in abscessibus aliqui eam cum lenta imponunt. Habet etiam quiddam amarum in se & acerbum: illo quidem lumbricos interficit, acerbitate uero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis excretiones reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium. Aëtius addit, potum eius decoctum tribus seriatim diebus, colicos omnino sanare.

EX PLINIO.

Mentæ hortensis odor animū excitat, & sapor auiditatem in cibis: ideo in mamarum mixtura familiares ipsæ excessere, ut coire denfariq; lac nō patiantur. Quare lactis potionibus additur, ne huius coagulati potu strangulentur. Data in aqua & mulso, eadem ui resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia denfari. Aequè maribus & fœminis sanguinem sistit, & purgationes fœminarum inhihet. Cum amylo ex aqua pota, celiacorum impetus, Syriation & uomicas uulua curauit. Ille & iecinorum uitia ternis obolis ex mulso datis. Item sanguinem excrementibus in sorbitionem. Ulcera in capite infantium mirè sanat. Arterias humidas siccant, siccas adstringit, pituitas corruptas purgat in mulso & aqua, Voci succus sub certamine utilis duntaxat, qui & gargarifatur uua tumente, adiecta ruta & coriandro ex lacte. Utilis & contra tonsillas cum alumine, linguæ asperæ cum melle. Ad cōuulsa intus per se, uitijq; pulmonis. Singultus & uomitus sistit cum succo granati, ut Democritus monstrat. Recentis succus narium uitia * spiritu subducto emendat. * Aliis spiritus subductos. Ipsa trita choleras in aceto quidem pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposita cum polenta, & si mammæ tendantur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumitur & contra scolopendras, & scorpiones marinos, & ad serpentes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus, item sedis uitij. Impetigines quoq; uel si teneat tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lienem mederi eam in horto gustatam, ita ne uellatur. Arida quoq; farinam tribus digitis apprehensam, & stomachi dolorem sedare in aqua, & similiter aspersa in potionem, uentris animalia pellere.

APPENDIX.

Animaduertendum, ea quæ Plinius Mentastro tribuit, Calaminthæ deberi, ut satis liquet Dioscoridem legenti. Neq; sanè mirum, quandoquidem autores societate quæ est inter Mentam, Mentastrum & Nepetam decepti, tum species, tum nomina confundunt.

APPENDIX ALTERA.

Cæterum appendicis etiam uice hic annotandum erit, Aristotelem sectione xx. proble. secundo, cum asserit Mentam refrigerare posse corpora, non pugnare cum Galeno alijsq; medicis qui illam esse calidam affirmant. Per se nanq; calida est Mentata: at quia ea libidinem proritat, & hæc cum immodica fuerit corporis uires deijcit, atq; ad eò animum & corpus refrigerat, ideo eam ex accidente, quia uidelicet ut in uenerem immodice ruamus efficit, refrigerare dixit Aristoteles.

EX SYMEONE SETHI.

Iuuat iecur frigidum, & uentrem corroborat ac stomachum, coctionem facit, uomitum sedat & singultum. Prodest etiam ad cordis morsus, & appetitionem suscitatur. Flatus discutit, & lumbricos interimit, potissimum syluestris Mentæius. Venerem stimulat, & iecinoris obstructions tollit. Verum hoc uesci ad satietatem non oportet, quoniam sanguinem extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauam bilem mutat: dein efficit ut sanguis qui maxime est tenuium partium discutatur, & crassus ac melancholicus relinquatur, atq; idcirco oportet biliosos ab ea abstinere. Cōnita cum sale, & morsui rabiosi canis imposita, medicamentum fit salubre. Arida uero



HEMIONITIS

Hirsungen.

À trita, & post cibum sumpta, ad cōcoctionem facit, & lienosos iuuat. Cum uino pota difficulter parienti succurrit. Ferunt etiam quod mansa lippienti imposita, fiat remedium: quodq̄ eius decoctum absorptum, confestim sanguinem è faucib. eijscentes sanet. Huius semen uentrem purgat, & pulmonem lædit.

DE HEMIONITIDE CAP. CXI

NOMINA.



ΜΙΩΝΙΤΙΣ, ἡ αἰλιουρ Græcis, Hemionitis Latinis, Plinio Teucrion, officinis & herbarijs Scolopendria & lingua ceruina, Germanis Hirszung nominatur. Alia tamen est à Dioscoridis Scolopendrio, quæ Asplenon alio nomine dicitur.

Scolopendria officinarum.

FORMA.

Folium Dracunculo simile profert, lunatum. Radices uero illi multæ subsunt, tenues. Neq̄ caulem, neq̄ semen, neq̄ florē fert. Ex qua descriptione satis liquet, eam herbam quā uulgus Scolopendriā uocat, esse Hemionitin, quod tota illi Dioscoridis pictura, nulla reclamante nota, conueniat. Sunt enim illi folia Dracunculi seu Ari, instar lung corniculantis falcata. Etsi enim interdum in altū surgant, ramen inter initia potissimum incurua, & lunæ crescentis modo falcata sunt. Radicibus etiam cohæret multis exilibus, nunquam florens, nec caulem, nec semen profrens. Non esse autem Phyllitim in primis folia docent, quæ in ea sunt recta, & minime sicut in Lingua ceruina lunata. Dein in tergo ueluti uermiculi, qui in Phyllitide pensiles, in Lingua ceruina autem sessiles & nequaquā propendentes, sed liratin digesti sunt. Tertio natales ipsi: Phyllitis enim in umbrosis opacisue, & hortis nascitur, Scolopendria uero seu Hemionitis in petrosis. Quarto, quod me omnium maxime mouet, Phyllitidi nulla prorsus lienem liquandi facultas inest, quam tamen Scolopendriæ uulgaris adesse præter cōmunem consensum, quotidiana etiam experimenta demonstrant. His itaq̄ de causis Phyllitis, Scolopendria uulgaris esse aut dici non debet. Dato enim quod descriptio per omnia conueniret, facultates tamen ipsæ, quæ diuersæ sunt, aliam à Scolopendria esse manifeste docerent.

Scolopendria est Hemionitis.

Scolopendria nō est Phyllitis.

LOCVS.

Nascitur locis umbrosis, montosis ac petrosis, copiosissime autē iuxta montem haud procul à Tubinga situm, quem Germanico uocabulo Sarnberg nominant, prouenire solet. Nunc passim in hortis habetur.

TEMPVS.

Æstate usq̄ ad autumnum abunde nascitur.

TEMPERAMENTVM.

Adstringens simul & parum amara est, unde credibile est in primo ordine esse calidam, & in secundo siccam.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Herba gustu adstringit. Hæc autem cum aceto pota lienem liquat.


EX GALENO.

Hemionitis simul & adstrictionē & amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto pota, lienosis auxilio est.

EX PLINIO.

Medetur lienibus. Constatq̄ sic inuentum: cum exta super eam proiecta essent, fertur adhæsisse lienem, eumq̄ exinanisse. Ob id à quibusdam Splenion uocat. Narant sues qui radicem eius edunt, sine splene inueniri.

Splenion unde dicitur.



ERYNGIVM.

ManScrew.

NOMINA.



PYRRION Græcis, Eryngiū Latinis, officinis corrupto uocabulo Irin-
 gus uocatur. Pleriq; etiā Centumcapita nominant, à numero nimirum
 capitum quæ in summo obtinet. Plinij tamen Centumcapita, ab Eryn-
 gio est diuersa, ut etiā Serapionis. Si quis enim diligenter eius descriptio-
 nem excutiat, eam planè esse deprehendet, quæ Dioscoridi Aster Atticus & Ingui-
 nalis appellatur. Vtriusq; enim picturæ sic sibi respondent, ut planè una esse herba
 uideat. Germanis Eryngiū nominatur *Wanstrew/Brachendistel/& Raddistel.*

Iringus.

Centumcapita.

Serapionis Cen-

tumcapita est

Aster.

FORMA.

In genere aculeatarum stirpium est Eryngium, cuius folia initio sale condita ole-
 um modo comeduntur. Sunt autè lata, & in ambitu aspera, gustu odorata. Quum
 uero adolefcunt, in multis caulium eminentijs spinis aculeant: in quorum summi-
 tatibus globosa capita, durarū acutissimarumq; spinarum ambitu stellæ instar cir-
 cumuallantur, quorum color modo uiridis aut candidus, interdum cæruleus inue-
 nitur. Radix illi oblonga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis crassitudine, & odora-
 ta. E qua nimirum deliniatione omnibus perspicuū fit, spinam cuius picturā nunc
 exhibemus, esse Eryngium: aculeatis enim folijs & per extrema spinosis conspici-
 tur, odoratis, caule cubitali, in cuius uertice coacta in globum capitula, durorum
 & acutissimorum spiculorum uallo, stellæ instar radiantur, quorum color in puber-
 tate uiridis, adultæ cæruleus, flaccescenti candidus conspicitur: radice pollicari, in-
 tus candida, foris nigra, sed odorata.

LOCVS.

Nascitur in campestribus & asperis locis. Prope Argentoratum eius magna est
 copia.

TEMPVS.

Colligi hanc quidam, ut Plinius tradit, cum sol Cancri hospitium tenet, hoc est,
 sub solstitio, iussere.

TEMPERAMENTVM.

Eryngium caliditate aut parum aut nihil ea quæ moderata & temperata sunt su-
 perat. Siccitatem uero in tenui essentia consistentem non exiguam obtinet.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Vim habet calefactoriam radix. Pota menses & urinas pellit. Tormina & infla-
 tiones discutit. Cum uino iecinorosis, uenenatorum moribus, & ijs qui letiferum
 hauserunt succurrit. Bibitur aduersus plurima cum Staphylini semine pondere
 drachmæ unius. Appensa & illita tubercula discutere proditur. Radix cum hydro-
 melite pota, opisthotonicis & comitialibus medetur.

EX AETIO.

Potum radice decoctum colicis medetur. Mulso addito calculos, stillicidia, diffi-
 cultates urinæ, & renum uitia sanat: quod per quindecim iugiter dies, & ieiunos,
 & in lectum ituros bibere oportet. Quod si cum eo Sium quoq; decoxeris, magis
 proficies. Affirmabat quidam assiduo Eryngij usu, nunq; postea minxisse calculos,
 cum prius eo morbo frequentissime uexaretur.

EX PLINIO.

Clara in primis aculeatarum Eryngion est, contra serpentes & uenenata omnia
 nascens. Aduersus ictus morsusq; radix eius bibitur drachmæ pondere in uino: aut
 si plerunq; tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter effi-
 cax contra chersydras acranas. Omnibus uero contra toxica & aconita efficio-
 rem. Heraclides medicus, in iure anseris decoctam, arbitratur. Apollodorus ad-
 uersus toxica cum rana decoquit, cæteri in aqua.

C

NOMINA.

Lactuca unde
dicta.

PIAÆ Græcè, Lactuca Latinè: officinæ latinum nomēn rētinuerunt: Germanicè *Lattich*/oder *Lactuch* nominat. Dicta autem Lactuca est, quòd copia lactis, quòd credebatur leniter mouere uentrem, exuberet: unde apud ueteres in primis epulis ueniebat, quòd Martialis etiam ijs testatur uerbis:

Prima tibi dabitur uentri Lactuca mouendo Vtilis.

GENERA.

Lactuca primum in satiuam & syluestrem deducitur. Satiuæ tria sunt genera, crispa nimirum, rotunda, & capitata. Nos una icone duo complexi sumus genera. *Crispa Lactuca.* Folium enim quod statim à radice erumpit, eam Lactucam refert quæ Latinis crispa, à folijs crispissimis, Germanis *trauser Lattich*/appellatur. Columella lib. xi. cap. iij. Cecilianam & Beticam à regionibus in quibus crescit, nominat. Reliqua folia eam quæ Rotunda à folijs rotundis uocatur, præ se ferunt. Germanicè *breiter Lattich* nominatur. Tertij generis Lactuca, quæ Capitata dicitur, à folijs suis, quæ ubi parum à terra attolluntur, mâli cuiusdam speciem rotundam obtinent, & instar Brassicæ capitatæ, in capitis ferè formam extuberant. Germanis *grosser Lattich*/ uel *weisser Lattich* à semine candido nominat. Syluestris Lactuca satiuæ opponitur, sponte enim sua in aruis nascitur. Germanis *wilder Lattich* nuncupatur.

FORMA.

Satiua prima, cuius imaginem hic damus, folia Intybo satiuo haud dissimilia habet, in rectumq; surgit, caulibus in summo brachiatum, in quorum cacumine flores sunt lutei. Altera folijs, quæ crispa admodum sunt, duntaxat à priori uariat, aliàs per omnia similis. Sic etiam capitata non nisi folijs suis, idq; dum paululum creuerunt, à priorib. differt. Ideoq; duab. picturis, quæ omnes referunt, contenti fuimus. *Lactuca syluestris.* Syluestris similis est satiuæ Lactucæ, radice tamen breuior, proceriore caule, candidioribus folijs, gracilioribusq; asperioribus, & gustu amaris, quæ, ut addidit Theophrastus, ubi cōsummata sunt aculeantur. Ex qua deliniatione abunde constat, Lactucam syluestrem esse eam herbam, quæ passim nunc ab officinis & herbarijs, nō sine magno errore, Endiuia dicitur. Ea enim in aruis & uinearum limitibus sponte nascitur, folio Lactucæ, & cum adoleuit per oras aculeato, & laciniatim serrato, caulibus bicubitali proceritate confurgentibus, spinulis inhorrescentibus, quibus succus inest lacteus, amarusq; flore ut Lactuca satiuo luteo. Desinant itaq; deinceps ea herba pro Endiuia uti medici, si modo recte consultum ægris cupiunt.

LOCVS.

Satiua in hortis prouenit. Syluestris in aruis & uinearum hortorumq; macerij sua sponte nascitur.

TEMPVS.

Florent Iulio mense, atq; subinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Lactuca satiuo humidum est frigidumq; olus, non tamen extremè: siquidē edendo non foret: uerum maxime secundum aquæ, ut sic dicam, fontanæ frigiditatem. Symeon Sethi frigidam & humidam in tertio ordine statuit. Syluestris autem minus refrigerat & humectat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Satiua Lactuca stomacho accommodata est, refrigerat, somnū conciliat, aluum mollit, lactis abundantiam facit. Elixia magis alit. Illota autem comesta stomachicis prodest. Semen eius potum uenerem assidue somniantibus opitulatur, & concubitum arceat. Ipsæ tamen frequentiores in cibo, claritati oculorum officiant. Condiuntur muria. Quum in caulem prodierunt, uim quandam nanciscuntur succo

aut



LACTUCA SATIVA CRISPATA ET ROTUNDA.


Krauser und breiter lattich

300

LACTUCA
CAPitata.

Grosser lattich.





LACTUCA
SYLVESTRIS

Wild lattich.

C aut lacti syluestris Lactuce similem. Syluestris uirib. in totum Papaueri similis est, unde aliqui eius succum Meconio permiscuerunt. Aquosa per aluum purgat potus in posca liquor obolorum duorum pondere. Exterit argema & caliginē. Cum lacte muliebri inuncta ad ambusta prodest. In uniuersum foporifera est, & dolorem leuat. Menses trahit. Contra scorpionum ictus, & phalangiorum morsus bibitur. Semen haud secus quam fatiue libidinum imaginationes in somno, ac uenere rem arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur succus eius in fictili uase, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatus.

EX GALENO.

Lactuca ad calidas phlegmonas accommodata est, & ad parua & leuia erysipelata, maioribus tamen satisfacere minime idonea est. Est etiam edulium sitim arcens. Semen potum geniturae profluuium cohibet: quamobrem etiam ijs qui libidinosi somnijs uexantur, datur. Sic & syluestris Lactuce semen. Cuius quoque succus colligitur, argema & caliginem expurgans. Ad adustiones cum lacte mulierum inungitur. Omnibus alijs oleribus paucissimum sanguinem & uitiosum generantibus, ex sola Lactuca non multus quidem, nec uitiosus, haud tamen omni ex parte laudabilis gignitur. Ut plurimum cruda ipsa uescuntur. Aestate autem cum in semen iam proruptura est, in aqua dulci praecoquentes, cum oleo, garo & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimentis, obsonijsue, praesertim ijs quae caseo constant. Plerique etiam antequam excaulescat, in aqua elixa utuntur: uti ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse coeperunt. Nam amicus quidam meus, quum olere hoc a longo tempore me ut familiari cibo usum fuisse sciret, uideretque post mandata me contra magnam molestiam non posse, cocturae rationem indicauit. In iuuentute enim, quoniam assiduo os uentriculi bile efferuescebat, aestus moderandi gratia Lactucis utebar. Quum autem ad prouectam aetatem peruenissem, olus hoc contra quam in iuuentute, somnum iam studio & industria accersenti mihi, auxilio fuit: quippe qui etiamnum iuuenis uigilijs dedita opera me assuefeceram, declinante iam aetate, ipsa ex se insomni, grauius hoc incommodo molestabar. Aduersus quod unicum mihi praesentissimum remedium Lactuca uespere comanducata semper fuit. Frigidum ergo humidumque succum profert, haudquaquam tamen uitiosum. Itaque sicut alia olera a iusta concoctione non excidit, neque aluum cohibet, uti neque impellit. Atque haec illi non immerito accidunt, quum nec austera, nec acerba sit, quibus facultatibus in uniuersum aluus sistitur, quemadmodum a salis, acris, & omnino abstergendi uim habentibus ad excretionem concitat, quorum nihil Lactuce inest.

EX PLINIO.

Est quidem natura omnibus refrigeratrix, & ideo estate gratata a stomacho fastidium auferunt, cibique appetentiam faciunt. Diuus certe Augustus Lactuca conseruatus in aegritudine fertur, prudentia Musae medici, cum priores eam ob religionem minime comanducarent, in tantum recepta commendatione, ut seruari etiam in alienos menses eas oxymelite repertum sit. Venerem inhibent, estum refrigerant, somnumque faciunt. Cruditatem ipsae nequaquam faciunt, nec ulla res maiorem in cibis auiditatem incitat inhibetque. Ambustis profunt recentibus, priusquam pustulae fiant, cum sale illitae. Ulcera etiam quae serpunt, coercent initio cum aphronitro, mox in uino tritae. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus, tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt. Eruptiones papularum ex uino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt, ad quod utilissimae quammaximi caulibus & amarae. Quidam lacte infundunt. Deferuefacti iij caules & stomacho utilissimi traduntur, sicut somno, & fatiua maxime Lactuca, & amara lactensque, quam Miconidem uocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte utilissimum esse praecipitur, dum tempestiue capiti inunguntur. Semen fatiuarum contra scorpiones dari, Se-

ari. Semine trito ex uino potō & libidinum imaginationes in somno compeſci. Tentantes aquas non nocere Lactucam edentibus. Quidam tamen frequentiores in cibo officere claritati oculorum tradiderunt.

DE THYMBRA CAP. CXIII.

NOMINA.

THYMBRA Græcis, Thymbra, Cunilac̄ Latinis, Kunel Germanis appellat̄.

GENERA.

Thymbra seu Cunilæ duæ sunt species. Vna hortensis seu fatiua, *Hortensis.* que quia minori est acrimonia, in cōdimentario genere edulij cōcoquitur: hinc à saturando Satureia dici cœpit.

Alij tamen à Satyris nomē traxisse putāt, *Satureia unde dicta.* quod scilicet marcescentes coitus stimulet.

Germanicè Saturon / Hinnerfūl / Jose plen / Zwibel oder Gartenhyſop / oder Sergentraut nominatur. Altera agrestis *Syluestris.* siue rustica Cunila est, quæ peculiariter Thymbra nuncupatur.

FORMA.

Thymbra similis est Thymo, sed minor atq; tenerior, ferens spicam floribus plenam, coloris uiridis. Satureia pedali altitudine surgit, fruticosa, furculosis utrinq; *Satureia.* cauliculis, folio Hyssopi, flosculis per interualla ex purpura candicantibus, odore saporeq; gratissimo.

LOCVS.

Thymbra in tenui solo, & asperis locis nascitur. Satureia in hortis seritur passim.

TEMPVS.

Æstate utraq; Cunila floret.

TEMPERAMENTVM.

Thymbra calida & sicca in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Thymbra eadem quæ Thymus præstat si consimiliter sumatur. Vtilis etiam in sanitate eius usus. Est etiam fatiua Thymbra, in cunctis syluestri minor: ad cibum uero utilior, propterea quod non adeo efficax illi sit acrimonia.

EX PAVLO.

Thymbra syluestris eadem quæ Thymus præstat, Hortensis autem omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatior.

EX PLINIO.

Nusquam utrunq; Thymbrae genus additur, quippe similis effectus.

EX HERBARIO ANTIQVO.

Farina eius ex uino pota, medetur pulmonis, thoracis, & uesicæ uitijs. Ciet urinas, menses pellit. Herba ipsa cum floribus Lethargicos excitat calfactu, aut coronę modo capiti imposta. Succus cum rosaceo auribus infunditur. Cum triticea farina coxendicibus illinitur. Satureiæ usus marcescentes coitus stimulat, quare à Satyris traxisse nomen putant. Stomachi concoctiones adiuuat, fastidia discutit, hebetes oculos exacuit.



SATYRIA
SATIVA.

Josephin oder Saturnon.

NOMINA.



Q Λ Α Σ Π Ι, ἢ θλασπίδιον, ἢ σίνυπι ἄγριον Græcis dicitur: Thlaspi, Capsella, & Scandulaceum Latinis. Sunt huius temporis herbarij qui Nasturtium tectorum, & Sinapi rusticum, quod digitis friatum sinapim suboleat, appellant. Alij Bursam pastoris uocant, non sanè quod sit reuera eius herbæ species, sed quod ad formam illius quamproximè accedat. Sic antiquo herbario Bursam pastoris appellare Thlaspin placuit. Thlaspi autem Græcis à fructus forma dictum est, qui Nasturtio similis est, sed latior, & uelut infractus & contusus. ολασπαι enim ipsidem contundi est & infringi, infringendoq; quod globosum tumidumue erat malleo, lapide, pedèue cum dilatazione exaquare.

Nasturtium tectorum.
Sinapi rusticum.
Bursa pastoris.

Thlaspi unde dictum.

GENERA.

Duo Thlaspis genera damus. Vnum latioribus folijs, quod ad Dioscoridis descriptione proxime accedit. Hoc germanicè *Baurnsensff/oder Kress* nominatur. Alterum folijs angustioribus constat, & germanicè *Besemtraut*/quod scoparum uices suppleat uocatur. Quare si quispiam hæc duo genera ab inuicem distinguere certis appellationibus uoluerit, primum Thlaspi maius aut latifolium, alterum uero minus aut angustifolium appellet. Dioscorides etiam duo Thlaspios genera facit, unum latifolium, alterum angustifolium.

FORMA.

Herbula est angustis folijs ad digiti longitudinem, in terram uersis, in extremitibus incisus, subpinguibus. Caulem tenuem, duorum dnodantum emittit, adnascens sibi paucos ramulos habentē, & per totum eius ambitū fructus est in summo modicè latus, in quo semen exiguum Nasturtio simile, disci figura, ueluti conquassatum, unde & nomen inuenit. Florem obtinet album, semenq; acre. Ex ea sanè descriptione satis cōstat, herbam hanc quam pictam damus esse Thlaspin, angusta enim folia habet, potissimū suprema eius parte, digitali longitudine, in terram se conuertentia, per extrema leniter incisa, caulem duum dnodantum, agnatis in eo paucis calycibus, breui pediculo nitentibus, quadam ligularum uel cochleariorum effigie, in quibus semen continetur Nasturtio simile, sed latius & ueluti conquassatum, quod acerrimi esse gustus deprehenditur, ita ut mansum Sinapis modo os & linguam uellicer.

LOCVS.

In fossis, semitis, & sepibus prouenit.

TEMPVS.

Maiō & Iunio mensibus floribus & semine prægnans inuenitur.

TEMPERAMENTVM.


Semen calfacit & exiccat in quarto ordine.

VIREŚ. EX DIOSCORIDE.

Calefacit, bilem per superna & inferna purgat acetabuli mensura potum. Ischia dicis in dysteri infunditur. Potum sanguinem ducit, & interiores abscessus rumpit, menses cit, & foetus necat.

EX PAVLO.

Semen Thlaspi facultatē habet acrem, adeò ut internos abscessus potum disrum pat. Menses cit, & foetus enecat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischia dibus prodest. Potest enim alioqui tum superne, tum inferne biliosos uacuare humores acetabuli mensura epotum. Infunditur & contra coxendicū dolores. Quintiam potum sanguinem trahit, & internos abscessus rumpit.



THLASPI
LATIFOLIUM.

Bauernsenff.



THLASPI
ANGUSTIFOLIUM

Beseckkraut.

c 4

C

EX GALENO.

Thlaspi semen facultate acre est, ad eò ut internos abscessus potù rumpat. Menfes mouet, & foetus necat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum inferne, tum superne biliosorum humorum euacuatorium, acetabuli mensura potum.

EX PLINIO.

Semen asperi gustus, bilem & pituitam utrinq; extrahit. Modus sumendi acetabuli mensura. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem extrahat. Menfes quoq; cit, sed partus necat.

DE THERMIS CAP. CXV.

NOMINA.



ΕΡΜΟΣ *lympos* Græcis, Lupinus satiuus Latinis: officinae latinum nomen retinuerunt: Germanis *Seigbon* appellatur.

FORMA.

Vnicum caulem obtinet Lupinus, folium quinquefariam aut septifariam dillectum, florem candidum, siliquas in quibus quina senaue intus grana, dura, lata, rufa q; continentur. Radicem luteam capillamentis fibratam.

LOCVS.

Exilem amat terram, arenosam & rubricam præcipue. Limoso agro non exit, culturamq; reformidat.

TEMPVS.

D Ter floret, primum Maio, deinde Iunio, & tertio Iulio mense. Post unumquemque florem siliquas producit.

TEMPERAMENTVM.

Immensa amaritudo euidenter calidum & siccum esse monstrat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Farina eius cum melle linctâ lumbricos pellit. Ipsi quoq; macerati, & amari adhuc comesti idem efficiunt. Decoctum eorundem cum Ruta & Pipere potù idem facit: unde & lienosis prodest. Eodem gangrænas, ulcera terra, incipientē scabiem, alphas, maculas, exanthemata, & achoras perfundere utile. Menfes & foetus idem decoctum cum myrrha & melle subditum trahit. Farina eorum cutem liuoremq; expurgat. Inflammationes cum polenta & aqua mitigat. Ischiades & tubercula cum aceto lenit. In aceto cocta & illita strumas dissipat, & carbunculos rumpit. Decocti pluuiali aqua donec in succū liquecant faciem abstergunt. Cum radice nigri Chamæleonis ouium scabiei medentur, si tepido decocto abluantur. Radix cum aqua cocta & pota cit urinam. Vbi autem edulcati fuerint, triti cum aceto & poti stomachi fastidium leniunt, & cibi aueritatem excitant.

EX GALENO.

Lupinus editur coctus, multis antè diebus maceratione in aqua amaritudinem deponens, sitq; tunc nutrimentum crassi succi. Cæterum ut medicamen ita præparatus ex genere est emplasticorum. Qui uero natiuam amaritudinem habet, iuic extergendi & digerendi uis inest. Lumbricos occidit illitus, & cum melle linctus, aut cum posca potus. Quin & decoctum eius lumbricos eicere potest. Foris identidem perfusum, alphas, achoras, exanthemata, scabies, gangrænas, ulceraq; maligna iuuat, partim extergendo, partim digerendo, citraq; mordacitatem siccando. Expurgat iecur & lienem cum Ruta & Pipere suauitatis gratia assumptum. Elicit menfes ac foetus cum myrrha & melle adpositum. Porro Lupinorum etiam farina sine mordacitate digerit: nec enim liuida tantum, sed & strumas & tubercula curat: atqui tunc in aceto, aut oxymelite, aut posca hanc decoquere oportet,

pro



LVPINVS

Feigbon.

C pro laborantis nimirum temperamento, & affectus diuersitate, quod ex usu est inueniendo, Digerit item quæ liuida sunt, & quæcunq; modo dictum est præstare decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt uero etiam qui Ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

EX PLINIO.

Ex omnibus quæ eduntur siccò nulli minus ponderis est, nec plus utilitatis. Mitescunt cinere aut aqua calidis. Colorem hominis frequentiores in cibo exhilarant. Amari cõtra aspidas ualent. Vlcera atra, aridi decorticatiq; triti, supposito linteolo, ad uiuum corpus redigunt. Strumas, parotidas in aceto cocti discutunt. Succus decoctorum cum ruta & pipere, uel in febris datur ad uentris animalia pellenda, minoribus triginta annorum. Pueris uero impositi in uentrem ieiunis profunt. Et alio genere tosti, & in defruto poti, uel ex melle sumpti. Iidem auiditatem cibi faciunt, fastidium detrahunt. Farina eorum aceto subacta, papulas pruritusq; in balneis illita cohibet, & per se siccata ulcera. Liuios emendat. Inflammationes cum lenta sedat. Si ad mellis crassitudinem decoquant, uutiligines nigras & lepras emendant. Rumpunt carbunculos impositi, panos & strumas minuunt, aut maturant. Cocti ex aceto cicatricibus candidum colorem reddunt. Si uero cœlesti aqua decoquantur, succus ille smegma fit, quo solent fouere gangrænas, eruptiones pituitæ, ulcera manantia, utilissimum. Expedi ad lienem bibere, & cum melle menstruis hærentibus. Lieni crudi cum fico sicca triti ex aceto imponuntur. Radix quoq; in aqua decocta, urinas pellit. Medentur pecori cum Chamæleonte herba decocti, aqua in potum collata. Sanant & scabiem quadrupedum omnium in amurca decocti, utroq; liquore postea mixto. Fumus crematorum culices necat.

D DE IO CAP. CXVI.

NOMINA.

Ion quare dicta.



viola unde uocata.

ION *πρωκυραῖον* Græcis, Viola muraria uel purpurea Latinis, blaw Veiel oder Mergenviolen Germanis dicitur. Officinæ simpliciter Violam nominant. Nicander Ion Græcis dictam credit, quod Nymphæ quædam Ionix, florè illum Ioui primum dedere muneris. Alij Græci Ion uocatum putant, quod cum Io in uaccam à Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Latini quoq; detrita t litera, Violam quasi uitulam imitatione græca uideri possunt appellasse.

FORMA.

Folium habet minus tenuiusq; quàm Hedera, nigrius tamen nec dissimile. Cauliculus statim à radice medius profilit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Humilis præterea est, statimq; à numerosa radice orbiculata folia sine ramis exeunt. Semen quoq; minutum in folliculis uasculisue rotundis, ut pictura indicat, extrema ferè ætate producit.

LOCVS.

Nascitur in opacis & asperis locis, ad radices maxime murorum, hortorum marginibus, & sepibus.

TEMPVS.

Viret hæc perpetuò, Theophrasto teste, si cultus adhibeat: tamen uere, & Martio mense floret, quo potissimum tempore colligi flores eiusdem debent. Semina uero in æstate, ut dictum est.

TEMPERAMENTVM.

Violæ folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Frigidè autem sunt primo ordine, humidæ uero secundo.

VIREs.



VIOLA
PURPUREA

Herzen violet.

C

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Refrigerandi uim obtinet. Folia eius per se & cū polenta illita, stomacho estuant, oculorum inflammationibus, sedisq; procidentijs auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est cum aqua potum, angina correptis, & puerorum comitialibus mederi affirmant.

EX GALENO.

Folia per se, aut cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponunt & ori uentriculi æstuanti, & oculis.

EX PLINIO.

Purpureæ uiolæ refrigerant. Contra inflammationes illinuntur stomacho ardenti. Imponuntur & capiti in fronte. Oculorū priuatim epiphoris, & sede procidente, uuluæ. Et contra suppurationes. Crapulam & grauedines capitis impositis coronis olfactiue discutunt. Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureum est ex ijs comitialibus medetur, maxime pueris, in aqua potum. Semen scorpionibus aduersatur.

EX SYMEONE SETHI.

Profunt ad intestinorum dolores, cor uero offendunt. Dolores capitis qui fiunt à flaua bile sopiunt potæ & odorata. Ventriculū irritant, & flauā in eo inuentam bilem. Caput siccum humectant, calidumq; refrigerant suo odoratu. Somnum inducunt. Humida capita destillationibus obnoxia reddunt.

DE VIOLA MATRONALI CAP. CXVII

NOMINA.

D



Eteribus Græcis & Latinis cognita fuerint nec ne Viola quæ hodie, quod eas matronæ colere soleant, matronales uocantur, nondum compertum habemus. Quare uulgari & usitato nomine, donec rectius inuentū fuerit, utemur. Germanicè, quod raræ adhuc in Germania dum ista scriberemus fuerint, welsch Weiel appellare uoluimus, ut nimirum hac nomenclatura à Leucoijs, de quibus suo dicemus loco, segregaremus. Possent etiam haud inepte *Srawenueiel* ad imitationem latini nominis appellari.

GENERA.

Tria Violarum matronalium damus genera. Primi enim generis candida est, alterius punicea, tertij purpurea: nec differre admodum nisi solis floribus uidentur.

FORMA.

Fruticosa est herba, cubitali altitudine, ramosa, caule & folijs lanuginosis, oblongis, angustis, mollibus ac canescentibus, floribus aut albis, aut puniceis, aut purpureis quadrifolijs, femine in oblongis siliquis lato ac tenui, radice longa, lignosa, sub-rufa & acri.

LOCVS.

In hortis & cultis locis proueniunt.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus florent.

TEMPERAMENTVM.

Admodum calidas esse sapor foliorum & radice, qui acris est, abunde docet. Humiditatem autem multā, Galeno lib. 4. cap. 18. de simpli. medi. facul. teste, eo quod amaræ non sint, admistam habent.

VIRES.

Incidendi & digerendi per halitum uim obtinent. Ideoq; radix aut folia decocta in aqua, cōuulsis, difficultate spirandi laborantibus, & ueteri tussi auxiliantur. Vri-nam & menses ducunt, sudoresq; ciendi facultatem habent.



VIOLA
MATRONALIS ALBA

Weißwelsch Veiel.

d



VIOLA MA-
TRONALIS PVNICEA

Rotwelsch Veiel.



VIOLA MA-
TRONALIS PURPUREA.

Braunwelsch Veiel.

d 2

C

NOMINA.



Iris unde dicta.

Causa vulgaris erroris.

PIΣ Græcis, Iris Latinis appellatur: officinis suam appellationem retinuit. Germanis *blaw Gilgen/ blaw Schwertel/ Weichwurß* dicitur. A cœlestis arcus similitudine, quam flores eius repræsentant, ut paulò post dicemus, nomen accepit Iris. Sunt qui non sine pudendo errore aliam assignent herbam recto, aliam casui paterno, ita ut Iris ab Ireos, tanquã purpureus color à niueo, distingui putetur imperitis herbarijs. Promanasse autẽ hunc errorem ex græca uoce *λέειον*, qua Liliũ, quod candidos profert flores, genti illi significatur, parum per unius literæ abiectionem deprauata, uerisimile est. Primam nanque literam abijcientes, ultimam uerò in *σ* uertentes, *είειον* dixerunt pro *λέειον*. Sed hæc opinio indigna est quæ explodatur, cum Dioscoridem & alios ueteres omnes seorsim de Iride & Lirio siue Lilio agere constet.

FORMA.

Folia Gladiolo similia fert, maiora tamen, latiora & pinguiora. Flores in caule æqualibus inuicem spacijs distantes, inflexi, uarij. Aut enim candidi, aut uirides, aut lutei, aut purpurei, aut cœrulei conspiciuntur. Vnde ob hanc uarietatem arcui cœlesti asimiata est. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ simulatq; fuerint dissectæ, siccantur in umbra, & filo traiectæ recondunẽ. Hæc Dioscoridis pictura tota huic herbe, quam Irim hodie herbarij & officinæ uocant, suffragat. Si quidem ea radicibus nititur solidis, geniculatis & odoratis, adẽ ut uiolarũ purpurearũ odorem prorsus referre uideatur, & hoc nomine à Germanis nostris *Weichwurß*/ hoc est, *Violacea radix*, sit appellata. Folia Gladioli faciem simulant, maiora duntaxat, latiora & pinguiora. Caule recto sesquipedali, è cuius fastigijs pari interuacante spatio flores erumpunt, inflexis mutuò foliorũ labris, qui nitent uaria colorum mistura, instar cœlestis arcus. Quemadmodũ enim aquarius ille arcus, qui est imago malè expressi solis, caua nube recepta, uarios mentitur colores, sic ut cœruleas, uirides, luteas, purpureasq; lineas ducat, ita cauo calyculi sinu uersicolores lituras flores ostendunt, qua diuersa specie cœlestem æmulantur arcum. Falluntur itaque qui in toto floris ambitu huiuscemodi uarietatem perquirunt, cum inflexa foliorum labra uel purpureus, uel cœruleus semper color inficiat.

LOCVS.

Pasim in hortis & macerijs uinearum prouenit. Laudatissima tamen est quæ in Illyrio & Macedonia nascitur, & melior inter has quæ densa & breui radice constat, quæque fragenti contumax est, colore subruffa, admodum odorata, gustuq; feruida.

TEMPVS.

Floret uere, Maio potissimũ mense, quo sanè tempore flores colligi debent. Radices autem suo tempore, hoc est, autumno.

TEMPERAMENTVM.

Iris in altero calefacit ordine, in tertio aut̃ desiccatur. Abstergit quoq; & maturatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Irides omnes calefaciendi extenuandiq; uim obtinent. Contra tussim efficaces, humoresq; nõ faciliẽ excreabiles extenuant. Biles ex hydromelite drachmarum septem pondere potæ purgant. Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Cum aceto potæ uenenatorum moribus, lienosis, conuulsis, refrigeratis, rigentibus, & quibus genitura effluit, auxiliatur. Menses cum uino potæ ducunt. Decoctũ earum ad muliebria fomenta utile, molliens aperiensq; locos. Ischia dicis infunditur. Fistulas & sinus carne explent. Quinetiã glandis modo cum melle apposita, foetus extrahunt. Strumas ueteresq; durities coctæ & illitæ emolliunt.

Aridæ

317



IRIS
GERMANICA.

Blau Silgen.

d 3

C Aridae ulcera explent, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo utiliter illinuntur. Lentigines, cutis in facie uitia cum Elleboro albo, & duabus mellis partibus illitae emendant. Pelsis, malagmatis & acopis miscentur. In uniuersum magni usus sunt.

EX PAVLO.

Iris tufsi utilis. Humores in thorace non facile excreabiles extenuat. Torminibus medetur, ulceraque fordida expurgat. Cum mulla pota aluum ducit.

EX PLINIO.

Infantibus eam circumligari salutare est. Dentientibus praecipua est & tufsientibus, tinearum uero uitio laborantibus, instillari. Caeterum ulcera purgat, capitis praecipue, suppuraciones ueteres. Aluum soluit duabus drachmis cum melle. Tufsim, tormina, inflationes, pota. Lienes ex aceto. Contra serpentium & araneorum morsus, ex posca ualet. Contra scorpiones, duarum drachmarum pondere in pane uel aqua sumitur. Contra canum morsus ex oleo imponitur. Et contra perfrictiones. Sic & neruorum doloribus. Lumbis uero & coxendicibus cum resina illinitur. Vis ei concafactoria. Naribus subdita, sternutamenta mouet, caputque purgat. Dolori capitis cum Cotoneis malis aut Strutheis illinitur. Crapulas quoque & orthopnoas discutit. Vomitiones cit, duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit, imposita cum melle. Ad paronychias farina eius utuntur. Halitus oris comanducata abolet, alarumque uitia. Succo duritias omnes emollit. Somnum conciliat, sed genituras consumit. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrementa sanat.

DE HIERACEO CAP. CXIX

D

NOMINA.



ΕΡΑΚΙΟΝ, ἡ συγγίτης Graecis, Hieraceum Latinis dicitur: officinis in usum tatum, Germanice, quum aliud nomen explicari non potueramus, Habichtraut appellauimus, ad graecam alludentes appellationem: neque enim alia ratione Graeci hanc herbam Hieraceum nominarunt, nisi quod accipitres, quos illi ἰερακας dicunt, scalpendo eam, succoque oculis tingendo, obscuritatem cum sensere discutiant. Sonchites autem dicta est, quod Soncho non admodum dissimilis sit, maxime quod ad eius circumferentiam & extremam partem, in qua caules & flores sunt, attinet. Haec enim & illa comcauo, & lacteum succum emittente caule, luteisque floribus est. Apuleius Lactucam syluaticam appellat. Plinius quoque libro uigesimo, cap. septimo, ut alij omnes ferent, in Lactucarum sponte nascentium numero, propter similitudinem, Hieraceon hoc habet. Quam autem inuicem similes sint Hieraceum & Lactuca syluestris, utriusque icones & effigies collatae monstrabunt.

Hieraceum unde dictum.

Sonchites.

Lactuca syluatica.

GENERA.


Hieracii duo sunt genera, maius nimirum & minus. Maius germanice groß Habichtraut, minus autem klein Habichtraut nominatur.

FORMA.

Hieraceum maius.

Hieraceum maius caulem habet asperum, modice rubentem, spinosum, concuum. Folia per interualla rariuscule diuisa, Soncho per circumferentiam similia. Flores in oblongis capitulis luteos. Quae designatio prorsus hanc quam pictam damus herbam exprimit. Siquidem caulem emittit scabrum, subrubrum, spinulis horrentem, cauum, folia ex interuallis & raro laciniata, Sonchi folijs non dissimilia. Flores in longiusculis capitulis luteos. Minus Hieraceum folia ex interuallis per

Hieraceum minus.



HIERACEVM
MAIVS.

Groß Habichtkraut.



HIERACEVM
MINVS.

Klein Habichtkraut.

Alis per ambitum diuisuris scissa obtinet. Caules de se emittit cauos, teneros & uirides, in quibus flores lutei circulum circumscribentes. Quae itidem notae omnes herbae illi, cuius picturam exhibemus, conueniunt.

LOCVS.

Vtrunq; in quibusdam pratis prouenit.

TEMPVS.

In fine Iulij mensis, & per uniuersum Augustum floret Hieraceum. Succus eius carpitur per messes inciso caule.

TEMPERAMENTVM.

Maius Hieraceum plane Sonchi temperamento constare uidetur, refrigerat itaque & mediocris adstrictionis est particeps. Minus in gustu paulo maiorem amaritudinem refert.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Hieraceum maius refrigerandi, & modice adstringendi, ideoq; aestuanti stomacho, & inflammationibus illitum prodest. Succus erosionem eiusdem in forbitione mitigat. Herba ipsa cum radice illita scorpionum ictibus auxiliatur. Minus facultates habet superiori easdem.

EX PLINIO.

Succus sanat omnia oculorum uitia cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionesq; omnes, praecipue caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus alium purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpentiū ictibus medetur in uino potus. Et folia tosta, thyrsiq; triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maxime contra scorpionum ictus. Verum contra phalangia, commixto uino ex aceto.

APPENDIX.

Sunt qui tantam inesse huic herbae uim contra oculorum uitia credant, ut radicem etiam a collo suspensam caliginem oculorum sanare posse dicant.

DE HIPPVRI CAP. CXX.

NOMINA.

HΙΡΡΟΥΡΙΣ Graecis, Equisetum, herba aut salix equinalis Latinis, recentioribus herbarijs uerbum uerbo reddentibus Cauda equina, Germanis Rosschwanz / Pferdtschwanz / Roswadel / Katzenwedel / Katzenzagal / Kantentrant / Schaffthow nominatur. Nomen tam Graecum quam Latinum a caudae equinae imagine, quam comae illius praeseferunt, accepit.

Equisetum.

Cauda equina.

Hippuris curdica.

GENERA.


Eius duo sunt genera. Vnum longius, quod nonnulli aetatis nostrae herbarij ab asperitate quam obtinet Asprellam uocant. Hinc est quod materiarij fabri ligneae pectinum & aliorum minorum operum ruditatem huius herbae scabritia in nitro expoliant. Germanice groß Rosschwanz dicitur. Alterum breuius est, ad abstergenda uasa aptum. Germani Klein Rosschwanz appellant.

Asprella.

FORMA.

Primum Equiseti genus cauliculos habet inanes, leniter rubentes, subasperos, solidos, geniculis qui inuicem inferuntur dissectos, in quibus folia iunca, crebra, & tenuia. In altitudinem adsurgit, scandendo proximas stipites comis circumfusa dependet multis, nigris ut equorum cauda. Radix illi est lignosa, dura. Alterum comas per interualla habet breuiores, candidiores & molliores.

LOCVS.



EQVISE TVM
LONGIVS.

Groß Kopfjagel.



EQUISETVM
MINVS.

Klein Rosschwanz

C

LOCVS.

Longius Equisetū in aquosis locis & scrobibus provenit, nec eo in fossis prope
χαράδρα aquas & umbrosis locis alia planta frequentior est, ut hoc nomine *χαράδρα* Græ-
εφύρα cis dictum sit. Nec enim *χαράδρα* aliud est illis nisi terrę rima & fissura, *εφύρα* etiam
 non alia ratione, quàm quod in aquosis produceretur, nominauerunt. Alterum in
 pratis inuenitur, nec ferè frequentius occurrit, inuisa scenifecis.

TEMPVS.

Vtruncq; æstate suis in locis copiose provenit.

TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatem, ac proinde ualenter simulq; citra
 mordicationem exiccantem, obtinet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adstringit, quapropter succus eius sanguinem ex naribus erumpen-
 tem sistit. Dysentericis cum uino potus confert. Vrinam cit. Folia cruenta uulne-
 ra glutinant trita & inspersa, Herba & radix tussientibus, orthopnoicis, ruptisq; suc-
 currit. Quinetiam intestinorum diuisiones, uescicæ diffectionem, & intestinorum
 ramicem coalescere cogitq; folia in aqua pota feruntur.

EX GALENO.

Vulnera maxima conglutinat, etiamsi præfectos esse neruos contingat: præte-
 rea intestinorum ramices cogit. Cæterum ad sanguinis reiectionem, ad fluxū mu-
 liebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & ad alia uentris profluuia genero-
 sum est medicamentum herba ipsa aut ex aqua, aut ex uino epota. Sunt qui de ea
 scriptum reliquerunt, quod nonnunq; etiam uescicæ, & tenuium intestinorum uul-
 nera succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluuio sanguinis ex naribus, tum
 D fluxu obnoxij in uentre affectibus ex austerorum quopiam uinorum potus, ac si
 febre teneatur ex aqua.

EX PLINIO.

Vis eius spissare corpora. Succus sanguinem è naribus fluentem inclusus sistit,
 item aluum. Medetur dysentericis in uino dulci potus cyathis tribus. Vrinam
 cit. Tussim, orthopnoeam sanat: item rupta, & quæ serpunt. Intestinis & uescicæ fo-
 lia bibuntur. Enterocelen cohibet.

DE HIBERIDE CAP. CXXI.

NOMINA.

Nasturtium
 agreste.




Agriocardamon
 cur dicta.

LΒΕΡΙΣ, ἢ καρδάμων, ἢ ἀγριόκαρδαμον Græcis, Galeno & Paulo alio nomi-
 ne Lepidion: Hiberis, Nasturtium agreste Latinis appellatur. Offici-
 nis nostris incognita. Germanis Gauchblum/ non alia ratione quàm
 quod plerofq; qui in illius notitiam nondum peruenerunt, infatuet.
 Potest etiam cōmodè dici wilder Kress. Cardamantice, & Agriocardamū Græcis
 appellata, quod radici odor insit Nasturtij: uel quod eius folia partim Nasturtio a-
 quatico, quod à Dioscoride Silymbrium cardamine dicitur, partim etiam hortensi,
 quod Cardamon Græcis nominat, similia sint: uel quod gustu Nasturtiū referant.

FORMA.

Folia Nasturtio similia habet, uerno tempore uirentia, cubitali longitudine, aut
 minore, flore lacteo, radicibus duabus, sed una apud nos frequentius, nititur, odo-
 re Nasturtij quamacerrimo. Ex qua nimirum descriptione omnibus perspicuum
 fit, herbam cuius picturam exhibemus esse Hiberida: caulem enim cubitalem ob-
 tinet, foliaq; Nasturtio similia. Quæ enim à radice statim exeunt, aquatici, quæ ue-
 ro in supremo caule emicant hortensis Nasturtij folia referunt. Verno quoq; tem-
 pore uirent, flos deniq; lacteus est, hoc est, in albo purpurascens: hunc enim Diosco-
 ridem



NASTURTIVM
AGRESTE.

Sauchblüm.

e

c ridem uocare lacteum florem, satis testatur quarta Ranunculi species, cuius etiam florem, qui colore huic similis est, lacteum esse scribit. Semen quoque in siliquulis tam exiguum producit, ut, Plinio etiam teste, uix aspici possit: radicem autem exilem atque acrem, cui inest Nasturtij odor.

LOCVS.

Nascitur incultis locis, circa itinera & prata.

TEMPVS.

Verno tempore apparet, Aprili potissimum mense & Maio, duratq; ad æstatis initia, quo potissimum tempore lacteum florem fundit: initio enim purpureo colore maculatus uidetur: efficaciorēq; usum obtinet, quod tum semen etiam in siliquulis proferat.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine calefacientium, ut Nasturtium, minus tamen eo desiccet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix calefacit & adurit. Vtilis est ad coxendicis dolores cum fuillo adipe falso, emplastri modo quaternis horis illita. Deinde in balneū descendatur, & oleo cum lana locus perungatur.

EX GALENO.

Similis Nasturtio tum odore, tum gustu, tum uiribus.

EX PLINIO.

Coxendicibus & articulis omnibus cum axungia modica utilissima, uiris plurimum quaternis horis, sceminis minus dimidio adalligata, ut dein in balneum descendatur in calidam, & postea oleo & uino corpus perungatur, diebusq; uicenis interpositis idem fiat, si qua admonitio doloris super sit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos. Imponitur in ipsa inflammatione, sed imminuta. Adalligata d capiti cum Quinquefolio, epiphoras & si qua in oculis uitia sunt, emendat.

APPENDIX.

Recentiores herbarij eius herbæ cuius picturam damus usum probant contra pediculos si lixiuio incoquatur. Vnde colligere licebit, eam exiccandi & ex alto euo candi trahendiq; facultatem, haud secus atq; Nasturtiū aut Sinapi, habere. Nam, Galeno lib. i. de composit. med. secundum locos, cap. vij. teste, medicamenta quæ phthiriasi medentur necessariò exiccant atq; ex alto trahunt. Vt iterum euidentissimum sit hanc herbam, eo quod Nasturtij facultates obtineat, esse ueram Hiberida, non obstante quod rarò aut nunquã duabus, sed una potius & exili nitatur.

DE HIPPOSELINO CAP. CXXII

NOMINA.

HIPPOSELAINON Græcis, Olus atrum Latinis dicitur: officinæ eius semine perperam pro Petroselino macedonico utuntur: Germanis groß Epffich/oder groß Epffich appellatur. Hipposelinon autem à magnitudine dictum est: siquidem Græci magnis & amplis rebus hippo præponere solent, adeò ut Hipposelinū Latinis nihil aliud nisi grande Apium sit. Olus autem atrum uel pullum à folijs, quæ atro colore nitent, appellatum esse uidetur.

FORMA.


Maius est hortensi Apio, caule cauo, alto, tenero, ueluti lineas habente, folijs latioribus, subpuniceis, Libanotidis coma, plena flore, in corymbos antequã defloreat cōgesta, semine nigro, oblongo, solido, acri, odorato, radice odorata, intus candida, ori grata, pro caulis magnitudine non admodū densa, Porrò ne mireris quod picturæ non ex omni parte respondeat descriptio: neq; enim Hipposelinum integrum, & quod ad perfectam peruenit ætatem, floresq; & semen produxit, damus, sed id

Officinarum error.

Hipposelinū unde dictum.

Olus atrū quare appellatum.





HIPPOSELINVM

Gros Spffich.

c 2

C sed id tantum quod primo erumpit. Radicem itaq; tantum & folia depingi curauimus, ut quæ Oleris atri, cuius sæpè sit apud Dioscoridem mentio, forma, saltem in folijs & radice, esset, cerneret. Annitemur tamen ut aliquando integram eius herbæ picturam exhibeamus.

LOCVS.

Nascitur in umbrosis, & iuxta paludes.

TEMPVS.

Satum tardè prouenit, ideoq; factum ut integrè depictum dare nobis haud licuerit. Floret, Plinio teste, æstate.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, ut Apium, & siccum in medio tertij.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Estur olerum modo ceu Apium. Radix etiam cocta & cruda estur. Quinetiam folia & caules cocti manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur. Crudaq; ad falgama condiuntur. Semen potum in mulso menses ducit. Rigore concussos calfacit potum & illitum. Urinæ stillicidio auxiliatur. Radix eadem præstat.

EX GALENO.

Hippofelini similis Apio uis est, ualidior tamen. Mensium autem & urinæ ciendæ potissimum facultatem habet, ut liquet ex capite eiusdem de Smyrnio.


EX PLINIO.

Olus atrum quod Hippofelinum uocant, aduersatur scorpionibus. Poto semine torminibus interaneis medetur. Itemq; difficultatibus urinæ semen eius decoctum ex mulso potum. Radix eius in uino decocta calculos pellit, & lumborum ac lateris dolores. Canis rabiosi moribus potum & illitum medetur.

D

DE IXO CAP. CXXIII

NOMINA.

 Ξ o Σ Græcis, Viscum Latinis & officinis, Germanis *Wissel* / *oder* Affolter nominatur.

FORMA.

Planta est fruticosa, lenta, semper uirens, intus porracei coloris, extrâ subflaua, folijs buxi, acinis exiguis, sine flore.

LOCVS.

Nunq; in terra, sed semper in arbore, quercu præsertim, pyro, mâloq; prouenit.

TEMPVS.

Autumni initio cum suis acinis decerpitur.

TEMPERAMENTVM.


Calfacit cum acrimonia: ex plurima enim aëria & aquea, paucissima terrena constat. Igitur acrimonia in eo amaritudinem excellit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Discutit, emollit, atrahit: tubercula, parotidas, ceterosq; abscessus cum resina & pari cera mixtum, maturat. Epinyctidas in splenio curat. Cum thure antiqua ulcera, & malignos abscessus mollit. Lienes cum calce, aut gagate lapide, aut asio coctum & impositum minuit. Cum auripigmento aut sandaracho illitum, ungues extrahit. Mixtum cum calce & fæce, uim suam intendit.

EX GALENO.

Valenter ex alto humores extrahit: nec tenues tantum, sed & crassiores, eosq; diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere quæ non protinus admota calfaciunt, sed quæ tempus requirunt, uelut Thapsia.



VISCUM

Mill.

NOMINA.

ISATIS Græcis, Ifatis Latinis uocatur. Gallis, ut in cōmentarijs suis testatur Cæsar, Glastum olim dicebatur, nunc Guadum. Germanis autem ad hoc nomen alludentibus, Weydt nominat. Arabibus Nil, Nilech, & Indicum, ut lib. i. Paradox. cap. uigesimalifexto monstrauimus. *O*fatis. Barbari deprauata uoce *O*fatim appellant.

GENERA.

Duo Ifatidis sunt genera. Vna enim fatiua, qua tingendis lanis infectores utuntur. Altera uerò syluestris, qua lanarum infectores haud utuntur. Priorem Germani simpliciter *Weydt*/alteram uerò cum adiectione *wild Weydt* nominant.

FORMA.

Satiua. Satiua folia habet Plantagini similia, sed pinguiora, nigrioraq; caulē duobus cubitis altiorē. Hęc Dioscorides, qui reliquas notas, quę syluestri similes per omnia sunt, cōmemorare noluit. Ex syluestris tamen effigie facillē quales sint æstimare poteris: hęc em̄ teste Dioscoride, fatiuae similis est, folia tamē maiora obtinet, ad Lactuce folia accedentia: caules etiā tenuiores, multifidos, rubicantes, qui in cacumine folliculos linguarū figura multos dependentes habent, in quibus semen. Flos ei luteus & tenuis.

LOCVS.

Ifatis fatiua copiose in Germania prouenit, præsertim agro Erphordiano, cui magnum quæstum adfert. Viridem enim herbam trifatilibus molis premunt, ut herbageā saniem excludant; dein abacto liquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis cōputrescere in æstate feruente sinunt. Hos cortinis infectoriae coquunt officinæ, & laneos pannos, ac uellera demergunt, ut coeruleū imbibant colorem. Syluestris sua sponte in quibusdam Germaniæ locis nascitur, ut Tubingæ, ubi omnes uinearum maceries hac herba septræ uidentur.

TEMPVS.

Maiō & Iunio mense florent, ac subinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Ifatis fatiua ualenter admodum exiccantis, nondum tamen mordentis facultatis est: amara enim simulatque adstringens existit. Syluestris uerò acre quiddam, tum gustu, tum actione præfert: proinde ualentius quàm fatiua desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Ifatidis fatiuae folia omnia cedemata & tubercula illita discutere possunt. Cruentia uulnera glutinant. Sanguinis profluuia sistunt. Ulcera phagedænica, herpetas, erysipelata, & putrescentia sanant, Syluestris eadem quæ fatiua potest. Lienosis etiam pota & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Satiua magna ulcera durorum corporum glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint, & sanguinis profluuiio laborantibus partibus utiliter illinitur. Tumores cedematodos mirifice discutit, simul & reprimat, omnibusq; ulceribus malignis mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si erodantur. Quod si quando laborantis natura ualidior appareat, folijs eius tritis aut panem, aut hordeaceā farinam, aut triticeam, aut polentam, pro uincente in unoquoq; affectu, miscere oportebit. Syluestris uerò potentissimē humidis putredinib. obsistit, ad cetera uerò iam comprehensa deterior; immoderatius enim & cum mordacitate desiccatur, talia namque irritantur hoc pacto, & phlegmone grauari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienosis quoq; utilis est, quum altera prodesse nondum possit.


EX PLINIO.

Ifatidis folia trita cum polenta, uulneribus profunt. Sanguinem sistit. Phagedænas & putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanat. Item tumores ante suppurationē. Contra ignem sacrum, radice uel folijs prodest, uel ad lienes pota,



ISATIS
SATIVA.

Weydt.



ISATIS
SYLVESTRIS.

Wald Meyerdt.

NOMINA.



TEA Græcis, Salix Latinis, Weiden/ oder Felber Germanis appellatur. Salix uerò à saliendo dicta est, quod ea celeritate crescat, ut quasi salire uideatur. Sic etiam Iteam quasi Salicem uocauerunt Græci.

Salix cur dicta.
Itea unde uocata.

GENERA.

Tria Salicis genera Theophrastus lib. iij. cap. xij. de historia plantarũ recenset. Primã nigram nominari dicit, quod nigro aut puniceo cortice obducta sit. Secundam candidam, quod candido obducatur cortice. Tertiam coactę breuitatis ac pumilam, Helicen Arcadibus appellari scribit. Plinius etiam lib. xvij. cap. xxxvij. tria Salicis nomina cõmemorat: Viminalem, eandemq; purpureã: Vitellinam à colore luteo, graciliorẽ priore; Gallicam, quæ sit tenuissimã. Lucius Columella lib. iij. cap. xxx. eiusdem quoque tria facit genera, Græcam, Gallicam, & Sabinam, quam etiam Amerinam uocari à plurimis scribit. Græcam flauï coloris, Gallicam obsoleti purpurei, tenuissimiq; uiminis, Sabinam gracilibus uirgis atq; rutilibus esse asserit. Quæ sanè singula pulchrè cum ijs quæ Theophrastus tradit, conuenire uidentur. Nam primam Salicis speciem, quam Theophrastus nigram aut puniceam uocat, Plinius Viminalem, Columella uerò Sabinam & Amerinam appellat, Germani tot Weiden nominant. Secundam speciem, quam Theophrastus candidam, Plinius Vitellinam, Columella autem Græcam uocat, Germani geel Weiden. Tertiam, quæ Theophrasto Helix dicitur, Plinius & Columella Gallicam appellant, Germani uerò à tenuitate Klein Weiden.

Salix nigra.
Candida.
Pumila.
Viminalis.
Vitellina.
Gallica.
Græca.
Sabina.
Prima Salicis species.
Secunda.
Tertia.

FORMA.

Salix breui caudice confurgit, ramis longis, è trunco extrẽmo ueluti à capite prodeuntibus, lentis, flexilibus; folijs longis, subtus incanis, supernè uirentibus; flore seu nucamento squamatim compactili, lanuginoso, propendente, fructu qui facillè ante maturitatem euanescat.

LOCVS.

Aquosis lætatur, ideoq; auctu perquam facilis.

TEMPVS.

Floret primo statim uere. Ocysimè amittit fructum, antè quàm omnino maturitatem sentiat, ob id dicta Homero *ὠλεσίκαρπος*, hoc est, frugiperda, Odyss. κ. ubi sic canit: *μακρὰ τ' ἀγυροὶ καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι*. Fructum siquidem fert, Plinio autore, abeuntem in araneam antequam percoquatur.

TEMPERAMENTVM.

Salicis tum folia, tum flores, citra mordacitatem exiccantis sunt facultatis, ac modicè adstringunt. Cortex tamen eius siccor.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Adstringunt Salicis folia, fructus, cortex & succus. Folia trita cum exiguo pipere & uino pota ileosis conueniunt. Per se etiam cum aqua sumpta, præstant mulieribus ne concipiant. Fructus potus sanguinè expuentibus prodest. Cortex eadem præstat. Vstus & cum aceto subactus, clauos & callos illitus tollit. Ex folijs & cortice succus in putamine mâli punici cum rosaceo calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri optimũ. Furfures exterit. Excipitur etiam è Salice succo exciso cum floret cortice; in interiore enim eius parte concretus inuenitur. Vim autem habet exterendi quæcunq; pupillæ claritati obstant.

EX GALENO.

Salicis folijs ad cruenti uulneris glutinationẽ quis uti posset. Verũ floribus eius maximè propè omnes utuntur medici ad exiccantis emplastri preparationẽ: est enim uis eorum desiccatoria; habent etiam quandam adstrictionẽ. Sunt qui succum ex ea expressum, medicamen seruent mordacitatis expers & exiccatorium, ad multas res uti-

334



PRIMUM SA-
LICIS GENVS.

Rot Weiden.



ALTERVM SALI-
CIS GENVS.

Geel Weiden.



TERTIVM
SALICIS GENVS.

Klein Weiden.

A res utile, Haud enim inuenias quid ad plures res utilius medicamento citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam adstringat. Porro arboris cortex similem facultatem obtinet, tum floribus, tum folijs, nisi quod temperaturæ sit siccioris, uel omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusq; cinere utuntur ad ea omnia quæ ualenter desiccare oportet. Nam clauos quos uocant, callos, myrmeciasq; tollunt, aceto ipsum macerantes acri. Nonnulli autem dum floret Salix, corticem eius incidunt, & succum quendam colligunt, utunturq; ad ea quæ pupillas obfuscant, extergente uidelicet simulq; tenuium partium medicamine. Vti uero illo ad multa alia quis posset, siquidem talis sit.

EX PLINIO.

Salicis fructus ante maturitatem in araneam abit. Sed si prius colligatur, sanguinem reijcientibus prodest. Corticis è ramis primis cinis, clauum & callum aqua mixta sanat. Vitia cutis in facie emendat, magis admixto succo suo. Est autem hic trium generum. Vnum arbor ipsa exudat gummi modo. Alterum manat in plaga cum floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine. Hic ad purganda quæ obstant oculis, item ad spissanda quæ opus sunt, ciendamq; urinam, & ad omnes collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detruncatione ramorum à falce destillans. Ex his aliquis cum rosaceo in calyce mali punici calfactus, auribus infunditur: uel folia cocta, & cum cera trita imponuntur. Item podagricis. Cortice & folijs in uino decoctis fouere neruos utilissimum. Flos tritus cum folijs furfures purgat in facie. Folia trita & pota intemperantiam libidinis coercent, atque in totum auferunt usum sæpius sumpta.

DE CAPNO CAP. CXXVI.

NOMINA.



CAPNOS Græcis, Fumaria Latinis; officinis Fumus terre, Germanis *Erdrauch/ Daubentropff/ Katzenöbel* appellatur. Fumaria uero hæc herba dicta est, propterea quod succus eius oculis inditus, ueluti fumus lachrymas mouet, oculosq; mordicat.

Fumus terre.

Fumaria unde dicta.

FORMA.

Fruticosa herbula est, Coriandro similis, tenera admodum; folijs candidioribus, cineracei coloris, undiq; numerosis: flore purpureo.

LOCVS.

Nascitur in segetibus hordeaceis, hortis, uineis, sepibus, & macerijs, alijsq; locis incultis atque pinguibus.

TEMPVS.

Carpitur in fine Maij mensis & Septembris.

TEMPERAMENTVM.

Capnos calida & sicca in secundo esse uidetur ordine, id quod ex gustu patet: acris enim & amara est.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius succus acris est, uisum acuit, lachrymas ducit, unde & nomen traxit. Illitus cum gummi duplices palpebrarum pilos renasci non sinit. Comanducata herba biliosam urinam trahit.

EX GALENO.

Capnos acris simul & amaræ qualitatis est particeps, nec tamen planè expers est acerbæ. Quamobrem biliosam urinam multam prouocat, sanatq; iecinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non parum lachrymarum trahens, ueluti ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea uti solebat ad stomachum roborandum, unaq; uentrem lubricandū. Siquidem herbam

f primum



FVMARIA

Erdrauch.

A primum desiccata condebat: dein cum uti uolebat subductionis quidem gratia melicrato inspergebat: roborandi uerò causa, uino nimirum diluto.

EX PLINIO.

Claritatē facit inunctis oculis, de lachrymationemq; ceu fumus, unde nomen accepit. Eadem euulsa palpebras renasci prohibet. Bilem per urinam trahit.

DE CICI CAP. CX XVII

NOMINA.



ΙΚΙ, ἢ κρότων Græcis, Ricinus Latinis, Mauritanis Kerua, officinis nonnullis Cataputia maior, quibusdā etiam Pentadactylon & Palma Christi, quod scilicet eius folia in humanæ manus effigiem articulantur: Germanis Wunderbaum/oder Kreuzbaum dicitur. Croton autem & Ricinus à similitudine animalis, quod semen eius referre uidetur, nominata est. Sunt enim Græcis κρότωνες, & Latinis Ricini, insecta animantia, quæ canibus præsertim adhærent, quibus cibi nullus exitus est, colore liuido, nullis discreta membris, in globum continuè crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies sponte sua decidunt. Hinc est quod à Germanis nostris *Seckentömer* nominentur.

Cherua.

Cataputia maior

Croton & Ricinus unde dicta.

κρότωνες.

FORMA.

Arbor est parue ficus magnitudine, folia Platano similia habens, maiora tamen, læuora & nigriora. Caudices uerò & ramos arundinis modo concauos. Semen in uuis racemisue asperis, quod cortice nudatum, Ricino animali simile est. Quæ descriptio ita picturæ quadrat, ut nihil magis.

LOCVS.

B Nascitur nusquam in Germania nostra, nisi fatum fuerit. Satum autem semel copiose prouenit. Sine difficultate etiam passim iam in hortis prouenit.

TEMPVS.

Carpitur Autumno dum femine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Ricinus in secundo uel summum tertio ordine calefacientium & siccantium esse apparet.


VIREŚ. EX DIOSCORIDE.

Ex femine Ricini oleum nomine Ricinum exprimitur, ad edendum minimè aptum: alioquin tamen lucernis & emplastris utile. Grana triginta numero putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, & aquam per aluum deiciunt. Vomitiones etiam mouent. Est uerò iniucunda admodum & laboriosa huiuscemodi purgatio: stomachū enim ualidè subuertit. Tusa & illita uaros, maculasq; sole cōtra ctas purgāt. Folia trita cum polenta, oculorū oedemata & inflammationes sedant, mammasq; turgentes cohibent. Per se aut cum aceto illita ignes sacros restinguūt.

Oleum Ricinū

EX GALENO.

Semen Ricini, quod etiam purgat, extergendi & digerendi facultatem obtinet. Sic uerò & folium, sed undequaq; debilius. Oleum quod ex femine cōficitur, tum calidius, tum tenuiorum partium, quàm est oleum commune, ac proinde quoque digerit.



RICINUS

Wunderbaum.

NOMINA.

KIPΣION græcè, Spina mollis, Buglossum magnum latinè nominatur: *Buglossa.*
 officinæ, necnon herbarij Buglossam uel Linguam bouis uocant. *Cir-*
 sion autem eò quod uarices, quos Græci *νερόδες* nomināt, sanet, dicta est. *Cirsion cur dicta*
 Germanis *Schsenzung* appellatur.

GENERA.

Nos duo damus genera, quorum unum Germanicum, alterum uerò Italicum est, in quo omnia sunt maiora.

FORMA.

Caulis est tener, duùm cubitorum, triangularis. Ab inferiore parte foliis roseorum figura, angulos spinosos per interualla, sed molles habentibus. Folia Buglossi similia, modicè hirsuta, longiora, albicantia, extremitatibus aculeata obtinet. Cacumen in caule orbiculatum, hirsutum, in quo capitula in summo purpurea, quæ in lanugines euanescent. Hæc sanè descriptio satis monstrat, Cirsion esse Buglossam hodie uocatam, cum ei deliniationes omnes, nulla ferè reclamante nota, conueniant. Siquidem caulis ei tener, bicubitalis, triangularis, spinosis per interualla angulis, sed mollibus & innoxijs aculeis. Folia Buglossi similia, longiora tamen, aut lege, *μυρόπρα*, hoc est, minora, cum Plinio: subcandida, leniter hirsuta, in extremis partibus aculeata. Cacumen quoque caulis circinatum, hirsutum, in quo capitula purpurea. Etsi uero reliqua omnia conueniant, tamen capitula purpurea non abeunt in pappos neq; in nostra, neq; in Italica. *Buglossa nostra.*
Locus Dioscoridis emendatur.

LOCVS.

Producitur locis cultis & incultis, arenosis potissimum & petrosis. Italicū etiam hodie in multis hortis magna copia nascitur.

TEMPVS.

Carpitur Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

In primo calefacere & humectare ordine apparet.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Radice m Cirsij laboranti loco adalligatam, dolores uaricum sedare Andreas scripsit.

EX PLINIO.

Hanc herbam radicemue eius adalligatam, dolores uaricum sanare tradunt.


APPENDIX.

Non plures iam cōmemoratis facultates Cirsio, Dioscorides & ueteres alij tribuunt. Videant igitur nostræ ætatis medici, ne temerè Buglossæ suæ quas non ob-
 tinet uires adscribant.



CIRSIVM
GERMANICVM.

Teufels Gahnenjung.



CIRSIVM
ITALICVM.
Welsch Schsenzung.

f 4

C

NOMINA.

Coriandrum.
Corion quare uo-
catum.



ΚΟΡΙΟΝ, ἢ κοριαννον Græcis: Corion seu Coriannon Latinis, uulgo & officinis Coriandrum, Germanis, qui latinam seu officinarum appellatio- nem imitantur, Coriander nominatur. Corio nomen fecisse cimices uerisimile est, quos folia & caules eius olent: κόρυς enim Græcis insecti κόρυς. id genus est, quod Latinis cimex dicitur.

FORMA.

Caulis Corianno exilis, sesquicubitalis, ramosus. Folium dum primū erumpit Adianti, dein Fumariæ, odore graui. Flores candidos. Semen rotundū ac nudum, firmum & diutinum. Radicem breuiusculam, ligneam, neq; admodum fibratam.

LOCVS.

Amat terram pinguem, Palladio teste, sed & macro solo nascitur, Nunquam autem nisi satum prouenit.

TEMPVS.

Autumno dum semine prægnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Coriandri temperamentū minimè frigidum ac simplex est, sed uariè coalitum & compositū. Est enim copiosæ quidem amaritudinis particeps, quæ in tenui simul ac terrestri substantia fundat: sed & aquosæ humiditatis tepidæ ei nō parum inest. Habet etiā adstrictionis nō nihil, sicut paulò post ex Galeni uerbis clarius innotescet.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.


Hæc Dioscoridis
uerba paulò post
Galenus exhibet

Vim refrigeratoriā habet Coriandrum, unde illitum cum pane aut polenta erysipelatis, & herpetibus medetur. Epinyctidas, testium inflammationes, carbunculosq; cum melle & uua passa sanat. Cum lomento strumas & tubercula discutit. Lumbricos semen cum passo potū pellit, genituramq; auget. Largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet, quapropter copiosiorē & cōtinuum eius usum cauere oportet. Succus cum cerussa, aut argenti spuma, necnon aceto & rosa- ceo illitus, ardentes in summa cute inflammationes iuuat.

EX GALENO.

Dioscorides re-
prehenditur.

Coriannon siue Corion, aut utcuq; uocare lubet. Vetustiores Græci Coriannon nominabāt, ac recentiores omnes medici Corion appellitant, sicut & Dioscorides refrigeratoriā esse herbam dicitans, sed perperā. Siquidem ex contrarijs constat facultatibus, plurimū habens amaræ essentia, quam ostendimus esse tenuium partium, & terrenam, nec modicum etiam aqueæ humiditatis obtinentē, quæ est facultatis tepidæ. Habet autem & adstrictionis paucillum. Ex quibus omnibus uariè quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, & non tantum ex refrigeratione. Cæterum ego cuiusq; particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mei unius duntaxat hoc in libro sententiā expromere. Sed fortè nihil obstabit, imò si uerum fatendum est, proderit nō nihil superiores methodos, quæ in paucis medicamentis sunt dictæ, hunc in modum repetere. Primum ergo nō Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorū indeterminatè & citra limitationē de morbis pronunciant, sicut sanè hac quoq; tempestate non paucos reperias medicos insignes, præter alia, hac in re maximè hallucinantes. Interdum enim atra, liuida, frigidaq; reddita parte quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente medicamenta, ceu antea, sed ea quæ infixum parti præter naturam humorem euacuent, ij tamen refrigerare perseverant. Aliquando autem ad digerentia quidē transeunt, cæterum erysipelas sanare dicunt. Et sanè scribunt incipientibus etiamnum & crescentibus erysipelatis alia cōuenire medicamenta, aliaq; declinantibus. Verum res ita non habet. Neq; enim erysipelas etiam uocari debet posteaquam inflammatio eius



CORIANDRUM

Coriander.

c eius & feruor, ac biliosum illud abierint: neq; quæ facultate sunt frigida, neq; quæ illa sanant, remedio esse putandum est, sed uelut si uel initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiã aut liuidus, aut niger extiterit, eum frigidum esse affectum existimabis, & quæ digerant exalfaciantq; poscere: ad eundem modum si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio nomine appellanda. Aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut aliqui alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendū sanè est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas uocetur: sed eam etiam calidā dicere ubi iam refrigerata est, id uerò ne utiquam concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriannon, quod, ut ipse ait, cum pane aut polenta illitum erysipelas sanat. Nam quod exquisitum est erysipelas, & iam in flammatum & flauum est, nequaquam cum pane sanabit Coriannon, sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus uoluminibus, quum determinata ac definita experientia cuiusq; medicamenti facultatem explorandam censuimus, quammaximè fieri posset simplicissimum eligi affectum consuluimus. At plerique medici, neq; quod uel plurimi morborum protinus ab initio compositi inuadant, norunt, neque quod alius affectus sit erysipelas exactum, alius uerò is qui uocatur ab omnibus nobis usitate, ut à ueteribus quoq; phlegmone. Alij autem inter hos medij plurimi, partim ut sic dicam erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelatodes. Ac inuenias nōnunquam ubi neutrum uincat, sed ad unguem paria sint. Quinetiam nōnunquam cedematodes esse erysipelas cōspicitur, sicut aliud

D scirrhodes, ut compositorū morborum haud paruus aceruetur numerus. De quibus copiosius cum alibi differuimus, tum in libris de curandi ratione. Dicitur autem & nunc, quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum erysipelas haud unquā ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, quum à biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porrò quod longè à refrigeratione absit Coriandrū, uel ex ijs quæ ipse scripsit Dioscorides discere licet. Nam strumas, inquit, cum lomento discutit. Quod uerò nullum refrigerantiū medicamentorū idoneum sit discutiendis strumis, uel ipsum Dioscoridē non dubitare arbitror, ut qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quæ omnia temperie calida, & actionibus digerentia esse cōfessus est. Hactenus Galenus: cuius quidē, etsi proluxa sint, uerba ideo recensere placuit, ut uulgi & nōnullorum etiam medicorū errorē detegeremus, qui præter ueritatē Coriandri temperamentū esse frigidum asserunt. Deniq; ut ex hoc loco discerent studiosi, quàm periculosum sit Dioscoridis ac aliorū ueterum scripta sine limitatione sequi. Admonitos quoq; lectores esse uolumus, hoc caput ex eorum esse numero, in quo Galenus à Dioscoride dissentit.

Libro xliij.
Exquisitum ery-
sipelas.

Periculosum Dio-
scoridis scripta si-
ne limitatione le-
gere.

EX PLINIO VALERIANO MEDICO.

Non dubitanter Coriandro refrigeratrix potestas datur, nō tamen simplex, ut prudentissimè Galeno uidetur, sed cui quædā portio austeritatis immixta sit, inde quod quædā ex eo uirtia curantur, quæ nunquā omnino curaret, si sola uirtute frigida niteret. Cum melle & uua passa tritū & impositū, omnes tumores collectionesq; compescit. Præcipuè tamen isto genere medicaminis doloribus testium subuenit. Succo mālī granati et oleo in potione permixtum, animalia interaneis innata persequit. Semen ex aqua potum solutionē uentris stringit. Scriptū à multis legitur tria Coriandri grana tertianas excludere ante accessionē si fuerint deuorata. Iisdē quoq; repellendis efficax est ipsum Coriandrū ante solis ortum ignorantī ceruicali uiride subiectū. Mirum est quod Xenocrates tradit, si unum seminis granū scemina biberit uno die menstrua cōtineri, biduo si duo, & totidē diebus quot grana sumpserit.

Eadē ferè sunt quæ alter Plin. lib. naturalis histo. xx. cap. xx. scribit, ideoq; omittere placuit. Tantū addit, Marcum Varronē putare Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptā æstate seruari.

APPENDIX.

Non transeundum silentio erit quod Dioscorides hic diligenter monet, Coriandri copiosum & cōtinuum usum esse fugiendum. Ideoq̄ errare uehementer recentiores medicos, qui eo tam frequenter, potissimum ad caput roborandū, cui infensissimum est, utuntur, manifestius est quā ut probatione indigeat. A quo sanè errore uel id saltem reuocare eos deberet, quod idem Dioscorides, libro sexto, Coriandrum inter uenena connumeret.

Coriandro nō copiose & cōtinuō utendum.

EX SYMEONE SETHI.

Stomacho bonum est, & eundem corroborat. Cibos in uentriculo donec probe cōcoquantur retinet. Tostum igne uentrem sistit. Prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. Sanguinis profluuiū potum, & si imponatur, compefcit. Cum uino potum, lumbricos educit: immodicus tamen eius usus delirium facit. Huius etiam succus potus uenenum est & occidit. Qui enim hunc bibunt, muti fiunt, & desipiunt.

DE CASSYTHA CAP. CXXX.

NOMINA.



ΑΣΣΥΘΑ recentioribus Græcis: Cassutha, y litera in u transeunte, ut sæpè fieri solet, Latinis appellatur: officinis & herbarijs nostræ ætatis hinc deflexa quadam pristini nominis umbra, Cuscuta dicitur, cum primum Cassutha, dein cōuersa Cuscutha, postremo Cuscuta cœperit appellari. Sunt qui podagram lini uocant, quod quasi compedibus id cui infederit illi get, nec uinctum eo facile possit extricari. Germanis *Silggraut* / *oder* *Glachßseiden* / *oder* *Todteer* dicitur. Errant qui Dioscoridis Androsacen esse putant, cum ueteres Græci, quod sciam, de Cuscuta hodie dicta, nihil memoriæ prodiderunt. Plinius tamen lib. xvi. cap. ultimo, eius uidetur meminisse ijs uerbis: Est & in Syria herba quæ uocatur Cassythas, non tantum arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluens sese: Cassyrtas enim legendum non Cadyrtas: sic enim codices aliquot Pliniani, ut in suis annotationibus doctissimus Hermolaus admonet, ijq̄ emendatiores, habent. Jam igitur memoria Plinij Cassyrtas herba suo nomine Syriaco uenerat in Latium, quod multis postea seculis usurpantes tam Pœni quā Arabes, suis scriptis protruerunt. Quod autem Plinius sine spiritu protulit, id librariorum culpa factum esse suspicor, qui inuertentes mutarunt Cassytha in Cassyrtas.

Podagralini.

Androsacen non est Cassutha.

Plinij locus emendatus.

FORMA.

Herbosis fruticibus adnascitur, earum adminiculo fulta: radice nulla, sed uelut ab alarum sinu prodeunte cirro capillamentoue miræ longitudinis, statim ab eius ortu sese ramulis conuolvente. Quæ iam ueluti clauiculis nixa, sensim prosperpens herbarum fastigia scandens, & crebris uolutionibus opere topiario per uertices rotata, comas herbarum complectitur: tam uolubilis illi natura est. Folijs uidua cernitur. Florem fundit album, semine quoq̄ scatet tenui. Cirri dilutiore rutilant purpura, nōnunquam ex rubro rufescunt, fidibus lyrarum crassitie pares.


LOCVS.

Non in terra, sed in herbis arboribusq̄ passim nascitur Cassytha, quas tam spisso sæpius irretit cōtextu, ut tentorij modo herbosum cespitem à sole uindicet. Non nunquam cacuminib. impendens stirpes humi deturbat, propriamq̄ parentē suis laqueis strangulat, aut continuò materni alimenti succu perducit ad tabem.

TEMPVS.

Æstate, Iulio potissimum & Augusto mensibus, maximus illius in Germania prouentus esse solet: hoc enim tempore tanta eius est luxuria, ut mole sua stirpes onerata ferè procumbere uideantur.

TEMPERA-



CASSIYA

Flachs seiden.

TEMPERAMENTVM.

In primo calefacientium abcessu seu ordine, & desiccantium secundo statuen-
dum: quendam enim respicit amaritudinem.

VIRE S.

Abstergendi naturam obtinet, & cum quadam adstrictione roborandi faculta-
te praedita est. Iecinoris impedimenta laxat, infarcti & obstructi lienis expedit ui-
tia, uenas pituitosis atq; biliosis exonerat humoribus, pellit urinam. Regio morbo
subuenit qui iecinoris obstructionibus contrahitur. Febris ijs auxiliatur quae
pueros male habent: sed usu nimio stomachum sua astrictione grauat: uerum no-
xa tollitur, si Anisi momentū adijciatur. Natura eius flauam bilem per aluum exi-
gere, sed efficaciorē cum Absinthio praebet effectum. Hae quidem ex Pcenorum
ac Arabum sententia facultates Cassuthae tribuunt, qui utiq; uires illius longē ma-
gis gliscere pollicentur, si parentis ingenium ei patrocinetur. Hinc est quod hanc
forsitan ueteres Graeci, quamuis triuiale, eo nomine subticuerunt, quod natiuas
suae merito parentis dotes adsciuisset, è sinu cuius uernaculum ebibens humorem
aleretur. Nam ut testatum ijdem Arabicae factionis medici reliquerunt, si calidae
insidet herbae arboriue, calidam fortietur facultatem, & si decubuerit frigidae, uina
sibi frigidam uendicabit.

DE CESTRO CAP. CXXXI.

NOMINA.

KESTPON graecè, Betonica seu Vetonica latinè: in officinis antiquū no-
men retinuit, Braumbetonick germanicè appellat. A uarietate autem
& copia remediorū, Cestron à Graecis dicta est: hac siquidem uoce opus Cestron unde
dicta.
interpunctū, ac uie pictum nominauere. Libri etiam à uarietate subie-
cti, ab aliquot Graecis hoc titulo inscripti sunt. Plinius quoque aliquando Ebur ce-
strum, id est, picturatum dixit, Betonica uerò ab inuentoribus Vetonibus, Hispa- Betonica.
niae populis, nominata est.

FORMA.

Herba est caulem tenuem obtinens, cubiti altitudine, aut maiorem, quadrangu-
lum. Folia longa, mollia, quernis similia, per ambitum incisuris diuisa, odorata, pro-
pe radicem maiora. In summo caulium semen ueluti Thymbrae spicatum inest. Ra-
dices subsunt tenues ut Ellebori.

LOCVS.

Nascitur in pratis, syluis, montosis, frigidis & opacis locis, ideoq; Graecis *ψυχρότατα ψυχρότατον*.
φου uocata est.

TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus floribus abundat.


TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca in primo ordine completo, aut in medio secundi.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Folia Betonicae carpunt & siccantur plurimos ad usus. Radices cum hydromeli
te potę, pituitosam uomitionē eliciunt. Folia dantur ruptis, cōuulsis, uuluae affectio-
nibus, & eiusdē strangulationib. drachmę unius pondere cum hydromelite. Ternę
in uini sextarijs duobus cōtra serpentū morsus ebibunt. Herba ipsa illita uenena-
torū morsib. prodest. Aduersus etiā uenena drachma ex uino pota cōuenit. Hanc
si quis praesumpserit, letale haustū uenenū nihil nocebit. Urinā cit. Aluum subdu-
cit. Medei comitialibus & furiosis cum aqua pota. Iecinoris & lienis uitij drachmę
pondere cum aceto mulso pota succurrit. Concoctionē adiuuat, si quis à cena eam

g fabae



BETONICA

Betonick.

A fabæ magnitudine cum melle cocto deuorauerit. Eodem modo & acida ructantibus propinat. Stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum uino sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus trium obolorū pondere cum diluti uini cyatho uno. Ischiadicis, renum & uescig dolorib. ex aqua. Hydropicis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, non febricitantibus, cū mulso. Regio morbo laborantes recreat. Menses ducit drachmæ pondere cum uino pota. Aluum purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem potæ. Cum melle tabidis, purulentis auxiliatur. Folia cum inauerint trita ad hos effectus sicili uase reponuntur.

EX GALENO.

Vim habet incidendi, ut gustus indicat. Amariuscula enim est, & subacris ipsa herba, id quod & particulatim edita ostendit actio. Nam consistentes in renibus lapides rumpit, & pulmonē & thoracem & iecur expurgat, abstergitq;. Menses mouet, & comitialibus prodest. Rupta atq; conuulsa curat, & omnibus bestiarū morfis illita ulceri auxiliatur. Acidum ructantibus & ischiadicis bibita succurrit.

EX PLINIO.

Morsibus serpentum imponitur Betonica præcipuè, cui uis tanta perhibetur, ut inclusæ circulo eius serpentes, ipsæ sese interimant flagellando. Datur & ad ictus semen eius denarij pondere cum tribus cyathis uini, uel farina drachmis tribus sextario aquæ imponitur. Obolis tribus in aqua, contra purulentas, contraq; cruentas excreationes facit. Faciles præstat uomitiones radix eius Ellebori modo quatuor drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spinæ leuat eiusdem farina ex aqua mulsa. Aluum soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Folia siccantur in farinam plurimos ad usum. Fit uinum ex ea & acetum, stomacho & claritati oculorū. Paralyfin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad lateris & pectoris dolores farina eius bibitur.

DE BETONICA ALTERA CAP. CXXXII.

NOMINA.

DVAS esse Betonice species præter Paulum Aeginetam lib. viij. Plinius etiam lib. xxv. cap. viij. abundè docet: & in aliquibus Dioscoridis codicibus huius quoque secundæ Betonice mentio fit. Hanc itaque posteriorem, tam officinæ quàm herbarij medici Tunicam, detractis à Betonica duabus literis prioribus, nominant. Germanis *Grasblumen* & *Vegetblumen* / quod flores eius garyophyllorū odorem referant, appellare placuit.

Herba Tunica.

GENERA.

Duū est generum. Vna siquidem syluestris est, quam Germani *wild Vegetblumen* / hoc est, syluestrem Garyophylleam, & *Dondernegele* / *Seldernegele* / & *Blüsteröpffle*. Altera altilis est, que alio nomine Betonica seu Vetonica coronaria, quod illius in coronis nimius usus sit, dicitur. Germani *heymisch Vegetblumen* / quasi domi natam Garyophylleam appellant.

Syluestris.


Altis.

FORMA.

Specie multum à priore Betonica differt. Radicem enim totam rubram, odoratamq; habet. Folia porracea, oblonga, stamine quo medium diuiditur puniceo ac rubente, cum recto calamo triangula, floribus in uertice purpureis. Hæc Dioscoridis deliniatio utriq; generi cōmunis est: priuatim tamen syluestris Betonica herba fruticosa est, folijs porri, oblongis, angustis, per extremū mucronatis, caelijs, concoloribus calamis, teretibus, geniculatis, cubitalibus, floribus speciosis, simplicibus, qui quinis, senisue folijs constant, lentè fimbriatis, magna ex parte purpureis, quamuis & interdum niuei conspiciant. Altis seu coronaria, folijs est porraceis,

Syluestris Betonica.

Altis seu coronaria Betonica.



BETONICA
SYLVESTRIS VNA.

Dondernegele.



BETONICA
SYLVESTRIS ALTERA.


Wildnegele.

83 3

354

BETONICA
ALILIS.

Regelblüm.



A oblongis, per extremum mucronatis, cōcoloratu cæsijs, teretibus cauliculis sesquicubitalibus, geniculatis, cōeuntibus pyxidatim internodijs, floribus omnium speciosissimis, Garyophyllorum odoratu, sed longè suauissimo, quandoquidem alius cocco rutilat, alius saturata nitet purpura, alius candido, alius emaculato blanditur colore, alius uerficolore uariatur cōmixtu. Omnibus teres longiusculusq; calyx speciat, orbiculo superiore denticulatus, à quo quina senaue folia prodeunt, lentè quidem fimbriata. Nonnulli tamen flores frequentiore coma stipantur, geminis utrinque emicantibus stamineis apicibus.

LOCVS.

Syluestris in pratis, montibus, nitidisq; locis nascitur. Coronaria uerò passim in fœtilibus uasis alitur, neq; facillè ædes inuenies, ante quas non expositam intuearis.

TEMPVS.

In æstate utriusq; magna est copia. Coronaria tamen longiori tempore durat, atq; æstiuas, autumnales, hyemalesq; fruit coronas.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse tum amaritudo, tum odor & alia multa declarant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Animas hominum & corpora custodit. Contra nocturnas peregrinationes, loca insidiosa, & difficiles somnos cōmendatur. In totum, ad omnem medendi rationem celebrata. Recens trita uulneribus capitis indita dolorem finit. Vulnura glutinat. Fracta ossa extrahit, & hoc quotidie efficit, donec perfanescat. Dolori capitis medetur, si decocta ea ex aqua caput perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix eiusdem suffiatur.

EX INCERTO.

B Farina eius tam aduersus toxica quàm serpentũ & scorpionũ ictus ex albo uino bibitur. Quartanæ reliquarumq; febrium horrores discutit. Comitialibus opitula tur sub ipsam accessionem propinata. Eadem per se carcinomatis inspergit, quæ tamen præstiterit herbæ succo prius abluisse. Estur contra uentris tineas. Succus pestis arcet contagia, atque etiam haustus, si iam morbus inuaserit, liberat. Fit ex flore oleum ad canis rabiosi morsus, ad fistulas & parotidas, quibus illitu medetur. Virus aciem exacuit. Ieiuno sumpta dolorem dentium sedat, iure decocti colluto ore. Discutit grauedines. Partum, qui sine febre sit, accelerat. Neruorũ uulneribus imponitur. Præsumpta ebrietatem arcet. Intertriginem in itinere faciundo non sentient qui ex uino biberint. Fastidia cum aceto mulso discutit. Iis qui ex morbis sese recolligunt aluum ex aqua calida deijcit. Vomitiones cohibet. Dolores podagræ ac inflationes uentris sedat. Venena rabiosi canis morsu impressa elicit plagæ diutius illigata.


APPENDIX.

Recentiores syluestris Betonicę succum mirificè cōmendant in atterendo & educendo calculo, & medendis comitialibus. Altilis autem radicem contra pestis contagia utilem esse tradunt. Hanc ob causam ex floribus etiam eiusdem, medicamentum conficiunt, quod Conseruam hodie uocant, quod ad eundem usum adhibent.



COLCHICVM

Zeitlosen mit den blümen.



COLCHICI
FOLIA ET SEMEN.

Zeitlosen mit blettern vnd samen.

C

NOMINA.

Hermodactylus,
Colchicum cur-
dictum.
Ephemerum,



ΟΛΧΙΚΟΝ, ἢ ἐφημερον Græcis, Bulbus agrestis Latinis, officinis & herbarijs Hermodactylus dicitur. Germanis Zeitlofen. Colchicum à Colchide ueneni ferace, in qua nascitur, nomē desumpsit. Dicitum uerò est Ephemerum, quoniam uno die sumptum interficiat, atque adeo ab altero Ephemero, quod minimè letale est, & de quo suo loco diximus, non solum figura, uerum etiam facultatibus differt. Etsi uerò Ephemerum Colchicum etiam significet, tamen præcipuè id Ephemerum quod ueneno caret, hoc nomine intelligitur.

FORMA.

Autumni exitu florem subcandidum, crocino similem profert. Post florem folia Bulbo similia, pinguiora tamen. Caulem palmo altum, ruffum ferentē semen. Radicem habentem corticem in nigro rufescentem, quæ cortice suo nudata, alba, tenera, succo plena, & dulcis inuenitur. Habet Bulbus eius in medio rimam fissuram uel unde flos erumpit. Huius descriptionis in uniuersum notæ omnes ita Hermodactylo nostro conueniunt, ut nemo, nisi Tiresia cæcior sit, Dioscoridis esse Colchicū ambigere possit. Exitu enim autumnii in pratis florem ædit albicantem, croci floribus similem. Posterior, Februarii nimirū mense & primo statim uere, folia Bulbi, sed pinguiora. Caulem palmeū ferentem semen rufum. Radicem cortice in nigro, colore rufescente, quæ decorticata candicat, tenera, succo plena, & dulcis apparet. Bulbus etiam eiusdem diuisionē in medio obtinet, ex qua flos erumpit, ut pictura exquisitè tibi monstrat. His accedit, quod Serapio Arabs sub nomine Hermodactyli, Dioscoridis Colchicon prorsus depingat. Alium tamen esse à nostro Hermodactylo illum putamus, quem Aëtius, Paulus Aegineta lib. vii. & Actuarius peculiariter & priuatim articulorum doloribus conducere scribunt. Paulus enim separatim tanquam diuersorum mentionē fecit, & de Colchico & Ephemero diuersa ab Hermodactylo capita constituit.

Hermodactylus
recentiorum græ-
corum.

LOCVS.

Magnus Colchici in Messenia, & apud Colchos prouentus. Nascitur & passim in omnibus pratis Germaniæ nostræ.

TEMPVS.

Flores in Autumni exitu, ut diximus, apparent. Folia autem post flores generantur, & primo statim uere è terra erumpunt. Semen in æstate Iunio potissimū mense producitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum nonnulli Colchicum in secundo ordine seu à medio recessu statuunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix eius comesta fungorum modo strangulando enecat. Hanc autem depinximus ne pro Bulbo deuorata aliquem lateat. Mirum est enim quantum ignaros propter suauitatē inuitet. Hæc Dioscorides. Proinde satis liquet Hermodactyli huius nostri usum minimè tutum esse: uenenum enim est, & usq; ad sanguinis excretionem per inferna subducit. Eius tamen, radicis potissimum & foliorum, ad enecandos ac abigendos pediculos usus esse potest.

REMEDIA CONTRA COLCHICVM.

Remedio sunt edentibus quæcunq; contra fungos opem ferunt. Bubulum etiā lac potum, ad eò ut quoties hoc affuerit, nullum præterea quærendum præsidium sit.

EX PAULO.

Ephemerum, quod nonnulli Colchicon, eò quod in Colchide nascatur, uocant, aut Bulbum agrestem, epotum protinus totum corpus prurire facit, uelut urtica & scilla

A scilla tactum irritatūq; interiora erodit, stomachum urit cum ponderosa grauitate. Inualeſcente autem malo, cruenta ſtrigmentis miſta per aluum egeruntur. Succurrendū, ut Salamandræ, uomitionibus & clyſteribus. Sed antequam uires ſibi adſciſcat uenenum, dari debet foliorum quercus, aut glandiū, aut malicori, aut ſerpylli decoctum cum lacte bibendum: aut Polygoni ſuccus, aut ſurculorum uitis, aut rubi, aut tenerarum ferularum medullæ, aut myrri cum uino. Benefacit etiam caſtaneorum interior tuniſcula, ſi cum aliquo è ſuccis, quos prædiximus, aſſumatur. Origanum quoq; cum lixiuia potum, in idem efficax eſt. Ad eò uerò exactum præſidium eſt lac uaccinum calidum potum, & ſimul in ore contentum, ut hoc præſente nullum aliud deſideretur.

DE CLEMATIDE DAPHNOIDE CAP. CXXXIIII.

NOMINA.



ΚΛΗΜΑΤΙΣ *δαφνοειδής* Græcis, Clematis Daphnoides Latinis, Peruinca officinis, Vincaperuinca uulgo nominatur. Germanis, eò quod ſemper uireat, *Yngrün* / uel *Syngrün*. Clematida Græci, quoniam *κλιματις*, hoc eſt, ſarmenta ſeu uiticulas per terram ſpargat, dixerunt. Da-

Clematis unde dicta.

phnoida uerò à foliorum Lauri, quam eius folia habent, figura. Plinius lib. xxiiij. cap. xv. Clematida Ægyptiam nominat: libro autem xxi. cap. xi. Vincamperuin-

Daphnoides.

cam, alioq; nomine Chamædaphnen dici tradit, quod ſcilicet humilis uideat Laurus, ut nomen ſonat. Non eſt autem cur eam Chamædaphnen putes quæ Romanis Laureola aut Laurago dicta eſt: hæc enim à Vincaperuinca genere & facultatibus diuerſa eſt, & ſeorſim illam Chamædaphnen depingit Plinius lib. xxiiij. cap.

Chamædaphne.

xv. ut hinc maniſteſtiſimū ſit Plinio duplicem eſſe Chamædaphnen. Vnam quam ſic appellant Dioſcorides, Galenus & alij Græci. Alteram quam priuatim Vincamperuinca alio nomine uocat Plinius. Sic autem, quod humi ſerpat, & ſe in modum funiculi porrigat uicina quæq; uinciens, appellat.

Plinio duplex

Chamædaphne.

FORMA.

Sarmenta oblonga habet, iuncæ craſſitudinis. Folium exiguum, Lauro figura & colore ſimile, multo tamen minus. Iam ſi quis imaginem & effigiem Clematidis daphnoidis exquisitiuſ exploret, ea deprehendẽ eſſe quæ hodie uulgò Vincaperuinca nominatur. Hæc enim humiles & graciles ſpargit iuncos, foliaq; Lauri figura & colore obtinet, multo tamen minora: flore hyacinthino ſeu in purpuram cæruleo, inodoro, rotundo, folijs quinque ſed continuis diſtincto. Ea etiam, ut Plinius ait, ſemper uiret, in modum lineæ folijs geniculatim circumdata. Hybernas ſua perpetua fronde texit coronas.

Vincaperuinca.

LOCVS.

Gignitur pingui, umbroſo, lætoq; ſolo, ſed inculto, in agrorū uinearumq; marginibus.

TEMPVS.

Hæc eſt nunquam non uireſcat, uere tamen duntaxat floreſcere uidetur, Martio potiſſimum menſe & Aprili.

TEMPERAMENTVM.

Siccitas in Clematide, Paulo Aegineta teſte, cæteris qualitatibus præualet. Id quod guſtus etiam oſtendit: guſtanti enim adſtrictionem quandam & amarorem habere uidetur. Adſtringit autem modicè, ſed fortiter amara eſt. Siccat itaque, at citra mordicationem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius caules ac folia in uino pota, alui profluuiia & dyſenterias finiunt. Vteri dō lores cum lacte & roſaceo, aut cyprino in peſſo appoſita ſanant. Commanducata dentium



CLEMATIS
DAPHNOIDES.

Songrün.

A dentium dolorem mitigant. Venenatorum moribus imposita profunt. Feruntur & aspidum moribus cum aceto pota auxiliari.

EX GALENO.

Clematis daphnoides nequaquam est exulceratoria, neque acris, imò alui profluuijs & dysenterijs cum uino pota prodest, dentiumq; dolores mansa mitigat. Veteri doloribus in pello admotum usui est, tantum abest ut urat aut ulceret.

EX PAULO.

Clematis quibusdam Daphnoides, alijs Myrsinoides, nonnullis Polygonoides, sarmenta habet prælonga, crassitudine iunci, folium uerò Lauri. Siccandi facultate pollet, qua alui fluores, difficultates intestinorum, & dentium dolores finit. Contra uenenatorum morsus prodest.

APPENDIX.

Iam cōmemoratae facultates satis ostendunt Clematida daphnoida esse Vincamperuinca: nam codex antiquus manuscriptus, quem in rebus dubijs lubens cito & sequor, easdem prorsus uires Peruincæ tribuit. Sanguinis enim è naribus profluuiò mirū in modum prodesse tradit. Item ijs qui sanguinē uomunt aut spuunt. In summa omnem sanguinis fluxum folia eius sistere asserit, ita ut euidentissimum sit Peruincam officinarum eandem esse cum Clematide hac nostra. Quibus etiam accedit pictura & descriptio eiusdem, quæ utraque adamussim Peruincæ nostræ respondent.

DE CARDAMO CAP. CXXXV

NOMINA.

KΑΡΔΑΜΟΝ græcè, Nasturtiū satiuum latinè dicitur. Officinis latinum nomen retinuit. Barbari nostræ ætatis herbarij Cressionem hortensem uocant, Germanicè Gartenkress dicitur. Cardamū uerò Græcis nonnulli dictum esse arbitrantur, *καρδίας καρδίας*, quod cor foueat, & in syncope illa, quam Cardiacam nominant, plurimum ualeat. Alij diuersa ratione usi, sic dictum quod caput edomet, quasi *καρδία καρδίας*, putant. Nam arcem mentis obsidens suo ferit acremento, & ignea uī præditum caput tentat. Sunt è Græcis qui *καρδία καρδίας*, id est, quod pupillas oculorum coeuntibus unà palpebris abscondat, ita dici censeant. Nam luminibus admotum subinde cogit conuiuere. A quo, ut uolunt, euentu *καρδία καρδίας* uerbum declinarunt, quod conuiuere nostra lingua dicimus. Nasturtium autem appellatum est, Varrone & Plinio testibus, à naribus torquendis, quod odore & seminis acrimonia sternutamenta prouocet.

*Cressio hortenſis
Cardamum un-
de dictum.*

*καρδία καρδίας
Nasturtiū quare
appellatum.*

FORMA.

Nasturtium caulibus affurgit sesquipedalibus, statim à radice minorū foliorum pediculo, floribus candidis, semine per ramorum latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acri sapore.

LOCVS.

Pasim in hortis satum prouenit.


TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimū mense. Sequenti tempore semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Nasturtij semen calefacit & desiccatur ordine quarto. Herba quoque sicca similem semini facultatem possidet. Humida autem adhuc & uiridis propter aqueæ humiditatis admistionem multo inferior est, adeoq; sic mordacitas eius moderata est, ut cum pane ea uti liceat ceu obsonio.

h VIRES.



NASTURTIVM
HORTENSE.

Gartenfress.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omniū semen calefacit, acre est, & stomacho inimicum. Aluum turbat. Lumbricos pellit. Lienem imminuit. Foetus in utero enecat. Menses cit. Venerem excitat. Sinapis & Brucae semini simile est. Lepras & impetigines abstergit. Lienem illitum cum melle extenuat & reprimat, & fauos expurgat. Sorbitionibus incoctum ea quae in pectore sunt educit. Potum serpentibus aduersatur. Suffitu eadem fugat. Capillos deciduos continet. Carbunculos rumpit ad suppurationem ducens. Ischiadicis cum polenta & aceto illitum confert. Oedemata & inflammationes discutit. Furunculos cum muria illitū ad suppurationes ducit. Herba omnia eadem, sed minore effectu, potest.

EX GALENO.

Nasturtij semen adurentis est facultatis particeps sicut Sinapi. Proinde coxendicis & capitis dolores, atque adeo quodcunque rubrificationē postulat, eo perinde atque Sinapi excalefaciunt. Miscetur quoque remedijs quae exhibentur asthmaticis, tanquam id quod crassos humores ualenter incidere ualeat, uelut & Sinapi. Nam per omnia ei simile est.

EX PLINIO.

Nasturtium Venerem stimulat, animum exacuit, aluum purgat. Detrahit bilem potum in aqua decem denariorū pondō. Cum lomento strumis illitum, operumque Brassica, praclare medetur. Capitis uitia purgat, uisum clarificat. Comotas mentes sedat ex aceto sumptū. Lienem ex uino potum, uel cum fico extenuat. Tussum ex melle, si quotidie ieiuni sumant. Semen ex uino omnia intestinorū animalia expellit, efficacius addito Mentastro. Prodest & contra suspiria cum Origano & uino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice, extrahitque corpori aculeos. Et maculas illitum ex aceto. Contra carcinomata adijcitur ouorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus uero ē melle utilissimē. Sestius adijcit hoc serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolores contritum, & alopecias emendare addito Sinapi: grauitatē aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aures succo. Porriginem & ulcera capitis cum adipe anserino. Furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad suppurationē perducit & rumpit. Phagedaenas ulcerum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polenta ex aceto illinitur. Item licheni & unguibus scabris: quippe natura eius caustica est.


DE CRINO ▶ CAP ▶ CXXXVI ▶

NOMINA.

K PINON *καλλιέριον* Græcis, Liliū siue Iunonis rosa Latinis, Liliū album officinis, weiß Lilgen/ oder Gilgen Germanis dicitur. Veteres Græcorū poëtae fingunt ē Iunonis lacte resperfa terra natum Liliū. Iunonis rosa quare dicitur Liliū. Namque cum Hercules puer, quem ex Alcмене sustulerat Iupiter, Iunonis dormientis uberibus admotus esset, & lacte se repleisset, post suctum digressus mamma lacte copiose profluxit. Quod in caelo à puero uago & incerto suctu perusum est, lacteam effecit uiam: quod humi sparsum est, Liliū lacteo flore nitentē creauit, unde rosa Iunonis dicitur.


FORMA.

Liliū caule simplici, raro duplici, tricubitali, comoso, folijs longis, Satyrii effigie, ex herbaceo nitentibus, flore eximij candoris, folijs foris striatis, & ab angustijs in latitudinem se paulatim laxantibus, forma calathi, resupinis per ambitum labris, luteis emicantibus ex fundo calycis apicibus, alterius quam flos odoris, constat.



LILIVM

Weiß Lilgen.



LILIVM
CROCEVM.

Soldtgilg.

h 3

C Flos ille languido semper collo est, nō sufficiente capitis oneri. Radix bulbosa. Hęc descriptio planè huic Lilio cōuenit, quod hodie candidum uocamus. Nos alterius etiam generis picturam adiecimus, quod Croceum appellauimus, à flore eius, qui non, ut in priore, candidus, sed croceus est. Folia quoq; eius angustiora sunt quàm prioris, aliàs simile, ut pictura luculenter ostendit.

LOCVS.

Palsim apud nos in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret initio mensis Iunij.

TEMPERAMENTVM.

Lilij flos temperaturā mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utiq; in gustu amaritudinē habet, partim ex aquea, eaq; temperata. Radix autem & folia primi ordinis sunt exiccantiū & abstergentium. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quàm in folijs.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lirinum oleum.

Ex Lilij flore unguentū fit quod ab alijs Lirinum, ab alijs Susinum appellatur, ad emolliendos neruos, priuatimq; uuluarum durities aptum. Folia herbe illita, serpentium moribus subueniunt. Feruefacta ambustis profunt. Eadem in aceto condita uulneribus opitulantur. Succus foliorum cum aceto & melle in aëreo uase coctus, cōtra uetusta ulcera, & recentia uulnera medicamentū fit. Radix assa, aut cum rosaceo trita ambustis medetur, uuluam emollit, menstrua ducit, & ulceribus cicatricem inducit. Cum melle subacta neruorum præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphos, lepras, furfuresq; emendat. Achores abstergit, faciemq; emendat & erugat. Testiculorū inflammationes trita cum aceto, aut Hyoscyami folijs, & farina triticea demulcet. Semen contra serpentū morsus potum ualeat. Illinuntur sacris ignibus semen & folia cum uino trita.

EX GALENO.

Quod ex flore Lilij conficitur oleum & unguentum, citra mordicationem digerendi simulq; emolliendi facultatem obtinet. Vnde fit ut uteri duritiebus sit aptissimum. Porro radix foliaq; per se trita desiccant & abstergunt & digerunt moderate; proinde quoque ambustis competunt: siquidem hæc quoq; moderate desiccantem extergentemq; facultatem postulāt. Radicem ergo assam tostamue, ac deinde cum rosaceo cōtritam, ambustis quoad obducatur cicatrix imponunt: quippe cum alioqui & aliorum ulcerum omnium bonum sit inducendæ cicatrici remediū. Quin etiam uteros emollit, mensesq; prouocat. Folia uerò præcoquentes, & ipsa ad obductam usq; cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed alijs quoq; uulneribus. Sed sunt qui aceto ea cōdientes ad uulnera suo tempore utant. Quum alphos, aut psoram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, cōmiscemus illi aliquid aliorum medicamentorū ualidius extergentiū, cuiusmodi mel est. Cæterū si id moderate illi ac cōuenienter admisceatur, & ad neruorū diuisiones competit, & ad alia uniuersa quæ ualenter exiccari postulant absq; morfu. Imposuimus uerò etiam quandoq; & foliorū succum cum aceto & melle coctū. Quinque partibus succi plus utroq; erat, atq; insigne medicamen ad omnia ea que exiccari postulant absq; morfu fuit, ceu uulnera omnia ingentia, & maximè quæ in capitibus musculorū eueniunt, & quæcunq; humida flaccidæ, diuturna & ægrè ad cicatricem perducuntur.

EX PLINIO.

Lilij radices multis modis florem suum nobilitauerunt, contra serpentium ictus ex uino potæ, & contra fungorum uenena. Propter clauos pedum in uino decoquantur,

quuntur, triduoq; non soluuntur. Cum adipe aut oleo decoctæ pilos adustis reddunt. E mulso potæ inutilem sanguinem cum aluo trahunt. Lienis & ruptis & uul-
 sis profunt. Et menstruis sceminarum in uino decoctæ. Impositæq; cum melle ner-
 uis præcis medentur. Lichenas, lepras & furfures in facie emendant. Erugant cor-
 pora. Folia in aceto cocta uulneribus imponuntur. Epiphoris testiu in melle cum
 Hyoscyamo & farina tritici. Semen illinitur igni sacro. Flos & folia ulcerum uetu-
 stati imponuntur. Succus qui flore expressus est ab alijs mel, ab alijs syrium uoca-
 tur, ad emolliendas uulvas utilis. Sudores mouet, suppurationes concoquit.

EX SYMEONE SETHI.

Odoratum frigido capiti prodest. Oleum uerò quod ex ipso paratur, uim habet
 discutienti & emolliendi. Huius autem radice quidam utuntur ad uulnerum sa-
 nationem.

DE CUCURBITA SATIUA CAP. CXXXVII

NOMINA.



ΚΑΟΥΚΥΝΘΑ ἐδ' ὠδύμη Græcis, Cucurbita Latinis uocatur; officinæ
 latinum nomen retinuerunt. Germanis Kürbß. Græci ex aduerso uo-
 cabulum imposuere, καουκύνθη nominantes, quod scilicet pumili bre-
 uesq; sint partus, quos ipsa passim enititur, cum tamen corporis mole
 omnes herbarum arborumue fructus uideantur superare. Cucurbitã uerò Latini
 à concuruatu haud dubiè dixerunt, quod facile si quid obstiterit aut fuerit impedi-
 mento quo minus extendatur, incuruescat.

καουκύνθη
 re nominata.
 Cucurbita cruda
 dicta.

GENERA.

Plinius lib. xix. cap. v. duo fatiua Cucurbitæ genera facit. Vnam camerariã uo-
 catam, quæ facili & admodum flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas & testudi-
 nes operit. Alterã plebeiam, quæ scilicet suis flagellis humi repit. Nos ad formã re-
 spicientes tria eiusdem genera fecimus. Vnam maiorẽ, altera uerò minorem. Maio-
 rem uocauimus sic à floribus & fructu, quos maiores habet. Minorem contrã, que
 prædicta minora obtinet. Tertiam longiorẽ, à fructu oblongiore diximus.

FORMA.

Cucurbita amplexicaulis est, reptantibus flagellis in altum scandens, in ramosq;
 uitis modo se diffundit; tamen ob caulis infirmitatẽ, humi spargitur, ni propius ad-
 sit cui caducus innitatur; folio rotundo, Personatiæ aut Afari folijs haud disimi-
 li; flore candido, fructu coloris herbacei primum, flauo paulò post, pyri forma tur-
 binato, qui aut in longum prorogatur, aut in orbem collectus intumescit, aut in
 breue crassamentum cogitur. Cortex recentis tener, inueterato durus, quo carne
 prius exinanito peregre proficiscentes urceorum uice frequenter utuntur in eo uina
 condentes, quo per iter se à sitis iniuria uindicare possint.

LOCVS.

Amat rigua & aquosa loca Cucurbita, nec nisi fata prouenit.

TEMPVS.


Tardius in Germania ob soli frigiditatem fructus Cucurbitæ maturescit, ideoq;
 uix ante exactum autumnum maturum eius fructum inuenies. Cibis autem quoti-
 dianus, donec lignescat, esse potest.

TEMPERAMENTVM.


Cucurbita frigida humidæq; temperaturæ est, utraq; qualitate secundi ordinis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cucurbita cruda trita & illita, cedemata, abscessusque mitigat. Ramenta eius



CUCURBITA
MAIOR.
Groß Kürb.ß.



CUCURBITA
MINOR.
Klein Kürbis.

370



CUCURBITA
OBLONGA.
Lang Kürbf.

infantibus contra capitis ardorem, quam firiasin uocant, in sincipite utiliter illinuntur. Oculorū inflammationes, podagrasq; similiter iuuant. Succus è ramentis confusus per se, & cum rosaceo instillatus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis inunctus adiuuat. Totius Cucurbitæ elixæ & expressæ succus cum exiguo melle & nitro potus, aluum leniter soluit. Si quis in Cucurbitā crudam excauatā uinū infundat, & sub dio habeat, temperaturūq; ieiunus bibat, aluum leniter molliet.

EX GALENO.


Succus ramentorū Cucurbitæ ad aurium dolores cum phlegmone iunctos, cum rosaceo utentibus prodest. Sic tota quoq; illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. Comesta humida est, & sitim arcet. Cruda cibo insuauis est, stomacho perniciofa, & concoctu planè inexpugnabilis, adeò ut si quis alterius cibi inopiaingere eam cōpellatur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum algore uentriculo incumbere sit sensurus, stomachumq; euertet, & ad uomitionē concitabit, quæ una eum ab urgentibus symptomatis liberare potest. Hanc igitur, aliāq; ex fugacibus cōplura, aut mox quā elixata est, aut frictam in sartagine, aut affam omnes homines esse consueuerunt. Ipsa quantum in se est, humidū frigidumq; corpori alimentū præbet, acidipsum ea de causa exiguum, sed leuiter per aluum subit, cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob cōmunem omnium humidorū ciborū rationem, qui scilicet citra adstrictiones tales sunt. Nec sanè infeliciter cōcoquitur, modo non anteuertat corruptio. Plura lib. ij. de aliment. facult. Galenus.

EX PLINIO VALERIANO.

Veteres medici de Cucurbita ita senserunt, ut eam aquam dicerent coagulata. Galenus humidæ putat uirtutis & frigidæ, idq; ex eo probat, quod ipsa in cibo sumpta stomachū relaxat, bibendī desideria non excitat. Cætera etiam in Cucurbita talia ut apertè frigidæ potestatis exempla demonstrat. Crudæ & tritæ leniunt omnem tumorem. In cibo sumptæ molliunt uentrem. Succus earum, ut Galenus ait, ad cōpescendum uelociter auriculæ dolorem tepefactus infunditur. Idem succus & dolorem dentiū mitigat, si diutius in ore teneatur. Sed & rosaceo mixtus, & unctio corporis admotus, febrīū restinguit ardores. Cinis aridæ corticis efficaciter potest combusta sanare. Eundem cinerē didicimus ab expertis uulnera in ueretro iam in putredinem uersa purgare, & ad cicatricem usq; perducere. Semini sicco illa uis traditur, ut in puluerem tusum & inspersum impleat uulnera quæ cauata sunt. Quiddam illud in uino bibendum dedere, ut solutionesalui fluentis inhiberet. Viticulæ quoq; Cucurbitæ iam senescentes cum passo & aceto dysentericis datæ, miro modo faucia intestina componunt.

EX SYMEONE SETHI.

Concoctu facilis, boniq; succi est, & admodū nutrit. Sitim sedat, urinā cit, & uentrem mouet. Calidis & siccis tēperaturis prodest, & inflāmationes uentris & iccoris sedat. Pituitosos autem lēdit, colicosq; affectus. Si malos humores assequitur, ab ijs corrumpitur, & malum succum generat. Semen genitale minuit, & Veneris appetentiam extinguit. Sanguis ex ea procreatus, consistentia tenuis est. Thoraci, pulmōni & uelicæ prodest. Succus ramentorum eius, cum rosaceo impositus, ad aures inflammatione laborantes confert. Integra uerò illita, calidas inflammationes refrigerat.



COLOCYNTHIS
Coloquint.

NOMINA.



ΚΑΛΟΚΥΝΘΙΣ Græcis, syluestris Cucurbita Latinis, Coloquintida *Coloquintida.*
 barbaris & officinis, Germanis wilder Kürbß/ uel Coloquint appel- *Colocynthis uno*
 latur. Sic autem nominata est, quasi parua Cucurbita. Nam si eius fru- *de dicta.*
 ctum cum fructu satiuæ contuleris, quantitate longe minor erit, ac pilæ
 forma in orbem coactus.

FORMA.

Vitulas foliaq; per terram strata emittit, satiuo Cucumeri, ei nimirum quem
 Citrulum hodie officinæ uocant, similia, diuisuris scissa, fructum rotundū, medio-
 cri pilæ similem, uehementer amarum, fungosa candidaq; intus medulla: flores,
 quod Dioscorides omisit, pallefcentes ac luteos, Cucumeri iam nominato similes.

LOCVS.

In Germania sua sponte non nascitur, sata tamen prouenit, sed rarissimè perfe-
 ctionem attingit, quod frigidior sit eius terra quàm quod in ea fructum proferre
 possit. In orientalibus enim & calidioribus locis nata ad nos defertur.

TEMPVS.

Eius flores in fine ferè estatis, fructus autem extremo autumno apparent, qui pri-
 mum quidem herbacei, mox pallidi fiunt. Legendi uerò sunt cum cceperint in pal-
 lidiorem colorem demutari. Et durat integris natura & uiribus ad quinq; annos.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccet in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Medulla fructus purgandi uim habet, quatuor obolorum pondere cum mulla
 aqua sumpta, & cum nitro, myrrha & melle coacta in catapotium. Arefactæ pilæ
 trita, utiliter miscentur clysteribus ischiadicorum, resolutionis neruorum, & coli-
 co dolore affectorum, pituitam, bilem & strigmenta, interdum etiam cruenta edu-
 centes. Appositæ foetus enecant. Dentium dolores, si quis repurget hanc, & lu-
 to oblinat, & in aceto nitroq; inferuefcet, & ad colluendos dentes det, tollit. Si ue-
 rò quis aquam mullam aut passum in ea decoxerit, & sub dño refrigeratum biben-
 dum dederit, crassos humores & strigmenta purgat. Stomacho supra modum ad-
 uersatur. Sedi etiam ex ea balani subiiciuntur, ad excrementa eiicienda. Quinetiã
 uirentis succo, ischiadici utiliter perfricantur.


EX GALENO.

Colocynthis gustu amara est. Sed quæ amarissimo dum potatur ad sunt opera
 medicamento, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem quam uali-
 dam in se continet, nimirum cum ijs quæ expurgat, per aluum & ipsa excerni præ-
 uertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadicis prodest.

EX PLINIO.

Herbacea arefacta per se inanit aluum. Infusa quoque clysteribus intestinorum
 omnium uitijs medetur, & renum, & lumborum, & paralyfi eiecto semine. Aqua
 mulla in ea decoquitur ad dimidias, sic tussienti infunditur obolis quatuor. Pro-
 dest & stomacho, farina aridæ pilulis cum decocto melle sumptis. In morbo ue-
 rò regio utiliter semina eius insumuntur, & protinus aqua mulla. Carnes eius cum
 absinthio & sale dentium dolorem tollunt. Succus uerò cum aceto calefactus mobi-
 les sistit. Item spinæ & lumborum ac coxarum dolores, cum oleo si infricetur. Præ-
 terea, mirum dictu, semina eius si fuerint pari numero adalligata febribus, sa-
 nare dicuntur quas Græci periodicas uocant.

374



COTONEA
MALVA.

Rüthenbaum.

NOMINA.

KΥΔΩΝΙΑ *μυλεε* Græcis, Mâlus Cotonea & Cydonia Latinis, officinis Citonia, Germanis *Küttenbaum* nominatur. Cydoniam uerò Græci à Cydone Creræ oppido, unde primum aduecta est, dixerunt. Cotonea uerò à Sidonte Corinthi uico nominata est. Sunt tamen qui sic uocatam uelint, quod mâla eius lana quadam tegi uideantur, quæ coton dicitur. At qui in re non admodū magni momenti, parum refert utram amplectaris sententiā.

Cydonia unde dicta.
Cotonea.

GENERA.

Cotoneæ arboris mâla Dioscoride & Galeno autoribus duū sunt generum. Alia enim minora, rotunda, odoratioraq; sunt, quæ uera Cotonea appellant. Alia autem maiora, dulciora, ac minus acerba, Galeno in fine libri sexti de tuenda sanita te teste, Struthea nuncupantur.

Struthea.

FORMA.

Arbor notior est quàm ut debeat representari. Mâlo uulgari haud dissimilis est, nisi quod infra magnitudinem illius subsidet, fructu scilicet incuruatos deprimente ramos, prohibenteq; parentem crescere. Folium quoque eius angustius à terra albicat. Poma tenui lanugine pubescunt, & incisuris crispantur, ut pictura affabre ostendit.

LOCVS.

In cultis & hortis prouenit. Locum tamē peculiariter & frigidum & humidum desiderat. Si in calido statuitur, assidua irrigatione illi succurri opus est: fert tamen mediocris situs, inter frigoris & caloris naturam, statum. Planis & decliuis gaudet.

TEMPVS.

Autumno poma eius maturefcunt.

TEMPERAMENTVM.

Mâla Cotonea frigido & terrestri temperamento donata sunt, propterq; uincem adstrictionem minus cæteris mâlis humida existunt. Frigida itaque sunt primo ordine, & sicca secundo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cotonea stomacho accōmodata sunt, urinam mouent. Tosta mitiora fiunt. Cœliacis, dysentericis, purulenta excreantibus, cholericis profunt, præsertim cruda. Maceratorū liquor potus stomachi atque alui fluxionibus opitulatur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis auxilio est. Decocto eorum sedes & uulua; procidentres proluuntur. Quæ melle condiuntur, urinam cient, mel autem naturam eorum induit: quippe adstringens & conspissans obstruensue fit. Quæ autem cum melle coquunt, stomacho utilia sunt, & gustu iucunda, minus autem cōstringunt. Cruda cataplasmatibus miscentur ad cohibendam aluum, contraq; stomachi subuersionem & ardorem, mammaram inflammationes, lienes induratos & cōdylomata. Fit uinum ex ijs tuis & expressis, sed quo perduret, sedecim sextarijs succi, unus mellis adijcitur, alioqui acescit. Prodest autem ad omnia quæ dicta sunt. Vnguentum etiam ex ipsis cōficitur, quod Melinum appellat, quo utimur quando adstringenti oleo opus est. Eligi oportet uera, quæ parua, rotunda & odorata sunt. Struthea autem uocata & magna, minus utilia. Flos & uiridis & sicca cataplasmatibus utilis, ijs potissimum quæ adstrictionem desiderant conueniens. Inflammationibus oculorum, sanguinis reiectionibus, alui fluxionibus, mensiumq; impetui cum uino potus prodest.

Vnguentum melleinum.

EX GALENO.

Eximium quid Cotonea præ alijs mâlis possident: nam & plus adstringunt, & durabilem succum habent, si cocta cum melle asseruare quis cupiat. Aliorū succus

i 2 repositi-

C repositus acefcit, utpote frigida humiditate multa redundans. Strutheorum quoque succus perennare potest ubi recte fuerit præparatus, quemadmodum & Cottoncorum: uerum hic minus fauis & iucundus est, maximeque adstringit, ita ut huius quoque aliquando ufus fit idoneus ad uentris maiorem in modum diffoluti robur restituumdum.

EX PLINIO.

Cotonea cocta suauiora. Cruda tamen duntaxat matura, profunt sanguine excreantibus, ac dysentericis, cholericis, coeliacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt costringentem illam uim succi. Imponunt & pectori in febris ardoribus, & tum decoquuntur in aqua, ad eadem quæ supra scripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda decoctæ cerati modo imponuntur. Lanugo eorum carbunculos sanat, cocta in uino, & illita cum cera. Alopecij capillum reddunt. Quæ ex ijs cruda in melle coadiuntur, urinam mouent. Mellis autem suauitati multum adijciunt, stomachoque id utilius faciunt. Quæ uero in melle condiuntur cocta, quidam ad stomachi uitia trita cum rosaceo folijs decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lienibus, orthopnoicis, hydropicis prodest. Item mammis, condylomatis, uaricibus. Flos & uiridis & siccus, inflammationibus oculorum, excretionibus sanguinis, mensibus mulierum. Fit & succus ex ijs mitis, cum uino dulci tusus, utilis & coeliacis & iecinori. Decocto quoque eorum fouentur, si procidant uulua & interanea. Fit & oleum ex ijs, quod Melinum uocauimus, quoties non fuerint in humidis nata. Minus utilia Struthea, quamuis cognata.

EX SYMEONE SETHI

Stomachum adstringunt & corroborant, & ante cibum sumpta uentrem cohibent, urinam prouocant. Si ad satietatem edantur, difficulter decoquuntur. Dulcia minus adstringunt, acida uero magis, uomitumque compescunt. Post cibum sumpta uentrem mouent: sed quibus est imbecilla facultas uentris retentrix, & excretrix ualida, plus cibi accipiant. Mansa a potu, uini uapore in caput distribui prohibent. Si qua prægnans, ut fertur, crebrius hæc comedat, puerum industrium & uersutum pariet.

DE CASTANEA CAP. CXL.

NOMINA.



CASTANA, ἢ δὸς Βάλανος, ἢ σαρδανία Βάλανος, ἢ λόπιον Græcis: Castanea, Sardiniana glans, Iouis glans, Nuxque castanea Latinis appellatur. Germanis nostris Castani/uel Kesten uocant. Castaneæ autem à Castano Magnesiæ oppido, unde primum aduectæ sunt, nominatas esse constat. Sardinianæ uero glandes, quoniam in Sardinia optimæ nascantur.

FORMA.

Arbor est uulgo cognita, Iuglandi haudquaquam dissimilis, folio tantum uenoso flore & fimbriato. Nux quam producit intus solida, & plurimum plana, triplici tegminis ambitu septa, membrana primum amara, mox lento cortice, demum echinato calyce.

LOCVS.

Puram & resolutam terram desiderat, opacoque & septentrionali diu lætatur. Montes & ualles diligit. In plerisque Germaniæ locis copiosissima prouenit.

TEMPVS.

Ineunte uere germinat, feriusque Vergiliarum occasu fructificat.


TEMPERAMENTVM.

Adstringit & exicat Castanea haud secus quam aliæ glandes. Calida uero & sicca est primo ordine,

VIRES.

Castaneæ unde dictæ.

Sardinianæ glandes.



CASTANEA

Reffen.

i 3

C VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Castaneæ adstringunt, eademq̄ quæ glandes possunt. Potissimū autem quæ inter carnem & corticem membrana est. Caro his qui Ephemeron, hoc est, Colchicon, biberunt, accommodata est.

EX GALENO.

Castaneæ inter omnes glandes principatum tenent, solæq̄ syluestrium fructuū alimentum memorabile corporibus præbent.

EX PLINIO.

Castaneæ uehementer sistunt stomachi & uentris fluxiones, sanguinē excreantibus profunt, carnes alunt.

EX PLINIO VALERIANO.

Castaneæ ex omnibus fortissimū quidem cibum corpori præstant, sed qui difficile concoquatur. Coctæ autem in carbonibus, uel in fictili uase sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tussientibus profunt. Aqua in qua cum suo cortice decoquuntur, coeliacis, dysentericis, sanguinemq̄ excreantibus bibenda haud inutiliter propinat. Interior membrana quæ corticē fructumq̄ discernit, ad tertiam partem decocta in aqua & potui oblata, mirè aluum fluentē refrenat, adeo ut Dioscorides putet etiam cathartico dato, per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquā necesse sit, purget.

EX SYMEONE SETHI.

Copiosum corpori alimentum præbent, tardè transeunt, & difficulter coquuntur. Crassum humorē, capitis dolorem, & flatu efficiunt, uentremq̄ sistunt. Si torreantur, aut siccantur, multum nocenti deponunt.

APPENDIX.

Capitis dolores creant, Inflationes pariunt, cōcoctu difficiles. Tostæ tamen crudis innocentiores sunt. Arefactæ multum noxæ remittunt. Tritæ cum melle & sale rabioforum canum moribus imponuntur. Mammarū duritias discutunt, cum hordeaceo polline & aceto impositæ, ijsq̄ uino maceratis, & cum farina subactis, pelsi uice utuntur ad supprimendos menses.

DE CARYO BASILICO CAP. CXLI

NOMINA.

KΑΡΥΟΝ βασιλικόν Græcis, Regia nux & Persica, Iuglansq̄ Latinis; officinis Nux simpliciter, Germanis Welschnuß appellatur. *κάρυον* autem Græcis à capitis grauedine uocatam esse notissimum est. Nam folia arboris huius grauem expirant halitū, uiresq̄ eius in cerebrum penetrāt, atque adeo eos sopore tentans lædit qui sub arbore decubuerint, Basilicā uerò, Regiamue & Persicam, eò quod è Perside primum in Græciam à regibus delata sit, dictam esse constat. Iuglandem à iuuando & glande nominatam existimant.

FORMA.


Arbor est pregrandis, multis prælongisq̄ nixa radicibus, procero caudice, multis summatim ramis ingentibus brachiato, ad binū ternūque cubitorū complexus sæpius crassescente, cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente, folijs latis, oblongis, è iucundo grauius subolentibus, patulamq̄ iaculantibus umbram & infalubrem, per autumnum deciduis. Verni temporis initio ueluti quodam gestiente foliorum conceptu, panicula prælonga, callo squamatim compactili protracta, ordine nucis pineæ protuberat, dehiscitq̄. Flauescens statim quàm frondem facere ccepit, nutans caducaq̄ prolabitur. Tum super ramenti huius pediculū flos erumpit, totidemq̄ calyculacea tegumenta quot flores petiolo contrahuntur, singulisq̄ ijs singulæ includuntur nuces, multis munitæ inuolucris, primum herbaceo cortice, mox ligneo putamine, dein tenui tunica. Crispi intus nuclei quadripartitò digerun-

Caryon unde
Græci appellat
urini.

Basilica & Persica
cur dicta.

Iuglans.

Umbra Iuglandis
arboris infalubris.



IVGLANS

Welschnuß.

i 4

C geruntur, lignosa intercedente membrana.

LOCVS.

Montibus læta, aquasq̄ odit. Passim in omnib. ferè Germaniæ hortis prouenit.

TEMPVS.

Germinat post afflatum Fauoniæ, non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus impulsio priore pullulo. Fructificat autumnus.

TEMPERAMENTVM.

Huius temperamentum ex uirium enarratione patebit. Virides uerò nuces primo ordine sicca, secundo uerò calidæ censentur.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Nuces iuglandes difficiles cōcoctu, stomacho inutiles, bilem augent, capitis dolorem faciunt, tussientibus inimicæ. Ad uomitiones ieiunis in cibo utiles. Præsumptæ & à cibo comestæ cum caricis & ruta letalibus uenenis aduersantur. Largius esitata latos lumbricos pellunt. Illinuntur mammariū inflammationi, abscessibus, luxatisq̄ cum exiguo melle & ruta. Cum cepa uerò, sale & melle, canis hominisq̄ morsui conferunt. Tormina cum putamine suo cremata & umbilico admota sedant. Cortex combustus, tritusq̄ in uino & oleo, infantibus inunctus capillos elegantes efficit, alopeciasq̄ replet. Sistit menses crematum tritumq̄, & cum uino admotum quod intra nuces clauditur. Vetusarū autem nucum nuclei illiti, gangrænas, carbunculos, ægilopas & alopecias cōmanducati & impositi celeriter sanant. Fit etiam ex ijs contulis & expressis oleum. Recentes nuces stomacho minus nocent, dulciores enim sunt. Quam ob causam alijs miscentur, ut acrimoniam auferant. Illitu liuores quoque tollunt.

EX GALENO.

D Arbor tum in germinibus, tum in folijs ad strictionem quādam possidet. Cæterum euidentem & plurimam in nucis putamine recenti & sicco; proinde eo fullores quoq̄ utuntur. At nos ea exprimentes, succo similiter ut mororum & ruborū decocto in melle, ut stomachico medicamento utimur, & ad omnia reliqua ad quæ modo dicti succi cōueniunt. Porrò nucis ipsius quod edendo est, oleosum est & tenuium partium, ideoq̄ etiam facile † exprimitur: & quo diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrè oleum ex eo inueterato exprimere licet: tunc sanè admodum discutiens fit, ut eo nonnulli gangrænas, & carbunculos, & ægilopas fiant: nonnulli uerò etiam ad neruos uulneratos utuntur. Cæterum si recens sit adstringentis nonnihil qualitatis quoq̄ obtinet. At quod imperfectū est etiamdum, & nondum siccum, ueluti reliqui fructus omnes qui uirides sunt, plenum est semicoctæ humiditatis. Cortex tamen eius ubi inaruit, tenuium partium & exicatoriū est medicamentum, morsus expers.

† Alijs ἐκχυθῆ
του, in bilem
ueritur.

EX PLINIO.

Arborum ipsarum foliorumq̄ uires, in cerebrū penetrant, hocq̄ minore momento, sed in cibus, nuclei faciūt. Sunt autem recentes iucundiores, sicca unguinosiores, & stomacho inutiles, difficiles cōcoctu, dolorē capitis inferentes, tussientibus inimicæ, & uomituris ieiunis aptæ in tenasmo solo: trahunt enim pituitā. Eadem præsumptæ uenena hebetant. Item anginam cum ruta & oleo. Item aduersantur cepis, leniuntq̄ earum saporem. Auriū inflammationi imponuntur cum mellis exiguo. Item cum ruta mammis & luxatis. Cum cepa autē & sale & melle, canis hominisq̄ morsui. Putamine nucis iuglandis, dens cauus inurit. Putamen combustum tritumq̄ in oleo aut uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum: & ad alopecias sic utuntur. Quo plures quis nuces ederit, hoc facilius tineas pellit. Et quæ perueteres sunt nuces gangrænis & carbunculis medentur. Item sugillatis. Cortex iuglandiū lichenum uitio & dysentericis prodest. Folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuarijs Mithridatis maximi Regis deuicti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari cō-

menta.

mentario ipsius manu compositionē antidoti, duabus nucibus siccis, item ficis totidem, & rutæ folijs uiginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum uenenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoq; canis morsus, nuclei à ieiuno homine cōmanducati illitq; præsentī remedio esse dicuntur.

EX PLINIO VALERIANO.

Nux uiridis, ut potē adhuc aquatoris humoris, styptica & frigida uirtute censet. Potest deniq; & stomacho aliquid uigoris acquirere, & uentrē cum garo sumpta mollire. Nuces autē sicca, dura, cum caricis duabus, & uiginti rutæ folijs addito salis grano simul cōteruntur, nullisq; uenenis opprimi poterit ea die quisquis ieiunus acceperit. Inter Calendas & Idus Iulij centum numero nuces statim ut arbori demptæ sunt cortice adhærente quassantur: his admiscentur aluminis scissi libræ tres, & in nouo fictili uase ponuntur: super hæc infunduntur olei boni libræ tres, & diligenter in loco neq; humido, neq; nimium sicco obruunt, post nonaginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorum damna restituit.

EX SYMEONE SETHI.

Virides uentrem mouent, quamobrē quidam ante cibum cum sapo comedunt. Facilius etiā quā amygdalæ concoquuntur. Aridæ in ore inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores fiunt, si cum caricis edantur. Ferunt etiā eum qui nuces cum caricis & ruta ante reliquos cibos esitauerit, non magnopere à uenenatis medicamentis lædi. Cōcoquuntur facilē nuces in frigidis uentriculis, in calidis uerò in bilem magis mutantur. Faucium & capitis dolorem afferunt, & tussēs augent. Ante alios cibos sumptæ, uomitum adiuuant. Ad satietatem comestas, lumbricos educere scimus. Ad dentium pruritum utiles sunt.

DE CALTHA CAP. CXLII

NOMINA.



VO nomine Græci plantam hanc appellauerint, fateor ingentē mihi nondum constare. Latinis autem dicta uidetur Caltha uel Calthula, quam uocē deinde corrumpentes officing, in Calendulam immutarunt. Calendula quare dicta. Quāquam uerisimile etiā sit, sic nominatam esse, quod omnibus mensium Calendis fruticare comperiat. Atque hinc fit quod nonnulli florem omnium mensium appellent. Germani Xingelblimen uocant, ab intorto, & in circulum acto semine.

Calendula quare dicta.
Flos omnium mensium.

FORMA.

Herba est fruticosa, caule dodrantali, lignoso, folijs longiusculis, in angustum desinentibus, floribus speciosis, croceis luteisue, non ingrati, quamuis grauis, odoris, qua dote in coronamenta uenit: semine, cuius uagina scorpionis caudam imitatur: radice simplici, multo capillitio fibrata. Cur autem hanc herbam Caltham esse credam, facit in primis Plinius, qui lib. uigesimo primo, capite sexto, Caltham odore grauem esse scribit. Dein Virgilius qui Ægloga secunda sic canit: Mollia luteola pingit uacinia Caltha. Luteolam, à luteo florū haud dubiē colore, nominans.

LOCVS.

Prouenit in cultis, atq; uix hortum inuenies in quo non copiose nascatur.

TEMPVS.

Singulis ferē mensium Calendis, ut diximus, florere deprehenditur, Maio incipiens mense. Magis autem autumnō eiusdem emicant flores.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse statuunt, neq; id immeritō, quandoquidē dulcedine modica cum amaritudine coniuncta participet.

VIREŚ



CALTHA

Ringelblüm.

VIRE S EX RECENTIORIBVS.

Herba ipsa adhibetur condimentis & acetarijs. Flos ex uino potus ciet menses: item herbæ succus, quo in dentium dolore os presentaneo remedio colluitur. Non parum etiam eius flos ad flauos reddendos capillos conducit. Idem, perinde atque ipsa herba, secundas educit mirificè, si aridus suffribus admotus fuerit.

DE CARYOPHYLLATA CAP. CXLIII.

NOMINA.



VALITER Græcis & antiquis Latinis scriptoribus hæc herba nominata sit, nondum compertum habeo. Cur enim Dioscoridis Lagopum Caryophyllata nō est Lagopus. non esse credam, etsi paniculum pedi leporino prorsus similem habeat, facit quod in manuscripto & peruetusto herbario seorsim descriptā & depictā utranq; herbam uiderim. Pictura autem Lagopi longè aliam herbam, que in segetibus nascitur, quàm sit Caryophyllata, exprimit: de qua suo loco dicemus. Neq; defunt qui herbam hanc de qua agimus, Geum Plinio dictam uelint, quorū certè sententia periculo uacat, quod eadem facultas utrisq; radicibus sit. Sed ad institutum reuertamur. Herbam quam recentiores Latini Caryophyllatam, ab odoris suauitate quam radices de se præbent, nominant, uulgo herbam Benedictam, Benedicta. à diuina sua efficacia, & Sanamundam appellant. Germani *Benedictenwurz*. Sanamunda.

GENERA.

Duo esse eius herbæ genera animaduerti, non tamen multum à se dissidentia. Primum genus Caryophyllatam hortensem uocauimus, cui ex cultura aliqua teneritas accedit in folijs, floribus & paniculis. Flos huic paulò minor & pallidior Caryophyllata hortenſis. quàm syluestri. Germanicè *garten / oder heymisch Benedictenwurz* appellari potest. Alterum huius herbæ genus Caryophyllatam syluestrem diximus, quod Caryophyllata syluestris. scilicet citra culturam proueniat. Flores eius multo maiores, magisq; ad croci colorem accedunt. Germanicè *wild Benedictenwurz* nominari cōmodè potest. Differentiam tamen nemo rectius quàm ipsa pictura demonstrabit.

FORMA.

Caulis illi sesquicubitalis, geniculatus, angustus, terna è pediculo longo folia articulatim exeuntia, per ambitum serrata, bina etiam prioribus minora, singula genicula cingunt. E medio alarum sinu ramuli funduntur tenues, quibus in summis flos luteus emicat, quo succusso caput extuberat circinatis acinulis cumulatè striptum, quasi rudimentum eluceat naturæ fragum inchoantis. Radix multis luteis capillamentis fibrata, Caryophyllon olet.

LOCVS.

Primum in hortis plantatum prouenit. Alterum in montanis, opacis, & iuxta sepes nascitur.

TEMPVS.


Floret Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores, & peruetustus etiam herbarius, calidam & siccam esse in secundo ordine statuunt. Folia sanè in gustu non mediocrem adstrictionem ostendunt. Radix itidem haud paruam adstrictionem obtinet.


VIRE S EX RECENTIORIBVS.

Radix eius luto & fordibus eluta siccat, & imbre aceti respersa arcas & uestes iucundo cōmendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosq; coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & cruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Fomentū item ex uino decoctionis eius menses



CARYOPHYLLATA
HORTENSIS.

Garten Benedictenwurz.



CARYOPHYLLATA
SYLVESTRIS.

Wild Benedictenwurz.

k

Contra uenena tritam cum uino sumptam ualere. Cōcoctionem præterea roborare, dolorem uentriculi & intestinorū à frigiditate aut flatibus ortum, decoctam in uino sanare ait. Mirificè etiam ad interna uulnera huius herbæ decoctum confert. Externa uerò ex ea collui debent.

DE CENTAVRIO MINORE CAP. CXLIII

NOMINA.

Centaurium un-
de dictum.



Limnesium.

Febrifuga.

Fel terræ.

CENTAVRION μικρόν, ἢ λιμνήσιον, καὶ λιμναῖον Græcis, Febrifuga & Fel terræ Latinis, officinis Centaurya minor, Germanis Klein Tausendtguldenkraut / Sieberkraut / Erdgall / & Biberkraut appellatur. Centaurium, quod ea curatus dicitur Chiron Centaurus, cum Hercules excepti hospitio pertractanti arma sagitta excidisset in pedem. Limnesion & Limnæum, quod secundū aquarum scatebras ac paludes, quas Græci λιμνας dicunt, nascatur. Febrifuga, eo quod febres fugat, & procul è corpore pellat. Fel terræ, ob summam quam habet amaritudinem.

FORMA.

Herba est Hyperico Origanoue similis, caulem habens altitudine supra dodrantem, angulosum. Flores in puniceo colore subpurpurascens, ad Lychnidis flores accedentes. Folijs paruis & oblongis ueluti Rutæ. Semen tritico simile. Radicem exiguam, inutilem & leuem.

LOCVS.

Propter lacus & rigua loca, Dioscoride autore, nascitur. Apuleio uerò teste in solidis & fortibus quoque locis prouenit, id quod non raro in Germania nostra accidere compertum habeo.

TEMPVS.

Floret æstate & autumno, quo maximè tempore, quia semine est prægnans, colligitur.

TEMPERAMENTVM.


In folijs & floribus uincit qualitas amara paululum obtinens adstrictionis, atque propter eiusmodi temperamentum admodum exiccatorium est medicamentum, expers mordacitatis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adhuc uirens tusa & illita uulnera glutinat. Ulcera uetera purgat, & cicatrice obducit. Biliosa & crassa per aluum ducit. Decoctum eiusdem ischiadicis cōmodè infunditur, sanguinem educens, & à dolore leuans. Succus ad oculorum medicamenta perutilis, cum melle quæ pupillas obtenebrant expurgans. In pello admotus menses ac foetus educit. Priuatim potus neruorum affectibus succurrit.

EX GALENO.

Centaurij minoris radix prorsus inefficax est. Rami uerò & potissimum folia quæ in ijs sunt atque flores, utiliora. Ulcera magna herba ipsa adhuc recens illita glutinat. Vetera quoque & quæ ægrè ad cicatricem perduci possunt eodem modo utentibus cicatrice obducuntur. Arefacta glutinatorijs & desiccatorijs miscetur facultatibus, ijs uidelicet quæ sinus & fistulas sanare sunt natae, & ueteres durities emollire, tum ulcerum maligna sanare. Miscetur etiam ijs quæ rheumaticis affectibus medentur, in quibus ea medicamenta optima sunt quæ uehementer desiccantia cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem. Decoctum herbæ quidam ischiadicis infundunt, ceu biliosa ac crassa ducens: nam & talia purgat. Quamquam quum adè uehementer operabitur ut cruenta euacuet, tunc magis proderit. Suc-



CENTAVRIVM
MINVS.

Klein Tausendgulden.

k z

Crit. Succus porrò eius quum ad similes sit facultatis, hoc est, exicatoriæ & absterforiæ, & reliqua iam dicta pulchrè efficere potest. Cum melle etiam oculis illinitur, mensesq; & foetum appositus in pello euocat. Sunt qui ipsum præbeant & ijs quibus nerui affecti sunt, ut qui euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt. Optimū etiam medicamentum est ad iecinoris obstructions soluendas. Bonum quoq; lie-
ni indurato foris impositum, & nihilo secius si quis bibere sustinuerit,

EX PLINIO.

Purgat aluum succus Centaurij minoris drachma in hemina aquæ cum exiguo salis & aceti, bilemq; detrahit.

DE CYAMO CAP. CXLV.

NOMINA.

KYAMOS Græcis, Faba Latinis dicitur. Officinæ Latinum nomen re-
tinent, Germanis *Bonen* appellatur.

FORMA.

KSola Faba inter legumina sine adminiculo nititur, folio carnosio, Por-
tulacæ simili, flore cristato, uersicolore, partim albo, partim purpureo, atris quibus-
dam maculis notato, quas M. Varro lugubres uocat literas: siliqua plerunque se-
mipedali, fructu intus lato humani unguis effigie, colore non simplici, sed aut ful-
uo, aut nigro, iam uerò etiam herbaceo & cocineo: radice singulari, lignosa, & ca-
pillata fibris. Quæ hic à quibusdam, quasi nostra non esset uera Faba, afferuntur
argumenta, non tanti momenti sunt ut confutatione indigeant: constat enim no-
stram, eas quas ueteres illi adscriperunt, habere notas & facultates, Non tamen ne
D gamus in diuersis terris maiorem aut minorem produci posse.

LOCVS.

Pasim in hortis sata prouenit, Latatur loco pinguisimo & stercorato.

TEMPVS.

Floret æstate.


TEMPERAMENTVM.

Faba in refrigerando & exiccando ad mediã temperaturam propinquissimè
accedit. Est itaque frigida & sicca in primo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Spirituosa, inflans, concoctu pertinax, insomnia tumultuosa faciens. Tussi ta-
men confert, carnesq; generat. Decocta in posca, & cum cortice comesta, dysente-
rias & coeliacas fluxiones sistit. Vtilis contra uomitiones in cibo sumpta. Minus
inflat priore aqua in decoctione effusa. Viridis magis stomacho nocet, plusq; in-
flat. Farina eius per se & cum polenta illita, ex plaga inflammationes mitigat, & ci-
catrices ad reliqui corporis colorè reducit. Mammis in quibus lac in grumos cogi-
tur, & inflammatione laborantibus auxiliat, lacq; extinguit. Cum melle & scenigre
ci farina furunculos, parotidas ac fugillata oculorum discutit. Cum rosa, thure, &
oui albo, procidentes oculos, staphylomata & oedemata compescit. Macerata in ui-
no suffusiones & ictus oculorum sanat. Ad sistendas fluxiones sine cortice com-
manducata fronti imponitur. Testium inflammationes in uino decocta sanat. Pue-
rorum pubi illita diu impuberes seruat. Alphos exterit. Euulsos pilos ut non nu-
triantur & graciles fiant, cortices illiti efficiunt. Cum polenta, alumine & oleo ueteri
illiti strumas discutunt. Decoctum illorum lanas tingit. Factas ab hirundinibus
sanguinis eruptiones, cortice ablato, Faba qua parte cohæret diuisa, si dimidia ap-
ponatur, compescit.

EX GALEO.



FABA

Bonnet.

k 3

C

EX GALENO.

Caro Fabæ paulum quid abstergentis facultatis cōtinet, sicut cortex adstringentis: idcirco medicorum nonnulli totam Fabam cum polenta decoctam dysentericis, cœliaciis & uomentibus exhibuerunt. Porrò ut edulium flatulenta est, & coctum difficilis, ut si quid aliud. Excreationibus quidem ex thorace & pulmone idonea. Ut medicamentum uerò foris imposita sine molestia exiccat. In podagricis ea sæpenumero usi sumus ex aqua decocta, deinceps adipem suillum admiscentes. Ad neruorum tum contusiones, tum uulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos qui ex ictu iam phlegmone occupabantur, cum polenta. Sed & testium & mammarum bonum est cataplasma. Nam hæ partes cum phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant, maximè cum mammæ ex lacte in ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Manifestè fabacea farina cutis sordes detergere conspicitur, quod intelligentes mangoles, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac utuntur. Illinunt præterea & hac faciem quemadmodū pitiana; nam quæ in summa cute eminent lentes exterit, & maculas uelut ex sole contractas.

EX PLINIO.

Faba hebetare sensus existimata, in somnia quoque facere. Solida fricta, feruensque in acri aceto coniecta, torminibus medetur. In cibo fressa, & cum allio cocta, contra deploratas tusses suppurationesque pectorum, quotidiani cibo sumitur: & comanducata ieiuno ore, etiam ad furunculos maturandos discutiendosue imponitur, & in uino decocta ad testium tumores & genitalium. Lomento quoque ex aceto decocto, tumores maturat atque aperit. Item liuoribus, combustis medetur. Voci eam prodesse, autor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarum cinis, ad coxendices, & ad neruorum ueteres dolores, cum adipis suilli uetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertias sistunt aluum.

DE CONSOLIDA MEDIA CAP. CXLVI.

NOMINA.

Consolida
media.



LINTER multas alias herbas quibus uulnera glutinandi facultas inest, & hæc cuius picturam damus cōnumeratur. Hinc est quod uulgius herbariorum illam Consolidam mediam nominet. Qua etiam appellatione nos uti uoluimus, quod nobis quo nomine ueteribus Græcis aut Latinis appellata sit nondum constaret. Rectius tamen Solidago diceretur. Germanis Gulde gungel nuncupatur.

FORMA.

Caulem habet quadrangulum, lanuginosum, ex quo per interualla folia bina ex singulis geniculis in extremitatibus, laciniata, Menthæ similia emicant. A medio caulibus ad fastigium usque ex singulis foliorum alis, flores sex aut septem in purpureo cœrulei exeunt. Radix illi subest lignosa, quæ multas à se exiguas radices capillamentorum instar per terram latè serpentes propagat.

LOCVS.

Pæssim in pratis nascitur.

TEMPVS.


Floret copiose Maio mense.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit & amara est, ut calidam & siccam esse nemo dubitare possit.

VIRE S.

Vulnera glutinat, Sanguinis grumos ex casu, uel cōtusionibus, coactos in corpore dissicit



CONSOLIDIDA
MEDIA.

Suldeguntzel.

k 4

c difijcit & diffoluit. Præfens remedium eft aphthis & ulceribus in ore serpentibus. Decoctum eius tumoribus illitum eos difsipat. Vfus etiam eius ad intertrigines, ulcera pudendorum, & inteftinorum exulcerationes prodeft.

DE CANNABE CAP. CXLVII.

NOMINA.



ANNABIS Græcis, Cannabis Latinis, Barbaris & uulgo Canapus dicitur, Germanis autem Hanff.

GENERA.

χωνόσποφθ.

Cannabis duo sunt genera. Vna enim fatiua est, quam Græci χωνόσποφθ, quod magni in uita usus sit ad robustissimos funes texendos. Germanis 3a-mer Hanff dicitur. Altera syluestris, quam Latini Terminalem uocant, Germani wilden Hanff.

FORMA.

Satiua Cannabis

Syluestris.

Satiua Cannabis folia fert fraxino similia, grauis odoris, caules longos, inanesq̃, fermen rotundum. Syluestris uero uirgas fundit Altheæ similes, nigriores, asperiores & minores, cubitali altitudine. Folia fatiuae similia, asperiora & nigriora. Flores subrubeos, Lychnidi similes. Semen & radicem Altheæ similia. Eius effigiem uidere nobis nondum licuit.

LOCVS.

Satiua, in locis cultis fata prouenit. Syluestris in syluis & asperis locis, Apuleioq̃ teste, iuxta femitas & fepes nascitur.

TEMPVS.

Herba ad usus medicos carpitur dum maxime uiret. Semen autem eius, Plinio D autore, cum maturum est, id quod prope autumnæ æquinoctium accidit.

TEMPERAMENTVM.

Admodum calefacit & exiccat.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Satiuæ maiori copia sumptum genituram extinguit. Ex uiridi autem succus expressus, contra aurium dolores utiliter instillatur. Syluestris radix decocta illitaq̃, inflammationes mitigat. Tumores discutit, & callos difijcit. Huius cortex texendis funibus utilis est.

EX GALENO.

Cannabis semen flatus extinguit, adeoq̃ desiccatur, ut si plusculum edatur genituram exiccat. Sunt qui ex uiridi succum exprimentes, ad aurium dolores ab obstructione, ut mihi uidetur, natos utuntur. Semen etiam cannabinum difficulter concoquitur, stomacho & capiti aduersatur, prauosq̃ humores creat. Admodum exalfacit, ideoq̃ caput æstuoso ac medicamentoso halitu sursum misso tentat.

EX PLINIO.

Semen Cannabis extinguere genituram uirorum dicitur. Succus ex eo uermiculos aurium, & quodcunq̃ animal intrauerit, eijcit, sed cum dolore capitis. Tantaq̃ uis ei est, ut aquæ infusa, coagulare dicatur, & ideo iumentorum aluo succurrit pota in aqua. Radix cōtractos articulos emollit in aqua cocta. Item podagras & similes impetus. Ambustis cruda illinitur, sed sæpius mutatur priusquam arefcat.

EX SYMEONE SETHI.

Semē Cannabis comestum idem nocumentum quod Coriandrū affert: immodicè enim si estur, ut illud, deliriū facit. Folia uero arida pota, ueluti farina, aut magis pro potione hæc farina exiccata, ebrietatem quandam hospitalem facit, & quæ ab hauriente non sentiatur. Apud Arabas enim pinsitur, subigiturue pro uino, & inebriat. Desiccatur uero semen genitale ut Caphura,



CANNABIS
SATIVA.

Zaner Gouff.

C

APPENDIX.

Quum ex iam dictis cōstet Cannabinum semen caput facile tentare, atque adeo lædere, imprudenter faciunt, qui vulgi errorē sequentes, in morbis, ijsq̃ maximis, capitis, ex hoc semine confecta iuscula ægrotantib. magno eorum malo exhibent.

DE CARDIACA CAP. CXLVIII.

NOMINA.

Cardiaca cur
dicta.



VO nomine herba hæc ueteribus sit appellata, nondum nobis constat. Nostri tamen temporis herbarij Cardiacam uocant. Germani *Hergspan/ oder Hergsperr*. Cardiaca uerò haud dubiè à recentioribus nominata est, quod cordis palpitationi, quam illi perperam *herp. siccum* appellant, mirificè conferre uideat̃. Alia est hæc à Ballote, de qua suo loco diximus.

FORMA.

Cardiaca caulem ex se mittit quadrangulum, geniculatum, nigrum: folia lacinata, nigra, per interualla in caule ex singulis geniculis prodeuntia: flores in candido purpureos orbiculato ambitu caules circumiacentes: radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam.

LOCVS.

Pasim in ruderibus & circa sepes nascitur.

TEMPVS.

Iulio mense floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Amara admodum existit, ut hoc nomine calidam esse in secundo ordine, & siccam in tertio constet.

D

VIRE S.

Recentiores recte contra cordis palpitationem, conuulsionem & resolutionem cōducere tradunt: potest enim quum amara sit herba, sua caliditate & siccitate crassos humores qui in uenis & alijs partibus, neruosis potissimum, sunt, incidere, extenuare & discutere. Hac etiam ratione morbo comitiali confert, urinas mouet, & menstrua educit, aliasq̃ facultates quas Galenus libro quarto de simpl. med. facult. cap. xvij. amaris tribuit, obtinet.



CARDIACA

Herzogspan.



CAROS

Feldküminch.

DE CARO ▶ CAP ▶ CXLIX ▶

397

NOMINA.



ΑΡΟΣ Græcis, Caron uel Careum Latinis, officinis Carui nominatur. *Carui.*
Germanis *Wartemich* / oder *Wysentimel* dicitur. A Caria forte *Caricum unde dicitur.*
regione, in qua laudatissimum nascitur, appellationem accepit.

FORMA.

Caules emittit quadrangulos ab una radice multos, folia Staphylini, flores candidos, & in caulium summo semen angulosum ac copiosum, radicem oblongam & luteam.

LOCVS.

Parsim in pratis Germaniæ nostræ prouenit, Optimum tamen est quod in Caria, ut diximus, nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Cari semen calfacit & exicat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen Cari calfacit, urinam cit, stomacho & ori gratum accommodumq̃. Concoctiones adiuuat. Antidotis & oxyporis utiliter miscetur, Aniso proportionè respondens. Radix elixa Pastinacæ syluestris modo edendo est.

EX GALENO.

Flatus extinguit & urinas ciet, non semen tantum sed & planta.

DE CARYO PONTICO ▶ CAP ▶ CL ▶

NOMINA.



ΑΡΥΑ *πυλικά, ἢ λεπτοκόρυα* Græcis: Auellanae nuces, & Prænestinae *Auellanae.*
Latinis, *Hafelnuß* Germanis nominantur. Ponticæ autem uocantur, *Ponticæ quare uocate.*
quod in Asiam Græciamq̃ è Ponto uenerunt, Paruæ, quod Iuglandi- *Paruæ.*
bus minores sint.

GENERA.

Duo eius sunt fastigia. Vna enim est syluestris, quam priuatim Germani nostri *Hafelnuß* nominant. Altera uerò urbana seu domestica, quam idem *Κορνυß* / oder *Κίρνυß* appellant.

FORMA.

Corylus arbor in qua Auellana nux prouenit, caudice est multis infernè stolo- *Corylus.*
nibus fruticante, supernè ramis brachiato, uirgis breuibus, sine alarum sinu enodibus, crassiq̃ nōnullis, folijs ab una parte nigris, altera uerò subalbis, per ambitum ferratis, materia admodum lenta, cortice summo tenui, pingui, maculis albis uario, medulla tenui & flaua. Non floret, sed floris uice quidam in eo peculiare compactili callo racematim cohærentes, & ueluti prælongi uermes singulari pediculo penfiles iuli erumpunt, qui ineunte uere dehiscunt ac defluunt cum folia profiliunt, ac *iuli.*
tum calyculacea tegumenta totidem summatim fimbriata, quot iuli supra pediculum exeunt, eorumq̃ singulis nuces singulae insunt. Domestica non differt à sylue- *Domestica.*
stri, nisi quod eius folium maius, & caudex procerior, melior fructus, rubra membrana inclusus.

LOCVS.

Gaudet argillosis & uliginosis locis: nascitur itaque in plano. Nemora etiam & montes Corylis uestiuntur.


TEMPVS.

Autumno leguntur Auellanae nuces.

I

TEM-

398



AVELLANA NVX
SYLVESTRIS.


Haselnuß.

399

AVELLANA
DOMESTICA.

Rotnuß.

12



TEMPERAMENTVM.

C Tum cortex, tum planta, tum fructus gustanti austerior quàm Iuglans apparet, plus itaque habet essentiae terrestris & frigidae. Symeon Sethi calidas & humidas esse Auellanas asserit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Stomacho aduerfantur Auellanae. Tritae in aqua mulsa, & potè ueterem tussim sanant. Tostae uerò & cum exiguo pipere comestae destillationem maturant. Totae crematae, tritae cum axungia aut seuo ursino & inunctae alopecias explent. Ferunt aliqui uista earum putamina, & in puluerem redacta cum oleo caesiorum oculorū pupillas infantibus denigrare, per fuso syncipite.

EX GALENO.

Valentiores sunt Auellanae quàm Iuglandes: nam densior strictiorq; his est substantia, ac minus oleosa. Caetera magnae nuci similia sunt.

EX AETIO.

Auellana, quae & Nux pontica nuncupatur, quod in Euxino ponto frequens sit, praeter quod frigidior, austerior, terrestriorq; est, in reliquis Iuglandi assimilatur. Comesta dolorem capitis inuehit.

EX SYMEONE SETHI.

D Magis nutriunt quàm Iuglandes nuces, difficiliusq; cōcoquuntur. Inflationes faciunt, & ut quidam aiunt, ieiunum intestinū laedunt. Facilius autem cōcoquuntur, minusq; uentrem sistunt, si interior earum cortex abijciat. Dicitur quod si quis ante reliquos cibos cum ruta sumpserit, huic neq; morsus, neq; uenena officere illo die posse, & scorpiones ab ipso fugere. Sumptae cum caricis, iam à scorpione ictos iuuant. Ad aciditatem à nigro humore excitatam omnino confert.

DE CENTVM MORBIA CAP. CLII

NOMINA.

Centummorbia
unde dicta.



Nummularia.

Vic herbae, ut alijs multis, nomē aliud imponere non licuit, quàm, quo uulgò hodie appellari solet, Centummorbiae. Sic autem haud dubiè à chirurgis, qui illa quotidie utunt, à mirifica sua quam in plurimis ulceribus medendis obtinet facultate, dicta est. Sunt qui à foliorū similitudine, quae nummi speciem referunt, Nummulariā uocant. A nonnullis Hirudinaria, quod passim terrae hirudinis instar affixa sit, dicitur. Nec desunt qui Serpentariam appellent, quod compertum sit serpentes hac herba si uulnerentur sibi mederi. Germanicè *Ugeltraut* / oder *Klein Waternung* / oder *Psennigtraut* nominatur.

FORMA.

Serpit per terram, exiguisq; radiculis è coliculis latis prodeuntibus nititur. Folia habet ex utroq; caulis latere rotunda, pinguiacq; flores luteos.

LOCVS.

Prouenit in locis humidis, potissimum uerò circa fluenta.

TEMPVS.


Maiō mense apparet, Iulio autem floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu admodum adstringit, ut hinc constet secundi aut tertij ordinis exiccantium esse herbam.

VIREs.

Huius flores & folia trita adeò desiccāt adstringuntq; ut quaeuis ulcera glutinare ualeant. Ideoq; pota cum uino dysenterias, uentris imbecillitates, fluxusq; ac humiditates sanant. Cataplasmatibus illita ulcerū putredinosa iuuant. Profunt etiam ad san-



401

CENTVMMORBIA

Egelkraut.

13

C ad sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, & ad omnia interanea uulnera & ulcera, potissimū pulmonis. Externis etiam ulceribus summè confert, si uino in quo herba hæc decocta est, lauentur atque abstergantur.

DE COCCIMELEA CAP. CLII.

NOMINA.

KOKKIMHAEA Græcis, Prunus Latinis & officinis, Germanis eius arboris fructus Pflaumen/oder Prumen dicuntur.

GENERA.

Satiua Pruna.



Pruneola.

Duo sanè Prunorū habentur genera. Vnum satiuorū, in quo genere sunt nigra, candicantia, uersicoloria, cerea, hoc est, ex candido in luteum pallefcentia, purpurea, Damascena, & si qua sunt alia. Alterum syluestriū, quæ Galeno lib. ij. de alimentorum facultatib. ἀγριοκκίμηλα, & in Asia πριμνα, Pruneola siue Prunula uulgo nominant, Germanicè Schlehen. Caue eorum amplectaris sententiam, qui Poterium esse putant: neque enim facultates, neq; notæ Prunulis respondent.

FORMA.

Prunus arbor est radicibus summo cespite uagantibus paucis, caudice subrecto, scabro, multis brachiato ramis, folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim ferrato, flore candido, foliato, pomo carne cuteq; uestito, osse intus duro in quo nucleus includitur.

LOCVS.

Satiua Prunus in hortis nascitur. Damascena in Damasco Syriæ, à quo cognominata sunt. Syluestris autem palsim in sepibus reperitur.

TEMPVS.

D Satiua in æstate poma sua profert, syluestris autem autumnō.

TEMPERAMENTVM.


Satiuæ Pruni fructus mediocriter humectant & refrigerant. Syluestris adstringunt, ut fusius ex eorundem facultatibus innotescet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eius pomum estur, stomacho tamen aduersatur. Aluum mollit. Syriaca autem pruna, & præsertim in Damasco genita, exiccata stomacho utilia sunt, & aluum cohibent. Folia in uino decocta & gargariffata columellam, gingiuas & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Præstant idem & syluestrium Prunorū fructus cum maturuerunt siccati. Cum sapa decocti stomacho utiliores, & ad cohibendam aluum aptiores redduntur. Gummi Prunorū glutinat, Potum in uino calculos conterit, Ex aceto illitum, impetigines infantium sanat.


EX GALENO.

Pruni fructus uentrem subducit, recens quidem plus, aridus uerò minus. Cæterum Dioscorides, haud scio cur, Pruna Damascena siccata uentrem sistere ait, quum tamen & ipsa palàm etiam subducant, minus tamen ijs quæ importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringunt: at quæ Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsæ arboreas fructibus proportionē respondent: minus enim adstringunt quæ in Iberia nascuntur, magis uerò quæ Damasci. Porrò ut in summa dicam, quarum in folijs aut germinibus adstrictio quædam inesse apparet manifesta, ijs decoctis phlegmonē in columella aut tonsillis existentes colluuntur. Syluestriū fructus euidenter adstrictorius est, uentremq; sistit. Gummi autē arboris sunt qui dicant cum uino potum lapides confringere, cum aceto uerò puerorū sanare impetigines. Ac si id præstat, clarum est incidendi tenuandiq; illi facultatem inesse. Raro fructum hunc austerum aut acidum, aut omnino iniucundum inuenias, ubi exactam maturi.



PRUNUS
SATIVA.

Pflaumenbaum.



PRUNUS
SYLVESTRIS.
Schlehen.

A maturitatem fuerit affecutus. Priusquam enim eò perueniat, nullus est fermè qui non acorem, aut acerbicatem præ se ferat: est qui & amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verum quum humectare & refrigerare mediocriter uentrem statuemus, utilis erit: quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porrò æque ac ficibus concessum est, ut uel exiccata utilia permaneat. Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima ijs quæ in Iberia & Hispania proueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cum mediocri adstrictione magna laxa quæ sunt. At parua, dura, acerba quæ & in cibo permolesta, & uentri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maximè cõueniunt. In melicrato plus mellis habente, abundè uentrem molliunt, etiamsi sola comedantur, & multo magis si melicratum ipsum subforbeatur.

EX PLINIO.

Pruni folia decocta tonsillis, gingiuis, uuæ profunt in uino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt. Syluestriū quidem Prunorum baccæ, uel è radice cortex, in uino austero si decoquat, ita ut triens ex hemina supersit, aluum & tormina sistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. Et in ijs & fatiuis Prunis est limus arborum, quem Græci Lichena appellant, rhagadijs & condylomatibus mirè utilis.

DE CONIO CAP. CLIII.

NOMINA.

KONNEION græcè, Cicuta Latinis & officinis, Germanis *Wuzerling/Wundtscherling/Schirling/oder Wüterich*/ quasi tyrannus dicitur, quod scilicet hominè interficiat, si intra corpus sumatur. Hinc est quod Athenienses eius succo in interimendo sapientissimo philosopho Socrate, quem falso Anytus & Melytus quasi parum recte de Dijs sentiret, accusarunt, usi sunt.

FORMA.

Caulem profert geniculatum Fœniculi modo, magnum. Folia ferulæ, uel, ut Plinius ait, Coriandro similia, angustiora tamen & graueolentia. In cacuminibus adnascens ramulos & umbellâ. Florem subalbum, semen Aniso simile, albidius tamen. Radicem concuam nec profundam.

LOCVS.

Pasim in pratis, locis incultis & umbrosis nascitur.

TEMPVS.

Iulio mense flores & semina profert.

TEMPERAMENTVM.


Summam habet refrigerandi uim Cicuta, atque adeo uenenum est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Inter letalia connumeratur Cicuta, sua frigiditate enecans. Remedio est meraci uini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus contulis, priusquam semen & coma areseat, expressus quæ in sole densatur. Multus aridi ad medendi rationem usus est. Miscetur utiliter collyrijs, quæ leuandi doloris gratia adhibentur. Herpetas & erysipelata illitus restinguit. Herba cum coma trita & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, languida quæ reddidit. Lac extinguit, mammas in uirginitate increfcere prohibet. Puerorum testiculos tabescere facit.

EX PLINIO.

Cicuta uenenum est, publica Atheniensium poena inuisa, ad multa tamen usus non omittendi. Semini & folijs refrigeratoria uis, quæ si enecat, incipiunt algere



CICUTA

Wüterich.

algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquam perueniat ad uitalia, uini natura excafactoria. Sed in uino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs floribusq; tunc enim maximè tempestiuus est & melior. Semine trito expressus, & sole densatus in pastillos, necat sanguinè spissando. Hæc altera uis. Et ideo sic necatorū maculæ in corporibus apparent. Ad dissoluenda medicamenta utuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandū malagma. Præcipuus tamen est ad cohibendas epiphoras æstiuas, oculorumq; dolores sedandos circumlitus. Miscetur collýrijs, & alios omnes rheumatismos cohibet. Folia quoq; tumorem omnem doloremq; & epiphoras sedant. Anaxilaus autor est, mammas à uirginitate illitas, semper staturas. Quod certum est, lac puerperarum mammis imposita extinguit, ueneremq; testibus circa pubertatem illita.

DE CYNOGLOSSO OFFICINARVM

CAP. CLIIII.

NOMINA.



ΚΥΝΟΓΛΩΣΣΟΝ græcè, latinè Lingua canina: officinæ græcam appellacionem retinuerunt, Germanicè Hundszung appellat. Animaduertendum tamen nos non temerè adiecisse officinarum: neque enim Dioscoridis damus Caninam linguam, quæ uidua caule est, & uiribus etiam ab hac nostra diuersa,

*Lingua canina.**Dioscoridis Cynoglosson.*

FORMA.

Caulem obtinet cubitalem, & interdum longiorem, hispidum, furculosum: folia angusta, prælonga & lanuginosa, non uenosa, molliaq; florem primum purpureum, dein cæruleum, stamina habentē purpurea: radicem oblongam, & profunde terram penetrantem.

LOCVS.

Parsim circa itinera prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores herbarij frigidam & siccam esse statuunt in ordine secundo.

VIRE S.

Oris & alijs maleficis ulceribus medetur. Dysentericæ etiam prodest. Debet itaque illius herbe usus esse in omnibus ulceribus, uulneribus, scabie Hispanica, & similibus morbis. Auxiliatur etiam gonorrhœæ & destillationibus: atque hinc est quod catapotiorum compositioni, quorum nomenclatura est ad omnes morbos catarrhi, aut de Cynoglosso, admisceatur.


Catapota de Cynoglosso.


DE CNICO.



CYNOGLOSSUM
OFFICINARVM.

Hundszung.





CARTAMVS

Wilder gartensaffran.

m

C

Cartamus.

Crocus hortensis.



NOMINA.
 ΝΙΚΟΣ græcè, Cnicus & Cnecus latinè nominatur. Officinæ Cartamum & Crocum hortensem appellant, Germani Wildengartensaffran / ad differentiam Atractylidis, de qua suprâ dictum est.

FORMA.

Folia habet oblonga, incisuris diuisa, aspera, aculeata, Caules cubitales, in quibus capita oliuæ magnitudine, Florem similem Croco, semen candidum & rufum, oblongum, angulosum.

LOCVS.

Nascitur in hortis & agris satus.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, ac subinde semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excalefacientium eius semen, si quis foris eo uti uolet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius flore utuntur in obsonijs. Semen tundit & ex eo exprimit succus qui cum hydromelite aut gallinæ iure datus aluum purgat. Stomacho tamē aduersatur. Fiunt etiam placentæ quæ aluum emolliunt, si succus eius amygdalis, nitro, aniso, & melli cocto misceatur. Oportet autem ante coenam in partes quatuor diuisas Iuglandis nucis quantitate duas aut tres sumere. Eas hoc modo conficere oportet. Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarū tostatarum & decorticatarū cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendum aluum efficacius efficit.

EX GALENO.

D Cnici femine duntaxat ad purgationes utimur.

DE CENCHRO CAP CLVI

NOMINA.

Miliū unde dictum.



ΕΙΧΡΟΣ Græcis, Miliū Latinis & officinis, Germanis Hirs appellatur. Nomen, Festo autore, à miliaria summa deriuatum.

FORMA.

Frumenti genus stipula cubito altiore, geniculata, folio arundinaceo, semine in iuba tereti & pendulo, folliculo concluso, radice numerosa, capillata, ac multiplici fruticante culmo.

LOCVS.

Satum in aruis prouenit. In frigido & aquoso solo prius serendum, postea in calido præcipiunt. Gaudet solo limoso uliginosoq̃.

TEMPVS.

Augusto mense demetendum.

TEMPERAMENTVM.

Miliū primo ordine refrigerat, exiccat autem tertio exoluto, aut certè secundo intenso. Paululum etiam tenuium est partium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Minus cæteris frugibus alit. In panes autem coactum, aut tanquam puls confectum aluum sistit, urinam autem mouet. Tostum uero saccis inditum & fomenti loco appositum, torminibus & alijs doloribus auxilio est.

EX GALENO.

Miliū ut ferculum comestum inter omnia frumentacea edulia minimū nutrimenti confert, Sed & uentrem desiccet, Porrò foris impositum in sacculis idoneum est fo-



MILIVM

Sis.

m 2

C est fomentum ijs quæ citra morsum exiccari postulant. Cataplasmatibus etiam modo illitum exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. Panis ex milio exigui est alimenti & refrigerantis. Constat insuper præaridum & instar arenulæ aut cineris friabilem esse: caret enim penitus glutinoso pinguique itaque aluum humentem desiccatur. Milium tamen ad omnia panico præstantius, nam & suauius editur, facilius concoquitur, uentremque minus cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti incoctam esurant, ueluti triticeam agricolæ: clarumque est id edulij tanto quàm illa que per se sola sumuntur melius esse, quanto lac milij natura ad boni succi procreationem, aliaque omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, uentris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoque ipsam in edendo suauitatem ac uoluptatem.

EX PLINIO.

Milio sistitur aluus, discutuntur tormina, in quem usum torretur antè. Nervorum doloribus & alijs feruens in sacco ponitur, neque aliud utilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis usus eius est ad omnia quibus calor profuturus est. Farina eius cum pice liquida, serpentium & multipedæ plagis imponitur.

EX SYMEONE SETHI.

Difficiliter concoquitur, uentrem sistit, parumque nutrit. Iuuat eos qui refrigeratione & exiccatione uentriculi indigent. Sumptum cum lacte, uel amygdala thasia facilius concoquitur, & humidius fit.

DE CRAMBE SATIUA CAP. CLVII.

NOMINA.

D



PAMBH ἢ ἰμῶσθῶ græcè, Brassica satiuâ latinè, officinis & uulgo Caulis, Germanicè Kôl appellat. Crambe Græcis dicta censetur quasi κροάμβη, quod pupillas oculorum, quas Græci κροάς uocant, obtundat, hebetetque. In qua certè sententia fuisse Columellam hoc eius de cultu hortorum carmen testatur:

Nuncueniat quamuis oculis inimica Corambe.

Attici integro nomine κροάμβη protulerunt, alio sed potiore etymi sensu, quasi κροῶ ἀμβῆ, uel rectius ἀνῆβη, id est, crapulæ satietatique contraheniat. Nam uino aduerfatur, ut inimica uitibus. Antecedens in cibis ebrietatem arcet, & postea sumpta crapulam discutit.

GENERA.


Et si plurima sint Brassicæ genera, ut ex ueteribus rei rusticæ scriptoribus liquet, quatuor tamen duntaxat, quæ hodie usitatæ sunt, producemus; quarum una Græcis λέια, hoc est, leuis nominatur, grandibus & latis folijs, caule magno: Germanis breiter oder grosser Kôl uocatur. Altera crispa, quæ à similitudine apij σαλινοσθῆς, id est, Apiana nuncupatur. Vulgo crispus caulis, Germanicè krauser Kôl. Tertia propriè uocatur Crambe, minutioribus caulibus, & tenuioribus folijs, flore luteo, Germanicè kleiner Kôl/ ut ab alijs discernatur, nominari potest, aut simpliciter & sine adiectione Kôl. Quarta sessilis est, folio & capite patula. Vulgus caputos caules, quasi capitulatos appellat, quoniam in capitis formam extuberant. Folia enim horum in orbem glomerantur, exterius callosa & per ambitum rugata, multis intus carinarum uoluminibus, externis semper interiora complectentibus. Huc alludentes Germani Cappistrant uocant. Nonnulli à candore foliorum Brassicam albam, & caules albos appellare maluerunt. Hoc genere Brassicæ in plerisque Germa-



BRASSICAE PRIMVUM
GENVS.

Breiter Kōl.

m 3



BRASSICAE SE
CVNDVM GENVS.


Krauser Kbl.



BRASSICAE TER
TIVM GENVS.

Kleiner Bot.

m 4



BRASSICAE QVAR
TVM GENVS.

Rappisbraut.

A Germaniæ partibus, Boioaria potissimum, per integrum anni curriculum quotidie uiscitant, quod illic eius prouentus sit uberrimus.

FORMA.

Caule est Brassica leuiter rubente, crasso, folio prægrandi, carnoso, ex cæsis candidante, in latus utrinque diffuso, prominulis uenarum toris fruticante, cyma patula, flore tum luteo, tum albo, semine in siliquis.

LOCVS.

In hortis hodie passim proueniunt Brassicæ. Frigidis uero & pluuijs regionibus positio earundem optima.

TEMPVS.

Augusto mense potissimum florent, ac subinde semen etiam proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Brassica tum manducata, tum foris imposita exiccat. Sicca uero & calida primo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Brassica fatiua aluo est idonea, si leuiter feruefacta edatur. Percoccta uero aluū sifit, & multo magis bis coccta, & in lixiuio decocta. Æstiuæ stomacho nocet & acrior est. In Aegypto propter amaritudinē nō estur. Obscuritate uisus laborantib. & tremulis comesta auxiliat. A cibo sumpta ex crapula & uino noxas restinguit. Cyma eius stomacho utilior, sed acrior, & ad ciendā urinā ualidior. Cōdita sale stomacho inimica est, aluumque cōturbat. Crudus eius succus cū iride & nitro deuoratus aluū mollit. Cū uino potus uiperarū morsib. succurrit. Cum Fcenigreci farina, podagricis & articulorū doloribus correptis, ulceribusque fordidis & uetustis illitus prodest. Caput purgat per se naribus infusus. Menses ducit cum loliacea farina inditus. Folia per se aut cum polenta trita, omnibus inflammationibus & cedematis cōferunt. Erysipelatis, epinyctidis & lepris medent. Cum sale carbunculos rumpunt. Capillorum incapite defluxū retinent. Coccta autem & mellis mixta gangrænarū pascensibus malis opitulant. Cruda ex aceto comesta lienosis profunt. Mansa uero deuorato succo uocem amissam restituunt. Decoctū eius potum, aluum & menses mouet. Flos post conceptionē in pello subditus sterilitatē facit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum lumbricos pellit. In antidota celiacorū additur. Faciem lentiginesque expurgat. Cauliculi uirides cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores impositi mitigant.

EX GALENO.

Brassica esculenta desiccandi uim habet tum esa, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & ulcera glutinat, & maligna ulcera sanat. Præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porrò semen eius potum lumbricos interficit, maxime Brassicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps semen est, sicut uidelicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundū eandem facultatem ephelidas, lentigines, & quæcumque alia modicā absterfionē postulant, adiuuat. Caules Brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, ut uidelicet iam & adurentē uim participant. Hac ratione ei ueterem adipem cōmiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam ualenter digerens medicamentum efficitur. Brassicæ quoque succus purgandi quandam uim obtinet: contra solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis quam incitare deiectionem potest. Proinde quum expellere alui excrementa propositum erit, ahero in quo elixa unā cum aqua fuit, propius admoto, ipsam eximere confestim, uasculoque in quo paratur, oleum cum garo injice.

C inijcere oportebit. At humentē aluum siccare uolentes, quum mediocriter bulhisse uidebitur, priore aqua effusa repente aliam calentem inijcimus, ac ita rursus in ea discoquimus usque dum tenera flaccidaque euaserit.

EX PLINIO.

Cato crispam maximè probat, dein leuem grandibus folijs, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorū caligini, scintillationibusque, uel stomachi doloribus, crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laseris radícula, sumptā acetabulis duobus matutino. Tantamque esse uim, ut qui terant hæc, ualidiores fieri se sentiant. Ergo uel cum uino tritam, sorbendam, uel ex olei intinctu sumendā. Podagræ autem, morbisque articularijs illini cum rutæ, coriandri & salis mica, hordei farina. Aqua quoque eius decocta, neruos articulosque mirè iuuari. Si foueantur uulnera & recentia & uetera, etiam carcinomata, quæ nullis alijs medicamentis sanari possunt. Fouerī prius aqua calida iubet, & bis die tritam, imponi. Sic etiam fistulas eluxatas, & tumores reuocari, quæque discuti opus sit. Insomnia etiam, uigiliasque tollere decoquat, si ieiuni edant quam plurimam ex oleo & sale. Tormina, si decocta iterum decoquat, addito oleo & sale, cumino, polenta. Si ita sumatur sine pane, magis profutura. Inter reliqua bilem detrahit per uinum nigrum pota. Quin & urinam eius qui Brasicæ estauerit, asseruari iubet, calefactamque neruis remedio esse. Auribus quoque ex uino succum Brasicæ tepidum instillari suadet. Idque etiam tarditati audientium prodesse asseuerat. Et impetigines eadem sanari sine ulcere. Græci biles detrahere non percoctā putant. Item aluum soluere, eandemque bis coctam sistere. Vino aduersari, ut inimicam tritibus. Antecedente in cibis caueri ebrietatem. Postea sumpta crapulam discuti. Hunc cibum & oculorū claritati conferre multum, succo uerò crudæ angulis uel tantum tactis cum Attico melle, plurimū.

D Hippocrates cœliaciis, dysentericis bis coctā cum sale dari iubet. Item ad tœnasmon, & renum causas, Lactis quoque ubertatem puerperis hoc cibo fieri iudicans, & purgationem fœminis. Crudus quidem caulis si edatur, partus quoque mortuos pelli. Inuenio & à podagra liberatos edendo eam, decoctamque ius bibendo. Hoc & cardiacis datum & comitialibus morbis addito sale. Item splenicis in uino albo per dies quadraginta. Contra uerò singultus cum coriandro, & anetho, & melle, ac pipere, & aceto. Illitam quoque prodesse inflationibus stomachi. Item serpentium ictibus, & sordidis ulceribus & uetustis, uel ipsam aquam cum hordeacea farina. Succū ex aceto, uel cum Fœnogræco. Sic aliqui & articulis, podagrisque imponunt. Epinyctidas ac quicquid aliud serpit in corpore, imposta leuat. Item repentinas caligines: has & si mandit ex aceto. Sugillata uerò & alios liuores pura illita. Lepras & psoras cum alumine rotundo ex aceto. Sic & fluentes capillos retinet. Epicharmus testium & genitalium malis hanc utilissimè imponi asserit. Efficacius eandem cum faba trita. Item conuulsis cum ruta. Et muris aranei morsus, foliorum aridorum farina alterutra parte exinanit. Stirpium Brasicæ aridorum cinis, inter caustica intelligitur. Ad coxendicū dolores cum adipe peruetusto. Plura de Brasicæ uiribus uide apud Catonem de re rustica, cap. clvij.

EX SYMEONE SETHI.

Malum & melancholicū succum procreat. Visum hebetat, & somnū per contraria insomnia interturbat. Succus eius aliquatenus purgat: corpus uerò eius uentri fistit. Quapropter in quibus humectā aluum exicare uolumus, ipsam modicè decoquentes, aquamque primam abijcetes, confestim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim neque aëris, neque frigidæ aquæ quod bis coquitur tangere debet. Astiua Brasica peioris succi est quàm hyberna. Cit uerò urinam, lumbricos interficit, & ijs qui ex uino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem quod ab humiditate ortam hebetudinem sanet. Cocta cum pingui carne, plurimum noxæ atque uitij amittit.

A amittit. Flos eius proprietate quadam semen genitale corrumpit, utero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem lædit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnificè defectiones uocis iuuet. Vulneribus imposita, ea conglutinatur, & malefica ulcera, & induratas inflammationes sanat.

DE CRUCIATA CAP. CLVIII.

NOMINA.



VO nomine ueteres hancherbam appellauerint nondum compertum habeo. Neque enim Ifatis est, quam uulgus Saponariam uocat, ut suo loco docebimus, ideoq; nomen quo illam nominaremus fingendum fuit. Ad imitationem autem Germanicæ nomenclaturæ Cruciatam di-

Cruciatam dicta.

ximus, quod eius radix in modum crucis transfossa sit. Vt hoc etiam nomine græcè *στυρότυνον* dici possit. Germanicè *Creuzwurts* / *Sperensstich* / & *Wadelgeer* *στυρότυνον* nuncupatur.

FORMA.

Caulē rotundum obtinet, dodrantalem, in summo rubentem, alas multas habentem, è quibus singulis bina folia crassa, angusta & oblonga, floresq; orbiculatim purpurei è siliquis coloris herbacei prodeunt. Radicem albam, longam, crucis instar ab utroq; latere perforatam, à qua illi nomen inditum est.

LOCVS.

Nascitur locis incultis.

TEMPVS.

B Floret Iulio mense.


TEMPERAMENTVM.

Admodum amara est, unde facile colligere licet calidam & siccam esse.

VIRE S.

Recentiores eius esse magnum contra pestilentiaë uenena usum tradunt. Item quod ea quæ in thorace sunt educere ualeat. Quæ sanè singula præstare posse amarus sapor qui illi inest abundè docet. Abstergunt enim expurgantq; amara, & quæ in uenis est crassitiem incidunt, Galeno libro quarto de simpl. medicamentorū facultatib. cap. decimoseptimo, autore. Quamobrè menses etiam mouet, comitiali morbo competit, & alia quæ amaris ab eodem tribuuntur, præstare potest.

Vulneribus etiam glutinandis mirificè conducit.



CRUCIATA

Stadelger.

NOMINA.



KISSOS græcè, Hedera latinè, *Ëphew* Germanicè dicitur. Athenienses *Ciffos* cur nomi-
Bacchum appellarunt *Citton*, quo nomine rigens Hedera quæ sine ad
miniculo stat, sola omnium generum ob id uocata est *Ciffos*: è diuerso
nunquã nisi repens humi *Chamæciffos*. Sic *Dionysia*, hoc est, Bacchica
nominata est à Baccho, qui primus ex Indis in Græciam Hederam asportauit: uel
quod in tutela eius fuerit. Nam ut ille iuuenis semper, ita hæc uiuret. Nec secus om-
nia, sicut ille mentes hominum, illigat. Hedera uerò dicta est, quod uetustis pa-
rietibus hæreat: uel potius quia edita petat, & altè diuagetur: uel quia id cui adhæ-
serit, edat atque corrumpat.

*Ciffos cur nomi-
nata.*

Dionysia.

*Hedera unde
appellata.*

GENERA.

Plurimas, Dioscoride autore, sigillatim habet species, sed maximè generales tan-
tum tres. Candida enim quedam dicitur, eo quod candidū fert fructū: hæc focmina
à Plinio uocatur. Germanis *weißser Ëphew* nominari cōmodè potest. Altera nigra,
quæ nigrum producit fructum: hæc Plinio *mas* nominatur. Germanis *schwar-
zer Ëphew*. Hæc etiã parietibus obrepit, murisq; pertinacius hæret quàm ut pos-
sit abire, hinc *Wauerephew* Germanis uocatur, & *Baumepheuw*/quod scilicet ar-
bores suo complexu strangulet. Tertia priuatim *Helix*, id est, clauicula, & *hederu-
la* nuncupatur. Germanis *klein Ëphew*/oder *Erdephew*.

Candida.

Nigra.

Helix.

FORMA.

Nigra, quæ in Germania nostra prouenit, arbores & parietes radicosis ample-
ditur brachijs, in totum fruticosa, folia primū cum pubescit angulosa, compluri-
mum in triangulam faciem exeuntia habens. Vetusiori rotundantur, pinguis, du-
ra, immortali uirore: flore exili, uirgineo, non inodoro: baccis primū herbaceis,
mox atris, & nonnunquã croceis, longiori pediculo in uua modum dependenti-
bus, sparsioribus racemis non in globum candidæ modo coeuntibus, sed in acinos
discretis. Radice numerosa, densa, flexuosa, cōtorta, ac furculosa, nec admodū pro-
funda. Candida inter media folia emittit brachia, quibus arbores complectitur, ma-
ximè ramosa & robusta, corymbis, hoc est, racemis in orbem circumactis, aut folio
albicat. *Helix* quantum uis diu uiuat, Theophrasto autore, nunquã fert fructum,
adeoq; sterilitate à cæteris distat. Parua tenuiãue huic folia, angulosa & rubra, uiti-
culãq; tenues sine corymbis.

Nigra.

Candida.

Helix.

LOCVS.

Hedera aquis gaudet. Nigra passim circa muros crescit, *Helix* uerò in syluis hu-
mi serpit.

TEMPVS.


Nusquam non uiuret Hedera.

TEMPERAMENTVM.

Hedera ex contrarijs cōposita est facultatibus: habet enim quiddam adstringen-
tis substantiæ, quæ terrena & frigida est. Habet etiam nō nihil acris, quæ calida est.
Nec deest tertia, aqueam nanq; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si ui-
ridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetq; quæ terrea
est & frigida adstringensq; & ea quæ calida & acris.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Hedera omnis acris & adstringens est. Neros tentat. Flores trium digitorum
carptu, in uino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti pro-
sunt. Tenuia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū
& corymborum succus cum irino unguento, melle, aut nitro naribus infunditur.
Et contra ueteres capitis dolores ualeat, atque eo perfunditur caput cum aceto & ro-
faceo, Dolentibus & purulentis auribus cum oleo medetur. Nigræ hedere succus,



4:2

HEDERA
NIGRA.

Maurepew.



HEDERA
HELIX.

Klein Ephew.

C aut e poti corymbi imbecillitatē pariunt, mentemq̄ turbant largius sumpti. Pīlulæ quinque corymborū tritæ calefactæq̄ in malicorio cum rosaceo si instillentur in contrariā aurem, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta, omniū ulcerum generi, etiam si cacoëthe sint, illinuntur. Vitiā cutis in facie & ambusta, uti iam diximus decocta, sanant. Mouent menses triti & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes scēminarū drachmę pondere sterilitatem faciunt. Pediculus foliorū melle irrigatus, ac uulvæ inditus, menstrua & fetus extrahit. Succus instillatus in naribus, graueolentiā & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculosq̄ illita necat. Radicum succus cum aceto potus, phalangiorum morfibus succurrit.

EX GALENO.


Viridis, folijs eius in uino decoctis, ulcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt, ad sanitatem reducit. Igne etiam factas exulcerationes cicatrice includit. Cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem quodammodo ualidiores sunt, ut ad leuorem redacta cum cerato ambustis conueniant. Præterea succus medicamentū est, quod naribus infusum capiti purgando idoneum existit. Vetustas aurium fluxiones sanat: ad hæc ulcera uetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo, aut dulci oleo misceatur. Lachryma eius pediculis interimit, pilis nudat, usque adeo calidæ potestatis ut obscurè adurat.

EX PLINIO.

Natura omnium Hederarū in medicina anceps. Mentem turbat & caput purgat largius pota. Neruis intus nocet, hisdem neruis adhibita foris prodest. Eadem natura quæ & aceto, ei est. Omnia genera eius refrigerant. Vrinam ciunt potu, capitis dolorem sedant, præcipuè cerebro: continentiq̄ cerebrū membranæ utiliter

D mollibus folijs impositis, cum aceto & rosaceo tritis & decoctis, addito postea rosaceo oleo. Illinuntur autem fronti, & decocto eorū fouetur os, caputq̄ perungitur. Lienī & pota & illita profunt. Decoquuntur & contra horrores febrium, eruptionesq̄ pituitæ, aut in uino teruntur. Corymbi quoque poti uel illiti lienem sanant: iecinora autem illiti. Trahunt & menses appositi. Succus Hederæ tædia nariū graueolentiāq̄ emendat, præcipuè albæ fatiua. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur etiam purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior albæ est, ferro calefactus: satisq̄ est acinos sex in uini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem alba terni, in aceto mulso poti, tineas pellunt: in qua curatione uentri quoque imposuisse eos utile est. Hederæ quam chrysocharpon appellauimus, baccæ aurei coloris uiginti, in uini sextario tritis, ita ut terni cyathi potentur, aquā quæ cutem subierit, per urinam educit Erasistratus. Eiusdem acinos quinq̄ tritos in rosaceo oleo, calefactosq̄ in cortice punici, instillauit dentium dolori à contraria aure. Acini, qui croci succū habent, præsumpti potu, à crapula tutos præstant. Item sanguinē excreantes, aut torminibus laborantes, Hederæ nigræ candidiores corymbi poti steriles etiam uiros faciunt. Illinitur decocta in uino omniū ulcerum generi, etiam si cacoëthe sint. Lachryma Hederæ psilothrum est, phthiria simq̄ tollit. Flos cuiuscunq̄ generis trium digitorū carptu, dysentericos & aluum citam emendat, in uino austero bis die potus. Et ambustis illinitur utiliter cum cera. Denigrant capillum corymbi. Radicis succus in aceto potus, contra phalangia prodest. Huius quoq̄ ligni uase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt, moxq̄ cōburunt, & ita illinunt ambusta, prius perfusa aqua calida. Sunt qui & incidāt succi gratia, eoq̄ utantur ad dentes erosos, frangi q̄ tradunt, proximis cera munitis ne ledantur.

Gummi etiam in Hedera quarunt, quod ex aceto utilissimum dentibus promittunt.



CERASVS

Kirschen.

n 3

C

NOMINA.

Cerasus unde
dicitur.

ΕΡΑΣΟΣ Grecis, Cerasus Latinis, Germanis *Kirschenbaum* dicitur. Cerasum autem arborem, ut Athenæus refert lib. ij. Dipnosoph. à Cerasunte Pontica ciuitate, primus in Italiam Lucullus intulit, debellato Mithridate. Ille idem est qui etiam fructum cognomine ciuitatis appellauit Cerasium.

GENERA.

Multa Cerasiorum sunt genera, in Germania tamen tria, quod sciam, duntaxat proueniunt. Primi enim generis sunt rotunda, ac maxime rubent, suaq; uoce illis dicuntur *Amarellen*. Alterius generis, quod ad figuram attinet, prioribus similia sunt, differunt autem colore, qui illis ad nigredinem accedit. Vocantur autem horum lingua *Weichsel*. Tertij generis prædictis minora sunt ac longiora, partimq; rubent, partim nigricant: à nonnullis priuatim *Kirschen* uel *Kerschen* appellantur. Nos una icone omnia tria complexi sumus. Quæ in utroq; genere nigra sunt, ea uescientiū manus & labra succo suo, qui sanguineus est, mororū instar inficiunt.

FORMA.

Cerasus folio ferè Mespili, duro, latiore, & in ambitu serrato cōstat, cortice læuo, in candido nigricante, flore albo racematim congesto, fructu rubro aut nigro, magnitudine fabæ.

LOCVS.

Frequens est in omnibus hortis Cerasus. Quæ tamen posterioris generis Cerasia profert, in syluis nonnunquam & nemoribus etiam reperitur. Gaudet autem aquosis montibus.

TEMPVS.

Junio ac Iulio potissimum mensibus fructus maturitatem consequitur. Flores primo statim uere apparent.

TEMPERAMENTVM.

Cerasorum non unum idemq; est temperamentum, quod ex eorundem facultatibus perspicuum fit. Symeon tamen Sethi frigida & humida esse tradit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cerasia quidem ipsa si uiridia sumantur, uentri utilia sunt. Eadem siccata aluum sistunt. Gummi Cerasorum cum uino diluto sumptū, uetusta tussi medetur. Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex uino potū calculosis auxilio est.

EX GALENO.

Cerasus arbor fructū fert non paris adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & in horum, sicut etiam malorum granatorum, & malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam uero dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum concocta sunt ac matura, quædam admodū acerba sunt, quædam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbā exuperat, in Cerasijs non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minus apta stomacho sunt. Contrā austera. Quæcunq; uero acida sunt, ea pituitosis excrementosisq; stomachis conueniunt. Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porrò ipsius arboris gummi cōmunem omnibus uiscosis & mordacitatem expertis medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accōmoda est. Propriè autem (si quidem uerum est quod quidam scribunt) calculis uexatos cum uino potum adiuuat. Nam sicilli tenuium partium quædam facultas inest.

EX PLINIO.

Cerasa & aluum molliunt, stomacho utilia. Eadem siccata aluum sistunt, urinā ciunt.

ciunt. Inuenio apud autores, si quis matutino roscida deuoret cum suis nucleis, in tantum leuari aluum, ut pedes morbo liberentur.

EX SYMEONE SETHI.

Cerasia mali succi sunt, uentrem subducunt, humidum uentriculū ledunt, praesertim cum non sunt matura. Profunt autem calidis & siccis uentriculis ac temperaturis. Gummi uerò arboris cum uino sumptum calculosis auxiliatur.

APPENDIX.

Sunt qui tradunt gummi quod ex arbore destillat ueteri tussi mederi, ex quò uino sumptum gutturis lenire asperitates, fastidia discutere, & ciborum appetentiam moliri. Colorem cutis facere gratiorem, & oculis asferre claritatem. Lichenes infantium ex aceto sanare.

DE CYANO CAP. CLXI

NOMINA.



CYANOS Græcis, Plinio & Latinis alijs Cyanus appellatur. Nonnullis Baptifecula, quod secantibus & merentibus officiat, retusa in eius Baptifecula. cursu falce. Nam & seculam ueteres falcem dixerunt. Rectius tamen Blaptifecula uocaretur, quod *βλαπτική* Græcis nocere significet. Nostri Flos frumentorū florem frumentorum, Germani autem *blaw Kornblumen* nominant, quod scilicet Cyanos cuius dicta in frumentario nascat agro. Cyanos uerò dicta est hæc planta, ob florem quem profert cœruleum, aut quod honorem nomenque dederit cœruleo colori. Hinc est quod pueri in hodiernum usque diem barbula calycibus erutas, ex candido oui liquore terant, quo in pingendis grandioribus literis cœrulei nitorem mentiantur.

FORMA.

Caulis illi est angulosus, folia angusta & oblonga, calyces rosarum, sed squarosi atque tristes, quos plurimæ cœruleæ stipant barbulae. Radix oblonga, lignosa, fibris quibusdam capillata.

LOCVS.

Triuialis flos est, passim in frumentis nascens.

TEMPVS.

Iunio potissimum mense floret, nec parum gratiæ suo cœruleo colore frumentis adfert. Hinc est quod rusticorum etiam coronis inferatur, quanquam inodorus prorsus sit.

TEMPERAMENTVM.

Frigidæ est temperaturæ atque adeo repellentis, id quod gustus etiam facile indicat, uiscositate manifestam, & nullum prorsus caloris indicium præ se ferens.

VIRE S.

Recentiores rectè tradunt huic herbæ facultatem inesse, qua oculis alijsque partibus inflammatione laborantibus proficit.



CYANVS

Blaw Kornblimen.

NOMINA.



KROMMYON Græcis, Cepa, & in neutro Cepe, Latinis dicitur. Officinæ genuinum nomen retinuerunt. Germanis *Zwibel* appellatur: quod sane uocabulum à Gallico detortum esse uidetur: quandoquidem Galli sua lingua Cepam uocent *Siboulam*. Crommyon autem, Aristotele in problematis autore, dictum est, quod oculi pupillam comprimi cogat. Nam oculos uellicando expressis subinde lachrymis contrahi pupillas certum est. Itidem libro nono *Dipnosoph.* testatur *Athenæus*. Cepa uerò à capitis magnitudine,

Crommyon in de dictum. Cepa quare uocata.

FORMA.

Folia habet ferè porracea, intus concaua: caulem teretem rotundumq̃, per cuius fastigium flores primùm candidi, ac subinde semen, in orbem sparguntur: radicem capitatam pluribus compactâ tunicis, quæ summatis prætenuibus rufisq̃ uestitur membranâ, uertice nigricanti, à quo fibræ capillitij modo fruticant.

LOCVS.

Terram Cepæ amant pinguem, uehementer subactam & irriguam, passimq̃ hodie in omnibus plantantur hortis.

TEMPVS.

Floret Iulio potissimùm mense, & deinceps semen profert, quod non antè legendum, quàm cum nigrum colorem præ se feret. Siquidem eo colore perfectionem fatetur, nigritiaq̃ maturitatis index est.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine excalefacientiũ, essentiaq̃ eius crassarum est partium. Si succum eius exprimas, quod reliquum est admodum terreæ substantiæ est, eiusq̃ calidæ: at succus aquæ aëriæq̃ caliditatis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cepa longa acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, sicca quàm uiridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordicant, flatu gignunt, appetentiam inuitant, extenuant, sitim excitant, fastidium pariunt & expurgant. Aluo utiles sunt. Detractis tunicis inq̃ oleum coniectæ, ac pro glandibus subditæ, hæmorrhoidas, reliquasq̃ excretiones aperiunt. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginaq̃ laborantibus. Suppressos menses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cum sale, ruta & melle illinitur. Cum aceto autem in sole inunctus alphas sanat. Cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. Alui fluoribus prodest. Aurium grauitati, ac sonitui confert. Ad purulentas aures, & eliciendam aquam in ijs interceptam ualet. Alopeciæ earum succo utiliter perfricantur: celerius enim quàm *Alcyonium pilos* euocat. Largior *Ceparum* cibus capitis dolores ciet. Cocta uehementius urinam pellit. In morbis, cocta etiam, copiosius comesta, lethargũ efficit. Cum passis uuis, & fico illita, tubercula cõcoquit & rumpit.

EX GALENO.

Hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cū aceto inuncta. In sole alphas abstergit, & alopecijs attrita pilos *Alcyonio* citius restituit. Porro succus eius ijs qui suffusione oculorũ laborant, aut aciem oculorũ obtusam præ crassitudine humorũ obtinent, inunctus prodest. Tota Cepa manducata flatuosa est. Itaq̃ quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuũ generant. Crassos corporis humores extenuat, glutinososq̃ incidit. Bis tamen aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliatur, quanquam ne sic quidem uim perdit extenuandi: uerum facultatẽ quandam obscurissimã alendi corpo-



CEPA

Zwibel.



A corporis exinde acquirat, cuius antea quam decoqueretur, nihil prorsus obtinebat.

EX PLINIO.

Cepæ olfactu ipso & delachrymationi, & caligini medentur, magis uero succi inunctione. Somnum etiam facere traduntur, & ulcera oris sanare, commanducata cum pane. Et canis morsus uirides ex aceto illitæ, aut siccæ cum melle & uino, ita ut post diem tertium soluantur. Sic & trita sanant. Tostam in cinere epiphoris multi imposuere cum farina hordeacea, & genitalium ulceribus, Succo & cicatrices oculorum, & albugines, & argemas inunxere, & serpentium morsus, & omnia ulcera cum melle. Item auricularum cum lacte mulierum, & in ipsdem sonitū ac grauitatem emendant, cum adipe anserino, aut cum melle stillauere. Et ex aqua bibendum dederunt repente obmutescentibus. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum omnium, priuatim scorpionum. Alopecias fricuere & psoras tuls cepis. Coctas dysentericis uescendas dedere, & contra lumborum dolores. Purgamenta quoque earum cremata in cinerem, illinentes ex aceto serpentium moribus, inter ipsas quoque multipedes ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inutilia esse præcordijs & concoctioni, inflationemque & sitim facere dixerunt. Asclepiadis schola ad ualidum quoque colorē profici hoc cibo. Et si succum ieiuni quotidie edant, firmitatem ualitudinis custodiri, stomacho utilia esse, ac spiritus agitationi, uentrem mollire, hæmorrhoidas pellere subditas pro balanis, succum cum succo fœniculi contra incipientes hydropises mirè proficere. Item contra anginas, ruta & melle. Excitari eisdem lethargicos.

EX SYMEONE SETHI.

B Cepa lotium cit, & semen genitale gignit. Cibi appetentiam excitat. Capitis dolores facit, & stomacho officit. Rationem etiam, ut aliqui ferunt, lædit. Si uero coquatur, plurimum malignitatis deponit, & utilis fit ad thoracis asperitates, & tuls. Hæmorrhoidas imposita aperit, & cum aceto inunctum alphas extergit. Et si autem crassarum partium substantiā habeat, humores tamen crassos & lentos extenuat. Venter uero inflat. Si crebrius quis ea utatur, in lienis uitia incidit.

DE CAMPANULA CAP. CLXIII

NOMINA.



VVM nobis non constat quo nomine ueteribus appellata sit hæc herba, placuit illam Campanulam, à florum similitudine, qui campanā planè referunt, nominare. Germanis *Nalskraut*, hoc est *Ceruicaria*, dicitur, quod scilicet ad oris, & ceruicis, fauciumque mala mirifice conferat.

Campanula un-
de dicta.
Ceruicaria.

FORMA.

Caulem profert quadrangularem, hirsutum, rubescentē, folia oblonga, hirsuta, in extremitatibus incisa & serrata, ad Vrticam proxime accedentia, flores purpureos campanæ aut calacho similes, in medio luteum quid prominens obtinentes, quibus emarcescentibus in rotundis capitulis semen prouenit. Radicem multifariam intortam, & candidam.

LOCVS.

Gignitur in pratis siccis, in quibus dumeta plurima existunt. Propemodū enim nunquam nisi in dumetis reperiri potest.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit, ut hinc exiccandi illi uim esse quisque consicere queat.

VIRE S.

Adstringendi habet facultatem, ideoque decoctum illius unice ad oris exulcerationes,



CAMPANULA

Galztrauc.

A riones, aliâq; eiusdem mala quæ ad strictione indigent, confert. Vtilis etiam haud dubiè ad alia quæuis ulcera, ob insignem quam obtinet in exiccando facultatem.

DE CALAMINTHA CAP. CLXIII.

NOMINA.



KALAMINTHON Græcis, Calamintha Latinis, officinis Calamentum nominatur. Germanicas appellationes paulò post indicabimus. Calamintha uerò dicitur quasi uel bona, uel utilis mentha; nanq; nidore suo serpentes fugat. Quod testatur etiam Aristophanes ijs uerbis: *οὐ δὲ ἔλας κελάνθης, ὄφεις ἐλασινῶ*. Nisi quis existimet à *κάλω*, hoc est, ligno, quasi lignosam appellari mentham.

Calamintha quæ re dicta.

GENERA.

Calaminthæ Dioscorides tria facit genera, Primum amat montes, ideo huius generis Calamintha montana uocatur. Germanis *Stein oder Katzenmünz* dicitur. Alterum Latini propriè Nepeam, uulgius eò quod Pulegio simile sit, syluestre Pulegium nominat. Germani etiã uulgi opinionè sequentes, *wilden Poley & Rommünz* uocant. Officinæ pro Calamento hoc solo genere utuntur. Tertium Mentastro simile est, Germanicè *Geelmünz* cōmodè appellatur.

Primum.

Secundum.

Pulegium syluestre.

Tertium.

FORMA.

Primum Calaminthæ genus folia Ocymo similia habet, subalba, ramulos angulosos, florem purpureū. Alterum Pulegio simile est, maius tamen, propter quod quidam, ut dictum est, syluestre Pulegium nominant, quoniam & odorem illius amuletur. Tertium Mentastri similitudine est, longioribus folijs, caule & ramis prædictis maius, sed minus efficax; flore luteo.

LOCVS.

Primi generis Calamintha in montibus & asperis gignitur, unde & montana dicta est. Alterius in campestribus & agris. Tertij in aquosis locis.

TEMPVS.

Florent Iunio, potissimum uerò Iulio, mense.

TEMPERAMENTVM.

Calamintha essentia est tenui & calida, siccaq; in tertio quodammodo ordine. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu quidè acris & palam calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium folia gustu feruentia admodum & acria, Radix inutilis. Pota aut illita demorsis à serpente opitulatur. Decoctum eius potum urinas & menses expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnceæ, torminibus, cholerae, rigoribusq; auxiliatur. Præsumpta in uino uenenis resistit. Regium morbū expurgat. Lumbricos & ascaridas cum sale & melle pota, enecat. Nec secus cocta crudaq; si terat. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis bibatur. Folia trita & apposita, menses ducunt, & fetus interimunt. Accensa aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita. Sugillata tollunt. Ischiadicis imponitur, ut humorem ex alto euocet, meatusq; transmutet, summam cutem exurens, Vermes necat succus auribus instillatus.

EX GALENO.

Periditantibus & corpori admoventibus extrinsecus imposita, primū quidem ualde exalfacit & mordicat, cutemq; laniat, postremo etiam ulcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum ipsa per se sicca, tum etiã cum melicrato, perspicuè calfacit, & sudorem ciet, omneq; corpus tum digerit, tum exiccet. Ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitū repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo

o inco-




CALAMINTHAE PRI
MVM GENVS.

Ratzenmüntz.



CALAMINTHAE SE
CVNDVM GENVS.

Wider Polep.



436



CALAMINTHAE
TERTIVM GENVS.

Seele Wüntz.

incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segni, in trō uero affumentes, sicuti est dictum. Quinetiā & coxendicibus eam quidam in ægritudinibus ischia- dicis tanquā strenuum remediū illinunt: trahit enim quæ in profundo hærent, to- tumq̃ adeo articulum exalfacit, cutemq̃ non obscure adurit, mensesq̃ tum pota- tum apposita admodū efficaciter prouocat. Bonum etiam elephanticoꝝ remediū, non eo tantum quod strenuè tenues humores digerat, uerum etiā quia extenuet & incidat ualenter crassos, quales sunt qui hunc morbū procreant. Sic & cicatricibus atris candorem reddit, & sugillata digerit. Sed ad talia recentem magis quàm aren- tem adhibere præstat. Quippe arefacta uehementior redditur, & ad urendū prom- prior. Porrò talis cum sit, ad uenenatarū bestiarū morsus assumitur, uelut etiā cau- teria, & quæcunq̃ medicamenta calida sunt & acria, tenuiumq̃ partiū, quæq̃ facile ex alto ad sese circumiacentē omnem humiditatē possunt attrahere. Cæterū quæ il- li inest amaritudo, planè exigua est, uerum ad quædā ita efficaciter agit, ut quæ ua- lentissima est, nimirū quum cōiuncta sit uehementi calori cum tenui essentia. Qua- re & ascaridas & lumbricos succus eius infusus aut potus enecat. Eadem ratione au- rium uermes, aut si alicubi in parte corporis sinuosa aut implicata quæ putredine tentetur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptū seu pota, seu admota interimit & eijcit. Igitur incidendū quidem ei uis adest propter calorē eius, tenuitatem, & amari- tudinē: abstergendi uero propter unicam amaritudinē. Itaq̃ asthmaticis ob omnia antedicta prodest. Ictericis uerò potissimum ob amaritudinē, sicut alia ferè omnia amara, utpote abstergentia & expurgantia in iecinore prouenientes obstructio- nes. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

EX PLINIO.

Decocta in aqua ad tertias discutit frigora. Mulierū menstruis prodest. Aestate sedat calores. Vires quoq̃ contra serpentes habet. Fumū ex ea nidoremq̃ fugiunt, quam & substernere in metu obdormituris utile est. Tusa ægilopis imponitur, & capitis doloribus recens, cum tertia parte panis temperata aceto illiniū. Succus eius instillatus naribus supinis, profluuiū sanguinis sistit. Item radix cum myrti semine in passo tepido gargarizata, anginis medetur.

DE CRITHE CAP. CLXV.

NOMINA.

ΠΙΘΗ Græcis, Hordeū Latinis & officinis dicitur. Germanis **Gersten**. Ex eo polenta, quam Græci *ἄλυστον* nominant, & Pisana, medicamen- Polenta. ta ueteribus usitatissima, conficiuntur.

GENERA.


Rustici duo esse Hordei genera tradunt. Vnum Polystichū, quod sic dictum est Hordeum poly-
stichum. quia in multos uersus spicatur. Sunt enim ex hoc genere quæ spicam tribus, interdū quatuor, nunc sex, nunc octo uersibus distinctā proferunt. Germanis **groß Gerst**/ hoc est, Hordeū magnum uocatur. Alterum Distichū nominatur, quod scilicet in Distichum. duos duntaxat uersus spicetur. Germani **klein Gersten**/ id est, Hordeum exiguum appellant.

FORMA.

Culmum habet tritici, fragiliorē tamen minoremq̃, quinque, sex, & interdum pluribus geniculatū articulis, simplici in stipula folio, & eo quidem scabro ac lato. Grana ferè nuda, longiore capillamento, mordaciq̃ arista. In uersus spicatur, radice frequenti, capillis fibrata.


LOCVS.

Hordeum pinguisimum amat agrum.



HORDEVUM
POLYSTICHVM.

Grosse Gerst.



HORDEVN DI
STICHVM.

Kleine Serst.

C

TEMPVS.

Erumpit à primo fatu die septimo, & caput alterum grani in radicem exit, alterũ in herbam. Metitur Augusto mense.

TEMPERAMENTVM.

Hordea primi sunt ordinis in exiccando & refrigerando.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Hordeum optimũ est candidum, purumq̃. Minus quàm triticum nutrit. Pitifana tamen ob cremorem in elixatione redditum, plus alimenti præbet quàm polenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atq̃ faucium scabritias, exulcerationesq̃ pollet, quibus etiam triticea pitifana præsidio est, sed plus alit, magisq̃ urinam mouet. Lac abundè suppeditat, si cum Fceniculi femine decocta sorbeatur. Abstergit, urinam ciet, inflat, stomacho aduersatur, & œdemata concoquit. Farina hordeacea cum fico in mulla aqua decocta, œdemata & inflammationes discutit. Duritias cū pice, resina & fimo columbino concoquit. Cum meliloto autem & papaueris calyce dolores finit qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes, cum lini femine, fcnogræco & ruta illinitur. Strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit. Cum Myrto autem, aut uino, aut syluestribus pyris, aut rubo, aut malicorio, alui profluuiã sistit. Podagricis inflammationibus cum cotoneis, aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liquata eadem cum aqua, atq̃ cum pice & oleo decocta, pus excitat. Cum aceto autem liquata, & cum pice decocta, contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex ijs aluum cohibet, inflammationesq̃ mitigat.


EX GALENO.

D Hordea paucissimum etiam absterfionis habent. Paulò etiam plus desiccant quàm farina fabacea, cui non insint cortices. Cetera uerò similia sunt foris utentibus. In cibo autem hoc præstant fabis, quod flatuosam naturã exuant: fabis quantumcunq̃ que coxeris, flatuosa natura remanet: sunt enim crassioris essentia quàm hordea, quamobrem ijs plus etiam nutriunt. Quoniam uerò ambo paulum à medio recesserunt, multo sunt usui. Nam talia medicamenta multis alijs miscentur ceu materia quaedam: itaque etiam cera & oleum paucis medicamentis coniunguntur. Polenta uerò multo plus hordeo desiccatur. Plura de hordeo, pitifana & polenta apud Galenum libro primo de alimentorũ facultatibus offendet.

EX PLINIO.


Farina ex hordeo & cruda & decocta, collectiones impetusq̃ discutit, lenit & concoquit. Decoquitur aliàs in mulla aqua, aut fico sicca. Ad icinoris dolores eam in posca positam cõcoqui opus est, aut cum uino. Cum uero inter coquendum discutendumq̃ cura est, tunc in aceto melius, aut in fecce aceti, aut cotoneis pyrisue decoctis. Ad multipedũ morsus cum melle, ad serpentium in aceto & contra suppurantia, ad extrahendas suppurationes ex posca, addita resina & galla. Ad concoctiones uero & ulcera uetera cum resina. Ad duritias cum fimo columbino, aut fico sicca, aut cinere. Ad neruorũ inflammationes, aut intestinorũ uel laterum uel uirilium dolores, cum papauere aut meliloto, & quoties ab ofsibus caro recedit. Ad strumas cum pice & impubis pueri urina. Cum oleo & fcnogræco contra tumores præcordiorum, uel in febris cum melle, uel adipe uetusto. Suppuratis triticea farina multo lenior. Neruis cum Hyoscyami succo illinitur. Ex aceto & melle lentiginini.

DE CRO-



CROCI FLORES

Saffranblumen.



CROCI FOLIA,

Saffranblätter.

NOMINA.

Crocus unde
dicitur.

ΚΡΟΚΟΣ Græcis, Crocus Latinis appellatur. Officinæ antiquū nomen retinuerunt. Germani *Saffran* uocant simpliciter, aut cum adiectione, *zamer Saffran*. Sic uerò uocatus à Croco iuvene, qui propter amorem Smilacis uirginis, in florem sui nominis uersus est: quod Ouidius testatur, qui sic scriptum reliquit:

Et Crocum in paruos uersum cum Smilace flores.

FORMA.

Crocus folio est angusto adusque capillamenti penè exilitatem; flore purpureo Colchici floribus non admodum dissimili, in quo flammea Croci stamina; radice bulbosa, copiosaq; ac uiuaci.

LOCVS.

Nascitur in Coryco monte Ciliciæ optimus. Proxima nobilitas ei qui in Olympo Lyciæ monte prouenit. Dein ei qui ex Aegis Ætoliciæ urbe affertur. Nunc in plerisque Germaniæ locis plantari cœpit haud infeliciter, quod uiribus è locis iam cōmemoratis allatis haud cedit.

TEMPVS.

Florem ante folium ædit: per autumnū nanq; Vergiliarum occasu floret, neque ultra mensis spacium flores durant. Postquā autem hi decidunt, statim folia angusta & oblonga prodeunt, uirentq; tota hyeme.

TEMPERAMENTVM.

Crocus paulum quid adstringens obtinet, quod terreum frigidumq; est: sed superat in eo calefaciens & qualitas & facultas, ut tota essentia secundi sit ordinis excelsa, & primi exiccantium.

D

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Crocus emollit, concoquit, leniter adstringit, urinam cit, & coloris bonitatē efficit. Arcet crapulam cum passo potus. Fluxiones oculorū cum lacte muliebri inunctus sistit. Potionibus quæ pro interaneis parantur, utiliter miscetur: item ijs quæ uulvæ sediq; subiiciuntur & illinuntur. Venerē stimulat. Inflammationes erysipelatofas inunctus lenit. Aurium remedijs utilissimus est. Letalem sanè dicit hunc si trium drachmarū pondere cum aqua bibat. Radix eius cum passo pota, urinā cit.

EX GALENO.

Crocus concoquendi uim quandam habet, adiutante scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodū exalfaciāt, pauca adest adstrictio, ea parem facultatē habent essentijs emplasticis nominatis, quas cum iunctas caliditati non uehementi contigerit, concoquentes esse constat.

EX PLINIO.

Discutit inflammationes omnes quidem, sed oculorū maximè ex ouo illitū. Vuluarum quoq; strangulatus. Stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iecinorū, pulmonū, uescicarumq; peculiariter inflammationi earum uehementer utile. Item tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus. Urinam cit. Qui Crocum prius biberint, crapulam non sentient, Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoq; ex eo mulcent ebrietatē. Somnum facit. Caput leniter mouet, Venerē stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cum creta Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur.

EX SYMEONE SETHI.

Stomacho bonus est, ciborumq; concoctionē efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethargica uitia iuuat. Discutiendi quoque uim obtinet, & uisceribus utilis est, ad spiritusq; difficultatē conducit. Si quis illo mediocriter utatur, bonum colorem habebit: sin uerò citra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibiq; inappe-

A inappetentiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus ubi dolent, summopere prodest, superpositis Betæ folijs.

DE CYNOCRAMBE CAP. CLXVII

NOMINA.



YNOKPAMBH, ἡ κυνία, ἡ λινόζωσις ἀγρία ἀγρίω Grecis, Canina Brastica, Cynia, & syluestris mercurialis mas Latinis, wild Bingeltraut das memle / Hundstöl Germanis appellatur.

FORMA.

Caulem ex se mittit dodrantalem, tenerum & subalbidū. Folia Mercuriali similia, albescencia ex certis interuallis. Semen prope folia paruum, rotundum. Ex qua quidem deliniatione sole meridiano clarius est, herbam cuius picturam damus esse Cynocramben. Siquidem ea caulem binūm palmorum altitudine habet, mollem & subcandidum. Folia Mercuriali similia admodum, certis interstitijs, subalbida. Semen item iuxta folia exiguum, rotundum, geminorū instar testiculorum connexum: & in summa, nihil est quod non in ea descriptioni adamussim respondeat.

LOCVS.

In syluis copiose prouenit.

TEMPVS.

Semen ueris initio, nempe Aprili mense, profert, maturescit autem Maio.

TEMPERAMENTVM.

Quum gustu nihil à satiuā Mercuriali distet Cynocrambe, colligitur hinc idem quod illa obtinere temperamentum.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Caulis & folia pota, & olerum modo comesta aluum cient. Jus uero decoctorū bilem & aquosa detrahit.

APPENDIX.

Alia est Cynocrambe ab hac nostra, ea cuius mentionem facit Galenus, Paulus & alij, adde etiam Dioscorides, uerum sub nomine Apocyni: quod lectorem, ne diuersas herbas unam esse putaret, monere uolui.



CYNOCRAMBE

Wild Bingelkraut.

NOMINA.



COLYTEA Græcis, Colytea & Colutea Latinis dicitur: à nullo tamen, quod sciam, ueterum, quàm à Theophrasto lib. iij. de plant. hist. cap. xvij. celebrata.

GENERA.

Duo eius sunt genera. Vnum quod priuatim Colytea uocatur, officinis incognitum. Germani welsch Linsen appellant. Alterum officinis cognitum & frequentius usu à medicis usurpatum, Mauritano sermone Sena nominatur. Germani ad eam alludentes appellationem, Sener nuncupant. Differunt autem inter se magnitudine: siquidem primū genus maius est altero, utpote quod quadriennio, Theophrasto loco paulò antè citato teste, se in arborem efferat. Siliquæ etiam illius magis turgido spiritu distenduntur, Sena uerò siliquas profert lunatas, nec ita prætumidas. Semen denique Colyteæ rotundum, lentis obtinens similitudinem; Senæ autem oblongum, cordisq; humani instar acuminatum.

FORMA.

Frutex est ramis exilibus, folio scenigræci, flore genistæ aut pisi luteo, membrano folliculo, pellucente, prætumido, & ueluti quodam spiritu distendente turgido, ita ut digitis si prematur, crepitans disiliat, in quo semen atrum, durum, latum, lentis magnitudine, pisi gustu, in ordinemq; digestum clauditur.

LOCVS.

Satum utrunque in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret Colytea Maio & Iunio mensibus, ac subinde in siliquis oblongis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Arabes calidam in principio secundi, & siccam in primo ordine statuunt.

VIRES. EXACTVARIO.

Sene siliquosus quidam fructus à barbaris appellatur, qui citra noxam drachmæ pondusculo potus, pituitam & bilem deijcit: post hos reliquos humores modestissime purgat, retorridam atramq; bilem, eiusq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetus capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini succurrit. Sed feruefacti ius potius quàm tritici farina propinatur. Interaneorum obstructions tollit.


APPENDIX.

Quum non forma tantum, imò etiam sapore duo hæc Colyteæ genera sibi similia sint, facile etiam hinc colligitur facultate inter se minimè differre. Quare utrunque citra molestiam atram bilem retorridamq; educit, caputq; ac cerebrum, & instrumenta sensuum à noxijs purgat humoribus. Quid multa; aduersus omnia uitia ab atra bile nata ualet.



COLYTEA

Welsch Linser.



SENA

Genet.

p 2

Pes Cornicis.
Coronopus us-
de dicta.
Sanguinaria.
Herba stellæ.



ΚΟΡΩΝΟΡΟΥΣ, ἡ ἀστρίον Græcis, Pes Cornicis & Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis incognita herba, Germanis cōmodè Kräen oder Rap-pensiß appellari potest. Coronopus enim non alia ratione dici cepit, quàm quod Cornicis pedem effigie repræsentet. Sanguinaria autem Sanguinalis uocata est, quod sanguini sistendo apta sit herba. Sunt qui herban Stellæ nominant, alludentes haud dubiè ad græcam appellationē astrion. Nonnulli quod folium eius multipartitò confectum in ceruini cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu uocauerunt.

FORMA.

Herbula est oblonga, per terram strata, folijs fissis, radice gracili & adstringente. Ex qua quidem descriptione, etsi concisa admodum, satis liquet, herbam hanc cuius picturam damus esse Coronopum. Herbula enim est folijs oblongis & scissis ac in multas partes laciniatis, atque adeo cornicis pedem effigie referentibus, humi quoque semper sparsa proserpit: radice denique tenui admodum & adstringente prædita. Quibus omnibus id quoque accedit, quod Dioscorides Psyllium folia Coronopo similia habere scribit: quod si uerum esse ex utriusque herbæ collatione experiri uolueris, senties Coronopi huius nostri folia planè Psyllij folijs simillima esse, potissimum ubi primum è terra erumpunt: imò quod ad folia, flores & semina attinet, omnia in utrisq; sibi similia deprehendes, in eoque solo distare comperies, quod Psyllium folia non fissa habeat, & in altum surgat, singulaq; iam dicta maiora producat: contra Coronopus humi repat, minoraq; omnia proferat. Vtraq; igitur herba luteos obtinet flores, & semina in capitulis pulcibus similia. Capitula uerò in Coronopo sunt multo quàm in Psyllio tenuiora ac longiora, id quod pictura graphicè monstrabit. Ex ijs quoque manifestum sit errare illos toto cælo, qui gramen aculeatum & Coronopum unam & eandem herbam esse contendunt, cum tamen forma non parum distare uideantur. Atque hinc est quod omnes ueteres tam Græci quàm Latini utranque herbam seorsim, & in diuersis locis descriperint. Plinius siquidem lib. xxiii. cap. xix. aculeatum gramen in cacumine aculeos plurimum quinos habere, atque adeo Dactylon uocatum esse hoc nomine, quod scilicet digitorum speciem referat, scribit. Coronopus uerò neque quinos, neque in cacumine aculeos obtinet, sed tantum folia fissa, uel si aculeos placet appellare has fissuras, non in cacumine, sed in ambitu passim foliorum eas reperies: ut certum sit Coronopum non esse aculeatum gramen.

LOCVS.

Dioscorides in incultis, semitis, & iuxta domicilia nasci tradit. In Germania tamen, quod sciam, nusquam nisi sata prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, ac subinde in oblongis capitulis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Ex adstrictione ipsa satis constat radicem ipsam siccandi ui præditam esse.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Herba cocta estur olerum modo, Radicem habet in cibo adstringentem, quæ cœliaciis conducatur.

EX GALENO.

Coronopodis radix comesta cœliaciis prodesse creditur.

EX PLINIO.

Seritur interim Coronopus, quoniã radix cœliaciis præclare facit in cinere tosta.



CORONOPVS

Kränsfuß.

P 3

C

NOMINA.



ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ, ἡ ἰχθυόθηρον Græcis, Rapum & tuber umbilicusq̄ terræ Latinis, Cyclamen officinis mutata uoce, Panis porcinus & terræ, atq̄ Arthanita à nostræ ætatis herbarijs, Germanis Erdwurcz oder Apffel/Schwein oder Sewbzot dicitur. Cyclamino Græci nomen fecerunt,

Cyclaminus uis
de dicta.

Ichthyotheron.

Rapum terræ.

Tuber terræ.

Umbilicus terræ

Panis porcinus.

Panis terræ.

circumactâ in orbem eius circinationē contemplati, ἡ τὸ κύκλος, quasi ab orbe Cyclaminon, hoc est, orbicularē dixerunt. Fuitq̄ hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Ichthyotheron uerò ijdem, quod pisces ea necantur nominauerunt. Romani Rapum terræ, quoniam eius radix in terra uelut Rapum extuberat. Quæ nê ratione terræ tuber, quod in molem quandam intumeat: aut umbilicum terræ, quoniam ut umbilicus circinata forma emergit, sic & Cyclaminus sub terra conspicitur, etiam appellarunt. Panem porcinum haud dubiè primum uocarunt subulci, qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, quod sæpius radicem in orbem circumactâ intuerentur, quæ non in globum intumescens, sed ueluti pressa sese in latitudinem explicaret, qua forma quotidiano usu panes uisuntur, terræ panem ceperunt appellare.

FORMA.

Folia Hederæ habet, purpurea, uaria, supra infraq̄ albicantibus maculis. Caulem longitudine quatuor digitorū, nudum, folijsq̄ carentem, in quo flores rosarum effigie purpurei. Radicem nigram, rapo similem, in latitudinem se pandentem.

LOCVS.

Nascitur in umbrosis & uepribus, maximè sub arboribus.

TEMPVS.

Cyclaminus ad finem Augusti folia sua quæ per integrū retinuit, amittit, & subinde noua emittit, atq̄ statim inter ea flores ostendit, qui integro durant autumnno.

TEMPERAMENTVM.


Clarum est ex particularibus operationibus, quas statim subiiciemus, Cyclaminum esse calidam & siccam in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Cyclamini cum hydromelite pota, pituitam, aquamq̄ per inferna trahit. Menses pota & apposita cit. Tradunt si prægnans mulier radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Bibitur & in uino contra letalia, præsertim leporē marinum. Illita contra serpentium ictus remedio est. Immista uino ebrietatem facit. Regium morbum sistit tribus drachmis pota cum passo, aut diluta mulsâ. Sed oportet eum qui bibit cubiculo calido reclinare, multis uestibus cõtectum, quò sudet. Eiectus uerò sudor felleus colore inuenitur. Succus eius ad purgandum caput, naribus instillatur. Sedi etiam deijcienda excrementa in lana subiicit. Vmbilico, imo uentri & coxæ illitus succus aluū mollit, uerum abortū efficit. Suffusus & hebetibus oculis inunctus cum melle succus prodest. Medicamentis abortū inferentibus admiscet. Sedem prociuentē cum aceto inunctus succus cõpescit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinē decoquit. Radix cutem extergit. Exanthemata reprimat. Vulneribus per se ex aceto aut melle medet. Illita lienē minuit. Vitia cutis in facie à sole & alopecias emendat. Decocto eius luxata, podagra, & capitulculcula, pernionesq̄ utiliter fouent. Ipsaq̄ in uetere oleo feruefacta, ad cicatricem perducit quæ oleo illo inuncta fuerint. Cauata radix oleo explet, & cineri feruenti imponit, adiecto interdū thyrrhenicæ ceræ modico, ut strigmenti crassitudinem contrahat unguentū, cum primis utile pernionibus. Radix Scillæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoriam assumi cõtusam, & in pastillos conformatâ.

EX GALENO.

Cyclaminus uarias uires obtinet, nam & extergit, & incidit, & ora uenarum aperit, & attrahit, & discutit. Clarum uerò id est ex particularibus operibus, Nam succus eius



CYCLAMINUS
Schweinbrot.


Cus eius hæmorrhoidas referat, uolenterq; ad recessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, strumas, aliasq; durities discutientibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit: ad hæc quoq; per nares expurgat. Ad eum est uehemens eius facultas, ut abdomine illito uentrem subducatur, & fecum interimat. Nam & alioqui ualidum interimendo conceptui medicamen est, in pelfo addita. Tota uerò radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa uehemens sit. Nam & menses siue epota, siue apposita euocat, & regio morbo prodest, non modo ipsum uiscus expurgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem excernens. Proinde à potione omnibus modis sudoris adiuuanda prouocatio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem extergit cum in alijs, tum quod alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curet. Lienem quoque induratum iuuat illita, tum recens, tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis exhibeant.

EX PLINIO.

Cyclamini radix contra serpentes omnes bibitur. In omnibus ferenda domibus, si uerum est, ubi fata sit, nihil nocere mala medicamenta: amuletū uocant:arrantq; ea ebrietatem repræsentari, addita in uinum radice. Et siccata Scillæ modo concisa reponitur, decoquiturq; eadem ad crassitudinē mellis. Suum tamē uenenum inest ei, traduntq; si prægnans radicem eam transgrediatur, abortum fieri. Radix denique tribus drachmis bibitur in loco calido, & perfrictionibus tuto; sudores enim felleos mouet.

DE CYPERO CAP. CLXXI

NOMINA.

D  **Κ**ΥΠΕΡΟΣ ἡ κνίπη. Græcis, Cyperus & Cypirus Latinis dicitur. Quum enim Græci quandoq; diphthongo, ut Theophrastus, quandoq; uocali breui, quemadmodū Dioscorides, Galenus & alij quidam, penultimam scribant, sit ut aliqui e, alij uerò i retineant. Poëtæ qui e ex diphthongo retinuerunt, meritò penultimam in Cypero produciunt. Officinæ latinū nomen retinuerunt, Germanis wilder Galgan uocatur.

FORMA.

Cyperus porri folia habet, longiora tamen, graciliora & solidiora. Caulem cubitalem, & nonnunquam altiorē, angulosum, schæno similem, in cuius cacumine minorum foliorum ac seminis productio est. Radices illi subsunt, quarum usus est, oblongæ, oliuarum modo sibi inuicem cōmissæ, aut rotundæ, nigræ, suauiter olentes, & amaræ: uel, ut Theophrastus deliniauit, inæquales, partim crassæ, carnosæq; partim graciles atq; furculosæ. Ex qua descriptione omnibus esse perspicuum arbitramur, stirpem cuius nunc picturā damus esse Cyperum. Siquidem folia ferri porracea, longiora exilioraq; caulem altitudine cubiti, aut altiorē, angulosum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt, inter quæ semen residet. Radices huic sunt oblongæ, oliuarum modo inter se connexæ ac inuicem implexæ, aut rotundæ, nigræ, iucundē spirantes, gustu amaræ. Præterea magna inæqualitate notantur, quod pars quædam crassa carnosaq; quædam gracilis atque lignosa sit. Nemo enim non uidet radices tenuitatē furculosam protinus in oliuaria tubercula uerticillari. Nascitur quoque è latere huius radícula, quod Theophrastus etiam notauit, unde cauliculus erumpit alius, ut pictura affabrè monstrat.

LOCVS.


Nascitur in locis cultis & palustribus. In Germania certè non nisi cultus in hortis prouenit.

TEMPVS.

Minuta folia in cacumine cum semine Iunio & Iulio mense producit,

CYPERVS

Wilder Galgan.



C

Cyperi radices maximè usui sunt, excafacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radici Cyperi calefaciendi uis inest, urinamq̃ mouendi. Calculosis & aqua inter cutem correptis pota succurrit. Aduersus scorpionū ictus remedio est. Refrigerationibus uuluarū & preclusionibus fotu auxiliatur. Pellit menses. Arida trita oris ulceribus, etiam si depascant, prodest. Malagmatis calefacientibus miscetur, & unguentorum spissamentis accommodatur.

EX GALENO.

Cyperi radices maximè usui sunt, excafacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem. Itaq̃ ulceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirificè profunt: habent enim quiddam etiam adstringens, quapropter ulceribus item oris conueniunt. Quin & incidendi uim quampiam illis inesse testificantur, quæ & calculo uexatis congruunt, & urinam mensesq̃ mouent.

EX PLINIO.

Cypero uis in medicina psilothri. Illinitur pterygijs, ulceribusq̃ genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris ulceribus. Radix aduersus serpentium ictus & scorpionum præsertim remedio est. Vuluas aperit pota. Largiori tanta uis, expellit eas. Urinam ciet & calculos: ob id utilissima hydropicis. Illinitur & ulceribus quæ serpunt, sed his præcipuè quæ in stomacho sunt, ex uino uel aceto illita. Iunci radix in tribus heminis aquæ decocta ad tertias tulsî medetur. Semen tostum & in aqua potum, sistit aluum & fœminarū menses, capitisq̃ dolores facit.

D

DE LATHYRI CAP. CLXXII

NOMINA.

Cataputiaminor
quare dicta



AΘΥΡΙΣ Græcis, Lathyris Latinis, officinis Cataputia minor, quod in pilulis quibusdam, seu potius catapotijs, semen ferat: aut, quod uerisimilius est, quia granis eius ad aluum subducendam pro catapotijs utantur. Germani Springkraut/Springböner oder Treibböner appellant, quod semen scilicet nisi in tempore auferatur, sua sponte ex loculamentis saliendo excidat.

FORMA.

Caulem profert cubitalem, uacuum, digiti crassitudine: in eius cacumine sunt alæ. Folia in caule oblonga, amygdalinis similia, latiora tamen & læuiora. Quæ uerò in summis sunt ramulis, minora, Aristolochiæ aut oblongæ Hederæ figura. Fructum fert in summis ramis tribus loculamentis distinctum, rotundum ceu Capparin, in quo terna sunt semina putaminibus, inuicè discreta, rotunda, maiora eruis, quæ quàm corticibus exuunt, candida sunt, & gustu dulcia. Radix illi tenuis & inutilis. Totus autem frutex lacteo liquore, Tithymali modo, plenus est. Hanc certè descriptionem, si singula comparare uelis, ita Cataputiæ minori quadrare inuenies, ut nulla prorsus sit nota, quam non pictura referat. Nam hæc caulem cubitali emittit longitudine, & digitali crassitudine. Gignunt in fastigio alæ, & folia in caule oblonga, amygdalæ proxima, latiora & læuiora. Quæ autem in summis emicant ramulis, minora ijs quæ caulem ambiunt conspiciuntur, Aristolochiæ aut longioris Hederæ figura. In cacuminibus fructum gerit triplici cellula conceptaculoque distinctum, ceu Capparin rotundum, in cuius uentriculis grana tria intercurtantibus membranis diuisa continentur, eruis maiora, rotunda, quæ corticibus exuta alba spectantur, gustatu dulcia.

Cataputia minor

LOCVS.



LATHYRIS

Springkraut.

LOCVS.

Nascitur locis cultis & fabulosis.

TEMPVS.

Carpitur autumnò dum fructu prægnans est, semenq; eximitur dum tuniculæ quibus includitur, inaruerunt.

TEMPERAMENTVM.

Calidam in tertio, & in primo ordine humidam statuunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Purgant aluum grana eius sex uel septem sumpta in catapotio, aut comesta, aut cum caricis aut palmulis deuorata, frigida superpota aqua. Ducunt autem pituitam & bilem, & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum præstat. Folia cum gallinaceo aut oleribus decoquuntur ad eisdem effectus.

EX GALENO.

Sunt qui Lathyrim dicant Tithymali esse speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, uniuersaq; illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus uideatur dulce: quod sanè etiam maximè purgatoriam uim obtinet.

EX PLINIO.

Grana uicena in aqua pura aut mulsâ pota, hydropicos sanant. Trahunt & bilem. Qui uehementius purgari uolunt, cum folliculis ipsis sumunt ea, nam stomachum lædunt: itaq; inuentum est, ut cum pisce, aut iure gallinacei fumerentur.

DE LEVCOIO DIOSCORIDIS

CAP. CLXXIII.

NOMINA.

D
Viola alba.
Cheiri.



ΕΥΚΟΙΟΝ Græcis, Viola alba, uel Viola simpliciter Latinis, officinis Mauritana uoce Cheiri uel Keirim appellatur, Germanis Weiel. Non autem temerè adiectū est Dioscoridis: hac enim uoce à Leucoio Theophrasti, de quo suo loco dicemus, segregare uoluimus.

GENERA.

Viola purpurea
duplex.

Viola candida
duplex.

Etsi Leucoij nomine Viola significetur candida, tamen & pro lutea, & cœrulea, & purpurea solet usurpari. Quatuor itaque Violæ huius sunt genera, quæ sola florum diuersitate inter se differunt. Alia enim candida, alia lutea, alia purpurea. Non est tamen quod per purpuream hic intelligas eam quæ Græcis ἰορ, & Latinis propriè Viola dicitur: nam eius alia ab ea de qua hic agimus familia est, huicq; tum qualitate tum facultate, adde etiam forma, contraria. Ea enim quæ ἰορ Græcis uocatur, humilis est, ob id à nonnullis Sessilis dicta, & latiore folio. Contrà nostra illa, ut mox dicemus, cubitali est altitudine, & minimè sessilis. Idem de candida dictum putes, nam ea quoq; duplex est: una de qua hic fit sermo, alia sessilis, de qua in præsentia nihil dicemus. Nos tria duntaxat genera picta damus: cœruleas enim uidere non licuit. Quare supposititium hoc uerbum in Dioscoride puto, maximè cum Plinius lib. xxi. ubi de satiuis Violis loquitur, purpurea scilicet, lutea & alba, nullam de cœrulea mentionem fecerit.


FORMA.

Cubitali altitudine prosiliunt, ramosæ, caule Brassicæ exiliore, folio longo, molli, canescente, flore quadrifolio, Violæ syluestris odorem referente, non unius coloris, nam alij candidi, alij lutei, alij purpurei. Semen foliaceum tenuibus quidem, sed quincuncialibus siliquis continetur.

LOCVS.

Vbiq; ferè in hortis & cultis reperiuntur. Non enim nascuntur magna ex parte nisi satæ fuerint.

TEMPVS.



LEVCOION


Weiß Weid.

456



VIOLA
LUTEA.

Seel Deich.



VIOLA
PURPUREA.

Braun Veiel.

C

Primo uere & Maio potissimū mense, inter flores emicat Leucoion. Hoc itaque tempore flores carpendi, Semen inter æstatis initia profert.

TEMPERAMENTVM.

Leucoion abstergentē facultatem possidet, & tenuium est partium, Galeno auctore, proinde ut calidum sit necesse est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lutea in medicina præcipui usus est. Huius flores aridi effereuefacti in desefsionibus, contra uuluae inflammationes ualent, & menstrua educunt. Cerato excepti rimas sedis sanant: cum melle oris ulcera. Semen eius duūm drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle appositum, menses, secundas & foetus educit, Radices cum aceto illitæ, reprimunt lienem, & podagricos iuuant.

EX GALENO.

Leucoij frutex uniuersus extergentē facultatem obtinet, ac tenuiū partium est, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciores magis etiam quam uirides, adeo ut & oculorum crassas cicatrices extenuent. Tum menses quoq; decoctū eorum mouet, & secundas, foetumq; emortuum elicit, & si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentū, ut si quod aliud, amarum. Quod si quis uirium eius uehementiam multa aqua admista mitiget, aut certē id genus aliquo, habebit & ad phlegmonas bonum medicamentū. Sic decoctum eius si non merum fuerit, uteri phlegmonas identidem perfusum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad scirri modum induruere. Sic cum cerato ulcera ægrè ad cicatricem peruenientia curat. Sunt uerò etiam qui cum melle ad oris ulcera adhibeant. Semen quum eiusdem sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarū mensura potum, tum mensibus ciendis cum melle appositum conuenire creditur, foetumq; uiuentem interficere ac mortuum eijcere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrenæ, cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli uerò & phlegmonas induratas ijs curant.

EX PLINIO.

Extenuant, menstrua & urinā ciunt. Minor uis est recentibus, ideoq; aridis post annum utendū. Lutea dimidio cyatho in aquæ tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illitæ sedant lienem. Item podagram, oculorū inflammationes, cum myrrha & croco. Folia cum melle purgant capitis ulcera, cum cera rimas sedis, & quæ in humidis sunt. Ex aceto uerò collectiones sanant.

DE LAPATHO CAP. CLXXIII.

NOMINA.

Lapathum unde dictum.

λαπάθη.



ΑΠΑΘΟΝ Græci, Rumicem Latini, barbari Lapathium uocant. Lapathum autem ab effectu nomen accepit, quod scilicet exinaniat: etenim λαιπάθη uacuare uel exinaniare Græcis est; omnium siquidem generum folijs decoctis aluus mollitur.

GENERA.

Primum. Huius quatuor genera facit Dioscorides. Primum oxylapathon Græcis & Latinis dicitur. Officinæ Lapathium acutum, Germani *Mengelwurz* / *Grindwurz* / *Sereyffwurz* / *Zitterwurz* / *Wildampffer* nominant. Oxylapathū, quamuis anceps in acidum sapore uel acutam figurā uideatur significatio, tamen nomen hoc à folijs quæ in mucronē desinunt accepisse uidetur. Secundū genus hortense priori dissimile, non quidē in uniuersum, sed duntaxat in folijs, quæ Serapione teste, multo sunt latiora. Hoc genus haud dubiè est Rhabarbarū monachorum, quod passim hodie in hortis plantatur: Oxylapatho enim per omnia ferè simile est, folia tamen latiora obtinet, & ob cultū paulò tenerius est. Cum autem primū erumpūt folia, purpurea ferè sunt, dein quotidie uiridiora fiunt, ut pictura ipsa monstrat. Tertium sylue-



OXYLAPATHVM

Stengelwurz.

RVMICIS SE
CYADVM GENVS.


Winch Khabarbarum.





RVMICIS
TERTIVM GENVS.

Güter Heinrich.



OXALIS

Sauer Ampfer.

A syluestre, paruum, plantagini simile, molle & humile est, quod uulgato nomine bonus Henrichus, germanicè gûter Heinrich dicitur, id quod ex forma primùm colligitur: folia enim eius oxalidi, nisi quod ampliora sunt, atque adeo ad plantaginis non nihil accedunt folia, similia sunt. Flores autem eius & semen sic Oxylapathū referunt, ut uix ab inuicè discerni queant. Dein uires etiam cōueniunt: uulneraria enim herba est Bonus Henrichus, ac mirificè ad sordida purganda, ac glutinanda ulcera confert, sic ut appensa etiam, ac trita uulnerib. imposita, uermes qui in ijs nati sunt excidere faciat. Quartū genus Græci *ὄξυλίδα*, Latini Oxaliden, officinæ Acetosam, *Quantum.* Germani Saur Ampffer nominant. Oxalis autem ideo dicta est, quod in gustu *Acetosa.* acorè planè respiciat, unde etiam uulgo Acetosam uocauit. Hanc propriè Romani appellarunt Rumicè, forsitan quod ab ea succus non aliter atq; mamma, quam Ru *Rumex uide dicta.* men ueteres dixerunt, sitientibus exugi soleat. Galenus tria tantum genera Lapa *Hippo.* thi facit, Oxaliden, Oxylapathon & Hippolapathon, quod sic Græci quasi grande Lapathum dicunt, magnis amplisq; rebus hippo præponere soliti, ab equo excel *Hippo.* lentis amplitudinis animali magnitudinem mutantes.

FORMA.

Oxylapathū folijs duris & in cacumine acutis, femine herbaceo acuminato ex mi *Oxylapathi.* nutissimis pediculis dependente, radice longa & lutea uel potius crocea. Secundū genus Oxylapatho perquam simile est, folijs tamē latioribus ac teneriorib. constat, caule bicubitali interdum, striato, floribus exiguis, luteis, femine ut Oxylapathon triangulari, radice longa & lutea seu crocea. Tertiū genus, quod uulgo hodie Bo num Henrichū uocat, foliū Oxalidi, latius tamē, aut Aro, uel ut Dioscorides inquit, *Oxalidis.* plantaginiue simile obtinet. Aliqua enim Ari, aliqua autē plantaginis folia referūt. Caulē prioribus duobus humiliorē, in quo flores & semina racematim multa de *B*pendent. Radicē uerò longam & subflauā. Oxalis autē folia syluestri & paruo hu milie Rumici similia habet. Caulis eius nō adeò grandis est, sesquicubitū altus. Semen acuminatum, rubrum, quod foliaceo uestitur inuolucro, sapore acri, quod in caule & adnascensibus coliculis nascitur.

LOCVS.

Oxylapathon in palustrib. & circa fossas potissimū nascitur. Secundū genus hodie in murtorū hortis consitum prouenit. Tertiū passim in areis, sepibus & circa itinera crescit. Oxalis in omnibus pratis copiosissimè prouenit.

TEMPVS.

Æstate antequam prata demetantur omnium copia haberi potest.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores Acetosam statuūt esse frigidā & siccā in secundo. Atqui quale huius & reliquarū Rumicū sit temperamentū, ex facultatibus earundem, quas mox dicemus, faciliè deprehendent studiosi. Secundi generis Rumex in folijs manifestissimā aciditatem ostendit, ut hinc etiam conijcere liceat esse Rumicem, ut cuncq; monachi & cum ijs multi quoq; medici, Rhabarbarum esse contendant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium Rumicū olus decoctū aluum mollit. Crudum illitū cum rosaceo aut croco melicerides discutit. Semē syluestris & Oxylapathi & Oxalidis cum aqua aut uino utiliter contra dysenterias, coeliacos affectus, stomachi fastidia, scorpionumq; ictus bibit. Si quis etiā in potu præsumat, nihil ictus patiet. Radices ipsarū ex aceto & crudæ illitæ, lepras, impetigines, scabrososq; ungues sanāt. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus decoctū earum sedat, si eo foueantur. Coctæ in uino si cum iure colluant, aurium dentiumq; dolorē mulcent. Strumas parotidasq; discutunt si cum uino decoctæ illinant. Lienes autē cum aceto. Aliqui utuntur radicibus contra strumas, uinculo collo eas appendentes. Tritæ & appositæ seminānarū fluxiones sistunt. Decoctæ cum uino & potè regio morbo correptos emendant. Calculos uesicæ cōminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon easdem antedictis Rumicum generibus uires obtinet.

EX GA-

C EX GALENO.

Lapathum moderatè digerentē facultatem habet, oxylapathum uerò mistam; nam simul cum eo quod digerit, nō nihil quoq; reprimendi facultate participat. Semen eorum manifestam quandam adstrictionē obtinet, adeò ut & dysenterias, & alui profluvia sanet, potissimum autem oxylapathi, Hippolapathon easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

EX PLINIO.

Syluestria Lapatha scorpionū ictibus medentur, & ferire prohibent habentes. Radix aceto decocta si coletur, succus dentibus auxiliatur: si uerò bibatur, morbo regio. Semen stomachi inextricabilia uitia sanat. Hippolapathi radices priuatim ungues scabrosos detrahunt. Dysentericos, semen duabus drachmis in uino potum, liberat. Oxylapathi semen lotum in aqua cœlesti, sanguinem reijcientibus, adiecta acacia lentis magnitudine, prodest. Præstantissimos pastillos faciunt ex folijs & radice, addito nitro & iure exiguo. In usu aceto diluunt. Sed fatiuū in epiphoris oculorum illinunt frontibus. Radice melicerias & lepras curant. In uino uerò decocta, strumas & parotidas & calculos. Poto uino & lienes, cœliacos æque & dysentericos & tenasimos. Ad eademq; omnia efficacius ius Lapathi, & ructus facit, & urinā ciet, & oculorum caliginem discutit. Item pruritus corporis, in folia balnearū additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat & cōmanducata dentes. Eadem decocta cum uino, sistit aluum. Folia soluunt adiecto sale.


APPENDIX.

Rhabarbari mo-
torum facult
as.

Alterius generis Rumicis, qui Rhabarbarū monachorū uocatur, radix purgandi etiam uim obtinet, si in puluerem redacta drachmæ pondere sumatur. Neq; id mirum admodum, cum etiam Dioscorides ipse omnium Rumicum olus decoctū aluum mollire, atq; decoctas eorundem radices cum uino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimirum per inferna eductionem, testetur.

DE LIMONIO CAP. CLXXV

NOMINA.

 LIMONION Græcis, Limonion; Beta syluestris & Tintinabulum terra Latinis, uulgo Pyrola, Germanis Wintergrün / Holzmangolt / Waldmangolt / oder Waldtöl appellatur. Beta autem syluestris hæc herba dicta est, quod in syluis & locis muscosis, hortensi Betæ primum erumpenti haud dissimilis, proueniat. Tintinabulum, à floribus eius tintinabulo similibus, Pyrola, quod eius folia arboris pyri folio similia sint.

Beta syluestris
unde dicta.

Tintinabulum
terra.

Pyrola.


FORMA.

Folia Betæ similia habet, tenuiora tamen & minora, decem, aut plura. Caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, semine rubro, gustuq; adstringente plenum. Ex qua siquidem descriptione abundè liquet, herbam quam uulgo Pyrolam uocat esse Limoniū. Folijs enim Betæ similis est, uerum tenuioribus & minoribus (legendum enim in Dioscoride μικρότερα, & non μικρότερα, Plinio libro uigesimo, capite octauo, teste) decem, interim pluribus. Caule tenui, recto, lilio simili, pleno seminis rubri, quod gustu adstringit. Quibus accedit quod germanicè Waldmangolt / id est, Beta syluestris nominatur. Neque uires discrepant: adstringit enim, uulnerariaq; herba est Pyrola, haud secus atque Limonium. Flores denique tintinabulo similes sunt, ut citra ullum discrimen Pyrolam Dioscoridis esse Limonium asseuerare liceat.

LOCVS.

In umbrosis & syluestribus prouenit locis.

TEMPVS.



LIMONIUM

Wintergrün.

C

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & semen gustu uehementer adstringunt, ita ut in tertio ordine siccitatis illud recte recentiores collocent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen tritum in uino potum acetabuli mensura, dysentericis ac cœliacis auxiliatur. Rubrum fecminarum profluuium sistit.

EX GALENO.

Limonij semen utpote austerum, cœliacis, dysentericis & sanguinem spuentibus cum uino exhibent. Iuuat & profluuium muliebri, Satis autem est acetabuli mensura.

EX PLINIO.

Huius folia ambustis utilia, guttantia adstringunt. Semen acetabuli mensura dysentericis prodest. Aquæ è radice coctæ maculas uestium eluere dicuntur, itemq; membranarum.

EX RECENTIORIBVS.

Pyrolæ decoctum interna & externa uulnera potum sanat. Item fistulis ac alijs malignis ulceribus medetur.

DE LAMIO CAP. CLXXVI.

NOMINA.

Archangelica.



D

Vrtica mortua
quare dicta.

LAMIUM Plinio lib. xxi. cap. xv. & lib. xxij. cap. xiiij. uocatur. Vulgo Vrtica iners & mortua. Sunt qui albam Vrticam nomenent, & Archangelicam. Officinis inusitatum, germanicè Todtnessel/ oder Taubnessel dicitur. Iners & mortua cognominata, quod folijs non mordentibus sit, & mitissima.

GENERA.

Vrticæ mortuæ tria inueniuntur genera. Vnum albis, quod propriè Lamium dicitur; alterum luteis, & tertium purpureis floribus constat. Nos, quia solis floribus differunt, nec in eorum folijs aliquod discrimen apparet, una icone omnia tria complexi sumus genera.

FORMA.

Folijs constat Vrticæ pungentis, minoribus, fimbriatis, candidioribus, lanuginè nequaquã mordaci, caule quadrangulo, flore albo, luteo, aut purpureo, radice ex interuallis cincinnis capillata. Graui odore tota fragrat. Innoxia est & morsu caret. Semen in caulibus per interualla copiosum & nigrum profert.

LOCVS.

Parsim circa semitas & sepes nascuntur.

TEMPVS.

Vere primo, Maio potissimum mense, floribus abundant, & tota ferè æstate.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est Lamium, ueluti etiam alia Vrticæ genera, id quod ex gustu, eiusq; facultatibus deprehenditur.

VIRES. EX PLINIO.

Medetur cum mica salis contusis incusisq; inustis & strumis, tumoribus, podagris, uulneribus. Album habet in medio folio, quod ignibus sacris medetur. Quidam è nostris tempore discreuere genera. Autumnalis Vrticæ radice alligata in tertianis, ita ut ægrî nuncupentur cum eruitur ea radix, & dicatur quæ, & cui, & quorum filio eximatur, liberari morbo tradiderunt. Hoc idem contra quartanas polle-
re, lidem



LAMIVM

Lamb-ear.

r

Cre. Iidem radice urticae addito sale, infixæ corpori extrahi. Folijs cum axungia strumas discutit, uel si suppurauerint, erodi compleriq̃.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores hac inertæ Vrtica utuntur sistendo ruentis è naribus sanguinis impetu, inæ ceruicæ uel scapulis alligando, inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum. Vlcerebus denique, putredinibus & fistulis mirifice conferre, ac mederi tradunt.

DE LINO CAP. CLXXVII

NOMINA.



INON Græcis, Linum Latinis & officinis, Germanis *Lein* / oder *Slachß* appellatur.

FORMA.

Herba est tenui caule, folijs angustis, oblongis, & in summo acuminatis, floribus cœruleis, speciosis, quibus decidentibus folliculus enascitur in quo semina continentur sulua.

LOCVS.

*Linum agris
noxium.*

Gaudet pingui solo & modicè humido. Agris autem noxiū est, deteriores enim eos facit, id quod h̃s carminibus in Georgicis significauit Virgilius:

*Vrit enim lini campum seges, urit auenæ,
Vrunt letheo perfusa papauera somno.*

TEMPVS.

D Vellitur æstate ubi maturitatē consecutum fuerit, quæ sanè duobus argumentis intelligitur, intumescente semine, uel flauescente colore.

TEMPERAMENTVM.

Est in primo ordine calidū, ac humiditatis & siccitatis quodāmodo in medio sitū.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen Lini eandem Fœnogræco facultatem obtinet. Omnem intus forisq̃ inflammationem discutit & emollit, cum melle, oleo, exiguaq̃ aqua decoctum, aut melle cocto exceptū. Vitia cutis in facie crudum, uarosq̃ cum nitro & ficu illitum. Cum lixiuia autem parotidas, duritiesq̃ discutit. Herpetas in uino decoctū, & fauos purgat. Vngues scabros cum pari modo Nasturtij & mellis eximit. Cum melle uice eclegmatis sumptum, ea quæ in thorace sunt educit. Tussim lenit. Venerem stimulat si cum melle & pipere mixtū pro placenta largius sumatur. Huius decoctū intestinorum uteriq̃ erosionibus iniectum medetur, adq̃ excrementorū educationem prodest. Ad uulua inflammationes in desefsionibus haud aliter quàm Fœnigræci perquam utile est.

EX GALENO.

Lini semen esum flatuosum est, etiamsi frigatur, adeò sanè excrementitia humiditate plenum est. Visceribus tamen quæ circa hypochondria sunt, ut si quid aliud, gratum existit. Quidam hoc tosto instar obsonij non secus ac factitio sale cum garo utuntur. In usu est & melle conspersum. Inserunt nonnulli panibus quoque. Stomacho & concoctioni repugnat. Tenuiter corpus alit. Quod spectat ad deiectionem, ne claudandum, nec uituperandum, per exigua tamen uim mouendæ urinæ tenet, quæ in tosto efficacior est. Idem quoque aluum magis sistit. Rustici sæpe numero torrefacto adiecta portione mellis utuntur.

EX PLINIO.

Lini semen cum alijs quidem in usu est. Et per se mulierum cutis uitia emendat in facie. Oculorum aciem succo adiuuat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum myrrha. Cum uino sedat parotidas. Cum melle, aut adipe, aut cera, stomachi solutiones



LINUM

Flachs.

r 2

C tiones inasperum polentæ modo. Anginas in aqua & oleo decoctum, & cum aniso illitum. Torretur ut aluum sistat. Cœliacis & dysentericis imponitur ex aceto. Ad iecinoris dolores estur cum uua passa & ad phthisin utilissimè. Semine fiunt & ecligmata. Musculorum, neruorum, articulorum, ceruicum duritias, cerebri membranas mitigat farina feminis, nitro aut sale, aut cinere additis. Eadem cum fico item concoquit ac maturat. Cum radice uero cucumeris syluestris extrahit quæcunque corpori in hærent. Sic & fracta ossa. Serpere ulcus in uino decocta prohibet. Eruptiones pituitæ cum melle emendat. Ungues scabros cum pari modo Nasturtij, & testium uitia & ramices cum resina & myrrha, & gangrænas ex aqua. Stomachi dolores cum Fœnogræco sextarijs utriusq; decoctis in aqua mulsa. Intestinatorum & thoracis perniciofa uitia, clystere in oleo & melle.

DE LICHENE CAP. CLXXVIII

NOMINA.

Hepatica.
Lichen quare
dicta.



Hepatica quare.

EIXHN Græcis, Lichen Latinis, officinis & herbarijs Hepatica, Germanis Stein oder Brunnenlebertrout dicitur. Lichena autem Græci & Latini nominauerunt, quod cōtra Lichenas omnibus remedijs anteponatur: aut à re ipsa nomen dederunt, quoniam saxa quibus hæret linguæ modo lambat. Hepaticam uerò recentiores uocarunt, quod iecinorum fibris similis conspiciatur.

FORMA.

Folio succi pleno, crasso & oblongo constat, rorulentis petris adhærente, sub quo cauliculi, pediculorum forma, capitula stellata habentes, exeunt.

D

LOCVS.

Nascitur in roscidis & grauiter olentibus saxis.

TEMPVS.

Iulio mense ea qua picta est forma decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Abstergentem ac modicè refrigerantem facultatem, utranq; uetò resiccantem habet. Abstergentem quidem atq; exiccantem à petra, refrigerantem autem ab aqueo humore.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Lichen illitus sanguinis eruptiones sistit, & inflammationes compescit. Impetigines sanat. Inunctus cum melle regio morbo affectis prodest. Oris & linguæ defluxiones arceat.


EX GALENO.

Lichen qui in petris nascitur, est ueluti muscus quidam, sed recte ex plantarum genere censerì potest. Sic nominatus uidetur, quod lichenas seu impetigines curet. Extergentem & mediocriter frigidam facultatem obtinet. Porrò quod ex talibus substantijs cõponitur, aduersum esse inflammationi nihil mirum est. An uerò sanguinis eruptiones sistat, ut Dioscorides ait, id neutiquam dicere queo.

EX PLINIO.

Sanguinem sistit uulneribus instillatus, & collectiones illitus. Morbum quoq; regium cum melle sanat ore illito & lingua. Stigmata etiam delet.

DE LINO



LICHEN

Stein Leberkraut.

C

NOMINA.

Mercurialis.

Mercurialis cur
dicta

ΙΝΟΖΩΣΤΙΣ, ἢ ἐρμῆ βοτάνιον, ἢ πῶα Græcis, Mercurialis Latinis & officinis dicitur, Germanis Zingelkraut / Mercuriuskraut / oder Kirswurts. Mercurialis dicta est, quod à Mercurio inuenta sit.

GENERA.

Duo eius genera, mas & fœmina, quæ facillè ex eorundè descriptionibus discerni poterunt, Folia uerò maribus nigriora, fœminis candidiora.

FORMA.

Mercurialis folia Ocimo similia habet, ad Helxines foliorum figuram accedentia, minora tamen, Ramulos geniculatos, alarū caua multa & densa habentes. Fœmina semen fert racemosum & multum. Mas uerò iuxta folia exiguum, rotundū, geminorum testiculorum modo connexum, Totus frutex dodrantalis, & nonnunquam maior.

LOCVS.

Nascitur in campestribus cultis, uinetisq̃, aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiam inficiat, & bibentibus ingrata reddat.

TEMPVS.

Augusto mense semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam in primo ordine esse afferunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtraq̃ aluum mouet olerū modo comesta. Cocta in aqua & epota aqua, bilem & aquosa ducit, Creduntur præterea fœminæ folia trita & pota, aut post purgationem pudendis apposita, ut fœminæ concipiantur efficere. Masculæ uerò similiter adhibita, mares progenerare.


EX GALENO.

Mercuriali omnes duntaxat ad uentris purgationes utuntur, Verumenimvero si quis eius facere periculum uolet in cataplasmate, sanè digredientis admodum facultatis esse experietur.

EX PLINIO.

Mirum est quod de utroq̃ eorum genere proditur: ut mares gignantur hunc facere, ut fœminæ illam. Hoc cõtingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturue folia decocta ex oleo & sale, uel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eam in nouo fictili cum heliotropio, & duabus aut tribus spicis, donec decoquantur, Decoctum dari iubent & herbam ipsam in cibo altero die purgationis mulieribus per triduū, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum usu prædicauit illas. Easq̃ ad hunc modum adhuc medicorū nemo nouit. Ille eas uulua cum melle, uel rosaceo, uel irino, uel lirino admouit. Item ad ciendos menses, secundasq̃. Hoc idem præstare potu fotuq̃ dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitq̃ cum uino uetere. Aluo folia imposuit, epiphoris, stranguriæ & uesicæ. Decoctum eius dedit cum myrrha & thure. Aluo quidem soluendæ, uel in febrî, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextarijs aquæ ad dimidias, bibitur sale & melle admixto: necnon cum ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui utranq̃ dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt.

DE LIBA.



MERCVRIALIS
M A S.

Bingelkraut memle.



MERCVRIALIS
FOEMINA.

Bingelkraut weiblich.

NOMINA.



LIBANOTIS Græcis, Rosmarinus Latinis & officinis, Germanis Rosmarin appellatur. Libanotis uerò dicta est, quod odorem thuris red-
dat. Libanotida autem nō eam quæ simpliciter sic nominatur à Græcis
intelligi, sed eam quæ cum adiectione, coronaria Libanotis appellatur.

Rosmarinus.

Libanotis cur
dicta.Libanotis cor-
onaria.

FORMA.

Rosmarinus quæ neſcentes coronas utunt, uirgas habet tenues, circa quas sunt
folia tenuia, crebra, oblonga & gracilia, intus candicantia, exteriore autem parte ui-
ridia, grauiter odorata. Florem, quod Dioscorides omisit, in candido cœruleum,
radicem nigram, multis fibris capillatam.

LOCVS.

Hodie passim in hortis & ficilibus uasis plantatur. In Narbonensi autem Gal-
lia sua sponte prouenit tam copiose, ut eius incolæ aliud lignum non urant.

TEMPVS.

Carpitur Maio mense & deinde usque ad Septembris medium. Floretq; bis an-
nuatim, uere & autumno.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod ex gustu & uiribus conſicere quisq; poterit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Calfacit. Regium morbum sanat, si quis eam in aqua decoxerit, & ante exerci-
tia bibendam dederit, dein post exercitia lauerit, & uino potauerit. Miscetur etiam
acopis, & musteo oleo.

EX GALENO.

Libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quam Romani Rosmarinū nuncupant,
decoctum regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim Libanotides ab-
stergentis & incidentis facultatis sunt participes.

APPENDIX.

Recentiores Rosmarinum suffitu tulsim & destillationem sedare tradunt. Et
quod in primis nobile, tutam præstare in pestilentia domum crematam, nidore im-
probam aëris diluentem perniciem. Adijciunt & alias facultates, eas nempe: Ros-
marinus corroborat cerebrum, sensus interiores, memoriam & cor. Succurrit tre-
mori, resolutioniq; partium. Loquelam amissam reparat, & alia multa potest,
quæ cōmemorare superuacaneum est.



ROSMARINUS

Rosmarin.

NOMINA.



LIGVSTRVM Plinio alijsq̄ Latinis nominatur. Officinis inusitatum, Germanis *Beinhölzlin* / *Mundtholz* / *Kein oder Schilweiden* dicitur. Quo autem nomine Græcis appellatum sit, nondum certo nobis constat: neque enim ut ferè omnes hodie putant Cypros est, quæ Plinio libro duodecimo teste, semen habet Coriandri, peregrinaq̄ existit arbor. At Ligustrum semen non Coriandro simile, quod rotundum ac subflauum est, sed potius atrum, & altera parte latum modicèq̄ cōcauum in racemis profert. Nec arbor est peregrina, sed sponte in sepibus & senticetis ubiq̄ prouenit. Mea tamen sententia Phillyrea potius apud Dioscoridem erit, quod hæc Cypro congener ac similis sit, easdemq̄ quas Ligustrum facultates habeat. Iudicium tamen penes prudentem lectorem esse uolumus.

Ligustrum non est Cypros.

Phillyrea uidetur esse Ligustrum

FORMA.

Ligustrum arbor est parua, folijs Oleæ similibus, floribus paruulis, candidis & odoratis, racematim florentibus, fructibus initio uirentibus, processu temporis nigris, uuarum more congestis.

LOCVS.

Nihil frequentius Ligustro in uepribus occurrit, nihilq̄ crebrius in dumetis inuenitur, ita ut hoc nomine contemptui habeatur. Quapropter huc respiciens Virgilius in Bucolico carmine, eius flores negligi à pastoribus, ac inutiliter perire canit, dicens:

Alba ligustra cadunt, uacinia nigra leguntur.

TEMPVS.

Maio mense floret, autumno autem cum maturis baccis nigrescit.

TEMPERAMENTVM.


Et si forma nō nihil à Cypro distet Ligustrum, temperamento tamen eodem est præditū. Eius enim folia & surculi mixta qualitate constant: discutiens enim quiddam cum aquea substantia, modicè calida, & quiddam etiam adstrictorium ex terrena substantia frigida, & sine morfu siccante, obtinent.

VIRES. EX PLINIO.

Succus eius neruis, articulis, algoribus, folia ubiq̄ ueteri ulceri cum salis mica, & oris exulcerationibus profunt. Acini contra phthiriasin, item contra intertrigines, foliæue, Sanant & gallinaceorum pituitas acini.

APPENDIX.

Recentiores Ligustri succum ulcera oris, ueretriq̄ sanare tradunt. Idem etiam posse folia in uino decocta adijciunt: ut hinc euidentissimū sit, folijs Ligustri, haud secus atque Cypri aut Phillyreæ, adstrictoriam inesse uim, propter quam cōmanducata & decocta, oris potissimum ulceribus opitulantur.



LIGUSTRUM

Beinhölzlein.

NOMINA.



IV multumq; de huius herbæ nomenclatura fuimus solliciti, at utcun- que multos interrogauerimus, tamen aliud nomen quàm id ipsum quo nunc appellamus expiscari haud potuimus. Vocetur itaque Lunaria minor, donec certio- rem appellationem habere contigerit. Germanicè Klein Monttraut/ut sit ad Latinam nomenclaturam allusio quædam, nuncupetur.

Lunaria minor.

FORMA.

Rotundo est caule, cui folia utrinq; septem annexa, cordis ferè humani formam habentia: in summitate caulis semen Betæ simile profert.

LOCVS.

Nascitur in montibus. Copiosissimè autem Tubingæ in pede montis Austria- ci prouenit. Prope hanc nunquam nō Ophris, de qua suo dicemus loco, inuenitur.

TEMPVS.


In fine Maij & Iunio mense inuenitur, dein statim euanescit.

TEMPERAMENTVM.

Terrestre quid præ se fert gustata, atque parum adstringit, ut hinc mediocriter frigidam & siccam esse uerisimile sit.

VIRES.

Vis foliorum eius haud dubiè uulneribus efficac, glutinandi nanque facultate prædita est. Chymicorum nugas, quibus eius herbæ usus frequentissimus est, lu- bens prætereo. Cōstat autem experientia, ad suppressendos menses, & album mu- liebre profluuium, mirificè conferre hanc herbam.



LUNARIA
MINOR.

Klein Honkruit.

NOMINA.



LEPIDION Græcis, Lepidium Latinis appellatur. Vulgus herbariorū Piperitum nomināt. Quam denominationē sequentes Germani nostri Pfeffertraut uocant. Nomen uerò hoc à pipere traxit, cuius acrimoniam herba hæc gustata refert. Diuersa est uerò, ut obiter parum attentos moneam, ab ea planta quam Plinius Piperitum nuncupat, de qua suo loco dicemus copiose. Sunt qui Lepidium alio nomine raphanum nominent, quod non alia fit ratione, quàm quod herba hæc quod ad folia attinet, raphano syluestri, quem Amoraciam alio nomine dicunt, admodum similis fit. Lepidium uerò appellatū, quod *λεπιδίον*, hoc est, squamas & maculas in facie deleat & repurget.

Piperitis.

Raphanus cur dicitur Lepidium.

Lepidium unde dictum.

FORMA.

Fruticosum est, in cubitalem altitudinem surgens, folijs laurinis, sed mollibus, & maioribus. Sic quidem Lepidion depingit Plinius & Paulus. Vnde sole clarius fit, herbam cuius picturam damus esse Lepidion: cubitalis enim & interdum bicubitalis est, caule solido & rotundo, folijs oblongis & laurinis, maioribus tamen & mollioribus, gustu piper referentibus & acribus, magnopereq; linguam uellicantibus, floribus candidis exiguis admodum, semine paruo, radice oblonga. In summa, forma totius herbæ raphano, ut diximus, syluestri similis est.

LOCVS.

In hortis potissimum prouenit, in quibus uiuacitatem suam usque ad multos annos prorogat.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, deinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

In ordine quarto calefacit, ut Nasturtium, exiccat autem ipso minus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Salgamorum more, sale cum lacte conditur. Foliorum uis acris & exulceratrix est. Quapropter ischiadicis præsentem remedio illinitur, tritum cum radice Inulæ, & quarta unius horæ parte impositum. Similiter & lienosis prodest. Lepras idem pellit. Radix collo adalligata, dentium dolorem leuare creditur.

EX GALENO.

Facultate Nasturtio simile est.

EX PLINIO.

In facie cutem emendat exulcerando, ut tamen cera & rosaceo facile sanetur. Sic lepras & psoras tollit semper facile, & cicatricū ulcera. Tradunt in dolore dentium adalligatum brachio quâ doleat, compescere dolorem.

APPENDIX.

Lepidion crassos & glutinosos cibos & humores extenuare, & incidere ualet: ideoq; culinaria est herba, & balsamentis idonea.



LEPIDIVM

Pefferkraut.

NOMINA.



ΕΥΚΟΙΟΝ Theophrasti hoc loco describimus, quod planè diuersum est à Leucoio Dioscoridis, quod supra depinximus, id quod tamen plerique etiam docti uiri non animaduertunt. Latinis Viola alba dicitur. Germanicè *weiß Dornungsblumen* / oder *Wergensblumen*. Non autem ab re Viola alba dici cœpit; flos enim huius herbæ colorem album, & Violarum odorem refert.

*viola alba.**viola alba cur dicta.*

FORMA.

Folia habet Porro similia, tenuiora tamen & molliora, ex radice bulbosa procedunt. Pediculus etiam profert dodrantalem, tenuem ac ferè iunceum, in quo candidus flos est, in medio croceus, Violarum purpurearum odorem referens, quo decedente, capitula Nucis auellanæ quantitate erumpunt, in quibus semen Sinapi haud dissimile continetur. Quod si ad hanc descriptionem adhibeas ea quæ de Viola alba Theophrastus libro sexto & septimo de stirpium historia tradit, certè sole manifestius erit herbam hanc cuius picturam damus esse eam, quam *λευκίον* Theophrastus uocat. Nam hæc prima florum se ostendit. Emicat ubi cœlum clementius statim, etiam non hyeme exacta: ubi uerò immitius, postea. Celeriter quoque euanescit. Radicem denique bulbosam & florem odoratum obtinet. Quæ singula etiam de hac nostra herba uerè dici possunt. Prima siquidem florum, hyeme etiam nondum exacta, Februario nimirum mense, & die diuo Valentino sacro, ubi cœlum clementius fuerit, apparet. In Aprili, ubi appropinquare iam cœperit Maius, euanescit. Flos item eius, Violarum purpurearum prorsus odorem refert. Radix etiam ad Bulbi similitudinem orbiculata existit, ut hoc nomine nemini dubium esse debeat, quin sit Viola alba Theophrasti.

*Theophrasti alba uola.**Flos Februarij uocatus.*

LOCVS.

Prouenit in umbrosis syluis & locis, qualis est non procul à Tubinga paulò supra & infra monasterium Bebenhufum uocatum, ubi copiosissimè nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis.

TEMPVS.


In Februario statim hæc erumpit, ut diximus, herba, & inter initia Martij ad perfectionem uenit. Semen in Aprili ostendit in capitulis, ut in altera pictura uides.

TEMPERAMENTVM.

Folia ferè qualitatis omnis expertia, radix autè dulcis & glutinosa est, ut hoc nomine adstringat & exiccet, ut reliqui bulbi.


VIRE S.

Digerentem leuiter, & cum hoc adstringentē facultatem, sicut reliquos bulbos, habere ex ijs quæ cōmemorauimus satis constat. Tamen nunc nullus, quod sciam, eius stirpis usus est.



VIOLA ALBA

Hornungblüm.



VIOLAE ALBAE FOLIA
CVM SEMINE.

Weißhornungsblüm mit dem Samen.

C

Miliū solis.

Lithospermon
unde dictum.

NOMINA.

ΙΘΟΣΠΕΡΜΟΝ Græcis, Lithospermum Latinis, officinis & medicis hodie omnibus Miliū solis appellatur. Germanis Weerbitz/oder Steinsomen. Nomen à lapidea seminis duritia accepit: neque enim Lithospermon aliud sonat Græcis, quàm lapideum semen. Quum itaque semina tanquam calculos ferat, candore & rotunditate margaritarum, duritia uerò lapidea, cōmodissima uoce Lithospermon dictum est. Miliū uerò solis recentioribus nominatum puto, quod semen eius candore solis & lucis splendore fulgeat.

FORMA.

Folia habet Oleæ similia, longiora tamen & latiora, & quæ in ima parte sunt, humi iacent. Ramulos uerò rectos, tenues, crassitudine Iunci acuti, solidos, lignososq;. In quorum cacumine bifidi diuariatiq; exortus, cauliculorum speciem exhibent longa habentes folia, inter quæ semen lapideum, rotundum, paruum, eruo equale. Plinius graphicè candore & rotunditate margaritas referre dixit. Nostrium autem Lithospermon multo minus quàm Dioscorides & Plinius tradiderunt semen profert, quod soli diuersitati acceptum referendum erit. Radix etiam Lithospermi, quod adijciendum esse arbitror, exteriori sui parte rubore perfunditur.

LOCVS.

Lithospermon asperis & sublimibus locis gaudet, Satum etiam in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, eoq; tempore semen etiam profert.

D

TEMPERAMENTVM.

Semen Lithospermi, cuius maximè usus est, calidum & siccum esse facile ex eiusdem facultatibus conijcitur. Omnia siquidem urinam cientia, Galeno lib. v. de simpl. medicam. facult. cap. xij. teste, calida & sicca sunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen cum uino albo potum, calculos frangit, & urinam ducit.

EX PAVLO.

Semen cum uino albo potum, calculos conterit, & urinas pellit.

EX PLINIO.

Lapillis eius drachmæ pondere potis uino albo calculos frangi pelliq; constat, & stranguriam discuti.



LITHOSPERMUM

Werbhuf.

C

NOMINĀ.

Lysimachia uin-
de appellata.

LYSIMACHION græcè, Lysimachia latinè, uulgò Salicaria, germanicè Weiderich nominatur. Lysimachia uerò ab eius inuentore Lysimacho appellata, aut quia uis tanta herbę, ut iumentis discordantibus imposita iugo, asperitatem cohibeat. Quare à dissoluenda dissidentium pugna, non ineptè Lysimachia uidebitur nominata. Salicaria uerò quod folia salicis, aut quod inter salices nascatur, dicta est.

GENERĀ.

Lysimachię duo esse genera ex Dioscoride & Plinio satis liquet. Plinij enim purpureum florem habet, hinc nos illam purpureā appellauimus, Germanicè *beaur Weiderich*. Dioscoridis uero rufos, hoc est, aureos, ut metipse interpretatur, flores obtinet, ideoq; luteam nominauimus, Germanicè *geel Weiderich*. Et hæc quidem altera magis adstringit, inq; usu medico hoc nomine eidem præferenda.

FORMĀ.

Caules profert cubitales, aut etiam maiores, tenues, fruticosos, quorum à geniculis folia exeunt gracilia, salici similia, gustum adstringentia, flores rufos, aut ad auri colorem declinantes. Ex qua pictura nulli non notum fit, plantas quas pictas damus esse Lysimachias. Caules enim emittunt cubitales, & multo quoque longiores, tenues & fruticosos. Folia etiam habent salicis, cum lentore quodam adstringentia. Flores hæc rufos, illa autem purpureos habet, ut non contemnendus autor est Plinius. His accedit locus natalis, & alia quæ referre non attinet.

LOCVS.

Nascuntur palustribus locis, & prope aquas, potissimū ubi salices proueniunt.

TEMPVS.

D Iunio & Iulio mensibus florent, ac subinde purpurea in siliquis oblongis semen producit, lutea uerò decidentibus floribus, semen exiguum, Coriandro haud dissimile profert, quod gustum non secus atque folia adstringit.

TEMPERAMENTVM.

Superantem adstrictoriam qualitatem, adeoq; exicatoriam uim obtinent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius, cui adstringendi facultas est, ad sanguinis excreationes & dysenterias potus & infusus confert. Sistit & mulierum fluxum appositus. Contra erumpentem è naribus sanguinem herba ipsa utiliter inferitur. Vulneraria etiam est, & sanguinem compescit. Incensa acerrimum habet fumum, ut serpentes quidem abigat, & muscas enecet.

EX GALENO.

Vulnera glutinat, erumpentemq; ex naribus sanguinem emplastri modo illita sistit: quin & reliquas sanguinis eruptiones compescere tum ipsa, tum succus eius multo magis potest. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones ac muliebrem fluxum fanat.

EX PLINIO.

Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Pota uel illita, uel naribus indita, sanguinis profluuium sistit. Vulneribus ijs priuatim quæ calceamento facta sunt contrita & arida infricata efficax est.

DE LAGO-



LYSIMACHIA
PURPUREA.

Rot Heidekraut.



LYSIMACHIA
LUTEA.

Seel Weiderich.

NOMINA.



ΑΓΛΟΝΣ Græcis, Leporinus pes Latinis, Trifolium humile & Tri^{Trinitas.} nitas à tribus folijs herbarijs dicitur. Officinis nostris ignota est herba. Germanis Hasensüß/oder Kagentlec/oder Kägle nominatur. Sic uerò Græci atque Latini hanc herbam appellarunt, quod Lepo^{Lagopus cur dicta.} rino pedi similem paniculam habeat.

FORMA.

A nullo, quod sciam, Lagopus describitur. Herba autem quam pro eo exhibemus, caules habet rotundos, hirsutos, folia Loto trifoliæ quæ in pratis gignitur similia, semen in paniculis muscosis lanuginosisq̄, leporino pedi similibus admodū, adstringentis gustus.

LOCVS.

In segetibus, Plinio etiam auctore, & in hortorum arcis, ut testatur Dioscorides, gignitur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus potissimum apparet.

TEMPERAMENTVM.

Exiccandi facultatem obtinet, Galeno teste, Lagopus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Lagopus herba sistendi aluum cum uino pota. Febrientibus autem cum aqua danda. Alligatur eadem contra inguinum inflammationes.

EX GALENO.

Fluxus alui probè exiccat.


EX PLINIO.

Lagopus sistit aluum è uino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adalligatur in tumore.

APPENDIX.


Ex his omnibus abundè constat, herbam eam quam depictam damus esse Lagopus, siquidem & nomen & forma illi aptissimè respondent. Locus etiam conuenit: nascitur enim copiosissimè in segetibus. Nec temperamentum abhorret, quod illi est adstringentium & exiccans. His omnibus accedunt vires: uulgò enim omnes hac planta in dysenteria, & alui profluuiò utuntur.

494



LAGOPVS

Razentlee.



LARIX

Lärchbaum.

A intertrigini & ambustis medetur, Potus alutum sistit. Vrinam mouet. Suffitu uul-
 uas corrigit, Resina larigna tulsii efficax habetur, polletq̃ contra uiscerum ulcera.

DE MELISSOPHYLLO ▶ CAP ▶ CLXXXIX ▶

NOMINA.



ΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ, ἢ μελίφυλλον Græcis, Apiastrum siue Citra-
 go Latinis, officinis Melissa dicitur. Germanis *Wanzenkraut* / *Wc-* *Melissa.*
lissenkraut / *Donigblum.* Melissophyllum non alio nomine ap- *Melissophyllum*
 pellatum est, nisi quod apes eius folio magnopere delectentur; *unde dictum.*
 neq̃ enim *μελισσόφυλλον* aliud quam apum folium significat. Mel-
 liphyllon uerò, qua uoce Nicander usus est, mellis folium indi-
 cat. Sic itaque nominari cœpit, quod hinc apes mellis materiam colligant. Pari ra-
 tione Latini Apiastrum haud dubiè dixerunt, quod ea herba apes plurimum læ- *Apiastrum.*
 tentur, adeò ut si ea aluearia confricentur perunganturue, detentum in eis examen
 non fugiat. Citraginem autem ab odore Citri; nares enim si consulantur Citrium *Citrage.*
 málum olebit.

GENERA.

Duo sunt ex uulgarium herbariorum sententia Melissophylli genera. Vnum
 uerum; alterum adulterinum, quod Germani *Wanzenkraut* nominant, ut paulò
 pòst dicemus.

FORMA.

Folia & cauliculi ueri Melissophylli, Balloti seu Marrubio nigro similia sunt, ma-
 iora tamen & tenuiora, nec ita hirsuta, citri málì odore. Perperam hodie officinæ
 B pro uera Melissa utuntur herba passim in hortis proueniente, quam Germani, ut
 diximus, quia cimices olere uidetur, *Wanzenkraut* nominant. Fœdus itaq̃ cum
 huius herbæ odor sit, non est cur apes ea delectentur, neq̃ ei florenti insident, sed
 eam potius fugiunt. Contrà illa quam pro uera pictam damus unicè oblectantur,
 quod illius tam gratus odor sit, ut in ædibus strata, eas gratissimo odore compleat.

LOCVS.

Nascitur in syluis uerum, adulterinum autem in hortis.

TEMPVS.

Carpitur æstate, Iunio potissimum mense, quo floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Melissophyllon ex secundo ordine calefacientiũ censetur, desiccatur uerò non æ-
 què, sed ipsum quispiam in hoc primi ordinis esse posuerit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.


Folia cum uino pota aut illita, contra scorpionũ, phalangiorũ, canumq̃ morsus
 profunt. Decoctiũ eorundem, si eo perfundantur, idem potest. In infesionibus ad-
 ducendos menses utile est. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis inie-
 ctum prodest. Fungorũ strangulationibus, folia cum nitro pota succurrunt. Tor-
 minibus auxiliant. Dantur in eclegmate orthopnoicis. Illita cum sale strumas dis-
 cutiunt. Ulcera purgant. Articulares dolores illita mitigant.

EX GALENO.

Melissophyllon Marrubio facultate simile est, sed plurimũ ab eo uincit: quam-
 obrem nec utitur illo quispiam. Superuacaneum siquidem foret præsentem Marru-
 bio, cuius tantus est ubiq̃ terrarum prouentus, uelle uti Melissophyllo. Cæterum
 si cui fortè ad manum quandoq̃ Marrubium non fuerit, illo ad quæcunque uti li-
 cebit, modo quanto ab hoc exuperetur cognitum habuerit.


EX PLINIO.

Melissophyllo siue Melittæna si perungantur aluearia, non fugient apes: nullo



MELISSOPHYLLUM
VERUM.

Steliffen.



MELISSOPHYLLVM
ADLTERINVM.

Wantsenkraut.

C enim magis gaudent flore. Copia istius examina facillimè continentur. Idem præsentissimum est contra ictus earum uesparumq; & araneorum, item scorpionum, remedium. Item contra uuluarum strangulationes addito nitro. Contra tormina è uiuo. Folia eius strumis illinuntur, & sedis uitij cum sale decocta. Succus fœminas purgat, & inflationes discutit, & ulcera sanat. Articularios morbos sedat, canisq; morsus. Prodest dysentericis ueteribus, & coeliacis, orthopnoicis, lienibus, ulceribus thoracis. Caligines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur.

EX SYMEONE SETHI.

Ad stomachi ex frigidityte morsus, & à nigra bile tristitia & timores qui sine ratione ex illa fiunt, confert. Hilaritatem efficit, & ad melancholicū ac pituitosum humorem prodest. Fertur quod industriam afferat, & quod ante somnum sumptum, bona somnia faciat, contraria ratione cum Brassica, quæ mala insomnia affert. Bones lædit.

DE MARATHRO CAP. CXC.

NOMINA.

Marathrum cur
appellatum.

Fœniculum.



ΑΡΑΘΡΟΝ græcè, Fœniculum latinè, officinæ antiquum & latinum nomen retinuerunt, Germanicè Fenchel dicitur. Marathrum Græcis dictum putant à marcescendo, quod ad cōdienda plurima cum inaruerit cōmendatissimum sit. Fœniculum autem dici existimant, quod factum magno cum scenore semen reddat.

FORMA.

D Fœniculum ferulacei generis est, hominisq; plerunq; proceritatem superat, caule geniculato, fungosa intus medulla, leui exterius cortice & herbaceo, folia Abrotini, sed longiore molliori, iucundo odore, umbella rotunda, ampla, lutea, in orbem radiatim circinato, in qua semen nudum dependet, radice candida, longa & odorata.

LOCVS.

Parsim in hortis satum prouenit, Sua etiam sponte interdum ceu Anethum nascitur.

TEMPVS.


Colligitur caule turgescente. Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Fœniculum tam ualenter excalfacit, ut ex tertio ordine excalefacientium censeripot possit. Exiccat uerò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat, quod, si admodum desiccaret, non sanè efficeret.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fœniculi herba comesta mammas lacte replet. Idem potest semē potum, aut decoctum cum ptisana. Comæ decoctum subditum impositumue, renum & uesicæ uitij utile: quippe quod urinam ciere potest. Contra serpentium ictus in uiuo potum prodest. Menses ducit. In febribus nauseam, & stomachi ardorem ex aqua frigida potum, sedat. Radices contritæ & cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caulibus & folijs expressis in sole siccatus, medicamentis quæ ad excitandam oculorum aciem cōficiuntur, utiliter adijcitur. Extrahitur etiam succus ex semine uiridi, folijs, ramulisq; ad eadem utilis. Radix in prima germinatione exprimitur. In occidentali Iberia liquorem gummi similem reddit. Caulem medium dum herba floret incolæ demetunt, igniq; admouent, quo facilius uī caloris exudans gummi remittat. Hoc efficacius succo est ad medicamenta oculorum.



FOENICVLVM

Fenchel.

C

EX GALENO.

Fœniculum lac procreat. Suffusis auxiliatur. Vrinas mensesq̄ cit. In condimentis assiduus Anethi usus, Fœniculi uerò & in obsonijs. Apud nos in hoc reponunt, non secus ac Pyrethrum & Terebinthum condientes, ut in totum annum usui sit, quemadmodum & cepas & rapas & alia huiusmodi quædam in solo aceto, alia in oxhalme asseruantes.

EX PLINIO.

Ad scorpionum ictus & serpentium, semine in uino potu ualet. Succus & auribus instillatur, uermiculosq̄ in his necat. Id ipsum condimentis propè omnibus inferitur. Oxyporis etiam aptissimè. Quin & crustis subditur panis. Semen stomachum dissolutum adstringit. Nauseam ex aqua tritum sedat. Pulmonibus & iecinoribus laudatissimum. Ventrem sistit cum modicè sumitur, urinam excitat, & tormina mitigat decoctum, lactisq̄ defectu potum mammas replet. Radix cum pitana pota renes purgat, siue decocto succo, siue semine sumpto. Prodest & hydropticis radix ex uino cocta: item conuulsis. Illinuntur folia tumoribus ardentibus ex aceto. Calculos uesicæ pellunt. Genituræ abundantiam quoquo modo haustum facit. Verendis amicissimum, siue ad fouendum radice cum uino cocta, siue contrita in oleo illitum. Multi tumoribus & fugillatis cum cera illinunt. Et radice in succo uel cum melle contra canis morsum utuntur. Et contra multipedè ex uino.

EX SYMEONE SETHI.

Lac procreat, & suffusis remedio est. Vrinam cit, & menses ducit.

DE MELANTHIO ▷ CAP ▷ CXCI ▷

D

NOMINA.

Nigella.

Melanthion un-
de dictum.

EA ANΘION Græcis, Papauer nigrum, Nigella & Gith Latinis dicitur. Officinæ omnes Nigellam appellant. Melanthion autem & Nigella, à nigro feminis colore hæc herba haud dubiè dicta est.

G E N E R A.

Esti apud Dioscoridem aliosq̄ ueteres una duntaxat Nigellæ species reperitur, nobis tamen domesticas & hortenses tres uidere contigit, quarum duæ quidem habent semina nigra, tertia uerò subflauum. Inter eas quæ habent semina nigra, primâ schwarz Komnich germanicè appellauimus, alteram autem schwarz Coriander / quod folia eius Coriandri folijs non dissimilia sint. Tertia, quod ad folia & flores attinet, primæ per omnia similis est, in semine tantum quod flauescit, ut diximus, diuersa. Herbarij huius temporis Nigellam citrinam nominant. Præter has tres iam cōmemoratas est quarta, quæ syluestris Nigella dicitur, quod scilicet sua sponte in aruis nascatur. Germanis wild schwarzer Coriander nominatur. Videtur autem esse potius tertium genus Cumini syluestris.

F O R M A.

Melanthion.

Melanthion frutex est pusillus, ramulis tenuibus, altitudiue palmorum duorum uel amplior, folijs paruis Senetionis herbæ similibus, multo tamen exilioribus, capitulo in cacumine, exiguo ceu Papaueris, oblongo, intercurfantibus internè distinctionibus loculosis quinque aut sex, in summitate extrinsecus corniculatis, quibus semen nigrum, acre, odoratum includitur. Syluestre alteri hortensi ferè simile est, folia siquidem anethi habet, flores primo similes, nisi quod colore sint elegantiores. Capitulum planè Aquileiæ respondet, atque in se semina nigra & odorata continet.


L O C V S.




MELANTHIVM HOR
TENSE PRIMVM.

SchwarzKommich.

504



NIGELLA HORTENSIS
ALTERA.
Schwarz Coriander.



MELANTHINUM
SYLVESTRE.

Wilder schwarzer Coriander.

C

L O C V S.

Melanthion domesticum non nisi in hortis satum prouenit. Syluestre autem, ut dictum est, in agris sua sponte prouenit.

T E M P V S.

Melanthion floret Iunio mense, Iulio autem & Augusto femine pragnans est.

T E M P E R A M E N T V M.

Melanthium excalefacit atque desiccatur tertio ordine.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Capitis doloribus illitum fronti Melanthiū, & incipientibus suffusionibus cum irino tritum & naribus infusum prodest. Tollit lentigines, lepras, oedemata uetusta, duritiesq; cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum uetere uino impositum. Dentium doloribus cum aceto & teda decoctum, si eo colluantur, succurrit. Rotundos uentris lumbricos expellit, ex aqua umbilico illitum. Tritum autem & in linteo colligatum & olfactum, destillatione laborantes adiuuat. Pluribus diebus potum, urinam, menses & lac prouocat. Difficultatem spirandi cum uino potum finit. Phalangiorum moribus drachmæ pondere cum aqua haustum auxiliatur. Suffitu serpentes fugantur. Tradunt largius eptum enecare.

E X G A L E N O.


Tenuium est partium Melanthium, unde destillationes sanat calidum in linteo admotum, atque assiduò olfactum. Quinetiam si intrò in corpus sumatur, uel maximè flatus extinguit. Hinc constat essentiae ipsam esse tenuis, & ad unguem à caliditate elaboratae. Propterea sanè etiam amarum est. Itaque mirum non est si lumbricos interimat non esum modo, sed etiam foris impositum. Neque sanè etiam mirandum si lepras, clauos, myrmecias eijciat. Sic uerò etiam orthopnceam iuuat, & menses prouocat, qui ob crassitiem aut uiscedinem retenti fuerint. In summa, ubi incisione, extersione, desiccatione, excalefactione est opus, praestantissimum id remedium est.

E X P L I N I O.

Melanthion medetur serpentium plagis & scorpionum. Illini ex aceto & melle reperio, incensoq; serpentes fugari. Bibitur drachma contra araneos. Destillationem narium discutit tusum in linteolo olfactum. Capitis dolores illitum ex aceto, & infusum naribus mitigat. Cum irino oculorū epiphoras & tumores lenit. Dentium dolores coctum cum aceto. Ulcera oris tritum & cōmanducatum. Lepras & lentigines ex aceto tritum emendat. Difficultates spirandi addito uino potum. Duritias tumoresq; ueteres & suppurationes illitum. Lac mulierum auget continuis diebus sumptum. Colligitur succus ut Hyoscyami. Oculos purgat, urinam & menstrua ciet. Similiter largius uenenum est, quod miremur, cum semen gratisimè panes etiam condiat. Quinimo linteolo alligatis tantum granis triginta, secundas tra hi reperio. Aiunt & clauis in pedibus mederi tritum in urina. Culices suffitu necare; item muscas.


E X S Y M E O N E S E T H I.

Est tenuium partium, lumbricos in uentre necat, flatus discutit, pituitamq; incidit. Ad orthopnceas & defluxus capitis facit odoratum, praesertim postquam calefactum fuerit. Dicitur uerò quod si teratur, & cum aceto uentri imponatur, etiam sic lumbricos necare. Et si cum melle fermentetur, & calida aqua hauriatur, calculos in renibus & uesica minuit, urinam ciet, menses ducit, & ueluti remedium contra uenena est, si quis ipsum ieiunus assumat.



MALVA
HORTENSIS.

Emrosen.



MALVA SYLVE
STRIS PVMILA.

Gesspappel.



MALVA SYLVESTRIS
ELATIOR.

Rosspappel.

C

NOMINA.

Malus quare
dicta.
μαλῶσιον.



ΑΛΑΧΗ græcè, Malua latinè, officinis latinum nomen retinuit, Germanicè Pappel dicitur. Malua autem Græcis ab emollienda aluo nomen traxit: μαλῶσιον enim mollire significat. Quinetiam Latinis Varro Maluam quasi moluam, quod aluum molliat, dictam esse contendit.

Antiqui enim ea utebantur in acetarijs cum Lactuca ad subducendam aluum, Vnde de Martialis libro decimo ait:

Exoneraturas uentrem mihi uillica maluas

Attulit, & uarias quas habet hortus opes.

G E N E R A.

Maluarū genera esse duo Dioscorides & Galenus tradunt. Vna enim hortensis, altera syluestris Malua dicitur. Hortensis, quæ in hortis sata prouenit, Germanis *Malua*. *Römische Pappel* / uel *Fennroß* / quod scilicet mēsis tempore floreant, uel *Herbstroß* nominatur. Huius iterum uaria sunt genera: alia siquidem rosas purpureas, & has uel simplici uel multiplici foliorū textura constantes, ut pictura monstrat: alia candidas & iterum foliorū textura differentes producit. Nos una pictura quatuor *Syluestris*. hæc hortensis Maluæ genera complexi sumus. Syluestris non quæ in syluis, aut asperis locis, sed quæ in incultis locis sua sponte nascitur, intelligi debet: id quod *ἄσποδια*, græca uox *ἄσποδια*, qua Dioscorides utitur, maximè docet. Hæc enim Græcis incultam & inelaboratā terram significat, qualis in semitis, pratis, alijsq; huiuscemodi ruris & agri partibus est. Erratica hæc seu syluestris Malua itidem in duas distribuitur species: quædam enim pumila est, & humi serpens, hanc Germani *Genßpappel* / *Râß* oder *Nasenspappel* uocant. Quædam altius attollitur, & ferè arborescit, hanc germanicè *Rößpappel* nominant.

D

F O R M A.

Hortensis. Hortensis Malua grandescit in arborem, eiusq; scapus tanta magnitudine proficit, ut baculi usum præbeat. Folia huic ampla, circinata rotunditatis, multis in ambitu segmentis, Caudex simplex, luxuriosæ proceritatis attollitur, à medio ferè ad uerticem pulcherrimis floribus decoratus, breui admodum pediculo dependentibus, qui uenustate rosas non cedunt, & si suppeteret odor, de principatu certarent. Colore constant purpureo, uermiculatoue & candido. Capitula quædam breuibus innixa petiolis, & leuiter in mucronem fastigiata primùm è caule prosiliunt, ipsæ paulatim intumescuntibus, prægnantia florū inuolucra fatiscunt, in quibus dehiscentes rosæ sese pandunt, & explicant in folia quinq; interdum structili quadam serie, ut diximus, numerosa, calycibus apices paucos cōplexis, qui lutei medijs emicant, quibus decidentibus erumpunt purpurea stamina. His factus succrescit multipliciter tunicatus, atq; in umbilici formam numerofo semine coagmentatus, in quibus cum decussa sunt folia, reliquarum Maluarū modo semina recluduntur. *Syluestris pumila*. syluestris pumila & humi repens, folio rotundo, pingui, & in ambitu serrato constat: caule magno, floribus ex candido purpurascens, radice candida. *Syluestris procerior*. syluestris procerior, altior folio magis laciniato nascitur, floribus ex cœruleo purpureis, radice candida.

L O C V S.

Hortensis in hortis sata prouenit. Syluestris autem locis incultis, pinguibus potissimum, & humidis.

T E M P V S.

Hortensis floret Iulio & Augusto præsertim mensibus: neque enim flos is ut rosa fugax est, sed diu uigor uitaq; durat. Syluestris pumila per totam æstatem, & in maximam autumnii partem durat. Arborecens autem Iunio & Iulio mensibus, floribus quammaximè abundat.

T E M P E R A.

TEMPERAMENTVM.

Malua syluestris digerentis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis uerò quanto plus habet aquæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto & siccior. Inter Lactucā, Betam & Maluam id est discriminis, nempe quod sicciora sint syluestria, satiuia humidiora. Permissū est Maluæ succo aliquid glutinosum, quo Lactuca caret. A refrigerādi facultate manifestè abest, ut ante sumptionē cernere licet, si ex ambobus particulatim oleribus, quemadmodū faciūtare homines consueuerunt, cataplasma ad calidum quempiam affectum, qualis est erysipelas, componas, molliuscula folia diligenter tundens donec ad leuorem redacta sint exactissimum. Tum nanque cognosces Lactucam manifestè refrigerare, Maluam uerò modicum, & quasi tepidum quendam calorem obtinere. Facile hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidum est, sed etiam quia glutinosum. Si horum trium olerum succos inter se compares, tenuis & absterforius Betæ, crassior glutinosiorq; Maluæ, in utriusq; medio Lactucæ statuetur. Hæc Galenus lib. ij. de alimentorū facultatibus.

Syluestria satiuia sicciora.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Esui aptior hortensis multò quàm syluestris. Stomacho noxia, aluum bonam efficit, præsertim caules, intestinis & uesicæ utiles. Folia cruda illita, & cum modico sale addito melle cōmanducata, egilopas sanant. Verum in inducenda cicatrice, ea sine sale utendum est. Contra apum uesparumq; ictus illita prodest. Et si cruda tritaq; cum oleo antea se inunxerit aliquis, non feritur. Achoras, furfuresq; cum urina illita sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia tritaq; utiliter cum oleo imponuntur. Eius decoctum uuluas in fessione mollit. Prodest erosionibus intestinorum, uulua sedisq; clystere infusum. Jus decoctæ cum radice sua omnibus letalibus uenenis auxiliatur, si continuò à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac proritat. Semen eius admixto Loti syluestris semine potum cum uino uesicæ dolores lenit.

EX PLINIO.

Maluæ contra omnes aculeatos ictus efficacior uis, præcipuè scorpionū, uesparum similiūq; & muris aranei. Quin & trita cum oleo qualibet earum peruncti antè, uel habentes eas non feruntur. Folium impositum scorpionibus torporem affert. Valent contra uenena. Aculeos omnes extrahunt illitæ crudæ, aut cum tanetho potæ. Decoctæ uerò cum radice sua, leporis marini uenena restringunt: & ut quidam dicunt, si uomatur. De eisdem mira & alia traduntur, sed maxime, si quotidie quis succi ex qualibet earum sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Ulcera manantia in capite sanant, in urina putrefactæ lichenas, & ulcera oris cum melle. Radix decocta furfures capitis & dentium mobilitates. Eius quæ unum caulem habet, radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas & parotidas panósque, addita hominis saliuia, purgat citra uulnus. Semen in uino nigro potum, à pituitis & nauiseis liberat. Radix mammarum uitijis occurrit, adalligata in lana nigra. Tusim in lacte cocta, & forbitionis modo sumpta, quin diebus emendat. Stomacho inutiles Sextus Niger dicit. Olympias Thebana, abortiuas esse cum adipe anseris. Aliqui purgari feminas, folijs earum manus plenæ mensura, in oleo & uino sumptis. Vtique constat parturientes substratis folijs celerius solui, protinus à partu reuocanda, ne uulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in uino decocta hemina. Quin & semen tritum adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoque eæ Veneri nascuntur, ut semen unicalis aspersum genitali, feminarum auiditates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta

† diu aceto.

C adalligatas, tenasmo & dysentericis utilissimè infundi. Item sedis uitijis, uel si fo-
ueantur; Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & infanienti-
bus quaternis. Decoctæ comitialibus heminae succi. Hic & calculosis, & inflatione,
& torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus
& ambustis decoctæ in oleum folia imponuntur, & ad uulnerum impetus cruda
cum pane, Succus decoctæ neruis prodest, & uesicæ, & intestinorum rosionibus.
Vulvas & cibo & infusione mollit in oleo. Succus decoctæ pori meatus suaues facit.

EX SYMEONE SETHI.

Ventriculum facillè subit, non solum propter humiditatem, uerum etiã glutino-
sitate, atq; inprimis si cum oleo & garo offeratur, uino quo editur tempore irro-
rata. Vesicam, thoracè, pulmonemq; iuuat, & raucam uocem lenit. Syluestris mala-
ua, ut ferunt, comesta, dolores ex uesparũ morfu tollit. Si quis morsus à uespis aut
apibus, succo Maluæ, præsertim syluestris, perungatur, confestim dolore leuatur.
Dicitur etiam quod huius decoctum potum, lapides conterit, somnum conciliat,
facilemq; partum præstat, si mulier ea crebrius utatur. Illita inflammationes lenit,
eaq; quæ indurata sunt emollit. Illud Maluæ peculiare est, ut imposta ictibus ue-
sparum & apum, dolores leuet.

DE MYRICE CAP. CXCIII.

NOMINA.

Tamariscus.



ΜΥΡΙΧ Græcis, Myrice & Tamarix Latinis, officinis Tamariscus, Ger-
manis Tamariscè & Porsè nominatur.

GENERA.

D Dioscorides duo Tamaricis genera facit. Vna enim syluestris est,
qualis est ea quæ in plerisq; Germaniæ locis prouenit, quamq; hic pictam damus.
Altera satia, quæ priori in cæteris similis est, nisi quod fructifera est, & minimè, ut
illa, sterilis.

FORMA.

Syluestris arbutum frutæue humilis est, ramis ex herbaceo fuluocq; colore ua-
riegatis, folijs Sabinae aut Ericæ, flore muscoso, qui demum in pappos euolat. Sa-
tia cætera similis est syluestri, fructum tamen gallæ non dissimilem profert, qui
gustu inæqualiter adstringit.

LOCVS.

Proxime paludes, residues stagnantesq; aquas nascit. Syluestrisq; copiosa in Ger-
mania ad Rhenum & Isarum, in signes fluuios, prouenit. Satia in Syria & Ægy-
pto, ubi procerissimas æquat arbores, gignitur.

TEMPVS.


Perpetua coma frondet.

TEMPERAMENTVM.

Myrice abstergentis est ac incidentis facultatis, absq; perspicua desiccatione; ha-
bet uerò etiã adstrictionē nonnullam. Cæterum fructus & cortex non paucam
fortita est adstrictionē, adeò ut gallæ omphacitidi seu immaturæ proxima sint, nisi
quod acerbitas euidentis est in galla, sed Myricæ fructui temperatura inest inæqua-
lis: immista est enim naturæ eius multa partium tenuitas, atque uis abstergendi,
quod sanè gallæ haud inest. Porrò Myricæ combustæ cinis admodum delicato-
riæ facultatis est, plurimam abstergendi facultatem habens, pauxillam adstrin-
gendi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fructu uice gallæ in oris oculorumq; medicaminibus utuntur. Cruentis sputis in
potu



TAMARIX

Tamarisck.

C potu, cœliaci, fœminarũ fluxionibus, morbo regio, & phalangiorũ moribus prodest. Oedemata illitus reprimat. Cortex eadem quæ fructus potest. Decoctum foliorum cum uino potum, lienem minuit. Ad dolorem dentium in collutionibus salutare est, & mulierum fluxionibus in defœsionibus. Apud his in quibus pediculi & lentes abundant circumfunditur. Cinis lignorum eius appositus profluuiũ ex utero suppressit. E trunco eius nonnulli potorios calices fabricant, quibus in lienem

Calices potorios
ex trunco tasis
maricis.

EX GALENO.

Myrice prodest admodũ lieni indurato, decoctis cum aceto aut uino radicibus, siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat uerò etiam dentium dolores.

EX PLINIO.

Lenæus sanari ea carcinomata in uino decocta tritaq; cum melle dicit. Ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in uino bibatur. Adeoq; mirabilem eius antipathiam cõtra solum hoc uiscerum faciunt, ut affirmat, si ex ea alueis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini quoque splenetico cibum potumq; dant in uasis ex ea factis. Lignum & flos & folia & cortex in eisdem usus adhibent, quam remissiora. Datur sanguinem reijcientibus cortex tritus, & contra profluvia fœminarum, cœliaci quoq;. Idem tufus impositusq; collectiones omnes inhiat. Folijs exprimitur succus. Ad hæc eadem & in uino decoquantur: ipsa uerò adiecto melle gangrenis illinuntur. Decoctum eorum in uino potum, uel impositum cum rosaceo & cera sedat. Sic & epinyctidas sanant. Ad dentium dolorem auriumq;, decoctum eorum salutare est. Radix ad eadem, similiter & folia. Hæc amplius ad ea quæ serpunt imponuntur cum polenta. Semen drachmæ pondere aduersus phalangia & araneos bibitur. Cum altilium uerò pingui furunculis imponitur. Efficax & contra serpentium ictus, præterquam aspidum. Nec non morbo regio, phthiria, si, lentesq; decoctum infusum prodest, abundantiamq; mulierum sistit. Cinis arboris ad omnia eadem prodest.

DE MECONE RHOEADE ▶ CAP ▶ CXCIIM ▶

NOMINA.

Papauer rubeũ.




ΗΚΩΝ ροιὰς Græcis, Papauer rhœas, hoc est, fluidum aut erraticum Latinis, Papauer rubeum officinis & herbarijs, Germanis à strepitu quem ludentes pueri harum folijs concauo pugno impositis, altera palma incussa ædunt, *Klapperrosen* / quasi dicas crepitaculares rosas, & *Rhœas unde dicitur Glitschen / & wild Waen / ac Kornrosen* appellant. Rhœas autem à flore, qui ei protinus decidit, dictum est.

Rhœas unde dicitur
flum.

FORMA.

Folia Erucae, aut Cichorio similia, & incisa habet, longiora tamen & aspera. Caulis lanuginosus, rectus, asperus, cubitalem. Florem puniceum, & aliquando candidum, similem syluestris Anemones flori. Caput oblongum, minus tamen quàm Anemones. Semen rufum. Radicem oblongam, subalbam, minoris digiti crassitudine, amaram. Ex qua deliniatione omnibus perspicuũ sit, herbam quam Papauer rubeum hodie uulgò nominant, esse Rhœada, quod sit folio Erucae, laciniato, scabro, & longiore: caule lanuginoso, recto, aspero, cubitali: flore syluestris Anemones puniceo, nonnunquã albo, oblongo capite: semine rufo, radice longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Errant itaque qui Anemonem esse arbitrantur, quod folia eius, quæ Coriandri sunt, euidentissimè reclamant. Nos Rhœadis utriusque picturas damus, Vnius, atque adeo primi, quod Erucae folia habet, alterius quod Cichorij.

Papauer rubeũ
nõ est Anemone.



PAPAVER ER
RATICVM PRIMVM.

Klappersosen.



PAPAVER ERRATI
GVM ALTERVM.

Roinrosen.

LOCVS.

Nascitur in aruis & segetibus passim.

TEMPVS.

Vere & æstate dum frumenta messem appetunt, floret; quo etiam tempore decipitur.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat, ut alia genera Papaueris.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius Papaueris quinque sexue capita cum tribus vini cyathis decocta donec ad duas reducantur, potui dabis quibus somnum accersere uolueris. Semen acetabuli mensura cum aqua multa potum, aluum leniter emollit. Ad idem præstandum mellitis & dulciarijs immiscetur. Folia cum calycibus illita inflammationes sanant. Eorundem perfusione & fotu somnus allicitur.

EX GALENO.

Papauer quoddam Rheas nuncupatur, quod scilicet celeriter flos eius defluat. Huius semen ualidius refrigerat, ita ut nequaquam eo quis innoxie solo uti possit, ueluti satiuo melli admiscens. Admodum uero ita sumptum somnum conciliat. Sed & pusillum eius inspergunt ijs quæ ex melle conficiuntur bellarijs, placentis & panibus.

EX PLINIO.

Aluum exinaniunt capita quinq; decocta in uini tribus heminis: pota somnum faciunt.

EX RECENTIORIBVS.

Sacro igni medetur. Mulierum menstrua profluua compescit. Sanguinem è naribus fluentem iecori impositum sistit. Lingua ex decocto eius lota, ardorem faucium sanat. Pudendorum tumores detumescere facit. Temporibus illitum, phreneticis somnum conciliat. Calidos oculorum dolores linteo impositum mitigat. Unde rursus omnibus liquet, Papauer hoc rubrum non esse Anemonem, quod scilicet hæc ipsa contrarias planè facultates obtineat.

DE MECONE SATIVO CAP. CXCV.

NOMINA.

M H K O N *μωρ* græcè, Papauer satiuum latinè dicitur. Officinæ antiquum nomen retinuerunt. Germanicè *Wassfomen* oder *Wân* uocatur. Dictum autem Græcis *μικρον ἀμνονειον*, hoc est, non ministrando, quod

Meccon quare appellatur.

GENERA.

Satiui Papaueris duplex genus, album uidelicet, cuius flos & semen candidum: & nigrum, quod semine nigro constat. Nos utrunque genus una pictura complexi sumus.

FORMA.

Folij constat longis, per ambitum serratis, nulloque pediculo caulii adherentibus: floribus uel candidis, uel ex candido leniter purpureis: capitibus oblongis, in quibus semen atrum uel candidum.

LOCVS.

Passim in hortis satum prouenit.

TEMPVS.

Æstate floret, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat, sicut omnia alia Papaueris genera, in quarto ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Comunis ipsis refrigerandi uis est: proinde folia & capita in aqua decocta fotu

x somnum



PAPAVER
SATIVVM.

Wagfomen.

A somnum accerfunt. Bibitur & decoctum contra uigilias. Capita trita & cum polenta cataplasmatibus mixta, ignibus sacris & inflammationibus profunt. Oportet autem uiridia ipsa tundere, & in pastillos conformare, sicatosque reponere ac uti. Capita per se etiam ad dimidias in aqua decocta, dein iterum cum melle dum humor densetur crassefatque decocta, elegma medicamentum efficiunt, dolorem mitigans in tussi, fluxionibus arteria & coeliacis affectionibus. Efficacius redditur adiecto Hypocistidis succo & Acacia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra fluxiones alui & fecminarum profluua. In peruigilijs fronti temporibusque cum aqua illinitur. Eiusdem liquor plus refrigerat, inspissat, siccaturque. Erui quantitate sumptus dolorem leuat, somnum conciliat & concoquit. Tussi atque coeliacis affectibus auxiliatur. Maiori autem copia hauustus nocet, lethargicos efficiens, & interimit. Ad dolores capitis cum rosaceo perfusus facit. Aures dolentibus cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. In oculorum inflammationibus cum tosto oui luteo & croco. Igni sacro & uulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulieris & croco sedi pro balano subditus, somnum allicit.

EX GALENO.

Satiui Papaueris semen panibus utiliter ceu dulciarium inspergitur, non secus ac Sesamum. Candidius nigriore praestat, uimque refrigerandi habet, ideoque somnificum est. Si uero liberalius sumatur, soporem etiam inducet, acreque concoquetur. Tussim praeterea ex thorace & pulmone compescit. Confert aduersus tenues ex capite destillationes. Corpori nullum notatu dignum exhibet nutrimentum.


EX PLINIO.

Candidi semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos edebatur. Calyx ipse teritur & bibitur somni causa. Semen elephantis medetur. E nigro Papauere lacteus succus scapo inciso exprimitur, qui densatur, & in pastillos tritus in umbra siccatur, non ui soporifera modo, uerum si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum: opion uocant. Semine eius trito in pastillos, e lacte utuntur ad somnum. Item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum his aurium dolori instillatur. Podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic & folijs ipsis utuntur ad sacros ignes. Item uulnera cum aceto. Ego tamen damnauerim collyrijs addi, multoque magis quas uocant lexypretas, quasque pepticas & coeliacas. Nigrum tamen coeliacis in uino datur.

EX SYMEONE SETHI.

Melius est album quam nigrum. Somnificam uim habet, & difficilis est concoctionis, parumque nutrit. Si autem cum melle edatur, semini genitali adijcit. Prodest & thoraci, & asperae arteriae, ac tussi. Ventrem sistit, etsi quidam falso putauerunt ipsum mouere, cum contrariam habeat uim. Laedit caput, si copiosius sumatur, idemque aggrauat. Sunt qui ipsum conterunt, & uigilantiu fronti imponunt, in hoc ut somnum conciliet. Caeterum nigrum Papauer frigidius est, & magis somniferum, adeo ut si quis eo immodice utatur, somno profundo similiter lethargicis capiatur.

Cum rosaceo impositum capiti, eiusdem dolores a calore ortos sanat. Dicitur etiam quod illitum cum lacte muliebri & croco, podagricos iuuat, Huius lachryma uenenum est. Nigri autem succus est uocatum opium.



PAPAVER
CORNICULATVM.

Gelb ölmagen.

NOMINA.



ΜΗΚΩΝ *κορατίνης* Græcis, Papauer corniculatum Latinis, officinis Papauer cornutum, Germanis Gelb Smetagen appellatur. Corniculatum à fructu, quem producit, cornu modo inflexo nominatum est.

FORMA.

Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, per ambitū Papaueris syluestris modo ferrata: caulem etiam similem, florem luteum pallidū mæ, fructum paruum ut cornu inflexum, scœnigræci corniculo similem, unde & nomen inuenit. Semen pusillum, nigrum quale Papaueris. Radicem in superficie terræ herentem, nigram, crassam.

LOCVS.

Dioscorides in maritimis & asperis locis prouenire ait. In Germania tamen òstra non nisi fatum fuerit nascitur.

TEMPVS.

Iunio floret mense. Semen autem circa messes legitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse, facultates eius, & in gustu nitrositas, satis ostendunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix ad dimidias cocta in aqua & pota, ischiadas, & iccinoris affectus sanare potest. His etiam qui crassas & araneosas faciunt urinas prodest. Semē acetabuli mensura cum aqua mulsa potum, aluum leniter purgat. Folia præterea floresq; cum oleo illita crustas emarginant. Eadem inuncta iumentorum argema ac nubeculas emendant.

EX GALENO.

Papauer corniculatū nominatum quidem est à fructu leuem inuersionē habente, ueluti & scœnum græcū, ut bouis cornu simile esse uideatur. Vim habet incidendi & abstergendi. Proinde radix herbæ in aqua decocta ad dimidium, iccinoris affectus adiuuat. Folia & flores, sordida admodum & maligna ulcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet ulceribus iam purgatis: ad eò enim abstergere ualent, ut & puræ quoque carnis non nihil eliquent. Hoc facultatum robore non sordes duntaxat, sed & crustam ulceribus detrahât.

EX PLINIO.

Semen aluum purgat dimidio acetabulo in mulso. Folia trita cum oleo, argemas iumentorū sanant. Radix acetabuli mensura cocta in duobus sextarijs ad dimidias, datur ad lumborum uitia & iccinoris. Carbunculis medentur ex melle folia.

DE MORO CAP CXCVII

NOMINA.




ΜΟΡΕΑ, ἢ *συνημνία* Græcis, Morus Latinis, officinis & uulgaribus herbarijs Morus celsi, Germanis Maulberbaum appellatur.

Morus celsi.

FORMA.

Morus arbor notior est quàm ut describi desideret. Folia autem rotunda ferè habet, nisi quod in summo sint acuminata, in extremitatib. ferrata, & ad Mentha hortensis primi & secundi generis folia accedentia. Flores lanugineos, fructum statim ab ortu candidum, cum pubescit rubrum, ubi maturuit atrum. Non est certè silentio transeundum, quod Mori folijs quadraginta ferè diebus à Vergiliarum exortu usq; ad solstitiū paschi uermiculi, qui *σῆψος* Græcis, Latinis bombyces ac Seres nominantur, sericeū uellus, quo turget uterus, pedibus explicantes conficiunt: nulla enim in re alia natura sagacior deprehendit, nec ars aliquid ab ijs accipisse uidebitur, in quo ingeniosus laborauerit, si tam multas dum id uellus perfici-

Seres uermiculi unde nutriantur, & eorundem miranda mactamorphosis.



MORVS

Maulberbaum.

A tur naturæ mutationes, & artis dum ad uitæ usum disponitur labores æstimeris. Appetente siquidem uere oua, piscium ouis haud dissimilia, linteolo chartæ ue ad hærescentia, quæ proximo autumno produxerunt, radijs solis exponuntur, aut calido in loco, hypocausto nimirum, seruantur. Quo fit ut uermiculi excludantur exigui, qui mox Mori folijs nutriuntur, quoad grandiores facti fuerint: tum statim penulæ cuiq; chartaceæ, uel potius inuolucra conficiuntur, quibus inclusi mirabili naturæ opere lanitio sese inuoluunt, ac congesto glomeri se condentes, postquam suum nendi obierunt munus emoriuntur, adeò ut semestris tantum illis apud nos uita sit. Mortuis testacea subinde tunica inducitur, qua aliquot diebus obducti reuiuiscunt, ac ascitis sibi alis in uolucres papiliones degenerant, qui assidue inuicem insidentes coeuntesq; tandem relictis ouis milij forma & colore, quibus sua rediuiua proles sequente anno renascitur, iterum moriuntur, atque adeo cum nullius præterea sint usus abijciuntur. Oua autem ad ueris usq; initia seruantur. Hanc mirificam metamorphosin quam non raro summa cum admiratione ac delectatione sum contemplatus, non potui non commemorare, quò studiosis uermiculorum istorum qui Mori folijs pascuntur natura prorsus perspecta esset.

LOCVS.

Nascitur in hortis quibusdam, Amat autem in primis loca calida sabulosaq;. Gaudet folsione & stercore.

TEMPVS.

Nouissima urbanarum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Proinde cum hanc germinare uiderimus, frigus minimè timendum erit.

Morus sapientissima arborum.

TEMPERAMENTVM.

B Immaturus Mori fructus ubi exaruerit admodum adstringit. Maturus autem mediocriter adstringit. Cortex radicis arboris amaritudinis cuiusdam & purgantis facultatis particeps est. Folia & germina quodammodo media temperie inter adstrictionem & purgatoriam facultatem sunt prædita.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Mori fructus aluum soluit. Facile corrumpitur. Stomacho inimicus est. Præstat hoc idem eius succus. Decoctus autem æreo uase, aut insolatus, magis adstringit. Admixto mellis exiguo, ad fluxiones, nomas & tonsillarum inflammationes facit. Augetur uis eius adiecto scissili alumine, galla, croco & myrrha, item tamaricis semine, iride & thure. Mora uerò immatura sicca tusaq;, Rhois uice obsonijs miscent, & cæliacos iuuant. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum soluit. Latos uentris lumbricos expellit: ijs quoq; auxiliæ qui aconitum hauserunt. Folia trita & cum oleo illita, ambustis igne medentur. Decocta in aqua cælesti cum uitis & nigræ fici folijs capillos tingunt. Succus foliorum cyathi mensura potus, phalangiorum morsibus auxiliatur. Corticis & foliorum decocto colluuntur utiliter in dolore dentes. Colligitur per messem succus, circumfossa & secta radice arboris: inuenitur enim postridie concretus, qui in dolore dentium utilis est. Tubercula discutit, & aluum purgat.

EX GALENO.

Mori fructus maturus uentrem quidem subducit: immaturus arefactus medicamentum fit satis constringens, adeò ut ad dysenterias & cæliacos affectus, aliosq; omnes qui ex fluxionum sunt genere efficax sit. Contunditur autem & obsonijs miscetur, ueluti Rhois fructus: aut si cui ita uideatur, ex aqua aut uino bibitur. Porro quod maturorum succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam uidelicet quæ inest illi adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia complura particularia, quæ mediocrem poscunt adstrictionem, competit. At immatura præter acerbicatem aciditate etiam participant. Tota quoq; arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam obtinere facultatem ex constringente & purgante compositam uidetur. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeò ut & latum

Cilumbricum interficiat. In alijs autem partibus constringens uincit. In folijs tamen & germinibus media quodammodo cōprimētis & subducentis facultas est. Cæterum Mora ubi in uentriculum purum, & prima fuerint ingesta, citissimè per intestina transeunt, & alijs cibus suo ueluti ductu uiam struunt. Verum secundo loco assumpta, aut prauum in uentre humorē inuenientia, celerrimè alijs unà cum cibus corrumpunt, extraneā quandam atq; inexplicabilem corruptelam inducentia similiter Cucurbitis. Tamen si enim fugacibus hæc omnia sint esculentis innocentiora, corruptione tamen nisi uelociter deorsum concedant, non secus ac Pepones, uitiantur. Porro quando uentriculi os squalidum calidumq; erit, tum sicut peponibus, ita & Moris utendum. Tale nanq; iecur etiam tunc esse necesse est. Immatura Mora ab arbore decerpta, siccataq; in hyemem reponunt, ut sibi medicamē ex ijs parent, utile ad dysenteriam, aluiq; diuturnum fluorem persanandū. Quod quidem facillè descendant fortè eis usuuenit sola substantiæ humiditate & lubricitate, fortè etiam admistione acrioris facultatis, quæ stimulantq; ad excretionem aluo sit satis. Nam adstringens qualitas ad eò nihil ad deiectionem opitulatur, ut etiam reprimere stipareq; sit nata. Proinde Moris exiguam quandam eius facultatis portiunculam inesse cōhicio, cuius permagna in purgantibus medicamentis habetur: quæ facit non solum ut facillè deiciantur, uerum etiā ut diutius morata in uentre corrumpantur. Quod si corruptionem effugiant, omnino quidem humectant, sed non planè refrigerant, nisi frigida accipiantur. Parcissimè corpus alunt, similiter ut Pepones, haud tamen uomitum cient, nec stomacho ut illi aduersantur.

DE MYRRHIDE ▶ CAP ▶ CXC VIII ▶

D

NOMINA.

Cicut.aria.



Error de duplici Cicutula.

ΥΡΡΙΣ *μύρρα* Græcis, Myrrha Latinis, uulgaribus herbarijs Cicutaria, quod scilicet caule & folijs Cicutæ simillima sit. Hac similitudine quidam decepti, ueram esse Cicutam putauerunt, cum tamen ab ea, uiribus potissimū, diuersissima sit. Germanis Wildertorffel appellatur.

FORMA.

Cicutæ caule & folijs similis est, radicem obtinet longam, teneram, rotundam, odoratam, in cibo non insuauem. Hæc tota Dioscoridis deliniatio, nulla prorsus reclamante nota, herbæ cuius effigiem damus pictam suffragatur. Siquidem caule striato, folijs & flore Cicutæ simillima est, ad eò ut eam nonnulli à Cicutula discernere nesciant. Radicem etiam habet longam, teneram, rotundam, cibo iucundam & odoratam.

LOCVS.

Parsim in hortis & pratis nonnullis prouenit.

TEMPVS.

Maio mense loca in quibus nascitur huius floribus quasi candicant.

TEMPERAMENTVM.

Ex secundo est ordine exalfacientium, adiuncta partium tenuitate.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Phalangiorū morsibus radix Myrrhidis succurrit cum uino pota. Menses purgat & secundas educit. Cocta in sorbitione tabidis utiliter datur. Ferunt præterea aliqui eam bis tērie die potam ex uino in pestilentialibus constitutionibus, à morbo seruare incolumes.

EX GALENO.

Radix eius menses mouet, quæq; in thorace & pulmone sunt expurgat.

EX PLINIO.

Cit menstrua & partus cum uino. Aiunt quoque eandem potam in pestilentia salutarem



MYRRHIS

Wildfennel.

- C salutarem esse. Subuenit & phthificis in sorbitione. Auiditatem cibi facit. Phalangiorum morsus restringit. Vlcera quoque in facie aut capite succus eius in aqua triduo macerata sanat.

DE MELILOTO CAP. CXCIX

NOMINA.

Sertula cur
dicta.
Coronae regiae.



ΕΛΙΑΩΤΟΣ Græcis, Melilotus, Sertula campana, & Corona regia Latinis dicitur. Meliloti nomen officinae retinuerunt. Sertulam uero dixerunt, quod flos eius coronamentis dicatus sit, & quia ex ea antiquitus coronae & sarta factitata sint, Coronam autem regiam, quoniam luteis floribus supernè coronetur.

GENERA.

- Vulgaris Melilotus. Tria Meliloti hodie faciunt genera. Primum uulgarè, statim à radice fruticosam, cubitalem, folio scenigræci minuto ac lentè fimbriato, flosculo luteo, odoris suauis, tereti per ramos diffuso semine. Hoc quanquam tertio generi, quod nos uerum esse putamus, folijs & floribus simile sit, tamen cum nullam gustu præ se ferat adstrictionè, quam summè requirunt Dioscorides, Galenus & alij ueteres medici, & præter amaritudinè haud exiguam acrimoniã habeat, sit ut inter Melilotos, meo quidem iudicio, rectè cõnumerari non possit. Hinc est quod nos infra, hanc alio nomine dignati sumus, Saxifragamq; luteam appellauerimus. Alterum aspectu caeno, Croci flore, folijs Trifolij, minutissimis, ut paulò post fusius dicemus. Hoc sanè genus nos Melilotum germanicã uocauimus, quod illa, & non prior, in Germania nostra pro uera Meliloto sit usurpanda, ob adstrictionem illam manifestam quam gustu præfert. Accedunt folia quæ pingua sunt, & flores Croci colorè referentes, quos Dioscorides requirit. Sententiã nostram confirmat antiquus manuscriptus herbarius, qui hanc pro Meliloto pingit. Neq; obstat quod hæc herba non admodum odorata sit; fatemur enim non esse laudatissimam Melilotum, sed eam quam Germania nostra profert. Nam quum Plinio lib. xxi, cap. xi, teste, Melilotus ubiq; nascatur, suam quæuis habeat ferè regio necesse est. Nihil igitur mirum si huic herbæ non adsint singulæ notæ, quas illi ueteres Græci & Latini attribuunt. Satis autem est ei mistam quandam, nempe adstringentè & digerentem inesse facultatem, haud secus quam optimæ. Germani hanc herbã nominant *Unser strawen schüchlin*, uel *wilden klee*. Tertium genus nos optimam & legitimam esse arbitramur Melilotum, quam nos maioris discriminis causa Italicam nuncupauimus, quod mos sit patrius Germaniæ nostræ, omnia ferè peregrina uocare Italica. Germanicè itaq; haud ineptè *welscher Stein klee* nominabitur.

FORMA.


- Melilotus Germanica. Vulgaris Meliloti descriptionè inuenies suo loco. Germanica, herba est humilis, palmi altitudine, folio pratensis Trifolij, pingui & cano, flore pisi, minore tamè, luteo, semine in siliquis, radice rufa. Italica, quam è Campania allatam in Germaniam arbitror, caulem habet subrufum, rotundum, folium scenigræci, in ambitu serratum, flore luteo, odorato, semine in siliqua lunata, ut pictura luculenter ostendit. Tota etiam herba odorata est, ut hinc etiam conijcere liceat ueram esse Melilotum.

LOCVS.

Germanica passim in pratis Germaniæ, montosis potissimum, nascitur. Italica in Germania, nisi fata fuerit, non prouenit. In Campania uerò circa Nolam, Dioscoride teste, copiose nascitur.


TEMPVS.

Floret ferè per integram æstatem utrunque genus. Siliquas tamen in fine Iulij & Augusto mense proferunt.



MELILOTVS
GERMANICA,

Unser frauen schüchlin.



MELILOTVS
ITALICA.

Welscher Scintillec.

TEMPERAMENTVM.

A Mixta est facultatis: habet enim quiddam adstringens, sed & discutit & maturat: copiosior enim in ea est substantia calida quam frigida.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Melilotus adstringendi facultate obtinet. Mollit omnes inflammationes, precipue autem oculorum, uteri, sedis & testium in passo decocta & illita. Aliquando autem addito oui luteo affato, aut scenigræci farina, aut lini semine, aut polline molario, aut capitulis Papaueris, aut Intybo. Recentes meliceridas per se cum aqua, & achoras cum creta Chia & uino aut galla illita sanat. Stomachi dolore cum uino cocta, & cruda cum antedictis leuat. Aurium etiam dolores crudæ expressus succus, & cum passo instillatus sedat. Capitis dolorem lenit, cum aceto & rosaceo inspersa.

EX PLINIO.

Melilotos oculis medetur cum lacte, cut cum lini semine. Maxillarum quoque dolores lenit, & capitis cum rosaceo: item aurium est passo, quæque in manibus intumescunt uel erumpunt. Stomachi dolores in uino decocta, uel cruda tritaque. Idem effectus est ad uulvas. Testes uero & sedem prociuum, quæque ibi sunt uitia, recens ex aqua decocta, uel ex passo. Adiecto rosaceo illinuntur ad carcinomata. Deferuecit in uino dulci. Peculiariter & contra meliceridas efficax.

DE MANDRAGORA CAP. CC.

NOMINA.



B ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ, ἢ κνίλια Græcis, ἀνθρωπόμορφος Pythagoræ, Latinis

canina aut terrestris mâlus, officinis Mandragora, Germanis *Alraun*

dicitur. Qui Circæam uocarunt, nomen illi à Circe fecerunt, quoniam

creditur radix eius ad amatoria conducere. Pythagoras haud dubie ab

humana forma, quam radix eius referre uidetur, Anthropomorphon appellauit.

Hinc sumpta occasione, agyrtæ & impostores illi circūforanei radices humana effi-

gie insignitas circumferunt, quas Mandragoras esse testantur, cum tamen constet

eas esse fictitias, & manu factas ex cannarum radicibus humana specie sculptis, pos-

tea plantatis. Nascuntur autem subinde radiculæ paruæ, quæ representant capil-

los, barbam, pectinis pilos, & ex terra eum acquirunt colorem, ut radices esse appa-

reant. Sunt & alia multa quæ nebulones illi fabulantur ut pecuniam ab imperitis

extorqueant, quæ commemorare in præsentia nihil attinet. Terrestrum mâlum Ro-

mani dixerunt, quod mâla proferat, nec in altum ut reliquæ arbores surgat.

GENERA.

Duo Dioscoridi & Plinio Mandragoræ sunt genera. Mas candida est, μάστυ Mas.

Græci uocant, Huius hic effigie, citra tamen poma, quæ habere non potuimus, da-

mus. Fœmina nigra, Græcis θειδανίας à similitudine foliorum appellata. Theophra-

stus tamen lib. vi. de historia plantarum, cap. ij. tertium quoddam genus Mandrago-

ræ constituere uidetur, cuius fructus sit μέλας, καὶ σκαγιώδης, καὶ ἀνωδύς τῶ χυμῶ, hoc est, ni-

ger, acinosus, & sapore uinosus. Et nisi hoc genus à prioribus diuersum esse statuas,

discrepare inter se non leuiter Theophrastum & Dioscoridem necesse est fatearis. Nam

Dioscorides palam asserit poma priorum duorum generum uitellis ouorum esse simi-

lia, & pallida: contra Theophrastus nigra, acinosa, ut diximus, & sapore uinosa esse

tradit. Accedit quod idem Theophrastus eodem loco Mandragoræ caulem tribuat,

perinde atque Plinius, quem Dioscorides penitus aufert: ut hoc nomine necesse sit hæc omnia ad tertium hoc genus Mandragoræ referre, quod nos tamen infra in

ter Solani genera recensebimus, ubi etiam eius picturam offendet.

Circæa quære dicitur
Et Mandragora

Anthropomorphos cur nominata.

Agyrtarum commentum.

Terrestris mâlus


Mas.

Fœmina.

Locus Theophrasti explicatu difficilis.

Fœminæ.

y uirosis,



MANDRAGORA
MAS.

Alcaun menle.

A uirosis, per terram sparsis, iuxtaq; folia pomis uitellis oui similibus, pallidis, odoratis, in quibus semen quale pyri, radicibus magnis, binis ternisue, sibi inuicem implicatis, in superficie nigris, intus candidis & crassi corticis. Caulem uerò non fert. Maris folia sunt magna, candida, lata, læuia ut Betæ. Mâla duplo maiora quàm fœminæ, croci colore, cum aliqua grauitate odorata, quæ comedentes pastores quadrantenus soporantur. Radix supradictæ similis, maior tamen candidiorq;. Orbata & hæc est caule.

LOCVS.

Prouenit in syluis & umbrosis locis. Nunc in hortis etiam plantatur.

TEMPERAMENTVM.

Mandragora uincem habet facultatem refrigeratoriam, ad eò ut tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen non nihil etiam caloris inest, & in pomis humiditatis. Radicis cortex non tantum refrigerat, sed & desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Succus colligitur è cortice recentis radicis tuso & prælis subiecto, quem insolatam cum iam cõcruerit, in fictili uase reponere oportet. Colligitur itidem è pomis succus, ignauior tamen. Delibratur radicis cortex, & traiectus lino ad usum suspenditur. Quidam Mandragoræ radices in uino ad tertias decoquunt, & traiectum per colum ius seruant, utentes cyathi unius mensura in peruigilijs, & doloribus, & in his quos sine doloris sensu secare aut urere uoluerint. Potus obolorum duorum pondere cum' mulsa aqua Mandragoræ liquor, pituitam, nigramq; bilem ueratri modo purgat. Verum maiore copia potus uitam adimit. Miscet medicamentis ocularibus, & ijs quæ dolores finiunt, pelsis quoq; emollientibus. Per se semioboli pondere appositus, menses & fetus trahit. Sedi pro balano subditus somnū facit. Radix ebur emollire fertur, si senis horis cum eo decocta sit, & in quam uoluerit aliquis formam fingi & formari facilem reddere. Folia recentia, oculorum & quas ulcera excitarunt inflammationibus cum polenta illita profunt. Discutiunt eadem omnē durtiem, abscessus, strumas, tuberculaq;, quinq; aut sex diebus leniter cõfricata. Stigmata sine ulceratione delent. Folia condita sale seruantur in eòdem usus. Radix autē trita ex aceto ignibus sacris, & serpentium ictibus ex melle aut oleo medetur. Strumas atque tubercula ex aqua disijcit. Articularū dolores cum polenta sedat. Confititur citra coctionē uinū è cortice radicis. Ternæ minæ in uini dulcis metretā cõijciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut uri debent, ut antè dictum est. Siquidē nullo tunc afficiuntur dolore, eò quod somno quodam præsi torpescant. Mâla olfactu, & comesta soporem afferunt. Potest idem & eorū succus. Nimiꝯ tamen eorundem usus obmutescere facit. Semen mâlorum potum uterum purgat, appositumq; cum sulphure ignem non experto rubra fœminarum profluuia sistit. Colligitur ex radice liquor, ea scarificata multifariam, & eo quod erumpit, in cauum uas recepto. Est autem liquor succo efficacior, Sed non ferunt omnibus locis liquorem radices, idq; experientia ostendit.

EX GALENO.

Soporem conciliandi uim habent Mandragoræ poma. Radicis cortex ualentissimus est, reliquum quod intus est imbecillum existit.

EX PLINIO.

Succus fit & è mâlis & è caule, deciso cacumine, & radice punctis aperta aut decocta, utilis hæc uel furculo. Concisa quoque in orbiculos seruatur in uino. Succus non ubiq; inuenitur, sed ubi potest, circa uindemias quaritur. Odor grauis eius, sed radicis & mâli grauior. Mâla matura in sole siccantur. Succus ex ijs sole densatur: item radicis tusa, uel in uino nigro ad tertias decoctæ. Folia seruantur in murijs efficacius, aliàs recentium succus pestis est: sic quoque uires noxiæ. Grauedinem

C afferunt etiam olfactu, quanquā mala in alijs terris mandantur, nimio tamē odore obmutescunt ignari. Potu quidem largiore etiam moriuntur. Vis somnifica pro uiribus bibentium. Media potio cyathi unius. Bibitur & contra serpentes, & ante sectiones punctionesq̄, ne sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnū odore quæfisse. Bibitur & pro Elleboro duobus obolis in mulso. Ad strumas radix Mandragoræ ex aqua bibit̄. Articulis profunt folia cum polenta, uel radix recens tusa cum cucumere syluestri, uel decocta in aqua. Cum cerato apostemata & ulcera tetra, folia Mandragoræ recentia sanant, Radix uulnera cum melle aut oleo.

DE MALIS INSANIS .CAP. CCI.

NOMINA.



VAE māla insana hodie appellantur, & à Neapolitanis Melanzana, ab alijs amoris poma, à Germanis uerò *Melanſan*/num ueteribus cognita fuerint asseuerare non ausim. Non latet tamen Hermolaum in Corollario suo in ea esse sententia, ut putet esse tertiā Mandragoræ speciem, quam Morion uocant. Quam tamen sententiam cur non probem, facit in primis Theophrastus, qui lib. vi. de historia stirpium cap. ij. eius fructum esse nigrum, acinosumq̄ scribit, qualia mala insana non sunt. Dein quod Morij fructus letalis sit, mala uerò insana minimè, ut paulò pòst dicemus. Mala autem insana dicta sunt, nō quod letalia sint, sed quod difficulter concoquantur. Amoris autem poma, quod propter elegantiam & pulchritudinem digna sint quæ amentur.

Māla insana non sunt tertia Mandragoræ species.

Māla insana cur dicta.

Amoris poma quare uocata.

GENERA.

Duo sunt malorum insanorum genera. Aliqua enim purpurea ferè tota, aliqua uerò lutea, aut candorem aliquem præ se ferentia. Primi generis poma germanicè *braun Melanſan*/alterius autem, gæl *Melanſan* uocantur.

FORMA.

Mala insana in frutice nascuntur, qui Personatiam propemodum caule & folijs refert. Differunt autem huius folia à Personatiæ, quod longiora, magisq̄ laciniata sint. Flores habet purpureos, speciosos, sex folijs è calatho stellatim radiatis, fructus oblongi mali forma & magnitudine, in quibus semen siliquaestro non dissimile. Radicem multis capillatam fibris luteamq̄.

LOCVS.

In hortis apud nos feruntur, sed frequenter in fictilibus & pensilibus fenestrarū hortis. Et eodem cultu quo cucumeres & melones gaudent.

TEMPVS.


Floret Augusto & Septembre mensibus, ac subinde fructum profert.

TEMPERAMENTVM.

In his malis haud dubiè ut in cucumere esculento, aut fungo, frigida & humida temperies superat.

VIRE S.

Nullum, quod sciam, in medicina usum habent. Eduntur autem à nonnullis ex oleo, sale & pipere fungorū modo cocta. Alij ubi paululum inferbuerunt igni, in orbiculos uel taleolas digerunt, & in acetarijs ex oleo, uel pipere & aceto comedunt. Salgamarij in muria acida seruant, cibo per hyemem & uer ori grato, sed tamen qui ægrius concoquatur. Quid multa: delicorum & omnia degustare uolentium cibus est malum insanum. Quare qui sanitatis studio aliquo tenentur, ij statim nomine ipso territi, usum illorum euitabunt.



MALA INSANA.

Melanthera.

Y 3

C

NOMINA.

Nenuphar.

Nymphæa cur
dida.

ΥΜΦΑΙΑ Græcis, Nymphæa Latinis, officinis Nenuphar bar-
bara uoce nominatur. Germanis Seeblüm / Wassermâher.
Nymphæa autem nomen sibi uendicasse uidetur, quod aquosa
amet loca: uel, ut ex ueteribus aliqui fabulati sunt, à Nympha,
quæ zelotypia Herculis intabuit & mortua est, inq̃ palustrem
hanc plantam mutata.

GENERA.

Candida. Duo eius genera. Vna enim à flore candido, Liliij simili, candida appellatur.
Lutea. Germanicè weiß Seeblüm. Altera itidem à floribus, qui lutei sunt, lutea no-
minatur, Germanicè geel Seeblüm. Possent etiam radicibus discerni, cum prior
nigra, altera uerò candida cōstet, adeò ut hoc nomine prima candida, altera autem
nigra diceretur. Multò uerò consultius est à floribus, quàm radice discrimen sume-
re, quòd illi nunquam non oculis expositi sint, radices autem non nisi effossæ in-
tueri possint.

FORMA.

Prima, folia Ciborio similia habet, minora tamen & longiora, quadantenus su-
per aquam eminentia, aliqua tamen etiam sub aquis, plura ab una radice prodeun-
tia. Flos candidus, Lilio similis, in medio quod croceum sit obtinens. Hic cum de-
floruerit rotundus, & mào circumferentia, aut Papaueris capiti similis, colore niger
fit. In quo sanè semen clauditur nigrum, latum, densum, gustu glutinosum. Caulis
illi læuis, minimè crassus, niger, Ægyptiæ fabæ similis. Radix nigra, aspera, clauæ
persimilis. Hæ singulæ notæ alteri Nenuphari uocato quadrant. Folio enim con-
spicitur orbiculato, læui, herbaceo, amplo, in stagnantibus aquis supernatante: flo-
re candido, Lilio simili, in medio croceum habente, & cum defloruerit capite Papa-
ueris, in quo semen latum, amarum, pingue. Caulis gracilis est & læuis, Radix ni-
gra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam repræsentans. Altera folia antedictæ
similia habet, sed radicem albam & asperam: florem luteum, splendentem, rosæ si-
mitem. Quæ itidem notæ in uniuersum omnes alteri Nenuphari, quæ luteis est
floribus, respondent.

LOCVS.

Nascitur in paludibus & aquis stagnantibus.

TEMPVS.

Flores in fine Maij & Iunio mense colliguntur. Radices autem in autumnno ef-
fodiuntur.

TEMPERAMENTVM.


Nymphæa tum radix, tum semen refrigerandi & citra morsum desiccandi uim
obtinet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix prioris sicca cum uino pota, coeliacis & dysentericis prodest. Lienem ab-
sumit. Stomachi uesciæq̃ doloribus illinitur. Alphos ex aqua exterit. Alopecias
cum pice imposita sanat. Eadem contra Veneris infomnia bibitur, siquidē ea com-
pescit. Paucis diebus, si quis continuò bibat, genitale infirmat. Idem semen potum
efficit. Alterius quæ lutea dicitur, radix & semen contra muliebria profluuia ex ui-
no nigro bibuntur.

EX GALENO.


Nymphæa radix & semē, uentris profluuia cohibent, semenq̃ genitale siue per so-
mnia, siue alio pacto immodicè profluens retinēt. Iuuāt dysentericos. Ceterū Nym-
phæa quæ candidā radicē habet, potentioris est facultatis, ut & muliebri profluuio
medea-



NYMPHAEA
GANDIDA.

Weiß Seebäumen

536



NYMPHAEA
LUTEA.

Geel Seeblimen.

A medeatur, Verum & hæc, & ea quoque quæ atram habet radicem, ex uino nigro austero bibitur. Porrò nonnullam etiam abstergendi uim obtinent, ita ut alphos & alopecias fanent. Ad alphos uerò macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

EX THEOPHRASTO.

Nymphæa trita plagæ imposita sanguinem sistere traditur. Vtilis & ad difficultates intestinorum pota.

EX PLINIO.

Venerem in totum adimit Nymphæa, semel in quadraginta dies pota. Insomnia quoque Veneris à ieiuno pota, & in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inhibet nō solum Venerem, sed effluentiam genituræ: ob id corpus alere, uocemq̄ dicitur. Semen cum uino potum dysentericis auxilio est. Tenesmo radix eiusdem ex uino bibitur. In uino quoque pota lienem consumit. Dolores uescicæ sedat ex uino. Manantia sanat ulcera. Maculas omnes emendat. Trita plagis imponitur. Viceribus, priuatim ijs quæ calceamento facta sunt, prodest arida infricata.

DE NAPY CAP. CCIII.

NOMINA.



A P Y, ἡ σινυπτι græcè, Sinapis & Sinapi latinè uocatur. Officinæ nomen retinuerunt. Perperâ tamen faciunt, quod altero genere pro Eruca, quam suo loco depinximus, utunt. Germanicè zam oder Gartensenff nominatur. Sinapis autem nomen è Græciâ uenit in Latium, censerq̄ dictum Athenæus lib. ix. Dypnosoph. Sinapi, ἡ σινυπτι τοῦ σινυπτιοῦ ἢ τῆς ὀσφύος, hoc est, quod olfactum luminibus officiat. Pleraq̄ Græciâ Napy nominat quasi Naphy, ut idem eodem in loco interpretatur, quoniam non sine natura sit, sed acri & proinde incommoda donetur. Alij Napy per priuationem uidelicet σινυπτι, quasi immitè dici uolunt, quoniam acrimoniæ uehementis particeps sit.

Officinæ error.

Sinapis unde dicta.

Napy curuocatum.

GENERA.

Sinapis duo inueniuntur genera, folijs, floribus & semine distantia. Primum siquidem genus rapitiâ frondem exprimit, floremq̄ luteum obtinet, ac semen album profert. Nos à floribus luteis germanicè geelen Gartensenff nominauimus. Alterum in Eruca folium laciniatur, floreq̄ albicante, & semine uesco pulloq̄ constat. Nos genus hoc ab albicantibus floribus weissen Gartensenff appellauimus, ut esset huius aliqua ab Eruca nomenclatura diuersitas, quam Germani simpliciter weissen Senff uocant.

FORMA.

Primum caulem habet hirsutum, longum, ramosum, folia rapi, minora tamè & asperiora, flores luteos, siliquas rotundas ac hirsutas, plenas semine candicante. Alterum genus itidem hirsuto caule præditum est, minore tamen, folijs Eruca, maioribus tamen ac latioribus, laciniatis, floribus albicantibus, crucisq̄ effigiem referentibus, siliquis teretibus & oblongis, semine pullo rufescente uel refertis.

LOCVS.

Vtruncq̄ in hortis satum prouenit. Et quamuis nullo cultu pleruncq̄ germinet, terram tamen aratam & congestitiâ magis amat.

TEMPVS.


Floret utrunq̄ Iunio ac Iulio mensibus, eodemq̄ tempore semen in siliquis suis profert.

TEMPERAMENTVM.

Sinapi calefacit & desiccat quarto ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Calfaciendi, extenuandi & extrahendi uim habet. Cōmanducatū capitis pituitā elicit.



SINAPI PRI
MVM GENVS.

Geeler gartensenff.



SINAPIS ALTE
RVM. GENVS.

Weiß Gartenschiff.

Cit. Succus eius hydromeliti mixtus contra tonfillarum præduros tumores, ac ueterem callosamq; arteriæ scabritiē conuenienter gargarizatur. Tritum naribus admotum, sternutamenta ciet. Comitialibus quoq; auxiliatur. Fœminas uuluaē strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, illinitur. Ficis ammissum & impositum donec rubescat locus, ad coxendicum cruciatus, lienes, & omnis generis diuturnos dolores confert, cum permutandæ pãisionis causa ex alto in cutis superficiem aliquid trahere uouerimus. Alopecijs illitum medetur. Faciem purgat. Sugillata cum melle, aut adipe, aut cerato delet. Ex aceto contra lepras, & feras impetigines perungitur. Aridum contra febrium circuitus bibitur, aut potui polentæ modo inspersum. Extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus utiliter ammiscetur. Grauitati aurium & sonitui, tritum cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum & palpebrarum scabritiem illinitur, Exprimitur autem ex uiridi adhuc semine succus, & in sole siccat.

EX PLINIO.

Sinapi Pythagoras principatum habere ex his, quorum sublime uis feratur, iudicauit: quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Ad serpentium ictus & scorpionum tritum cum aceto illinitur. Fungorum uenena discutit. Contra pituitam tenetur in ore donec liquecat, aut gargarizatur cum aqua mulsã. Ad dentium dolorem manditur. Ad uuam gargarizatur cum aceto & melle. Stomacho utilissimũ contra omnia uitia, pulmonibusq;. Excreationes faciles facit in cibo sumptum. Datur & suspiriosis. Item comitialibus tepidum cum succo cucumerũ. Sensus atque sternutamenta capitis purgat, aluum mollit, menstrua & urinam ciet. Et hydropicis imponitur. Cum fico & cumino tusum ternis partibus comitali morbo. Et uuluarum conuersionē suffitum excitat odore aceto mixto. Item lethargicos: & si uehementior somnus lethargicos premat, cruribus aut etiam capiti illinitur cum fico & aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, coxendicũ, humerorum, & in quacunq; parte corporis ex alto uitia extrahenda sunt, illitum caustica ui emendat pustulas faciendo. At in magna duritiã sine fico impositum: uel si uehementior urigo timeatur, per duplices pannos. Utuntur ad alopecias cum rubrica, pforas, lepras, phtiriales, tetanicos, opisthotonicos. Inungunt quoq; scabras genas aut caligantes oculos cũ melle. Succusq; tribus modis exprimitur in fictili, calefcitq; in eo in sole modicè. Exit & è cauliculo succus lacteus, qui ita cum induruit, dentium dolori medetur. Semen ac radix cum immaduere musto, conteruntur, manusq; plenæ mensura forbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput, sensusq; omnes. Mulierũ etiam lassitudines, saluberrimo medicinae genere. Calculos quoque discutit, potum ex aceto. Illinitur & liuoribus sugillatisq; cum melle & adipe anserino, aut cera Cypria. Fit & oleum ex semine madefacto in oleo expressoq;, quo utuntur ad neruorum rigores, lumborumq; & coxendicum perfrictiones.

EX SYMEONE SETHI.

Sinapi uim habet dissoluendi & discutiendi humiditates quæ in capite & stomacho sunt. Confert etiã lienis affectib; à humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt: ad hæc & podagris à pituita factis. Officit uerò uisui, & calido capiti, aciecori. Adiuuat concoctionē & distributionē ciborum crassarũ partium. Minuit quæ in uentriculo sunt humiditates. Illitum lepris, eas in melius mutat. Linguas etiam humiditate grauatas siccat. Si cum melle sumatur, tussis resoluit. Cum caricis uerò ischiadicis illitum, & lienosis utile est; trahit enim quæ intus sunt ad corporis superficiem, Suffitum uerò & incensum, serpentes fugat.



NERIVM

Gleander.

z

C

NOMINA.

Oleander.
Rhododaphne
cur dicta.



Rhododendros
quare.

HPION, ἢ ῥοδοδελφον, ἢ ῥοδοδελφον Græcis, Nerion & Rhododendron Latinis, officinis & barbaris Oleander, Germanis Olander dicitur. Rhododaphnen autem Græci dixerunt à rosæ floribus & lauri folijs, quæ fruticis huius præcipuæ sunt notæ. Nec refert quod Dioscorides amygdalæ folijs eius folia cõparauerit, lauro enim & amygdalæ nõ dissimilis magnope re foliorũ figura est. Fecit idem rosæ flos & arbor, ut eadẽ gens Rhododendrũ nomenauerit.

FORMA.

Notus frutex, amygdalæ longiora & crassiora folia habens, florem rosarum figura, fructum amygdalæ similem, ueluti cornu, qui dehiscens lanca natura plenus est, pappis acanthinis simili. Radix illi est acuminata, longa, lignosa, gustanti fassa,

LOCVS.

Nascitur in hortis, maritimis, & secundum amnes locis.

TEMPVS.

Quo mense floribus & fructu prægnans sit Nerion, non satis constat: neque enim uel flores uel fructus eius nobis uidere licuit. Hinc est quod etiam pictura quam exhibemus isdem careat.

TEMPERAMENTVM.

Neriũ Arabes calefacere in principio tertij ordinis, & in secundo siccare tradunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Flores & folia canes, asinos, mulos & quadrupedes plurimos enecant: hominũ uerò cum uino pota contra uenenatorũ morsus præsidia salutaria sunt, præsertim si ruta cõmiscueris. Infirmiora uerò animantia, ut oues, caprasq; si aquam biberint in qua folia eius maduerint, moriuntur.

D

EX GALENO.

Nerium aut Rhododaphne notus omnibus est frutex. Foris quidem illitus discutienti uim obtinet. Intrò autem in corpus assumptus, perniciosus ac uenenosus non tantum hominibus, uerumetiam plerisque pecudibus.

EX PLINIO.

Rhododendros ne nomen quidem apud nos inuenit latinum: Rhododaphnen uocant, aut Nerium. Mirum, folia eius quadrupedum uenenum esse, homini uerò contra serpentes præsidium, ruta addita, & è uino pota. Pecus etiam & capræ si aquam biberint in qua folia ea maduerint, mori dicuntur.

DE OXYACANTHA CAP CCV

NOMINA.

oxycantha.



ΞΥΑΚΑΝΘΑ Græcis, Oxycantha Latinis, officinis Berberis, Germanis Paisselbeer / Saurich / Erbsel / Versich uocatur. Haud dubie Græci à spinarum acuminatis cuspidibus Oxycanthan dixerunt.


FORMA.

Syluestri pyro similis arbor est, sed minor & nimis spinosa. Fructum fert Myrto similem, plenum conferctumue, rubentem, fractu facilem, seminis nucleos habentem. Radicem multifidam & altam. Huius delimitationis note, nulla prorsus reclamante, arbori quam uulgò Berberim barbara uoce nominant, adhaerens respondens. Nanque arbuscula est pyri syluestris aspectu, sed humilior ramis ex interuallo spinosis, folio lentè per ambitum aculeato, acinis rubentibus, in pediculo iuxta & racemo pendulis, gustu acido & subaustero, duobus in partibus granis, radice numerosa.

LOCVS.

OXYACANTHA

Verfich.



C

LOCVS.

Multis nascitur locis, syluis nempe, frutetis, campestribus, montanis, siccis & aquosis.

TEMPVS.

Germinat ineunte uere, ab occasu autem Vergiliarũ fructifera. Per Septembrẽ itaque ac Octobrem menses carpitur, campos syluasq; exornans.

TEMPERAMENTVM.

Oxyacantha adstringit & desiccatur, atque adeo quorundam sententia frigida & sicca in secundo est ordine. Fructus tamen tenuium est partium, & paululum quidam incisiuum habet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius fructus potus & comestus,alui profluuium, & muliebrem fluxum sistit. Radix trita & illita aculeos & spicula extrahit. Abortum facere tradunt, si sensim uenter ter radice feriat aut perungatur.

EX GALENO.

Oxyacanthus arbor ut pyro syluestri similem habet speciem, ita & facultates minime dissimiles. Quin & ipsi fructus, Pyri quidem syluestris prorsum atq; absolute austerus est, Oxyacanthus autem tenuium partium est, & modicẽ incidit. Porrò arboris huius fructus, pyri syluestris similis non est, sed Myrti potius fructui, rubens scilicet & † rarus. Habet uerò & nucleos. Cæterum non tantum esus, sed & bibitus omnes fluxionum affectus cohibet atque sistit.

† Ad hoc uidetur legendum, ut est apud Dioscor.

EX RECENTIORIBVS.

E baccis uinum exprimitur eodem ferẽ usu, quo uinum ex mælo punico. Condiuntur item acini uel melle uel saccharo ad restringendã sitim, depellendamq; febricitantium malaciam, quorũ morosum nimis palatum cibum ferre quemcunq; respuit, Elanguescens appetentia grato huius acore recreatur.

DE OSYRIDE CAP. CCVI.

NOMINA.



Linaria quare dicta.

ΣΥΡΙΣ Græcis, Osyris Latinis, officinis Linaria, nonnullis herba uirinalis appellatur. Germanicè Glachstrauch / Lyntrauch / Harntrauch / Unser strawen flachß / Wildflachß / Krotensflachß / Labeltrauch. Linariam autem dixerunt recentiores à folijs quæ Lini faciẽ referre uident.

FORMA.

Virgultum sarmentumue nigrum est Osyris, tenues uirgas lentasq; habens. In quibus foliola sunt terna & quaterna, modo quina, interim & sena, ceu Lini nigra initio, dein colore mutato subrubescencia. Iam si rem diligenter expendas, nullam deliniationis notam Osyridi traditã, in Linaria dicta hodie deesse reperies. Siquidẽ hæc cauliculis fruticat nigricantibus, & qui ob suum lentorem haud facillè franguntur, tenuibus, atris quoque folijs, Lini faciẽ. Concolori denique semine tantisper dum maturefcit, postquam ematuruit rubescente. Senescentes quoque ramuli nigritiam in ruborem uertunt. His accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, qui Linariam eam esse herbam tradit, quæ Dioscoridi Osyris dicitur, floremq; habere luteum inquit. Respondet etiam per omnia pictura.

LOCVS.

Pasim in campestribus prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate tota & autumnò.

TEMPVS.



OSYRIS

Garnkraut.

C

TEMPERAMENTVM.

Linaria non est frigida.

Osyridi amara inest qualitas, & obstructiones aperiendi, adeoq; ut calida sit necesse est. Amara namq; Galeno lib. iij. cap. x. de simpl. medicament. facult. teste, qualitate prædita, omnia calida sunt. Sic etiam eodem autore lib. v. cap. xi. eiusdem tractationis, singula quæ poros & meatus expurgant, ab infarctuq; liberant medicamenta, calida sunt & tenuiũ partium. Vehementer itaque errant, qui Linariam frigidam & humidam esse asserunt. Et certè præter ea quæ iam dicta sunt, uel hoc uno argumento erroneam illorum sententiam confutare omnium maximè licebit. Cum etenim Linariæ urinam mouendi facultatem inesse scribant uulgares etiam herbarij, colligitur illam non esse frigidam & humidam, quando Galeno libro iam citato cap. xij. attestante, omnia quæ urinam ducunt ex acrim atque adeo calidorũ & siccorum sint genere.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius decoctum potum morbo regio affectos iuuat.

EX GALENO.

Osyridi, ex qua medicamenta ad exterendam leuigandamq; cutem, Græci *ωσϋρις* uocant, fieri solent, amara inest qualitas, & obstructiones expediendi facultas. quare & in iccinore consistentes obstructiones adiuuat.

EX AETIO.

Osyris est herba subfruticosa, tenuibus uirgulis, fractioni renitentibus, folijs Linosimilibus, nigris primo, postea subrubescens, gustu amaris, unde regio morbo conferunt.

EX PLINIO.

Smegmata mulieribus ex Osyridis folijs faciunt. Radicum decoctũ potum, sanant arquatos. Eadem priusquã maturescit semen concisat, & sole siccata, aluum sistunt. Post maturitatẽ uerò collectæ, & in sorbitione decoctæ, rheumatismis uentris medentur, & per se trita ex aqua cœlesti bibuntur.

DE OCIMO. CAP. CCVII.

NOMINA.

OKIMON Græcis, Ocimum Latinis, recentioribus Græcis *Βασιλισμός*, id est, regium appellatur, quod nomen apud omnes nostræ ætatis herbarios & officinas usurpatur. Sunt tamen quibus Ocimum gariophyllatũ nominetur. Germanicè *Basilien*/uel *Basilgram* dicitur. Ocimum autem quibusdã à nascendi celeritate dictum est, siquidem à satu tertio statim die emicat. Quod uerius Ocymo uidetur conuenire, quod pabuli & farraginis quoddam genus est, sic nominatũ ab *ωκός* græca dictione, quæ citò significat. Proinde sunt qui significantius per *z* scribendũ ducant Ozimum, ab *ωζω*, quod redolere denotat, quoniam herba tota suauissimũ spiret odorem. Ab eodem odore, quod basilica & regia domu dignum sit, Basilicum hodie nuncupatur.

GENERA.

Sunt qui duo Ocimi cõminiscantur genera: unum latiora folia habens, quod priuatim Basilicum: alterum angustiora, quod Ocimum gariophyllatum appellant. Nos tria tibi exhibemus ex uno promiscuè semine nobis nata, Primũ maioris discriminis ratione Ocimũ exiguũ, Germanicè *klein Basilien*/nominauimus. Alterum mediocre, Germanicè *mittel Basilien*. Tertium magnum, Germanicè *groß Basilien* uocauimus. Neq; enim nisi folijs solis distare uident, quæ in primo genere exigua admodũ sunt, in altero uerò paulò latiora, in tertio primi respectu latissima, Odor autem omnibus tribus unus idemq; est.


FORMA.

ωσϋρις enim uero solum scopas, ut quidam arbitrat, uerum etiam *ωσϋρις*, Suida & Pharrino testibus, hoc est compertoria & uenustantia facie medicamenta græci dixerunt: è quo rum sanè numero Osyris est, quæ eũ amara sit, ex tergere citã que sunt in corpore, facie potissimũ, maculas potest. Hinc recte Plinius ex eius folijs mulieribus, ut pote que plus alijs comere & uenustare faciem solent, smegmata fieri tradit.

Ozimum cur dictum.

Basilicum.





O C I M V M
EXIGVVM.

Klein Basilien.



OCIMUM
MEDIocre.

Witrel Basilien.



OCIMUM
MAGNUM.

Groß Basilien.

C

FORMA.

Ocimum pedali altitudine profilit, furculofum, ramulis rotundis, folio Mercurialis, diluti uiroris. Floret particulatim, primò parte inferiore, demum superiore: flosculo candido, semine pullo nigròue, cui cortex obducitur. Radix una descendit in altitudinem, crassior & lignosa, cæteræ à lateribus funduntur exiles ac prolixæ.

LOCVS.

Parsim in figulinis uasis mulieres extra fenestras ædium fouent Ocimū. In hortis etiam satum prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, dein semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, cum excrementitia quadam humiditate.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Copiose comestum oculorum aciem heberat, aluum emollit, flatus mouet, urinam cit, lac euocat, ægreq; in uentre mutatur. Illitum cum polentæ farina, rosaceo & aceto, inflammationibus, marinisq; draconis & scorpionis ictibus auxilio est. Per se autem cum uino Chio oculorū doloribus. Oculorum caligines succus eiusdem abstergit, eorundemq; fluxiones exiccat. Semen potum quibus atra bilis gignitur, difficultati urinæ, in flatibusq; conuenit. Olfactu per nares attractum, copiosa sternutamenta mouet. Quod idem herba efficit. Porrò instante sternutamento oculos comprimere oportet. Sunt qui Ocimum cauent minimeq; comedunt, quandoquidem manducatū, & in sole positum uermes gignat. Libyes autem adiecerunt, quod si feriantur à scorpione qui Ocimum ederint, nullo dolore conflictari.

D

EX GALENO.

Ocimum excrementitiā humiditatem habet, proinde nec cōmodum est quod in corpus sumatur. Cæterum foris illitum, ad digerendum & concoquendū utile est. Pleriq; hoc etiam ut obsonio utuntur, ex oleo & garo offerentes. Vitiosioris autem succi est. Admentiuntur ob hoc quidam dicentes, si tritum fictili nouo indatur, celerimè intra paucos dies scorpiones gignere, præsertim ubi quis quotidie ollam soli expositam calfecerit. Sed hoc sanè à uero abest. Id porrò uerè de eo dixeris, prauit succi, stomacho inimicum, & concoctu pertinax olus esse.

EX PLINIO.

Ocimum Chrysippus grauius increpuit, inutile esse dicens stomacho, urinæ, oculorum quoq; claritati. Præterea insaniam facere, & lethargos, & iccinoris uitia, ideoq; capras id aspernari: hominibus quoq; fugiendum censet. Adijciunt quidam, tritum si operiatur lapide, scorpionē gignere: cōmanducatum, & in sole positum, uermes afferre. Alij uerò, si eo die feriatur quispiam à scorpione qui ediderit Ocimum, sanari non posse. Quinimò tradunt aliqui, manipulo Ocimi cum cancris decem marinis uel fluuiatilibus trito, cōuenire ad eum scorpiones à proximo omnes. Diodotus in empiricis, etiam pediculos facere Ocimi cibum. Secuta ætas alacriter defendit, nam id esse capras, nec minus quàm mentham & rutam scorpionū terrestrium ictibus, marinorumq; uenenis mederi cum uino, addito aceto exiguo. Vsu quoq; cōpertum, deficientibus ex aceto odoratum salutarem esse. Item lethargicis, & inflammatis refrigerationi. Illitū capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris impositum ex uino. Stomacho quoq; esse utile, inflationes & ructum ex aceto dissoluere sumptum. Aluum sistere impositum. Urinam ciere. Sic & morbo regio & hydropicis prodesse. Choleras eo & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiam celiacis Philistio dedit, & coctum dysentericis & colicis Plistonico. Aliqui & in tenasmo, & sanguinē excreantibus, in uino. Contra duritiā præcordiorū illinitur mammis, Extinguit quoq; lactis prouentum, Auribus utilissi.

A utilissimū infantium, præcipuè cum adipe asferino. Semen tritum & haustum naribus, sternutamenta mouet, & destillationes capiti quoq; illitum. Vuluas purgat in cibo ex aceto. Verrucas mixto atramento futorio tollit. Venerem stimulat.

EX SYMEONE SETHI.

Basilica ocima olfacta cor & caput iuuant. Si aqua irrigantur, humidiora fiunt, & somnum conciliant. Semen eorum cardiacis affectibus succurrit. Animi incrorem ex atra bile ortam, in hilaritatem & lætitiã mutat.

APPENDIX.

Vides in referendis Ocimi facultatibus non parū inter se dissentire Dioscoridē, Galenū & Plinium, ita ut uix pugnantibus illorum sententias conciliare possis. Quare cōsultum erit ut hic, quemadmodū in alijs etiam, Galeni amplectaris opinionē, qui quodammodo inter hos medius interiectus, cōmendat exteriorem eius usum in ijs quæ *συμπεφυγὴ δισφόρησις*, id est, concoctionem & discussionē desiderant: damnat uerò internum, ob excrementitiū humorem quo grauat & lædit interanea. Et ad hunc etiam scopum respiciens, plerasq; alias Dioscoridis & Plinij contradictiones tollere poteris.

DE ORIGANO ▶ CAP ▶ CCVIII ▶

NOMINA.



ORIGANOS Græcis, Origanus uel Origanum Latinis, officinis nomen suū retinuit, Germanis *Wolgemut* / *Dosten* / *Braundosten* / uel *Bergmünz* nominatur. Origanum uerò quod montibus gaudeat appellationem apud Græcos inuenit, *ὄρος τὸ ὄρος*, id est, monte, & *χαρῆς*, gaudio.

Origanum unde dictum.

B Herodianus quod uisum exacuat nomen duxisse testatur, ab *ὄρα* uidere, & *γανῶ* clarifico, quasi aciem oculorum illustrans. Theodorus grammaticus nomen ex aduerso datū putat, à *ρίγῶ*, quod est algeo, fieri *ρίγανου*, quasi rigens, censet, & tandem ascita litera principe, o, in Origanum esse confectum, contrario tamen sensu, quod minimè refrigeret.

GENERA.

Origani genera seu rectius cognomina quatuor esse constat. Est enim *Heracleoticum*, *Onitis*, *Tragoriganū*, & *syluestre*. Primum ab *Heraclea* Ponti dictum, cætera à pecoribus cognomina desumpserunt. *Onitis*, quod ab asinis impeteretur, acin cibo gratum esset. *Tragoriganū*, quasi hircinum Origanum, non alia forsitan ratione quàm quod eius pabuli uoluptate animal hoc caperetur. *Syluestre*, quod sine cultura, & sua sponte proueniat, cognominatum fuit. Cæterum quum in tantum nomenclationū tum historiæ ambiguitate uarietateq; tam Græcorum quàm Latinorum nō facile sit quicquam in solidum de his statuere, satis sit unum genus, *syluestre* nimirum & uulgare, pro omnibus pictum exhibere, quòd, ut *Paulus* ait, utcunque nominibus distinguantur, una tamen omnium sit facultas, adeoq; in re admodum incerta, multum operæ aut laboris temerè insumere minimè necessarium putauit.

Heracleoticum.

Onitis.

Tragoriganum.

Syluestre.

FORMA.

Origanum uulgare fruticulus est, tam folijs quàm ramis *Serpyllo* *syluestri* similis, comante supra cacumen umbella, in qua flores haud secus quàm in *Serpyllo* in albo purpurei, odore iucundo præditi emicāt. Ex qua sanè deliniatione satis liquet, Origanum hoc uulgare, *Tragoriganū*, uel saltem eiusdem speciem quandam esse, quod hoc ut *Dioscorides* refert, folijs & ramulis *syluestri* *Serpyllo* simile existat.

Vulgare.

LOCVS.

Montibus cliuosisq; locis gaudet Origanum nostrum, passimq; in his propter sepes nascitur.

TEMPVS.



ORIGANVM SYLVESTRE
SEV VVLGARE,

Wolgemit.

TEMPVS.

Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Omnes Origani species, Galeno & Paulo testibus, calefaciunt & exiccant in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Heracleoticū exalfacit, unde decoctum eius cum uino potum uenenatorū mor-
sibus prodest: cum passo autem ijs qui cicutam, aut meconiū: cum oxymelite ijs
qui gypsum aut ephemerū hauserunt. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico man-
ditur. Aridū acetabuli mensura potum cum aqua mulla, atros humores per aluum
ducit, mensesq̄ ciet. Linctū ex melle tussibus medetur. Prurigines itidem, scabies,
regiumq̄ morbū, decoctum eius cum in balnea descensum est, iuuat. Succus eius-
dem adhuc uirentis, tonsillas, columellas, orisq̄ ulcera sanat. Per nares cum oleo iri-
no infusus trahit. Cum lacte aurium dolores mitigat. Conficitur ex eo & cepis, &
rhu obsontiorū uomitorium medicamentū, omnibus ijs in gre Cyprio sub Canis ar-
denti aestu per quadraginta dies insolat. Herba uerò substrata serpentes fugat.
Onitis eadem quæ Heracleoticū Origanum præstat, non tamen eadem efficacia.
Syluestre priuauū folijs & floribus cum uino potis, uenenatorū morsibus auxilia-
tur. Omnia autem Tragorigani genera calefaciunt, urinā mouent, bonam faciunt
aluū, si decoctū eius bibatur: biliosa enim deſciunt. Lienosis cum aceto pota uti-
lia: cum uino autem his qui Ixiam hauserunt. Menses ducunt. Tussientibus, peri-
pneumonicis, ex melle in eclegmate dantur. Est & efficax potio, quare cibum fasti-
dientibus, & stomacho male affectis, & acida ruſtantibus datur. Item ijs quibus t̄ a
maris iactatione nausea, & hypochondriorū calor excitatur. Oedemata cum po-
lenta illita discutunt.

EX GALENO.

Origanus Heracleotica efficacior est Onitide. Syluestris uerò utraq̄ ualentior.
Omnes autem incidendi, extenuandi & calfaciendi facultatem obtinent. Tragori-
ganus quippiam etiam ad strictionis assumpsit.

EX PLINIO.

Origani priuatim usus contra torsiones stomachi in tepida aqua, & cruditates.
Contra araneos scorpionesq̄ in uino albo. Luxata & contusa in aceto & oleo & la-
na. Tragoriganū urinam ciet, tumores discutit, contra uiscum potū uiperęq̄ ictum
efficacissimū, stomachoq̄ acida ruſtanti & præcordijs. Tussientibus quoque cum
melle datur, & pleuriticis, & peripneumonicis. Heraclium serpentes fugat. Percul-
sis esui datur decoctū. Potu urinā ciet. Ruptis, conuulsis medetur cum Panacis ra-
dice. Hydropicis cum fico, aut cum hyssopo, acetabuli mensuris decoctū ad sextā.
Item scabiem, pruriginē, pforas, in descensione balnearū. Succus auribus infundit-
tur cum lacte mulieris. Tonsillis quoq̄ & uuis medetur. Capitis ulceribus. Vene-
na opij & gypsi extinguit decoctū, si cum cinere & uino bibatur. Aluum mollit ace-
tabuli mensura. Sugillatis illinitur. Item dentiū dolori, quibus etiā & candorē facit
cum melle & nitro. Sanguinē narium sistit. Ad parotidas decoquitur cum hordea-
cea farina. Ad arterias alperas cum gallo & melle teritur. Ad lienem folia cum mel-
le & sale. Craſsiores pituitas & nigras extenuat coctum cum aceto & sale sumptum
paulatim. Regio morbo tritum cum oleo in nares infunditur. Lasi perungun-
tur ex eo, ita ut ne uenter attingatur. Epinyctidas cum pice sanat. Furunculos ape-
rit cum fico trita. Strumas cum oleo & aceto & farina hordeacea. Lateris do-
lores cum fico illitum. Fluxiones sanguinis in genitalibus tu-
sum ex aceto illitum. Reliquias purgatio-
num à partu.



ORCHIS MAS LA
TIFOLIA.


Ungesprenget Knabentrautmennle.

ORCHIS MAS
ANGUSTIFOLIA.

Gesprenge Knabenkraut
männl.

aa 2





ORCHIS FOE
MINA MAIOR.

Das grösser Knabenkraut
weiblin.



ORCHIS SIVE CYNOSORCHIS
FOEMINA MINOR.

Knabenkraut weiblich
das kleiner.

aa 3

C

Testiculus
canis.
Orchis cur
dicta.
Cynoforchis.



ΠΧΙΣ ἡνωὸς ὄρχις Græcis, Orchis & Cynoforchis Latinis, ἰεστικυλος canis officinis, Germanis *Knabenkraut* uocatur. Orchis dicta hec herba est, quod radices sibi inuicem haud secus atque duo testiculi cohaerent. Cynoforchis uerò, quod canum testiculis similem radicem habeat.

NOMINA.

GENERA.

Orcheos duo esse genera animaduertimus, marem nimirum & foemina. Mas in uniuersum maior quam foemina proceriorque est, ut pictura ipsa pulchre declarat. Estque duorum generum. Vnum latioribus folijs & candicantibus ferè floribus, quod Orchin marem latifoliam uocauimus. Alterum quod angustioribus folijs, & maculosis magis, floribusque purpureis constat. Nos maioris discriminis rationem habentes, Orchin marem angustifolia nuncupauimus. Foemina itidem duorum est generum; una enim maior, altera minor est, ut pictura satis demonstrat.

FORMA.

Folia habet circa caulem & ima eius parte per terram strata, oleae molli similia, angustiora tamen, leuia & longiora. Caulem dodrantali altitudine, in quo purpurei flores. Radicem bulbo similem, oblongam, duplicem, in modum oliuae angustam, superiorem alteram, inferiorem alteram; & hanc quidem mollem ac rugosam, illam uerò plenam.

LOCVS.

Nascitur locis, Dioscoride autore, petrosis & arenosis. In Germania certè nostra in hortis & pratis, locisque fabulosis copiose prouenit.

TEMPVS.

In Maio & Iunij principio carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius maior calida & humida est, gustantibusque dulcior esse apparet. Minor admodum elaborata est, ad calidius sicciusque tendit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix editur ut bulbus cocta. Fertur de ea, si maiorem edant uiri, mares generari; minorem uerò foeminae, foeminas. Addunt etiam in Thessalia mulieres paruam cum caprino lacte bibendam dare, ut ad uenerea excitent; aridam uerò ad inhibendam atque dissipandam. Alterum etiam alterius potu resolui.

EX GALENO.

Radix maior Orchios multam uidetur habere humiditatem excrementitiam & flatuosam: quapropter pota Venerem excitat. Altera uerò, minor uidelicet, contra non modo non stimulat ad coitum, sed planè cohibet ac reprimat. Eduntur bulborum more assa.


EX PLINIO.

Tumores & uitia partium earum erumpentia, cum polenta illita radix sedat, uel per se trita. Eadem ex lacte ouillo neruos intendit, & ex aqua remittit.



TRIORCHIS SERA
PIAS MAS.

Asabentrautmentsches kleiner.



TRIORCHIS
FOEMINA.

Ragwurz weiblich.

NOMINA.



ΠΧΙΣ *σέρapiας, ή τριόρχης*, Paulo & Aëtio testibus, Græcis dicitur, Orchis
 siue testiculus Serapias Latinis. Officinæ eius cognitionē non habent.
 Germanicè *Agwur* dicitur. Serapias autem ab Andrea medico ob
 multos radicis usus, ut inquit Dioscorides, appellata est. Sunt qui à Sa-
 rapi Alexandrinorū deo nominatā uelint, propter lasciuā impudentē, qua is deus
 Canopi, ubi templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur: de quo
 Strabo in xvij. suæ Geographiæ libro. Triorchis uerò, manifesto ex ea appellatio-
 ne argumento, quod non duabus, sed tribus testiculatis radicibus in terra nitatur,
 Qua una quidem re facilè à prioribus discriminantur Orchibus.

*Serapias quare
dicitur.*

*Triorchis cur
dicatur.*

GENERA.

Duo esse Orchis Serapiadis seu Triorchis genera, res ipsa satis monstrat. Etsi
 enim in folijs ac radicibus nihil aut parum discriminis habeant, tamen in floribus
 manifestè differre uidentur. Nam alterum genus, quod nos marem uocauimus,
 floribus constat purpureis, & parumper albicantibus. Alterum uerò, quod nos ut
 certius à priori discerneretur, fœminam nominauimus, flores obtinet diuersis co-
 loribus distinctos, purpureo uidelicet, candido, uiridi ac nigricante, inferioreq; par-
 te fuci planè effigiem exhibent.

Triorchis mas.

*Triorchis fœ-
mina.*

FORMA.

Folia habet Porro similia, oblonga, latiora & pinguia, in alarū cauis inflexa, Cat-
 liculos dodrantes, subpurpureos flores. Radicem minimis testiculis similem.

LOCVS.

Prouenit in pratis & campestribus.

TEMPVS.

In fine Maij mensis & initio Iunij hoc genus apparet, dein nusquam inueniri
 potest.

TEMPERAMENTVM.

Valentius quàm primo ordine exiccat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Radix illita tumores disijciendi uim obtinet, atque ulcera expurgat. Herpetas
 cohibet. Fistulas abolet, inflammatione laborantia illita mitigat. Sicca nomas com-
 pescit, ulceraq; putrescentia & maligna oris sanat. Cum uino pota aluum sistit. Fe-
 runtur de hac etiam quæcunque de Cynosorche dicta sunt.

EX GALENO.

Orchis Serapias ad Venerem nō similiter accōmodus est. Oedemata illitus dis-
 cutit, & ulcera sordida purgat, & herpetes sanat. Siccatus multò magis desiccatur,
 adeò ut & putrescentia contumaciāq; ulcera sanet. Habet etiam quippiam subad-
 stringens, ac proinde uentrem in uino potus sistit.

EX PLINIO.

Eius radices sanant oris ulcera, thoracis pituitas, aluum sistunt è uino potæ.



OENANTHE

Rot Steinbrech.

NOMINA.



OENANTHE, ἡ λειψάνθη Græcis, Oenanthe Latinis, Filipendula officinis, & Saxifraga rubra, Germanis rot Steinbrech nominatur. Oenanthe autem dicta haud dubiè est quod cum uino floreat. Leucanthon uerò à florum quos producit candore. Filipendulam à numerosis illis & rotundis in radice capitibus tuberibusue, quæ quasi ex filo quodam pendere uidentur, appellatam esse constat.

Saxifraga rubra
Oenanthe quare dicta.
Filipendula.

FORMA.

Folia Pastinacæ syluestris habet, flores candidos, caulem crassum, dodrantalem, semen Atriplicis, radicem magnam, multa habentem capita rotunda. Ex qua descriptione palàm apparet, Oenanthem eam esse herbam quam atlas nostra Filipendulam uocat, quod nulla prorsus sit nota quæ illi non conueniat. Folijs enim Pastinacæ erraticæ est, quæ planè eius herbæ quæ uulgò Petroselinon hodie appellatur folijs similia sunt. Hinc est quod in uulgaribus herbarijs scribatur folia Petroselino similia habere; quamuis Staphylino legendum esse putem. Manuscriptus etiam herbarius Filipendulam folia Dauci agrestis habere tradit. Flores denique illi albi, caulis crassus, dodrantalis, Atriplicis semen. Radices quoque multa, quinque interdum aut sex, nonnunquã etiam plura capita rotunda, tanquam à filo pendentia, ut ait antiquus herbarius, habentes; ita ut hinc esse Oenanthem abundè constet. Sed demus non esse, nihil tamen inde periculi erit, quod scilicet Oenanthem eadem quas Filipendula, sicut ex paulò post dicendis patebit, facultates obtineat.

LOCVS.

Nascitur in petris & montibus asperis. Tubingæ certè in monte Austriaco nominato copiosissimè prouenit, & in sylua non procul ab arce eius oppidi distante.

TEMPVS.

Junio mense floret, quo sanè tempore quia facilè ex floribus agnoscitur, carpi potest. Radices tamen inter autumnii initia colligendæ erunt.

TEMPERAMENTVM.

Amara admodum est Filipendula, ita ut non temerè hanc recentiores calidam & siccam in tertio ordine statuunt.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Oenanthes semen, caulis & folia cū mulso ad secundas eijciendas bibuntur. Radix cum uino contra stranguriam conuenit.

EX PAVLO.


Oenanthæ secundas eijcit, urinæ stillicidio, morboq; regio medetur.

EX PLINIO.

Caulis eius & folia cum melle ac uino nigro pota, facilitatem pariendi præstant, secundasq; purgant. Tussim è melle tollunt. Urinam cient. Radix uesicæ uitij me-
detur.

EX RECENTIORIBVS.

Filipendula in lotij stillicidio & urinæ remoratu, neque non renum doloribus, atque lapide eorundem, cõuenit. Eadem stomachi inflationes discutit, medetur & suspiriosis & anhelantibus, & omnibus morbis quos causa frigida concitauit. Farinam eiusdem cibus comitialium inspergunt.



O X Y S

Sauer Klee.

NOMINA.



ΞΥΞ græcè, Oxys Plinio & Latinis, Trifolium acetosum & Alleluya officinis, uulgo Panis cuculi, uel quod cuculus auis eo uescatur, uel quia hoc erumpente, cuculus uocem suam edere incipiat. Germanis Saueretele/Büchtele/Büchampffer/Büchbrot/Sauchtele/Suckgauchtele & Nasentele appellatur, Oxys uerò ab acido sapore dicta est.

Trifolium acetosum.
Alleluya.
Panis cuculi.

Oxys quare dicta.

FORMA.

Humilis herba est, longis tantum pediculis, tria summatim folia perinde atque Trifolium proferens, exigua, & in cacumine laciniata, sapore acido. Florem habet candidum, in simplici stylo inter folia proflientem; rufum in lunatis siliquis semen. Radicem in transuersum longam, geniculatam acrufam. Antiquus & manuscriptus herbarius putat hanc herbam esse Lotus fatiuam, cuius certe sententiam, quod à Dioscoride non describatur Lotus, neque probo neque improbo. Cur tamen non sequatur, facit quod herba quam Alleluya barbari uocant, non sit fatiua, sed passim in syluis & alijs locis umbrosis nascatur futuræ tempestatis preñuncia. Siquidem appropinquantem aliquam tempestate, arrigitur contra tanquam tempestati colluctatura.

LOCVS.

Multis locis prouenit: nam in syluis circa petrosam & aquea loca nascentem conspicimus. Nullibi autem copiosiore quam Tubingæ in primo statim conscensu montis Austriaci ad dextram prouenire uidimus.

TEMPVS.

Aprili atque interdum Maio mense floret, dum scilicet cuculi uox primum exauditur, atque hinc Cuculi panem dictam esse puto, ut dictum est antea. Obseruatum autem est à nobis, atque adeo multorum aliorum experientia cognitum, quod eius herbae copiosi flores, crebras illius anni pluias, & aquarum inundationes certo portendant; pauci contra siccitatem.

TEMPERAMENTVM.

Quum acidum in gustu saporem præ se ferat, idem cum Oxalide habere temperamentum, frigidum nempe & siccum, euidentissimum est.

VIRES. EX PLINIO.

Datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocæcen habent.

EX RECENTIORIBVS.

Vlceribus, uulneribus & fistulis, potissimum autem oris, medetur. Sitim arcet, & ut summatim dicam, easdem quas Oxalis, acetosam nostri nominant, facultates obtinet.

DE OPHRID CAP CXXIII

NOMINA.




OPHRIN hanc herbam nominare placuit, quod inuenerim plantam binis duntaxat folijs constantem hac appellatione insigniri. Germanicum nomen nullum extorquere potuimus: neque enim ea est quæ Durchwachs/hoc est, Perfoliata uocatur, ideoque hanc à geminis folijs Swebblatt nominauimus.

Ophris.

FORMA.

Caulem à radice singularem ac rotundum emittit, per bina quæ tantum habet folia penetrantem, à cuius medio ad summum usque calyculi multi sunt, & in his ueluti linguæ dissectæ nutantes flosculi. Radix uerò illi subest tenuis, adnascens sibi radículas multas, obliquas & odoratas obtinens.

bb LOCVS.



OPHRIS

Zweyblatt.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & nullibi maiori copia quam Tubingæ in pede montis Auftriaci prouenit.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret, dein statim euanescit. Quapropter hoc potissimum tempore colligenda.

TEMPERAMENTVM.

Gustanti glutinosa esse apparet, & quodammodo dulcis, ideoque calidam & siccam esse conijcere licebit.

VIRE S.

Iuxta dictarum qualitatuum mistionem contrahendi & constringendi facultate præditam esse nemini non constat. Hinc est quod ad rupta, & uulnera cõglutinanda hac herba cõmodè utantur recentiores.

DE ORMINO CAP. CCXIII.

NOMINA.

ORMINON Græcis, Orminum & Geminalis Latinis, Gallitricum officinis, Germanis *Scharlach* appellatur. Orminon autem Græcis haud dubiè dictum est, quia Venerem extimulat.

Gallitricum.
Orminon cur dictum.

GENERA.

Ormini duo sunt genera. Vnum satium, quod Gallitricum simpliciter nominant, & germanicè *Scharlach*. Alterum syluestre, quod alio nomine Saluiam syluestrem herbarij uocant, Germani *wilden Scharlach* / oder *wilde Salbey*.

Saluia syluestris.

FORMA.

Orminum satium herba est folijs Marrubio similis, caule quadrangulo, semicubitali, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, ad radicem uersus nutantes, in quibus semen est. Ex qua deliniatione abundè liquet herbam quam hodie Gallitricum uocant esse Orminum satium: hæc enim folijs Marrubio similis est, nisi quod sunt maiora & mirificè odorata: caule semicubitali, quadrangulo, ab imo rufescente, calyculis circa caulem siliquarum effigie prominentibus, & ad radicem deorsum spectantibus, in quibus semen nigrum & oblongum includitur: flosculis in candido purpureis, aut in dilutum ruborem inclinatis. Syluestre priori non admodum dissimile est, folijs satis ad Saluiam accedentibus, rugosaque asperitate præditis: caule sesquipedali, leniter hirsuto, in quadrangulum striato: floribus è cœruleo in purpureum uergentibus, ad aquilini rostri effigiem falcatis, calyculis pluribus in terram inclinatis, in quibus ad summum quatuor semina, parua, rotunda & fuluescentia reperiuntur.

Orminum satium.

Syluestre.

LOCVS.

Satium nusquam non in hortis satum prouenit. Syluestre autem passim omnia prata exornat, suaque sponte in his nascitur.

TEMPVS.


Vtrunque Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Orminum calidum & mediocriter siccum est, id quod amaritudo atque adstrictio in gustu satis monstrant.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Creditur semen satii cum uino potum Venerem stimulare. Cum melle argema & oculorum albugines purgat. Illitum cum aqua cedemata discutit. Surculos extrahit. Herba ipsa illita eadem potest, Syluestre uehementiorem facultatem habere, quare uingentis miscetur.



ORMINUM
SATIVUM.

Scharlach.



ORMINVM
SYLVESTRE.

Wilder Scharlach.

C

EX PAVLO.

Orminon Venerem stimulat, oculorum crassities cum melle repurgat, cedemata discutit, & extrahit aculeos. Syluestre domestico est ualentius.

EX PLINIO.

Semen ad Venerem stimulamdam, & ad oculorum argema & albugines ualet. Vtroque genere tuso extrahuntur aculei ex corpore, per se illito ex aqua. Folia ex aceto imposta, panos per se uel cum melle discutunt. Item furunculos, priusquã capita faciant, omnesq; acrimonias.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores etiam easdem facultates suo Gallitrico attribuunt: potissimum autem conferre ad albugines & oculorũ caliginem tradunt, ut hinc etiam colligi possit, herbam hanc Orminon esse Dioscoridis.

DE OROBO CAP. CCXV.

NOMINA.



POBOΣ Græcis, Eruum Latinis dicitur. Officinæ græcam appellationem retinuerunt. Germanis Eruen / ad imitationem latini nominis, appellari possunt.

GENERA.

Duo sunt genera Eruui: unum enim candidum, alterum autem rufum inuenitur. Nec inter se nisi floribus & radicibus differunt, quemadmodũ pictura affabre monstrat. Rufum uerò syluestre est, suaq; sponte in aruis, & inter dumeta prouenit.

FORMA.

D Exiguus frutex est, tenuis, angustis folijs, floribus uel candidis, uel in candido cœruleis aut puniceis, seminibus in siliquis sine septo cylindraceis, quemadmodũ pisa, se inuicem tangentibus.

LOCVS.

Lætatur loco macro, non humido, quia plerunque luxuria corrumpitur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, ipsedemq; semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccatur quidem Eruum excessu secundo intenso, calefacit uerò primo.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Capitis grauitatẽ facit Eruum, uentrem turbat, sanguinemq; per urinã ducit si comedatur. Coctum tamen appositũ boues saginat. Farina eius bonam facit aluũ, urinam cit, corporis colorem cõmendat. Frequentior in esu aut potu sanguinẽ cum torminibus per aluum & uesicam ducit. Ulcera cum melle purgat, & lentigines, & aspredinẽ cutis in facie, eiusdemq; maculas & reliquũ corpus. Nomas, gangrenasq; cohibet, & mammarũ duritias emollit. Fera ulcera, carbunculos, fauosq; rumpit. In uino macerata canum, hominũ, uiperarumq; morsus illita sanat. Cum aceto autem difficultates uring, tormina & tenesmos lenit. Prodest etiã ipsi qui cibo non nutriuntur, nucis magnitudine frixa & cum melle sumpta. Decoctum eius fouendo pernio nes, & in corpore pruritus sanat.

EX GALENO.

Orobus quatenus amaritudinis est particeps, eatenus incidit, extergit, atq; obstructions expedit. Cæterũ si sumatur copiose, sanguinẽ per urinas euocat. Homini num cibis prorsus hoc semen damnat: est enim & insuauissimũ & prauũ succi. Eruo autem instar lupini preparato ex melle utimur, ut medicamento crassos pulmonis thoracisq; humores expurgante. Candidum minus est medicamentosum, quàm id quod ad flauum aut pallidum colorem tendit.

DE OROBO



ERVVM
SATIVVM.

Weiß Eruen.

bb 4



ERVUM
SATIVUM.

Koroder wild Erum.

NOMINA.



ΠΕΟΣΕΛΙΝΟΝ, ἢ πετροσελινου ἄχριοι Græcis, Syluestre Petroselinum, & Apium montanū Latinis, officinis & barbaram sectantibus medicinā A viū mont nū. Petroselinum dicitur. Id quod hinc accidisse puto, quod linguæ græcæ Petroselinū offi- cinarum. incscitia, Oreoselinum dictionem in Petroselinum mutauerint: uel quia Petroselinum syl- uestre. simpliciter enunciauerint quod cum adiectione nominandum erat Petroselinū syl- uestre, ad differentiā nimirum Macedonici, quod uerè est Petroselinum ueterum. Germani Peterzilgen uocant. Nos deutsch Peterzilgen/oder Peterlin nominauimus, ut discerneretur à Macedonico, de quo suo dicemus loco.

FORMA.

Caulē habet unum dodrantalem à radice tenui exeuntem, circa quem ramuli & capitula Cicutæ similia, multò tamen tenuiora. In his semen oblongum, acre, tenue, odoratū, Cumino simile. Ex qua sanè descriptione sole clarius apparet, Petroselinum officinarum esse Oreoselinum ueterum: caule enim uno prouenit dodrantali ex radice pertenui, qui per ambitum ramulos spargit capitulis Cicutæ, tametsi multò tenuioribus: in ijs semen, acrimoniā gustu præferens, odoratum, tenue, Dioscoridis loci- cus emendatur. Cumino proximum. Neque obstat quod in plerisque exemplaribus Dioscoridis capitulorum Papaueris fiat mentio: error enim haud exiguus subest, quod scilicet non μικρονία παρεμπερη, hoc est, Papaueri similia, sed κωνία, id est, Cicutæ legendum sit. Id quod in primis confirmant ea quæ scribit Plinius libro xix. capite octauo, in hunc modum: Oreoselinum est Cicutæ folijs, radice tenui, semine Anethi, minutiore tamen. Quod si tamen hæc sententiā minus arriserit, nihil moror quin dicas Petroselinum germanicum, cum forma parum admodum à uero Petroselino distet, ut palam sit utriusque picturas intuenti.

LOCVS.

B Nascitur in locis petrosis & montanis, unde etiam nomen accepit. In Germania uerò nostra in hortis passim plantatur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo gradu extenso, siccum uerò in medio tertij.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen & radix in uino pota urinam cient. Menses etiam ducunt. Miscetur antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus & excalfacientibus. Non hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in petris prouenit: aliud enim ab hoc est Petroselinum.

APPENDIX.

Vt cunque autem diligenter hoc monuerit Dioscorides, tamen cauere non potuit quin posteritas medicorum Oreoselinum esse Petroselinum certò crediderit.

EX GALENO.

Oreoselini similis Apio uis est.

EX PLINIO.

Oreoselinum urinæ & menstruis efficac. Eo etiam purgantur scemina à uino.



OREOSELINVM

Leutsch Petersilg.

A

NOMINA.



H Græcis, Sorbus Latinis, est arbor cuius fructus Græcis *ἀκτιόνα*, Ga. Sorbus, leno teste, Latinis uerò Sorba appellantur. Officinæ latinam nomenclaturam retinuerunt. Germanis Speierling / uel Spozöpfel corrupta puto uoce pro Sorböpfel nominantur. Vel sic ab austeritate uocata sunt, quasi m̃la austeri.

GENERA.

Sorborum duo genera tradit Theophrastus lib. iij. de historia stirpium, cap. xij. *Duo sunt genera Sorborū Theophrasto.* fceminam fructiferam, & masculam sterilem. Differre quoque fructibus idem scribit, quod aliæ orbiculatum, aliæ ouatum ferant. Fructus autem orbiculati dulciores sentiuntur, ouati sæpenumero acidi, minusq; odorati. Plinius lib. xv. cap. xxi. *Plinius quatuor differentias Sorborum ponit.* in Sorbo quatuor differentias Latinos nosse memoriæ prodidit: alijs enim eorum, ait, rotunditas m̃li est, alijs turbinatio pyri, alijs ouata species ceu m̃lorum. Quartum genus torminale appellant. Nos picturam eius generis damus, quod turbinatum pyri instar fructum ædit, qui Germanis Spozbirn / corrupta uoce pro Sorbibrn / aut quasi austerum pyrum dicitur.

FORMA.

Sorbus arbor est procera, recto caudice, cortice leui, pinguiusculo, colore ad flauum albicante, cuius folia pediculo singulari, prolixo, neruaceoq; in uersus condita, alæ modo à lateribus exeuntia, tanquam ex omnibus unum fiat, ad neruum usque laciniatum, uerum ampliusculo interuallo distantia. Omnibus ramulis in extremo pediculi folium impar prominet, cuius accessione impar numerus efficitur. Figura laurum tenuifoliam imitantur, uerum ambitu serrata, breuioraq; sunt, nec in extremum acutum mucronata, sed in rotundius orbiculata. Flos racematim singulari petiolo, è multis minutis & candidis constans. Fructus uel orbiculatus, ut dictum est, uel ouatus, uel pyri instar turbinatus. Radices haud multas, nec altè descendentes, ualidas tamen & crassas & incorruptibiles agit.

LOCVS.

Loca amat humida, montana & frigida, eodem Theophrasto autore.

TEMPVS.

Autumno fructus suos Sorbus ostentat.

TEMPERAMENTVM.

Adstringentē obtinet qualitatē Sorbus, sed multò imbecilliorē q̃ Mespilus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Sorba m̃lorum colorem referentia, necdum maturefcentia, dissecta & in sole siccata, cum manduntur aluum sistunt. Farina eorum cum mola teritur, polentæ loco in eundem usum sumitur. Potest idem & decoctum eorum.

EX GALENO.

Sorba quidem adstringunt, sed multò fortius Mespila quàm Sorba. Quamobrem aluo fluenti in cibo accommodatissimè exhibentur. Sorba maiori cum uoluptate sumuntur: prorsus enim initio nihil acerbi uti Mespila habent, sed succus eorum citra acerbitatē duntaxat austerus est. Illud porrò neminem puto latere, hæc omnia parçè, non largè ut ficus, uuasq; esse comedenda. Nequaquam enim eis ut cibus, sed magis ut medicamentis egemus.


DE OPHIO

576



SORBVM
OVATVM.

Speierling.



OPHIOGLOSSVM

Waterjünglin.

NOMINA.

Ὀφιογλωσσον
cur dicta.



Lingua serpentina.

ERBA hæc appositissima uoce græcè Ὀφιογλωσσον appellari potest, non quod sic eam ueteres aut recentiores græci nominauerint, sed quod cum germanica nomenclatura optime quadret. Nec enim certò constat an Græcis, & sub quo nomine herba illa cognita fuerit. Quapropter ut no uam ei inderemus appellationē necessum erat: meliorem uerò hac ipsa quam retu limus, inuenire haud potuimus. Latine Ophioglossum, aut lingua serpentina dici potest: germanicè enim *Waterzünglin* uocatur, à forma & figura quam refert. E singulis nanque folijs singulari pediculo prodit, quod ligulam serpentis forma sua referre uidetur, ut pictura affabrè monstrat.

FORMA.

Folium unicū obtinet pingue, digiti longitudine, Plantagini aquaticæ uocatæ haud dissimile, è cuius sinu inferiore pediculus exit, cui quippiam herbacei coloris insidet, quod serpentinæ linguæ uocati lapilli similitudinē refert.

LOCVS.

Copiose in monte prope Tubingā Austriaco nominato prouenit. Amat & alia prata in montanis sita.

TEMPVS.

Maiο mense reperitur, subinde autem euanescit, ac nusquam apparet.

TEMPERAMENTVM.

Citra caliditatem insignem exiccat, id quod gustus satis docet.

VIRE S.

Vulneraria est herba, maligna siquidē & curatu difficilia uulnera sanat. Tumor es etiam discutit, & ferè Symphyti facultates obtinet.

DE XANTHIO ▶ CAP ▶ CCXIX ▶

NOMINA.

Lappa inuersa.
Xanthion unde
dictum.



XANTHION, ἡ φάσγανον græcè, Xanthium latinè nominatur. Ab herbarijs nostræ tempestatis Lappa minor & Lappa inuersa uocatur. Germanicè *Bettlerleus* / oder *Bübenleus*. Xanthion dictum, quod *ξανθός*, hoc est, flauos capillos faciat.

FORMA.

Caulem habet cubitalem, pinguem, angulosum, & in ipso alas multas. Folia Atriplici similia, incisuras habentia, odore Nasturtij. Fructū rotundū ceu grandem oliuam, aculeatum ut Platani pila, contactu uestibus adherentē. Ex qua quidem deliniatione nemo non uidet herbam cuius picturā damus esse Xanthion, quod illi omnes notæ ad amussim respondeant. Caule enim est cubitali, pingui, anguloso, crebras fundente alas, folijs Atriplici incisuras habentibus, Nasturtium manifestissimè olentibus, fructu magnæ oliuæ modo rotundo, ut Platani pila spinoso, contactu uestes apprehendente. Nucleus qui in echinata pilula clauditur à pueris estur dulci & grato cibo.

LOCVS.

Nascitur lactis & pinguibus locis, & lacubus paludibusue exiccatis.


TEMPVS.

Fructus Autumno maturefcit, quo sanè tempore colligi debet.

TEMPERAMENTVM.

Cum discutiendi uires habeat, facile colligitur temperamento esse calido & siccò præditum, id quod ex sapore etiam, qui est amarus & subacris, deprehendi potest.

VIRE S.



XANTHIVM

Bettlerseuß.

C VIRES, EX DIOSCORIDE.

Potest fructus antequam penitus inarescat collectus, tufus, & in fictili uase reconditus, capillos flauos reddere, si quis cum ufus exigit trybli pondus ex eo fumens, tepidaq; aqua madefaciens, nitro prius capite præparato illinat. Alij cū uino tufum ipfum reponunt. Fructus etiam cōmodè tumoribus illinatur.

EX GALENO.

Xanthion uocatur etiam Phafganion, Fructus difcutiendi facultatē obtinet.

DE XYLO▷ CAP▷ CCXX▷

NOMINA.

Goflipion.

Cotum.

Cotonium.

Cotonum.

Xylina ue

stes.

Lana lignea.



XYLON & Goflipium Plinio & alijs Latinis dicitur, Græci, quod fciam, eius nufquam meminerunt, Barbaris ac Arabibus Cotum & Bombax feu Bombafum, Germanis Baumwoll appellatur. Linum eius cotonium uulgò uocatur, ficut lanugo ipfa cotonū. Ab huius generis planta uestes xylinae, & lina xylina nominata funt. Iurisconfulti lanam hanc ligneam nuncupant.

FORMA.

Frutex eft exiguus, folio uitium, fed minore, floribus luteis in medio purpurafcentibus, fructu barbatae nuci fimili, lanugine pleno, quæ netur in linum candidiffimum, molliffimumq;. Nux autem ipfa cum hiafcens fatifcit, lanuginis globos repræfentat.

LOCVS.

D Superior pars Ægypti in Arabiam uergens, Plinio lib. xix. capite primo teftè, fruticem hunc gignit. In Creta etiam nafcitur, & in Apulia, ac Maltha prope Siciliam infula. Nunc in Germaniæ noftræ hortis plantatur, ut plurima alia peregrina, nobis antea prorfus incognita.

TEMPVS.

Tam fertilis hic frutex eft, ut fimulatque adolefit, quod duorum menfium fpatio accidit, nunquam definat florem & fructum proferre, donec alperitate & inclementia hyemis impediatur.


TEMPERAMENTVM.

Arabes, ut annotauit Serapion, fruticis huius lanuginem calidam & humidam effe ftatuunt.

VIRES EX ARABIBVS.

Foliorum fuccus medetur infantiumalui profluuiò atque torminibus. Semen tufi & thoracis uitijis. Oleo feminis emaculantur lentigines & faciei puftulæ. Semen etiam eius genitale femen procreat.

DE PARTHE



XYLON

Baumwoll.

C

Cautia.
Cotula foetida.

NOMINA.

ΑΡΘΕΝΙΟΝ, ἀμάρανος, χαμαίμηλον Græcis: Partheniū, Amaracum, Solis oculus, Millefoliū Latinis: Thufcis Cauta, officinis & herbarijs Cotula foetida dicitur. Germanis Krottendill / Hundsblium / wild Chamillen. Cæterum cogitabunt hoc loco studiosi, Amaracum de quo nunc agimus diuersum esse ab eo quem alio nomine Sampsycho Græci uocant, ut suo loco fusius dicemus.

FORMA.

Folia Coriandro similia habet tenuia. Flores per ambitū candidos, in medio luteos, odore graui & subuiroso, gustuq; amaro. Hæc Dioscoridis descriptio pulchrè & per omnia herbae illi quæ hodie uulgò Cotula foetida nominatur, respondet. Si quidem ea folijs est Coriandri tenuibus, flore per ambitum albo, intus luteo, odore graui, & sapore amaro. Folijs autem Coriandri, non quidem iam erumpentis & paulò antè enati, necdum maturescents, quæ sunt quadantenus lata & subrotunda, atque in extremitatibus incisa: sed maturi, cuius quidem in alto folia ad Chamæmeli aut Fœniculi foliorum formam accedunt, capillataq; sunt, constare scias. Sic enim utriusque folia similia sunt, ut Coriandrum Parthenij, & rursus Parthenium Coriandri prorsus referre folia uideatur. Quod ut discretè innueret Dioscorides, φύλλα λεπτά, id est, folia tenuia dixit, ut scilicet hac uoce latiora, quæ in infima sunt Coriandri parte, secluderet. Quod autem de ijs folijs Dioscorides locutus sit, extractandi ordinè abundè liquet. De tribus siquidem herbis, Chamæmelo, Parthenio & Buphthalmo, quæ sanè inter se congeneres, atque folijs admodum similes sunt, ordine agit, quod nunquã fecisset si nulla inter has similitudo intercederet foliorum, adde etiam florum. Buphthalmū tamen folijs ad Fœniculi formam propius quàm reliquæ duæ accedit. Sententiã hanc nostram confirmat, quod aliqui Parthenium, ob similitudinẽ quam habet cum Anthemide, Chamæmelon dixerint. Tam similis enim est Chamæmelo, ut frequenter etiam ab imperitis pro illa carpatur. His accedit & hoc, quod ob foliorum tenuitatem nonnullis Millefolium appellatum sit Parthenium, quod fieri minimè potuisset si ad latiora Coriandri folia Dioscorides respexisset. Præterea esse Parthenium Cotulam, nomen quod illi Thufci indiderunt satis declarat: Cautam enim appellauerunt, unde diminutiũ Cautula deductum est, & tandem corrupta uoce Cotula. Foetidam autem esse, grauis odor qui in ea omnium maximè sentitur, euidenter declarat. Nequaquã itaq; ea esse herba potest, quam Matricariã uulgò uocant, ut Hermolaus, & alij multi docti uiri hunc sequentes putant: quòd huius folia latiora sint, quàm ut cum Chamæmeli, Buphthalmi aut Coriandri tenuibus folijs cõparari queant, tantum abest ut similia sint. Huc accedit, quod omnium maximè euertere uidetur aduersariorũ sententiã: nemo unquam ex recentioribus Matricariæ herbae bilis & pituitæ per inferna tractricem facultatem tribuit, quam tamen Parthenio Dioscorides, Paulus & alij ueteres assignant, ut etiam hoc nomine Parthenium non possit esse Matricaria herba dicta uulgò.

Cotula uox unde
deducta.Parthenium nõ
est Matricaria.

LOCVS.

Nascitur inter segetes & iuxta semitas, intermixta ferè semper Chamæmelo. In hortorum etiam sepibus, Plinio teste, prouenit.


TEMPVS.

Primo statim uere, Maio potissimū mense, erumpit, ac totam æstatem durat.

TEMPERAMENTVM.

Non in strenuè, Galeno autore qui Amaracum uocat, calefacit, non autem uehementer desiccatur. Itaq; in caliditate tertij est ordinis, in siccitate uerò secundi.

VIRES.



PARTHENIVM

Krottendill.

C VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sicca cum oxymelite, aut sale pota, non secus atque Epithymum bilem atram & pituitam per inferna ducit. Asthmaticis & melancholicis prodest. Herba ipsa floribus demptis à calculosis & asthmaticis utiliter bibitur. Decoctum eius ad insidendum prodest in uuluae duritia & inflammatione. Illinitur cum floribus sacris ignibus, & inflammationi.

EX PAVLO.

Parthenium aridum in potu sumptum atram bilem per inferna deducit.

EX PLINIO.

Siccatum cum melle & aceto potum, bilem trahit atram. Ob hoc contra uertigines utilis & calculosis. Ad insidendum decoctum in duritia uuluarum & inflammationibus. Illinitur & sacro igni, item strumis cum axungia inueterata. Magi contra tertianas sinistra manu euelli eam iubent, dicens cuius causa uellatur, nec respicere: dein eius folium ægri linguæ subijcere, ut mox in cytho aquæ deuoretur.

DE POLYGONATO CAP. CCXXII

NOMINA.

Sigillum Salomonis.
Polygonatum
cur dictum.



Polygonaton Græcis, Polygonatū Latinis dicitur. Officinis, item herbarijs & uulgo, sigillum Salomonis, Germanis Weiswurts / hoc est, radix alba nominatur. Polygonatū autem à radice geniculorū frequentibus nodis ex interuallis tumente appellauerunt.

GENERA.

Duo eius genera damus. Vnum uerum, latioribus folijs: alterum multò angustioribus, quemadmodū pictura graphicè ostendit. A folijs utriusque nomina sunt indita.

FORMA.

Sigillum Salomonium.

Frutex est cubito altior, folia lauro similia habens, latiora tamen & leuiora, sapore mālī cotoneæ aut punicæ: gustatum enim adstrictionē quandam respicit. Per singulos foliorum exortus candidos flores promit numero maiore quàm folia, suppuratione à radice facta. Radicem habet candidā, mollem, longam, geniculis plenam, densam, graueolentem, digiti crassitudine obtinentem. Iam si singulas Salomonij sigilli notas libeat prosequi, omnes, ne una quidem reclamante, adesse comperies. Nanque in montibus gignitur, frutice cubito proceriore, folijs lauri latioribus, & læuioribus, quæ gustata quendam mālī cotoneæ aut punicæ saporem referant cum aliqua adstrictione. Flores per singulas foliorum eruptiones exiliunt candidi, qui folia numero longè superent, à radice ad cacumen supputata. Siquidem bini, terni, aut plures ab unoquoque foliorum sinu prodeunt. Radix illi candida, mollis, longa, crebris nodis articulata, densa, grauiter olens, digitali crassitudine. Floribus exculsis baccæ pisi ferè magnitudine dependent, ex uiridi nigricantes, & in quendam ordinem digestæ.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

TEMPVS.

Maior mense floret, quo etiam tempore carpi debet.


TEMPERAMENTVM.

Polygonatum mistam habet qualitatem. Est enim in eo adstrictionis pariter & acrimonie quippiam, necnon fastidiosa cuiusdam amaritatis explicatu difficilis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix illita uulneribus auxiliatur. Quinetiā uultus maculas delet & aufert.

EX GALE



POLYGONATVM
LATIFOLIVM.

Weiskortz.



POLYGONATUM AN
GVSTIFOLIUM.

Schmale Weiswurz.

EX GALENO.

Radice[m] Polygonati quidam uulneribus illinunt. Sunt etiã qui illo nauos maculasq[ue] in facie detergant.

APPENDIX.

Hodie quoq[ue] mulieres sigillo Salomonis sibi faciem extergunt & fucant, ut plañe nullum sublit dubium, quin Polygonatum esse constanter credamus.

DE POLYPODIO CAP. CCXXIII.

NOMINA.



ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ græcè, Polypodiũ, Filicula latinè, officinæ græcam appellationem retinuerunt, Germanicè Engelsfuß/ Baumfarz/ Droyffwurz uocatur. Polypodio nomen à radice quæ polyporum modo circum obtinet inditum est. Filiculam autem Latini à similitudine foliorũ cum Filice nuncupauerunt.

Polypodium ut de dictum.
Filicula.

FORMA.

Herba est palmi altitudine, Filici similis, subhirsuta, incisuris diuisa, non tamen ad eò tenuibus. Radix illi est hirsuta, cirros polyporum modo habens, minimi digiti crassitudine. Derasa hæc intus uiridis est, acerba, gustu subdulcis. Parte auersa folia fuluis maculis notata, sine semine.

LOCVS.

Gignitur in muscosis petris, & in agrestibus quercuum truncis.

TEMPVS.

Radix in fine Augusti carpenda.

TEMPERAMENTVM.

Polypodium dulcem simul & austeram habet uincensentem qualitatem, ut facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Purgandi uim obtinet. Coquitur autem cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua ad purgationem. Arida aquæ mulsæ insparsa, bilem & pituitam ducit. Radix trita & illita luxatis confert, & ad fissuras quæ inter digitos sunt.


EX PAVLO.

Polypodiũ exicat admodum citra morsum, & potum per inferna purgat.

EX PLINIO.

Radix in usu. Exprimitur succus aqua madefacta, & ipsa concisa inspergitur olei, & Betæ, & Maluæ, uel balsamento, uel cum pulicula coquitur ad aluum leniter soluendam, uel in febrì. Detrahit bilem & pituitam. Stomachum offendit. Arida farina indita naribus Polypum consumit. Illita luxatis medetur.

DE PRASIO.



POLYPODIVM

Engelfuß.

NOMINA.

ΠΑΣΙΟΝ Græcis, Marrubiū Latinis, Prassium officinis uocatur. Germanis Andorn das weiblin / weiß Andorn / Marobel / Gottsvergeß. *Marrubium Prassium.*

FORMA.



Frutex est ab una radice ramosus, subhirsutus, albicans, uirgis quadrangulis. Folium pollicis æquale, subrotundū, hirsutū, rugosum, gustu amarū. Semen per interualla in caulibus est. Flores asperi uerticillorū figura. Hæc delinatio adamusim Marrubio hodie dicto respondet. Siquidem singulari radice, angulosis ramulis fruticat, lanuginosum: folijs ferè orbiculatis, pollicis magnitudine, incanis, hirtis, amaris, lacteo flore, uerticillato cinctu caulem ex interuallo amplectente, cui succrescit teres & asperum semèn. *Marrubium.*

LOCVS.

Nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera.

TEMPVS.

Colligitur herba in æstate, Iulio potissimū mense, dum semine est prægnans.

TEMPERAMENTVM.

Marrubiū in caliditate quidem secundi ordinis iam completi est, in siccitate uerò tertij medijs aut completi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius folia arida cum semine decocta in aqua, aut uiridium expressus succus, datur cum melle asthmaticis, tussientibus & tabidis. Crassa è thorace cum iride sicca ducunt, Datur mulieribus quæ non purgantur, ut menstrua & secundas pellant. Item difficile parientibus, his qui à serpentibus morfi sunt, & qui letale quid biberunt. Vesicæ tamen & renibus nocent. Folia cū melle illita fordida ulcera purgant, pterygia nomasq; cohibent. Dolores laterum mitigant. Ad eadem pollet ex folijs contusis expressus succus & sole coactus. Cum uino & melle illitus, oculorum claritatem exacuit. Morbū regium per nares expurgat, Aurium doloribus per se, aut cum rosaceo instillatus prodest.

EX GALENO.

Prassium ut gustu amarum est, ita si quis utatur consentientē huic saporis actionē habet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemq; expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum detergit ac discutit. Succo eius cum melle ad aciei oculorum claritatem utuntur. Quinetiam & per nares morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus utique obstructionem dissolvere, meatumq; ipsum & explantationes membranarū expurgare necesse est.

EX PLINIO.

Huius folia semenq; contrita profunt contra serpentes, pectorum & lateris dolores, tussim ueterē. Iis qui sanguinē eijciunt eximie utile, scapis eius cum panico aqua decoctis, ut asperitas succi mitigetur. Imponitur strumis cum adipe. Sunt qui uiridis semen, quantum duobus digitis capiant, cum farris pugillo decoctū, addito exiguo olei & salis, forbere ieiunos ad tussim iubeant. Alij nihil cōparant. In eadē causa Marrubij & Feniculi succis ad sextarios ternos expressis, decoctisq; ad sextarios duos, si cochlearij mensura in die forbeatur in aquæ cyatho. Virilitum uitij tussum cum melle mirè prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruptis, conuulsis, neruorum contractionibus salutare. Potum aluum soluit cum sale & aceto. Item menstrua & secundas mulierū. Arida farina cum melle ad tussim siccam efficacissima est. Item ad gangrenas & pterygia. Succus uerò articulis, & è naribus morbo regio, minuendæq; bili cum melle prodest. Item contra uenena inter pauca potens. Ipsa herba stoma machū & excreationes pectoris purgat. Cum iride & melle urinam ciet. Cauenda tamē exulceratæ uesicæ, & renum uitij. Dicitur succus claritatē oculorū adiuuare.



MARRUBIVM

Weiß Androm.

NOMINA.



ΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝ, *ἑρπὸς βοτάνη* græcè: Verbenaca, Verbena, Columbaris seu *Verbenaca.*
 Columbina, herba Sagminalis latinè, herbarijs & officinis Verbena uo *Verbena.*
 catur. Germanicè *Wisenbraut* / uel *Wisenhart* / hoc est, ferraria, quod
 nomen ut olim, sic hodie quoq; habet. Peristereon nomen inditū à co- *Peristereon cur*
 lumbis, qui in ea uersari plurimum delectantur. Hierobotane autem, hoc est, sacra *dicta.*
 herba ideo dicta, quod ea olim apud Romanos domus purgabatur, familia lustra- *Hierobotane.*
 batur, Iouis mensa ad sacrificiū & epulas uerrebat, & sceciales in sacris legationibus
 illa coronabantur, uel ut Dioscorides inquit, quod in expiationibus suspensa & alli
 gata mirè utilis sit. Sagminalis uerò, quod inter sagmina, hoc est, gramina ex loco *Sagminalis.*
 sacro, præsertim arce Capitolij, cum sua terra euulla, primum hæc honorè haberet.

GENERA.

Dito Verbenacæ & Græci & Latini fecerunt genera. Dioscorides & alij Græci
 à plantæ habitu rectam & supinam. Plinius à sexu marem & fœminam. Recta Dio
 scoridis, est Plinij mas, aliq; nomine Crista gallinacea, à ferratis folijs quæ gallina *Crista galli*
 cææ cristæ formam referunt, dicitur. Recta autem nominata est, quod rectis ramu- *nica.*
 lis assurgat. Supina autem Dioscoridis apud Plinium fœmina est, Romanisq; Cin
 cinnalis uocatur. Supinam uerò uocarunt, quod semper humi supinè procumbat.
 Germani etiam per sexum genera illa distinguunt, uocantq; rectam Verbenacam
Wisenbraut & *das m emle* / Supinam uerò *das weible*.

FORMA.

Recta siue mas herba est altitudinis palmi, aliquando etiam maioris. Folia hinc *Recta.*
 incisa, subalbida, è caule prodeuntia, qui ei unus est magna ex parte, quemadmodū
 & radix una. Flos luteus, quo solo ferè à fœmina differre uidetur. Hæc descriptio
 pulchrè Verbenacæ mari respondet: est enim herba dodrantalis, interdum uerò
 procerior, quemadmodū ea est quæ in Germania nostra prouenit; nunquam enim
 aut rarissimè palmi altitudinē non excedit. Folia habet incisuris diuisa, albescentia,
 erumpentia è caule. Singularis denique illi, ut plurimum, caulis & radix una. *Supina.*
 Supina seu fœmina ramos profert cubitales, aliquando etiam maiores, angulosos, cir-
 ca quos folia sunt per interualla quernis similia, angustiora tamen & minora, per
 ambitum incisa, colore subcæsi. Radicem habet oblongam, tenuem. Flores pur-
 pureos, tenues. Cuius iterum deliniationis notæ Verbenæ fœminæ adamussim
 conueniunt. Siquidem multis statim à radice angulosis coliculis constat, coma sub
 tus incana, folio querno non dissimili, nisi quod minus est & angustius, multis per
 ambitū incisuris: flosculo ex albore & purpura uersicolore. Quibus omnibus ma-
 nuscripti codicis, qui Peristereon interpretatur Verbenam, accedit testimonium,
 & communis omnium consensus, à quo sine manifestis coniecturis & rationibus
 nunquam est discedendum.

LOCVS.

Vtraque in planis & aquosis locis prouenit.

TEMPVS.

Mas citius quàm fœmina apparet. Colligi debent, potissimū fœmina, circa Ca-
 nis ortum, nam hoc tempore floret.

TEMPERAMENTVM.

Vtraque desiccatur & adstringit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Rectæ Verbenacæ folia cum rosaceo, aut adipe suillo recenti apposita, uulua-
 rum dolores finire putantur. Ignem sacrum cum aceto illita reprimunt. Putrescen-
 tia ulcera cohibent, Vulnere glutinant, ueteraq; ex melle ad cicatricem perducunt.

552



VERBENACA RECTA
SIVE MAS.

Eisentrautmennle.



VERBENACA SVPI
NA SIVE FOEMINA.

Eisenkraut weible.

dd 3

C Supinae autem folia & radix in uino pota illitaq̄, aduersus reptilia serpentesue faciunt. Eadem drachmae pondere cum thuris obolis tribus, & uini ueteris hemina, quadragenis diebus ieiuno contra regium morbum bibuntur. Vetera cedemata, & inflammationes illita mitigant. Sordida ulcera purgant. Tota autem herba in uino decocta tonsillarum crustas abrumpit, & oris nomas gargariffata cohibet. Fertur sparso aqua triclinio qua maduerit, laetiores conuiuias fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum cum adiacentibus folijs; quartanis, quartum.

EX GALENO.

Vim habet adeò desiccantem ut uulnera glutinet.

EX AETIO.

Verbenaca recta ad capitis dolores summo praesidio esse testatur Archigenes, si ea coronetur patiens, aut si teratur cum aceto & rosaceo & illinat, aut oleo decoquatur, ac foueatur caput. Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoq̄ fluentes compescit. Radicis decoctum calidum ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisq̄ ulceribus medetur. Ad colicos radices semicontusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato: efficacissimum id esse experientia compertum est. Facit & ad calculos atq̄ ad inchoantem elephantiasim, si cum melle propinetur. Vere itidem ad epilepticos, & ad quotidiana, quartanaue febre laborantes. Ad podagricos uerò & coxendicū morbo affectos uino decocta exhibetur. Succus è radice expressi collutio ad fistulas commodissima est. Et si mororum liquori ac melli mixtus exuratur, & acidus illinatur, fistulas sanat. Potest etiam melle assumi, & fistulae tanquam collyrium injici, ac mirum in modum prodest.

D

EX PLINIO.

Aiunt si aqua spargatur triclinio qua maduerit Verbenaca, laetiores conuictus fieri. Aduersus serpentes conteritur ex uino. Omnibus uisceribus medetur, lateribus, pulmonibus, iecinoribus, thoraci, peculiariter autem pulmonibus, & quos ab ijs phthisis tentat. Dysenterias emendat ex aqua data carentibus febre, aut ex uino aminæo cochlearibus quinque, additis in cyathis tribus uini.

EX SYMEONE SETHI.

Verbenaca recta facit ad capitis dolores & defluentes capillos inuncta. Dentium dolores sedat, & motos atq̄ concussos confirmat. Oris ulcera sanat. Decoctum eius colicos & calculosos iuuat. Pota ijs qui primum elephantia laborare incipiunt, & comitiali morbo affectis succurrit. Item quotidiana & quartana laborantes similiter iuuat. Podagricos uerò & coxendicis morbo captos, uulneratosq̄ illita sanat.

DE PTERIDE CAP. CCXXVI.

NOMINA.

Filix.
Pteris cur dicta.




ΤΕΡΙΣ, ἢ πτερίδες Græcis, Filix Latinis dicitur. Officinæ latino nomine utuntur. Germanicè *Waldsfarr*. Pteris autem & Pterion ab alis auium, quarum formā in ramulis disposita eius folia referunt, Græcis dicitur: pennatus enim, & pennatis folijs frutex Filix est.

GENERA.

Pteris. Duo Filicis sunt genera, mas scilicet & foemina. Mas Græcis simpliciter *πτερίς*, Latinis Filix mas, Germanis *Waldsfarr mennle* dicitur. Foemina Græcis *θηλυπτερίς*, Latinis Filix foemina, Germanis *Waldsfarr weibele* appellatur.

FORMA.



FILIX MAS

Waldfarn gemeine.

dd 4



FILIX
FOEMINA.

Waldfarn weiblich.

FORMA.

A Filix mascula folia habet sine caule, sine flore, sine femine, ex uno pediculo cubitali longitudine excurrentia, incisa, alarum auium modo explicata, odore subgrauia. Radicem in terræ superficie foris nigram, crassam, oblongam, adnascentias appendicisue multas habentem, Ex qua siquidem descriptione satis constat hanc quam sub hoc nomine pictam damus herbam esse Filicem masculam: hæc enim neque caulem (quod enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulium rationem obtinet) neque florem, neque semen habet: folia ex uno pediculo cubitali à terra statim, aut ex stipite eius exeunt, utroque latere pinnata, subgrauis odore. Radix denique illi est per summa cespitum nigra, & ut Theophrastus ait, crassa, oblonga, multis adnatis & capillamentis fibrata, atque, ut summatim dicam, omnes illi notæ adamussim respondent. Filix femina folia priori similia obtinet, non tamen uno singularique pediculo ut illa hærentia, sed adnascentes ramulos multos altioresque habentia, Radix illi longa, obliqua, in nigro colore subflaua, aliquando uerò rubescens. Quæ descriptio iterum per omnia cum ea herba cuius picturam exhibemus ita conuenit, ut nulla prorsus sit nota quæ illi non respondeat.

*Filix mascula.**Filix femina.*

LOCVS.

Nascuntur ubique, sed maximè in montibus, syluis & saxosis locis.

TEMPVS.

Effodiuntur Vergilijs occidentibus, hoc est, autumno.

TEMPERAMENTVM.

Amaræ sunt Filices, paululum habentes adstrictionis, ut euidentissimum sit has calefacere & exiccare posse.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

B Filicis masculæ radix pellit latos lumbricos pondere drachmarum quatuor cum aqua mulsa pota. Melius autem si cum Scammonia, aut ueratrigri quatuor obolis detur: ueruntamen oportet sumentes alia præsumpsisse. Lienosis ut restituantur prodest pota. Radix etiam cum axungia illita contra ictus ab harundine factos utilis est. Eius autem hæc probatio. Peribit Filix quam per ambitum copiosior harundo coronet: & contra euanesceat harundo, quam obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Feminae radices cum melle in eclegmate sumptæ, latos lumbricos pellunt. Cum uino autem pondere trium drachmarum potæ, rotundos lumbricos eijciunt. Mulieribus datæ sterilitatem faciunt. Et si prægnans sumat, abortum. Sicca & in farinam trita, humidis & ijs quæ difficulter sanantur ulceribus insperguntur. Medentur iumentorum ceruicibus. Folia eius nuper prodeuntia oleum modo elixa comeduntur, aluumque molliunt.

EX GALENO.

Filix mas radicem habet maximè utilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmarum pondere in aqua mulsa sumpserit. Ad eundem modum factum quidem uiuum necare, mortuum autem eijcere mirum non est. Viceribus imposita ualenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei uim habet Thelypteris nominata.

EX THEOPHRASTO.

Thelypteris seu femina Filix, contra lumbricos uentris & latos & graciles utilis est. Contra latos quidem cum melle mixta, contra tenues autem in uino dulci cum polenta data. Quinetiam mulieri si detur, prægnanti quidem abortum: simpliciter autem feminis sterilitatem facere affirmant.

EX PLINIO.

C

EX PLINIO.

Vfus radice in trimatu tantum, neque antè neq; postea. Pellunt interaneorum animalia. Ex his tincas cum melle, cætera ex uino dulci triduro potæ. Vtraque stomacho inutilissima. Aluum soluit, primo bilem trahens, mox aquam. Melius tincas cum Scammonij pari pondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post unius diei abstinentiam bibitur, melle prægustato, contra rheumatismos. Neutra danda sceminis, quoniam grauidis abortum, ceteris sterilitatem facit. Farina earum ulceribus tetris inspergitur. Iumentorum quoque ceruicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt, ideo substerni utile est in locis suspectis. Vstæ etiam fugant nidore.

APPENDIX.

*Filix femine pro
fus caret.*

Falsum & cõmentitium haud dubie est quicquid neoterici aliqui de Filicis femine fabulantur: quod scilicet una solstitiali nocte floreat, eademq; hora cum defloruit maturum in terram semen cadat, ideoq; nisi quispiam tunc affuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse, tum quia incredibilia sunt, tum quod omnes, Theophrastus scilicet, Galenus, Dioscorides, Plinius, sterilem & sine femine dixerunt. Neq; etiam medici uel Arabes uel Persæ ad magicas uanitates nati, seminis huius meminerunt. Quapropter omnia hæc agyrtarum cõmenta esse uidentur humanæ ignorantie ad quæstum impudenter illudentium, quæ certè uel una hac ratione abundè satis confutari possunt, quod cuncta illa fieri & obseruari natali nocte diui Ioannis Baptistæ præcipiunt, cum natalis ea nox & solstitialis illa duodecim dierum numero nunc inter se distent.

D DE PEUCEDANO CAP. CCXXVII

NOMINA.

*Fœniculus por-
cinus.*



*Peucedanus un-
de dicta.*

Pinastellus.

ΕΥΚΕΔΑΝΟΣ Græcis, Peucedanus Latinis, officinis & herbarijs nostræ ætatis Fœniculus porcinus dicitur. Germanis Harstrang / Sewfenchel / oder Schwefelwurz / quod lachryma è radice sulphuri aut thuri similis exudet. Peucedanum autem nomen inuenit à pinu, quæ Græcis ὀβύνη dicitur, cui folio par est. Hinc posteriores Latini Pinastellum eum uocauerunt.

FORMA.

*Officinariū Peu-
cedanus non est
genuina.*

Caulem emittit tenuem, macilentum, Fœniculo similem, Comam habet circa radicem copiosam & densam. Florem luteum, radicem foris nigram, intus albam, graui odore, crassam, liquore plenam. Hæ sanè omnes notæ, nulla prorsus reclamante, huic quam pictam exhibemus herbæ conueniunt. Officinæ, quæ non raro adulterinas pro genuinis uendunt herbas, Peucedanum ostendunt radice non succosa, sed lignosa, nec graui odore, sed iucundo: unde satis cõstare potest uerum non esse.

LOCVS.

Gignitur in montibus opacis, potissimum in monte prope Tubingam, cui olim arx imposita fuit, in itinere uersus Rotenburgum sito.

TEMPVS.


Floret Iulio & Augusto mensibus, atque deinceps semen producit. Radix foditur exitu autumnii.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit ordine secundo iam completo; desiccatur uerò tertio iam incipiente.

VIRES, EX DIOSCORIDE.

Radice adhuc tenera Peucedani cultello incisa liquor effunditur, profluensq; statim in umbra reponitur: in sole siquidem languescit. Facit cum colligitur capitis dolores & uertigines, nisi quis antea rosaceo nares præungat, & caput irrigat. Radix assata inutilis



PEVCEANVS

Garstrang.

C inutilis fit. Colligitur & ex caulibus & ex radice sicut è Mandragora liquor atq; succus. Minus tamen efficax succo liquor, & uelocius expirat. Interdū etiā cōcreta inuenitur lachryma thuri similis, caulibus radicibusq; adhærens. Ex aceto & rosaceo inunctus lethargicis, phreneticis, uertiginosis, comitialibus, diuturnis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: in uniuersumq; neruorū affectionib. ex oleo & aceto inungitur. Strangulatu uulua laborantes olfactus, soporeq; profundo correptos reuocat. Suffitu serpentes fugat. Aurium doloribus cum rosaceo instillatus prodest. Causis dentium erosio inditus eorundem dolores mitigat. Contra tulsim in ouo sumptus facit. Difficultati spirandi, torminibus & inflationibus subuenit. Aluum leniter mollit. Lienem minuit. Difficiles partus egregie adiuuat. Ad uescig renuq; dolores & distentiones potus confert. Aperit uulua. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Sicca trita sordida purgat ulcera, ossiumq; squamas detrahit, ueteraq; cicatrice obducit. Ceratis malagmaticisq; calcificandi ui præditis miscetur. Eligi debet recens, non cariosum, solidum, odoris plenum. Succus ad potiones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho dissoluitur.


EX GALENO.

Peucedani radice quidē maximè, sed tamen etiā succo & liquore utimur. Sunt autē hæc omnia eiusdē specie facultatis, sed ualentior liquor, admodū exalfaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa neruos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine atque uiscositate humorū factis. Et intrò quidem in corpus sumpta, sed tamen etiā olfactu profunt. Porrò quod incidat atque extenuet, sæpe etiā dentium perforatorū dolores cauitati impositus protinus sedauit, quia uidelicet est tenuiū partium, & exalfactorius. **Q**uin **D** etiā lienes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo & extenuando crassos humores. Sed & radice ad hæc uti licebit, quæ & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia uidelicet ualidè desiccet, minus tamen quàm succus exalfaciens. Et ulceribus malignis arida illita optimum est remedium; ipsa enim expurgat, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

EX PLINIO.

Peucedani radices conciduntur in quaternos digitos offeis cultellis, funduntq; succum in umbra, capite prius & naribus rosaceo perunctis, ne uertigo sentiat. Et alius succus inuenitur caulibus adhærens, incisq; manat. Probatum crassitudine mellea, colore ruffo, odore suauiter graui, feruens gustu. Et hic in usu & radix, & decoctum eius pluribus medicamentis. Succo tamen efficacissimo, qui resoluitur amaris amygdalis, aut ruta, bibiturq; contra serpentes, & ex oleo perunctos tuetur. Idem pectoris doloribus subuenit. Pituitam & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta lieni & renibus prodest. Perungunt & radicē sudoris causa eliciendi, quoniam caustica uis ei est. Peucedano ad recentia uulnera tanta uis est, ut saniem ossibus extrahat. Cum semine Cupressi bibitur, si sanguis per os redditus est, fluitq; ab infernis. Strangulatus uulua nidore ustum recreat, laxanturq; suffocationes eo: sed quidam ammiscunt in uino semen Cupressi cōtritum. Potum cum coagulo uituli marini æquis portionibus comitiales sanat. Succus infantium rami-
ci, & umbilicis eminentibus inungitur. Stranguriæ cum melle medetur.

Item semine lethargici excitantur, & ut perhibent ex
euphorbio naribus tactis Peuce-
dani succo,



60t

PERSICA

Pfirsichbaum.

cc

C

NOMINA.



Persica cur dicta.

ΠΕΡΣΙΚΗ μύρτα Græcis, Persica mālus Latinis: antiquum nomen herbarij uulgares retinuerunt: Germanis Pfersichbaum appellatur. Persica fortè dicta, quod ex Perside primum aduecta sit.

FORMA.

Persica folijs amygdalæ maioribus constat: flore subpunico, pomo carnosissimo, succulento, foris lanuginoso, dura intus & scabra nuce, in qua nucleus qualis amygdalis.

LOCVS.

Parsim in hortis, uineis potissimū, nascitur. Gaudet autem aquosis.

TEMPVS.

Floret primo statim uere, fructus uerò eius autumnis ferè exitu maturefcit, celerimè marcescens.

TEMPERAMENTVM.

Persica arbor in germinibus & folijs uincens amaram qualitatem habet, ut hoc nomine calidam esse nemo dubitare possit. Fructus eius in secundo ordine frigidus & humidus existit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Persica poma stomacho grata sunt, matura bonum faciunt aluum, cruda uerò aluum constringunt. Siccata uehementius adstringunt. Siccorum decoctum haustum stomachi & uentris fluxiones sistit.

EX GALENO.

Folia Persicæ trita & super umbilicum imposita lumbricos necant. Alioquinè etiam discutiens medicamentum est. Pomorum uerò eius succus & ueluti caro facile corrumpitur, omninoque noxam infert, quapropter haud post alios cibos ultimoque, sicut nonnulli solent, illa offerri oportet: nam in summo natantia corrumpuntur. Huius uerò, quod omnibus commune est, meminisse oportet: quæcumque uitiosi succi, quæ humida & lubrica sunt, facileque descendunt seceduntue, præ alijs comedenda esse: sic enim & ipsa celeriter subeunt, & alijs præeunt, ac quasi iter muniunt. Postremò autem sumpta, unà secum alia quoque in corruptionem trahunt.


EX PLINIO VALERIANO.

Persicorum cibus est quidem stomacho inutilis, eò quod citò succus eius inacescat, & caro æque in digestionem uitietur, uerum minimè grauis, dum non diutius in intestinis moratur, & ad ima semper exitu celeriter festinat. Persicorum cibus negatur à medicis membra nutrire. Sed & Galenus suadet nunquam omnino post cibum sumere, corrumpi affirmans si cibus cæteris innatent. Persicorum folia trita & imposita uentris animalia perimunt & expellunt. Eadem sicca & in puluerem tusa, recentes plagas cruentorum uulnerum claudunt. Nucleus persicorum capitis dolori cum oleo & aceto tritus illinitur: quamuis quidam cum solo rosaceo terere maluerint. Gummi gutta quam Persici truncus illachrymat, fluenti aluo medetur. Eadem mixta cum uino etiam in uesica lapillos frangit. Trita ex aceto impetigines reprimit. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperam arteriæ canalem leuiorem facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstructos sinus referat: uitia pulmonis expurgat.

APPENDIX.

Flores Persicæ saccharo conditi, instar rosarum aut uiolarum, aluum haud leuiter mouent atque subducunt.

DE PEPLO.



603

PEPLOS

Wolffmilch.

cc 2

C

Efula rotunda.



ΕΦΛΟΣ Græcis, Peplos Latinis, officinis & uulgo Efula rotunda, Germanis Teufelsmilch appellatur.

FORMA.

Exiguus frutex est albo liquore plenus: folijs paruis ut Rutæ, latioribus tamen. Tota eius coma dodrantalis, rotunda, humi fusa: semine sub folijs paruo & rotundo, minore quàm candidi papaueris, Radice una, ex qua totus frutex prouenit.

LOCVS.

Nascitur in hortis & uineis.

TEMPVS.

Colligitur melsibus, siccaturq; in umbra, & continuè uertitur.

TEMPERAMENTVM.

Idem cum Tithymallis habet temperamentū, atque adeo ex quarto calefacientium ordine est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa multos habet usus, radix uerò inutilis. Semen eius tusum, feruidaq; aqua madefactū reconditur. Pituitam & bilem acerabuli pondere cum hydromelitibus cyatho potū ducit. Obsonijs mixta herba aluū conturbat. Conditur in muria.

EX GALENO.

Peplos frutex liquorem similem Tithymallis habet, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

EX AETIO.

Pituitam ac bilem ducit acerabuli mensura cum mulsæ cyatho bibitum Pepli semen. Sale etiam herba maceratur, flatuq; discutit, ut Hippocrates asserit. Summo pere igitur confert flatuosis affectibus, qui in melancholia dominantur, item diurnis lienis & uteri & coli flatibus, tumefactisq; cedematibus in abdomine.

EX PLINIO.

Semine Pepli potio aluus soluitur, bilis ac pituita detrahitur. Media portio est acerabuli mensura, in aquæ mulsæ heminis tribus. Et cibus inspergitur obsonijsq; ad molliendam aluum.

DE PILOSELLA CAP. CCXXX

NOMINA.



VO nomine ueteribus Græcis aut Latinis nominata sit hæc herba, ingenuè fateor me ignorare. Neq; enim est $\mu\upsilon\delta\sigma\epsilon\varsigma$ Dioscoridis. Cum itaque græco & latino nomine destitueremur, barbaro uti nobis necesse fuit, nisi planè herbam hanc uulneribus glutinandis mirè utilem, præterire uoluissimus. Herbarij itaq; nostræ ætatis à copiosis pilis quibus uestitur, Pilosellam, Germani *Wenßörlin* uocant.

Pilosella unde dicta.

GENERA.

Maiores. Duo eius herbæ genera reperiuntur, in nullo ferè nisi floribus distantia. Vnum genus maioribus folijs, & quæ se à solo sustollunt, floribusq; luteis, maior Pilosella nominatur, Germanis propriè *Tageltraut*. Alterū minoribus folijs, in terra sessilibus, floribus purpureis, & quasi in pappum euanescentibus, Germanis *Wenßörlin* / oder *Dasenspätlin* peculiariter appellatur. Sic etiam suam Pilosellam manu scriptus herbarius in maiorem & minorem digessit.

FORMA.

Herba est folijs in terram graminis modo sparsis, pilosis, albicantibus à terra, supernè



PILOSELLA
MAIOR.

Nigelkraut.

ec 3

PILOSELLA
MINOR.

Weyßblüt.



A supernè uirentibus, floribus luteis aut purpureis, radice in exilitatē multam extenuata. Ex qua descriptione sole clarius fit, eam herbam quæ à Græcis Myosotis, à *Myosotis non est Pilosella.* Latinis autem Auricula muris dicitur, non esse Pilosellam: nam, ut reliqua taceam, neque maior neque minor Pilosella cœruleum flosculum uelut Anagallis obtinet: ut non parum errent herbarij nostri temporis qui Pilosellam alio nomine Muris auriculam appellari tradunt.

LOCVS.

Nascitur utrunque genus locis montosis & collibus terrenis. Maior autem inuenitur etiam in asperis & incultis agrorum limitibus.

TEMPVS.

Maior & Iunior potissimū mense florent. Minor tamen Pilosella paulò post initia Iunij mensis disperit, & nusquam subinde inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Esse calidas & siccas Pilosellas gustus palam declarat: habent enim adstrictionē cum exigua quadam acrimonia coniunctam, ut hoc nomine ad purificanda ac subinde glutinanda uulnera sint mirificè utiles.

VIRES EX RECENTIORIBVS.

Ferunt foliorum farinam uulnera mirum in modum glutinare. Herbarum recentis succum exprimunt ad cohibendos quartanæ febris horrores. Eodem tingunt gladiorum aciem, ut omne ferrum aliud domet, secetq̃: ferrum enim quod huius succo comaduit tantam contrahere duritiam, tamq̃ magnū induere robur produunt, ut chalybis aciem respuat. Has certè omnes facultates manuscriptus herbarius Pilosellæ adscribit. Recentiores huius herbarum radicem Maio mense effossam, siccata, & in puluerem redactam, ac subinde potam, aut in cibo datam, efficacissimū esse ad uersus ramicem remedium tradunt.

DE PIMPINELLA CAP. CCXXXI.

NOMINA.



T appellata sit Græcis aut Latinis herba hæc quam hodie uulgus herbariorum & officinæ Pimpinellam uocant, nondum nobis certò scire licuit. Sunt qui Pampinulam & Bipennulam nominent. Germani *Bibinellen* & *Bibernellen* appellant. *Pampinula.*

GENERA.

Duū est generum Pimpinella. Vna maior, radice admodū longa, folijs multifariam scisis, Sisaro haud dissimilibus, caulibus angulosis, floribusq̃ in summo exiguis & candidis. Altera minor, caulibus rufescentibus, folijsq̃ minoribus, & non dissectis multifariam, sed ferratis tantum, aliàs priori per omnia similis.

FORMA.

Herba est folio mucronato, dissecto, aut in extremitatibus ferrato, caulibus ab eadem radice binis aut trinis, angulosis, & interdum rubentibus, in quorum summo nascuntur flores minuti & candidi, & ijs decidentibus semen exiguum Oreofelini semini simile. Radice crassa, longa, & subrubente, acri admodum.

LOCVS.

Lucis & opacis locis minus, in pratis autem maius, affatim citra cultū erumpit.


TEMPVS.

Æstate in autumnum usque floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum acrimoniam non exiguam in gustu præ se ferat, haud dubiè in secundo ordine calida & sicca erit, imò secundum calefaciendi ordinem excedere credibile est, & ad tertium ferè accedere.

PIMPINELLA
MAIOR.
Groß Bibinell.





PIMPINELLA
MINOR.

Klein Bibinell.

C

VIREs EX RECENTIORIBVS.

Sanguisorba nō
est Pimpinella.

Pimpinellæ succus bibitur contra serpentium morsus. Ex uino pota calculos terit. Stranguriã etiam decocta leuat. Succus eius potus omne uenenum discutit. Aqua eius ignis uī expressa oculorū caliginem discutit. Hæ sunt facultates quas illi antiquus herbarius tribuit. Alij tradunt succum eiusdem faciei maculas detergere posse. Est autem radicis Pimpinellæ tum usus præcipuus, quum sæuientis populatim pestilentiae contagia arcere conamur: unice enim uenenis aduersatur, & corpora ab hac lue uindicat, ut adfirmant, si tantum in ore teneatur. Quod certè non potest ea quam hodie Sanguisorbã uocant herba. Quare mirum in modū errant, qui hanc cum Pimpinella confundunt, ut fusius suo dicemus loco,

DE PASTORIA BURSA▷ CAP▷ CCXXXII▷

NOMINA.

Bursa aut pe-
ra pastoris cur
dicta.



VO nomine herba quam uulgius Pastoriam bursam appellat græcis & latinis medicis dicta sit, ignorare me ingenuè fateor. Sunt qui peram etiam pastoris nominent, à folliculis in exiguæ uulgæ similitudinem compressis, turbinata cordis effigie. Germanis Descheltraut & Dirtenjœtel uocatur.

FORMA.

Herba raro pede altior, ramosa, Eruçæ folia habens, at minora. Flores exiguos, candidos. Semen in uulgis minutum & nigrum. Radicem candicantē & oblongã.

LOCVS.

Nascitur propter uias passim, & in parietinis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus legitur.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & adstringit.

VIREs EX RECENTIORIBVS.


Ex aceto trita collectionum inflammationes refrigerat, ac eò confluentes humores cohibet. Imponitur sacris ignibus, & quibus stomachus æstuat. Succus eius purulentis auribus infunditur. Cruenta sanat uulnera. Medetur dysentericis, sanguinem excreantibus, neq; non muliebri profluuiō. Manuscriptus herbarius addit hanc sanguinem enaribus profluentem sistere mirificè posse. Herbam quoque manu tantum gestatam, mox idem efficere tradit. Quid multa? mirè efficacax est in comprimendis omnibus sanguinis eruptionibus,

DE PEDE



PASTORIA
BVRSA.

Deschelkraut.



PES LEONIS

Synon.

NOMINA.



QVAM uulgus herbariorū Pedem leonis nominat, non est Dioscoridis Leontopodion, id quod descriptio satis monstrat. Quo uerò nomine Græcis & Latinis appellata sit, mihi nondum constat. Sunt ex barbaris qui Alchimillam, alij etiam qui plantam leonis nominant. Sic autem dicta, quod folia habeat instar leonini pedis lata & rotunda. Germanis Symaro/Löwentapen/Löwenfuß/& vnser strawen mantel uocatur.

Leontopodion
Dioscoridis non
est Pes leonis her
bariorum.
Alchimilla.
Pes leonis cur
dicta.

FORMA.

Dodrantalís est herba, folia lata, crispa & rotunda octo ferratis incisuris distincta, non tamen ad pediculos usque, qui statim è radice exeunt, fissa habens. Flores item exiguos & luteos profert, Radicem digito crassiore, & sesquipalmo longiorem, subrubescentem.

LOCVS.

Pasim in pratis, in alto potissimum sitis, nascitur.

TEMPVS.

Maió mense erumpit, ac inter Iunij initia floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & radix ad strictione uehementi participant, atque adeo exiccant, Recentiores id ipsum in secundo efficere ordine tradunt.

VIRESEXRECENTIORIBVS.

Vulneribus glutinandis aptissima est. Decocto enim illius lauant utiliter omnia uulnera. Linteum quoque in eo madefactum illis comode imponitur. Mulierum mammas impense laxas linteum decocto eiusdem intinctum & impositum, duras solidasq; efficit. Decoctum denique hoc epotum interanea uulnera, rupturasq; glutinat. Et quod dictum mirum est, tanta eius plantæ in glutinando uis est, ut ramices intestinorum, in pueris potissimum, sanare possit.

DE POLYGONO MARE CAP. CCXXXIIII

NOMINA.



ΠΟΛΥΓΟΝΟΝ ἀγγύη græcè: Proserpinaca, Seminalis à seminis multitudine, & Sanguinalis à cohibendo sanguine nominatur. Officinis Corrigiola & Centumnodia. Germanicè Weggras/Denngras/Wegdrutt appellatur. Polygonon à geniculorum frequentia, & multitudine dictum est.

Seminalis cin
dicta.
Sanguinalis.
Corrigiola.
Centumnodia.

FORMA.

Herba est ramis tenuibus, teneribus, copiosis, geniculis intersectis, in terra graminis modo repentibus. Folijs Rutæ similibus, longioribus tamen. Iuxta singula folia semine, unde masculum uocatur. Flore albo aut puniceo.

LOCVS.

Nascitur pasim, quotidieq; pedibus conculcatur, sua sponte in aggeribus & semitis proueniens.

TEMPVS.


Æstate floret, quo etiam tempore legitur.

TEMPERAMENTVM.

Vti ad strictionē quandam obtinet Polygonum, ita sanè uincit in eo aqueum frigidum, ut uidelicet secundi sit ordinis medicaminū refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Est etiam exiccatorium.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Vim habet adstringendī & refrigerandi succus Polygoni potus. Prodest sangui
ff nem ex-



POLYGONVM
M A S.

Weggras-

A nem expuentibus, &alui defluxionibus, cholericis & urinæ stillicidio. Vrinā enim euidenter ducit. Cum uino potus uenenatorū morsibus auxiliatur. Valet etiam ad febrium circuitus una hora ante accessiōē sumptus. Muliebri profluuium appositus sistit. Aurium doloribus, & purulentis auribus instillatus confert. Cum uino decoctus melle adiecto, eximiē ad genitalium ulcera facit. Folia contra stomachi ardorem, sanguinis reiectionem, herpetas, ignes sacros, inflammationes, cedemata, & uulnera recentia illinuntur.

EX GALENO.

Polygonū ijs sanè quibus stomachus aestu feruet extrinsecus illitum auxiliatur: ueluti etiam ignes sacros & calidas phlegmonas iuuat. Porrò tale cum sit, & fluxiones reprimat, & hac ratione uidetur exicatorium esse. Quare cum herpetum, tum ulcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimū autem inflammatione & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum uulnecum glutinatoriū. Sed & auriū ulceribus prodest: & si uel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccet. Easdem ob facultates & muliebri profluuium, & dysenteriā, & sanguinis eiectiones, & undecunque aliunde immoderatiores impetus sistit. Refert Dioscorides quod & urinam prouocet exhibitum stillicidio affectis, Non tamen affectum exactè discriminat in quo dari ipsum expediat.

EX PLINIO.

B Succus eius infusus naribus supprimit sanguinem, & potus cum uino, cuiuslibet partis profluuium excreationesq; cruentas inhihet. Vis eius spissare ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, urinam ciet, rheumatismos cohibet: qui si non fuere, non prodest. Stomachi feruori folia imponuntur. Vesicæ dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorū dolori per se. Dabatur & in febribus ante accessiones, duobus cyathis in tertianis quartanisue præcipuè. Item cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi.

DE PEGANO > CAP > CCXXXV >

NOMINA.



PHTANON *κωνιδιον* græcè, Ruta hortensis latinè: officinæ retinuerunt nomen latinum: *Rauten* & *Weintauten* germanicè uocatur. Peganon Græci, Plutarcho libro tertio sui symposij teste, à facultate, quod calore siccitateq; genituram coagularet, dixerunt: *πηγνυδα* enim coagulare, & quasi in glaciem contrahere est. Hinc uterum gestantibus inimica etiam coronis inserta putatur.

Peganon unde dictum.

FORMA.

Frutex est Ruta hortensis grauiissimi odoris, semper ferè uirens: folio exiguo, penè rotundo, cæsi coloris, denso, surculosis ramis: flore luteo, angulosis calycibus, in quibus semen album continetur.

LOCVS.

Prouenit passim in hortis, amat aprica & sicca loca.

TEMPVS.


Floret æstate, semen autem Autumno maturescit, quo etiam tempore carpendum uenit.

TEMPERAMENTVM.

Gustū non solum acri, sed & amaro est, ex tertio ordine exalfacientium, & strenuè desiccantium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vrit, calfacit, exulcerat, urinam mouet, menstruaque ducit. Aluum sistit pota
ff 2 & co.



RUTA HOR
TENSIS.

Weinraut.

A & comeſta. Letalium uenenorū antidotum eſt, ſi ſemen acetabuli menſura in uino bibatur. Folia per ſe ante cibum ſumpta, & cum nucibus iuglandibus, aridiſq; ficis, inefficacia uenena reddunt. Contra ſerpentes ſimiliter ſumpta proſunt. Geniturā tam in cibo quā potu extinguit. Coctum cum anetho ſiccō, tormina ſiſtit. Facit etiam ad lateris thoraciſq; dolores, difficultatē ſpirandi, tuſſes, pulmonis inflammationem, coxendicum, articularumq; cruciatus, rigores circuitibus certis repetentiū febrium, uti prædictū eſt, pota. Ad inflationes coli, uteri & recti inteſtini, decocta cum oleo & infuſa. Vuluæ ſtrangulatu liberat trita cum melle, ſi à genitali uſq; ad ſedem imponatur. Feruefacta cum oleo & pota, lumbricos excutit. Articularū doloribus cum melle, aquę inter cutem, quæ hypofarca dicitur, cum ficis illinitur. Eiſdem pota auxiliatur, in uino decocta ad dimidias partes, & ſi ea abſtergantur. Cruda, ſaleq; condita ac comeſta, uiſus aciem exacuit, & oculorū dolores cum polenta illita ſedar. Cum roſaceo & aceto capitis doloribus ſuccurrit. Sanguinis narium profluuiā trita & impoſita ſiſtit. Teſtium inflammationibus cum Lauri folijs illita, & exanthematis cum myrto & cerato prodeſt. Cum uino autem, pipere & nitro conſtricta, albæ uiriligni medetur. Cum iſdem illita thymos & myrmecias tollit. Cum melle & alumine impoſita lichenibus prodeſt. Succus in malicorio caſtactus & inſtillatus aurium doloribus ſuccurrit. Oculorū hebetudinibus cum ſucco Fœniculi & melle inunctus ſubuenit. Ignes ſacros, herpes & achores cum aceto, ceruſſa & roſaceo inunctus ſanat. Ceparum & aliorum acrimoniam cōmanducata domat.

EX GALENO.

Ruta incidere atque digerere craſſos lentosq; humores poteſt. Ob eam autem uim & urinas mouet. Quinetiā tenuium eſt partiū, flatuſq; extinguit. Quare ad inflationes prodeſt, ac Veneris appetitum cohibet. Diſcutit atq; exiccat ſtrenuē: eſt enim ex eorum medicamentorū numero quæ ualenter exiccant.

EX PLINIO.

Quecunq; Ruta & per ſe pro antidoto ualet, folijs tritis & ex uino ſumptis. Contra aconitū maximē & ixiā. Item fungos, ſiue in potu detur, ſiue in cibo. Simili modo contra ſerpentiū iſtus, utpote quū muſtelæ dimicaturæ cum his, Rutam prius edendo ſe muniant. Valent & cōtra ſcorpionū iſtus, & araneorū, apum, crabronū, uesparū aculeos, & cantharidas, ac ſalamandras, canisue rabioſi morſus, acetabuli menſura ſi ſuccus ē uino bibitur, & folia trita uel cōmanducata imponunt cum melle & ſale, uel cum aceto & pice decocta. Succo uerò perunctos, aut etiā habentes, negant feriri ab his maleficijs. Serpentesq; ſi uratur Ruta, nidorem fugere. Efficaciſſima tamen eſt ſylueſtris radix cum uino ſumpta: eandem adijciunt efficaciorē eſſe ſub diō potam. Pythagoras oculis noxiam putauit falſo, quoniam ſculptores & pictores hoc cibo utuntur oculorū cauſa. Cum pane quocq; uel naſturtio fatiuæ atq; ſylueſtris propter uiſum. Vt aiunt, multi ſucco eius cum melle attrito inuncti diſcuſſerunt caligines, uel cum lacte mulieris puerum enixæ, uel puro ſucco angulis oculorū tactis. Epiphoras cum polenta impoſito. Lenit autem capitis dolores pota cum uino, aut cum aceto & roſaceo illita. Si uerò ſint cephalæa, cum farina hordeacea, uel aceto. Eadem cruditates diſcutit, mox inflationes, dolores ſtomachi ueteres. Vuluas aperit, corrigitq; conuerſas, illita in melle toto uentre & pectore. Hydropticis cum ficu, & decocta ad dimidias partes, potaq; ex uino. Sic bibitur & ad pectoris dolores laterumq;, & lumborū, tuſſes, ſuſpiria: pulmonū, iecinorū, renum uitia: horrores frigidos. Ad crapulæ grauedines decoquuntur folia poturis. Et in cibo uel cruda uel decocta conditæ uel prodeſt. Item torminibus in Hyſſopo decocta, & cum uino. Sic & ſanguinem ſiſtit interiorem, & narium, indita: ſic & collutis dentibus prodeſt. Auribus quoque in dolore ſuccus infunditur, cuſtodito ut diximus modo. E ſylueſtri uerò contra tarditatē & ſonitum cum roſaceo, uel cum lau-

reo oleo, aut cumino & melle. Succus & phreneticis ex aceto tritæ instillatur in tempora & cerebrum. Adiecerunt aliqui & Serpyllum, & Laurum, illinentes capita & colla. Dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendū. Dederunt & comitialibus bibendum decoctæ succum in cyathis quatuor ante accessiones, quarum frigus intolerabile est. Alfosisq̃ crudam dari in cibo. Urinam quoque uel cruentam pellit. Fecminarū etiam purgationes, secundasq̃, etiam emortuos partus, ut Hippocrati uidetur, ex uino dulci nigro pota. Itaque illitam & uuluarum causa etiam suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Et contra ileum decoctæ farina in oleo, & uelleribus collecta. Multi uerò & contra purulentas excreationes sicca drachmas duas, sulphuris unam & dimidiam sumi censent. Et contra cruentas, ramos tres in uino decoctos. Datur & dysentericis cum caseo in uino contrita. Dederunt & cum bitumine infrictam potioni propter anhelitum. Ex alto lapsis seminis tres uncias, ex olei libra, uiniq̃ sextario. Illinitur cum oleo coctis folijs partibus quas frigus adufferit. Si urinam mouet, ut Hippocrati uidetur, mirum est quosdam dare uelut inhibentem potui contra incontinentiā urinæ. Psoras & lepras cū melle & alumine illita emendat. Item uirilignes uel rugas, strumas, & similia, cum hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Item ignem sacrum ex aceto & oleo, uel psimmythio. Carbunculum ex aceto. Nonnulli laferpitiū unā illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas curant. Imponunt & mammis turgentibus decoctam, & pituitæ eruptionibus cum cera. Testium uerò epiphoris cum ramis lauræ teneris, adeò peculiari in uisceribus his effectu, ut syluestri Ruta cum axungia ueteri illitos ramices sanari prodant. Fracta quoque membra semine trito cum cera imposito. Radix Rutæ sanguinem oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat. Ex reliquis quoque quæ traduntur, mirum est, cum feruentem Rutæ naturam esse conueniat, fasciculum eius in rosaceo decoctum addita uncia aloës, perunctis sudorē reprimere. Itemq̃ generationes impediri hoc cibo, ideo profluuiū genitali datur, & Venerē crebrò per somnia imaginantibus. Præcauendum est grauidis, abstineant hoc cibo, necari enim partus inuenio. Eadem ex omnibus satis quadrupedū quoq̃ morbis in maximo usu est, siue difficile spirantibus, siue contra maleficorum animalium ictus, infusa per nares ex uino: aut si sanguisugam exhauserit, ex aceto, & quocunq̃ in simili morborum genere, ut in homine temperato.

EX SYMEONE SETHI.

Incidit crassos & tenaces humores, perq̃ urinam uacuat, & ad inflationes conducit, appetentiamq̃ Veneris compescit, ac strenuè exiccat. Ad inflatas aquas inter cetera, & anasarcam, morfos à uiperis, succum Papaueris aut aconitum bibentes, colicosq̃, pota & iniecta. Traditur quod comesta uisum acuet, ob id antiqui pictores hanc assidue degustabant. Nonnulli & succum eius melli cōmiscentes, medicamentum ad oculorū aciem acuendam cōficiunt. Succurrit difficultati urinæ si cum oleo coquatur, & ea uesica foueatur. Item difficulter spirantes cum melle data, confestim iuuat. Lethargicis pota, & per clysteres iniecta remedium fit. Intestina corroborat, non solum caliditate, sed proprietate quadā. Fertur etiam quod si prægnans mulier ex eius succo bibat, abortiat. Et si in dies quindecim folia assumat, idem facit, Obstructiones iecoris & lienis tollit. Si ieiunus quisquam ipsam assumpserit, eo die à ueneno non lædetur.



POTENTILLA

Genseric.

ff 4

NOMINA.

Potentilla.
Tanacetum syl-
vestre.



VO nomine Græci & Latini hanc herbam appellarint, à nullo, quod sciam, adhuc proditum est. Recentiores herbarij Potentillam, aliqui ob similitudinē Agrimoniam & Tanacetum sylvestre nuncupant, Germani, quod herba illa anseres in cibo delectentur, *Genferich* uocant.

FORMA.

Herba Eupatorio, quod Agrimoniam hodie uocant, haud dissimilis. Caules ex una radice multos profert, humi stratos. Folia Eupatorio similia, supernè uiridia, infernè candicantia. Flores luteos singulari pediculo pendentes. Radicē extrinsecus rufescentem, intus candidam.

LOCVS.

Nascitur passim circa semitas & loca aquosa, atque in fluuiorum ripis ac marginibus.

TEMPVS.

Æstate floret, quo etiam tempore legi debet.

TEMPERAMENTVM.

Potentilla nō est
humida.


Quum folia eius & radix adstringant, temperamento à Pentaphyllo seu Quinquefolio nihil differre uidetur. Quare hæc, potissimum autem eius radix, ex tertio ordine desiccatoria est, minimumq; euidentis caliditatis habet. Errant itaq; mirum quàm quod in humidis locis proueniat: quasi uerò Nasturtium aquaticum, quod Silybrium cardamine Dioscoridi uocatur, haud obstante quod in aquosis nascitur, non etiam in tertio desiccat ordine. Debuisset certè illos ab hac sententia deterere non leuis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim, Galeno libro quarto de simpli. medicament. facult. capite sexto teste, terrena sunt & crassa corporis consistentia, atque adeo sicca.

VIRE S.

Recentiores Potentillā fluxionibus & puncturis oculorū prodesse, recentia uulnera glutinare, & exedentia sanare, mulierū menstrua cōpescere, artus & membra cōfirmare, rectè tradunt: nam id ipsum posse, adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, abundè docet. Et cum habeat Quinquefolij temperamentū, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentiū itaq; dolorē finit. Exedentia oris ulcera sanat. Dysentericis & alui profluuijs, coxendicis articularumq; doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliaq; potest quæ à Dioscoride Quinquefolio tribuuntur. Quod uerò adijciunt hanc etiā lumbricos exterminare posse, id minus rectè faciūt. Ea siquidem facultas non huic, sed illi inest herbæ quæ uerè Tanacetū dicitur, quæ

Herbarij Potens-
tillam cum Tana-
ceto confuderūt.

quidem est tertia, ut suo diximus loco, Artemisiæ species. Proinde non sine magno errore, Potentillam cum ea quæ propriè Tanacetum uocatur herba confuderunt.



PRUNELLA

Braunellen.

C

NOMINA.



Prunella.

ONDVM nobis constat quo nomine hæc herba ueteribus tum Græcis tum Latinis appellata sit. Vulgus tamen medicorū & herbariorū Prunellam nominant, Germani *Braunnellen* oder *Gottheyl*.

FORMA.

Caulis habet in medio striatos, pingues & hirsutos: folia Ocimo similia, coloris herbacei, & acuminata. Flores in summis caulibus spicatos, Lauandulæ uocatæ herba non dissimiles, Radicem tenuem, multis capillamentis fibratam.

LOCVS.

Nascitur passim in pratis.

TEMPVS.

Maius & Iunio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse constat, id quod ex gustu patet: glutinosa enim admodū, & modicè amara est.

VIRES.

Vulnerariam esse herbam euidentissimū est. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, uehementes capitis dolores sedare recentiores uno consensu tradunt, si tempora ex eo inungantur, Aphthas & oris ulcera, fauciumq; uitia succus eiusdem sanat.

DE PENTAPHYLLO CAP. CCXXXVIII

D

NOMINA.



Quinquefolium unde dictum.

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ Græcis, Quinquefoliū Latinis & officinis, Germanis *Sünssingertraut* / oder *Sünssblatt* appellatur. Nomen à numero foliorū habet: in unoquoq; enim pediculo quinque esse deprehendunt.

GENERA.

Et si Dioscorides unum duntaxat Pentaphylli genus faciat, tamē nos ad nostras respicientes terras tria eius genera in uniuersum produximus. Vnū quod maius appellauimus, prorsus ad Dioscoridis picturā accedēs, ut hoc nomine uerū esse Quinquefoliū putemus. Estq; duūm generū: unum quod pallidos seu candidos flores obtinēt, hinc est quod Quinquefoliū maius candidum appellauerimus, Germanicè *groß weisß Sünssingertraut*. Alterum floribus ornatur auri colorē æmulantibus, seu luteis. Nos ut discerneremus à priori, Quinquefoliū maius luteum nominauimus. Dioscorides etiā hæc duo genera innuere uidetur, cum inquit florem habere uel candidum uel auri æmulū. Tertium minus diximus, quod priori haud dissimile est, non tamen passim ut illud quinque folia obtinens. Hoc, cum non haberemus aliud nomen quo ipsum appellaremus, inter Quinquefolij genera connumerare placuit. Videtur uerò Hippocrates etiam duo Quinquefolij genera nouisse, unū humiliter, alterū procerius, ut hoc nomine nobis etiā liceat minus & maius statuere.

FORMA.

Ramulos habet festucarū instar graciles, dodrantales, & in ijs semen. Folia Menthe similia, in singulis pediculis quina, rarè plura, per ambitum ferræ modo incisat florem in candido pallidum, auri æmulū. Radicem subrubrā, oblongam, Elleboro nigro crassiorē. Ex qua sanè descriptione omnibus liquet, maius Quinquefoliū esse legitimum. Ex una siquidem radice subrubra & oblonga, ramulos profert tenues, ac prorsus festucaceos, & in ijs semen, folia Menthe, quina in singulis pediculis, per ambitum ferræ modo crenata, florem luteum, aut aureum. Quibus accedūt natalis locus (in riguis enim nascitur) & immensa adstringendi facultas: quæ quidem singula ue-

Maius Quinquefolium est uerum Pentaphyllum.



QVINQVEFOLIUM
MAIVS CANDIDVM.

Grosweißfünffingerkraut.

624

QVINQVEFOLIVM
MAIVS LVTEVM.

Groß Fünffingerkraut.





QVINQVEFO
LIVM. MINVS.

Klein Süßfingerkraut.

C gula uerum esse Quinquefoliū docent. Adeoq̄ mirari satis non possum, cur nonnulli adulterina hæc esse Pentaphylla sibi persuaferint.

LOCVS.

Prouenit aquosis locis, & iuxta aquæductus. Interdum etiam in incultis, siccis & arenosis locis.

TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mensibus potissimum.

TEMPERAMENTVM.

Vriusq̄ certè folia, flores & radices uehementer adstringunt: atque adeo, ut Galenus ait, radix, cuius multus est usus, ex tertio est ordine desiccantiū, minimum habens euidentis caliditatis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Radiciſ Quinquefolij decoctum ad tertias depressum deductumue, si in ore retineatur, dentium dolores sedat. Putrescentia oris ulcera collutione sistit. Arteriæ asperitates gargarizatum emendat. Contra alui profluuia, & dysenterias auxiliatur. Item articulorū & coxendicū dolores potum sanat. Cocta in aceto & illita, herpetas cohibet. Strumas discutit, duritiās, œdemata, aneurysmata, abscessus, erysipelata, digitorum pterygia, condylomata, scabiesq̄ sanat. Teneræ radiciſ succus, contra iecinoris pulmonisq̄ affectiones & uenena prodest. Folia cum hydromelite, aut uino diluto, & exiguo pipere, contra februm circuitus bibuntur: in quartana quidem quaternorū ramulorum folia, in tertiana uerò trium, in quotidiana unius. Trienis diebus pota comitali morbo medentur. Succus foliorū per dies aliquot triū cyathorū mensura potus, celeriter regiū morbum sanat. Vulneribus ac fistulis cum sale & melle illita medentur. Enterocelicis, id est, intestinorum ramice laborantibus succurrunt. Sanguinis eruptiones porum & illitum Quinquefoliū sistit. Inciditur ad expiationes lustrationesue, sanguinis profluuia & castimonias.

EX GALENO.

Pentaphylli radix desiccatur uehementer, minimum uerò acris est: quare in multo est usu, uelut alia quoque omnia, quæ quum sint tenuium partium, citra morsum desiccant.

EX PLINIO.

Quinquefoliū adhibetur purgandis domibus. Strumis medetur, & pectoris uitijſ. Idem ischiadicis bibitur & imponitur. Panos sanat. Impositū articulis utilissimum. Fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle. Phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de Quinquefolio potus cyathis tribus angine medetur. Idem iecinoris & pulmonis uitijſ, sanguinemq̄ reiicientibus, cuiuscunq̄ sanguinis uitio intus occurrit. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefoliū, decoctis in lacte radicibus & potis. Item decoctum ad tertias in uino ictericis dari atq̄ illini utilissimū est. Eius folia ex aqua comitiales sanant. Item contrita ex uino sumpta triginta diebus in betonice farinae pondo denariorū tredecim cum aceti scillitici cyatho, comitalibus morbis liberant. Celerrimè succus regio morbo medetur, tribus cyathis cum sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pipere ex aqua mulsa.



PISUM
Groß Erbs.

C

NOMINA.

Pisum quare
dictum.

ΠΙΣΟΝ, ἡ δὲ ὀνομασία ἑλληνικῶς ἄρα, Πισίον ἑλληνικῶς λέγεται. Ὁφθαλμῶν ἰατρικῶν ἰσχυρὸν ἔστιν οὗτο. Ἑλληνικῶς ἔρεβος, ἢ ἔρεβος, ἢ ἔρεβος. Ἑλληνικῶς ἔρεβος, ἢ ἔρεβος. Ἑλληνικῶς ἔρεβος, ἢ ἔρεβος. Ἑλληνικῶς ἔρεβος, ἢ ἔρεβος.

GENERA.

Duo apud nos genera Pisorum reperiuntur. Vnum in aruis caducū, humi serpens, quod genus Germani Klein feld Erweyssen nominant. Huius, utpote vulgaris, picturam haud damus. Alterum in altum scandit, arboribus aut palis quibus accubet adfixis, quibus sese capreolis uinciens illigat. Hoc Germani groß garten Erweyssen uocant. Genus hoc pictum exhibemus.

FORMA.

Caules in terram spargit concavos, ramososq; prætenui furculo: folio frequentī præter cæterorū morem longiusculo: flore papilionis forma, circa umbilicum puro: siliqua oblonga seu cylindracea: granis rotundis, & ut Plinius lib. xvij. capite xij. ait, angulos multos inæquales habentibus: radice imbecilla: ut mirari satis non possim, unde plerisq; suspicio orta sit, ut Pisum nostrum legitimum esse dubitauerint. Scio autē esse qui legumen hoc quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse Cicer arietinū, quod scilicet ualuulæ seu siliquæ eius cornu arietini formā habeant. Quorum certē sententiam probare non possum, quod, Plinio teste, Cicer arietinū sic non sit dictum quia ualuulæ effigiē arietini cornu exprimant, sed quia legumen ipsum seu granum Ciceris arietino capiti simile sit. Eam autem formā legumen hoc quod Pisum nominamus non refert.

LOCVS.

Apricis gaudet locis, frigorū nanq; impatientissimū. Tepidum itaque locum, & coelum frequentis humoris desiderat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, & subinde etiā semina in ualuulis profert.

TEMPERAMENTVM.

Quū Pisum simile quid tota substantia cum faba, ut testatur Galenus, obtineat, necesse est ut non multum à medio temperamento in refrigerando & exiccando recedat.

VIRESEXGALENO.

Simile quid tota substantia cum fabis obtinent Pisa, nec alio quā illæ modo manduntur. In duobus autem euariant. Non enim similiter ac fabæ inflant, nec abstergendī facultatē habent, ideoq; legnīus quā illæ per aluum secedunt.

EXPAVLO.

Pisum molle quidem & laxum est, non tamen adeò inflat.

DE POLYTRICHO APVLEIANO

CAP. CCXL.

NOMINA.

Polytrichū Apu
leij cur dictum.

NON temerè adiectū est Apuleij, ne scilicet quispiam Dioscoridis & aliorum Græcorum intelligeret Polytrichon, quod sanè forma ab eo quod nunc describimus alienissimū est. Germanicè à colore aureo quam habet, guldiner Widerthon uocatur. Officinis incognita est hæc herba. Polytrichon dicta est à ramulis, qui capillorum instar tenues sunt.

GENERA.

G E N E R A.

Duo Polytrichi Apuleiani damus genera. Vnum maius, alterum minus; neque enim differunt nisi sola magnitudine.

F O R M A.

Ramulos habet capillorū instar tenues, colore aurum referentes, circumque hos folia multa capillacea, in summo capitula lentis aquaticæ ferè forma, eiusdem cum ramulis coloris.

L O C V S.

Maius nascit̃ in pratis humidis & uliginosis. Minus in petris ac muris humidis.

T E M P V S.

Mense Iulio utrunque reperitur.

T E M P E R A M E N T V M.

In caliditate & frigiditate symmetra sunt: desiccant tamen, extenuant & digerūt.

V I R E S.

Decoctum eorundem in aqua aut lixiuia capillorū radices firmat, ideoque in alopecia caput glabrum capillis uestit. Potum, uiscosorum crassorumque è thorace pulmoneque excreationibus non mediocriter confert: lapides frangit, & urinas ducit. Morbo regio correptis & lienosis auxiliatur. Strumas discutit, & in summa eadem quæ Adiantum potest. Recentiores superstitione quadam ducti, illis multa ridicula & incredibilia tribuunt.

Maius Polytrichum Apuleij.

Das groß guldin Widerthon.



Minus Polytrichum Apuleij.

Das klein guldin Widerthon.





PERSICARIA

Höhkrans.

NOMINA.



ON clām me est quā uariē à multis diuinatum sit, quo nomine Persicaria uocata ueterib. sit. Sed mea quidē sententiā, in uniuersum omnes coniecturis usi non satis firmis, decepti sunt. Et ego quidem fateor ingenue, nec mihi constare num à ueteribus descripta sit, tantum abest ut scire queam quo illam appellauerint nomine. Vulgus herbariorū uno consensu hodie, quod folia Persicæ habeat, Persicariā nominant. Germani *Sidhtraut*.

Persicaria.

Persicaria unde dicta.

FORMA.

Folia Persicæ arboris habet, fusca in medio macula plumbaginēue: caule geniculato, rubente, longo: flore spicaceo, primū candido, dehinc purpureo; semine minuto, radice lutea, numerosa.

LOCVS.

In humidis & palustribus locis frequentius prouenit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floribus ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Frigidam & admodum siccam esse gustus abundē monstrat: mirificē enim gustata adstringit.

VIRE S.

Vulnerariam herbam esse temperamentū eius satis docet. Recte itaq; iuniores medici in uulneribus, & maximē fistulis curandis utuntur. Vtilis haud dubiē in dysenteria, alijsq; malis quæ refrigerationē & adstrictionem requirunt.

DE PERFOLIATA ▶ CAP ▶ CCXLII ▶

NOMINA.



In hac herba ueteribus cognita fuerit Græcis & Latinis, affirmare certō non possum. Ego planē Cotyledonem putarem Dioscoridis, nisi radix in diuersam me traheret sententiā, quæ oliuæ instar rotunda non est. Hodie tamen, quod caulis eius singula folia dissecat atq; penetrat, Perfoliata ab omnibus appellatur. Germanicē *Durchwachß* & *Bruchwurß* dicitur.

Perfoliata cui dicta.

FORMA.

Caulis illi rotundus, rubescens, folia singula penetrans, quæ Pisorum folijs haud dissimilia sunt, tenuia admodum & glabra. In summo coliculorum capitula, & in ijs flores lutei, & semina formam ferē Tithymalli, quam uulgo Esulam nominant, præ se ferentia. Radix candida, fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in hortis sata, & interdum sua sponte in arenosis locis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, & subinde semina producit.


TEMPERAMENTVM.

Amara modicē est & adstringit, ut hinc colligi liceat calidam & siccam esse.

VIRE S.

Vulneribus & ulceribus tam externis quā internis curandis aptissima est herba: hæc enim glutinat. Valet autem potissimum ad ramices puerorum sanandos. Auxiliatur etiam exulcerationibus & prominentijs umbilici, Plurimus huius apud chirurgos usus.

632



PERFOLIATVM

Durchwachs.

NOMINA.



PARSON Græcis, Porrum Latinis & officinis, Germanis Lauch appellatur. Porrum autem dictum putant, quod porro eat, & longè lateq; grassetur.

Porrum unde dictum.

GENERA.

Porri duo genera signauit antiquitas. Vnum capitatum, sic nòminatum quod eius radix in caput increseat atque extuberet. Alterum sectiuum, cui frondens coma super terram eminens aufertur amputaturue. Hoc Germani pulchrè ad nomen latinum alludentes, Schnittlauch nominant, & Byslauch.

Capitatum Porrum. Sectiuum.

FORMA.

Capitatū simplici capite ex albæ ceruicis angustijs extuberante constat, fronde super terram carinata, & in angulum oblonga. Sectiuo uerò caulis est longus, intus cauus, multis in uertice floribus aceruatim collectis, & in speciè absoluti orbis conglomeratis, id quod in bimo accidit: quod etiam sementescit, sparso per eius cacumen semine, & emoritur. Radix candicans, crassa, multis fibris capillata, ac tunicis quibusdam uestita.

LOCVS.

Læto solo gaudet, odit rigua.

TEMPVS.

Duodeuigesimo die à fatu prorumpit, bimatumq; perfert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & extenuat perinde atque cepa, ut ex eius facultatibus euidentius innotescet. Symeon Sethi calidum & siccum in secundo facit ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Porrum capitatum inflationē facit. Noxium succum creat, difficilia in somnia parit. Urinam ciet. Aluo accōmodum. Extenuat. Oculorum obscuritatē facit. Menses pellit, uescicam exulceratā, renesq; lædit. Cum pitiana uerò coctum & comestū, ea quæ in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in defelsionibus ad præclusiones uulue & duritias, utilis habetur. Vna & altera aqua coctū, aut aqua frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriā uim habet. Quare succus eius cum aceto, addito thure aut manna, sanguinem, maximè è naribus prorumpentē, sistit. Venerē stimulat. Contra omnia thoracis uitia pro delinctu efficax est, & ad tabem comestū. Purgat etiam arteriam. Sed si asiduè estur, uisus obscuritatē inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, contra bestiarū morsus auxilio est. Idem quoque illitus potest. Cum aceto, thure & lacte, aut rosaceo instillatus, aurium doloribus & sonitui prodest. Varos tollunt folia, cum rhoë obsoniorum illita. Epinyctidi medentur. Cruftas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis drachmæ binæ cum æquali baccarum Myrti pondere potæ.

EX GALENO.


Corpus calefacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinososq; incidit. Bis tamen aut ter in aqua decoctum, acrimonia spoliatur: quanquam ne sic quidem uim perdit extenuandī.

EX AETIO.

Porri capitatī acris saporis ueluti & cepe sunt, cuius ratione corpus calefaciunt, crassosq; humores attenuant, ac lentos incidunt, urinam prouocant, sanguinē purgant. Præstantissimus usus eorum qui bis coquuntur: ita enim acrimoniam deponunt, neque amplius deprauatum succum retinent.


EX PAVLO.

Porrū mali succi est & acre. Ut autē Dioscorides ait, grauiā facit in somnia, aluūq; bonam, urinā cit & extenuat. Habet & abstergendī uim aliquā, cum pitiana: siquidem



PORRVM CA
PITATVM.

Cauch.



PORRUM SE-
CTIVUM.

Schnittlauch.

C dem coctum, ea quæ in thorace sunt educit. Semen uerò eius nephriticis miscetur medicamentis. Folia etiam nōnihil adstringunt, ob eamq̃ causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

EX PLINIO.

Porro sectiuo profluuia sanguinis sisti in naribus, contrito eo obturatis, uel gal. læ mixto, aut menthæ. Item ex abortu profluuia, potō succo cum lacte mulierum. Tussi etiam ueteri, ac pectoris & pulmonis uitijis medetur. Illitis folijs sanantur am. busta, epinyctides: ita uocatur ulcus aciem hebetans, & in angulo oculi perpetim humor emanans. Quidam eodem nomine appellāt pustulas liuentes, ac noctibus inquietantes. Et alia ulcera cum melle trito. Vel bestiarū morsus ex aceto. Item ser. pentium. Aurium uerò uitia cum felle caprino, uel pari mensura mulsi. Stridores cum lacte mulieris. Capitis dolores, si in nares fundatur, dormiturisue in aurem, duobus succi cochlearibus, uno mellis. Succus & ad serpentū scorpionumq̃ ictus in potu bibitur cum mero, & ad lumborū dolores cum uini hemina potus. Sangu. nem uerò excreantibus & phthisicis, destillationibus longis, uel succus, uel ex ipso cibus prodest. Item morbo regio, uel hydropicis. Et ad renum dolores, cum ptis. næ succo acetabuli mensura. Idem modus cum melle, uulvas purgat. Tostus uerò editur & contra fungorum uenena, imponitur & uulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietatē discutit. Sed oculorū aciem hebetare traditur, in inflationē quo. que facere, quæ tamen stomacho non noceat, uentremq̃ molliat. Capitato maior est ad eadem effectus. Sanguinem reijcientibus succus eius cum caule aut thuris fa. rina, uel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, uulvasq̃ contra. ctas aperiri putat. Fecunditatē etiam fœminarum hoc cibo augeri. Contritum ex melle ulcera purgare. Tussim & destillationes thoracis. Pulmonis & arteriæ sanat

D uitia, datum in forbitione ptisanæ: uel crudum, præter capita, sine pane, ita ut alter. nis diebus sumatur: uel si purulenta excreentur. Sic uoci uel Veneri, somnoq̃ mul. tum confert. Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistunt, & inflationes ueteres, Cortex decoctus illitusq̃, inficit canos.

EX SYMEONE SETHI.

Vrinam cit, & mali succi est. Assiduè comestum uisus hebetudinē efficit. Diffici. lia inuehit somnia, & stomacho nocet. Semen genitale calefacit, & capitis dolores excitat. Iecur, renes & uesicam lædit. Confert ad hæmorrhoidas. Bis uerò aqua coctum, & aceto, garo & oleo, cuminoq̃ conditum, salubre est ijs qui frigido sunt stomacho.

DE PVLMONARIA CAP. CCXLIII

NOMINA.

Pulmonaria cur
nominata.



T ueteribus Græcis & Latinis nominata sit hæc herba, nondum scire licuit. Hodierni temporis medici & herbarij Pulmonariam uocant, Germani Lungenkraut. Sic autem haud dubiè appellari cœpit, quod pulmonum uitijis, exulcerationibus potissimum eorundem, præsens remedium sit.


FORMA.

Folia mollia habet, inuicem incumbentia, leniter laciniata, cauis multis prædita, superiore parte uiridia, inferiore in luteo albicantia, ac ueluti punctis aut pustulis quibusdā notata, atq̃ hoc nomine aliquam pulmonis humani formam referentia: unde etiam Pulmonariam dictam esse conijcimus.

LOCVS.

Prouenit in quercu arbore, & saxosis locis.

TEMPVS.



PVLMONARIA

Lungenkraut.

hh

C

TEMPVS.

Tota æstate inuenitur locis iam monstratis.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores frigidam & humidam esse, mea quidem sententia, falso statuunt: admodum enim adstringit, ut hoc nomine idem cum quercu in qua nascitur habeat temperamentum. Deliccat itaque & paulò infra media calefacit, in genere eorum quæ tepida sunt.

VIRE S.

Desiccandi & adstringendi facultatem obtinet, quamobrem uulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis. Ad incipientes quoque ac crescentes phlegmonas utilis: nam quæ iam uehementes sunt, adstringentia respuunt. Confert autem haud dubiè etiam ad muliebrem profluum, & sanguinis exuisiones, & diurnos alui fluores.

DE PTARMICE CAP. CCXLV.

NOMINA.

Sternutamenta
via.
Syluestre Pyre-
thrum.



Ptarmice cur
dicta.

ΠΑΡΜΙΚΗ Græcis, Sternutamentaria Latinis dici potest. Sunt qui syluestre Pyrethrum nominent, quod scilicet Pyrethri modo, quanquam mitius, linguam uellicet. Atque hinc est quod nonnulli pro uero Pyrethro, seducti eius titillante acrimonia, descripserint. Germanis wilder Bertram appellari potest. Ptarmice dicta est, quod flores eius naribus obiecti sternutamenta eliciunt.

D

FORMA.

Breuis frutex est, paruis, multis, teretibus, & Abrotono similibus ramulis, circa quos folia multa, oblonga, oleaginis similia. In summo Chamæmeli capitulū, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, unde & nomen inuenit. Hæcenus Dioscorides. Quod si itaq; naturam atque imaginem eius fruticis rectè expendas, undiquaq; ei plantæ cuius picturā damus, hæc descriptio quadrabit. Nam surculis fruticat exiguis, multis, rotundis, Abrotono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui folijs frequentibus, longiusculis, oleæ similibus, angustis, utrinq; leniter serratis ambiuntur, cacumine Anthemidis umbellam obtinente, quæ acri suo odore nares feriens sternutamentum irritat.

LOCVS.

Inuenitur sæpius in montibus altis & saxosis locis.

TEMPVS.

Floret æstate; radix eius extremo effoditur autumno.

TEMPERAMENTVM.

Eius temperies est calida & sicca, uiridis etiam nū ordine secundo, siccata tertio.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus illita sugillata emendare possunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent.


EX GALENO.

Ptarmices flores ciendæ sternutationis uim obtinent, unde & herbæ nomen. Sugillata & reliquas ecchymoses discutit.

EX PAVLO.

Ptarmices folia sternutamenta mouent. Totus autem frutex uiridis sugillata, liuoresq; alios dissicit.

DE PYRE-



639

PTARMICE

Wilber Bertram.

hh 2

C

NOMINA.

Pyrethron cur
dictum,
Saliuaris herba
quare nominata.



ΥΠΕΡΟΝ græcè, Saliuaris latinè dicitur. Officinæ græcam appellationem retinuerunt. Germanicè *Bertram* nominatur. Pyrethron autem à feruido, ac ignis simili, qui in eius radice est sapore, Græci dixerūt. Saliuaris uerò, quod manfa uel ore tantum detenta eius radix, copiosam saliuam eliciat, Romanis appellata est.

FORMA.

Herba est caulem foliaq; syluestris Dauci, & Fœniculi instar proferens. Umbellam Anetho similem orbiculatam. Radicem pollicis crassitudine, longam, sapore feruidissimā. Hæc Dioscorides. Vbi nobis monendus uenit lector, Pyrethrum nostri soli non ex omni parte huic descriptioni respondere. Non enim umbellam anetho similem, sed anthemidis potius orbiculatum capitulum, quod Ptarmici tribuit Dioscorides, habere deprehenditur. Cætera omnia adamussim respondent. Siquidem habet Pyrethrum caules & folia Dauci syluestris & Fœniculi, radicem pollicis crassitudine, gustus ardentissimi.

Pyrethrum nos-
trum Ptarmices
fiores obtinet.

LOCVS.

In Germania nostra, quod sciam, non nisi plantatum prouenit.

TEMPVS.

Floret æstatis maxima parte.

TEMPERAMENTVM.

Excalfacit & siccatur in tertio ordine, uel ut aliqui putant, in quarto.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Pituitā elicit radix: ideoq; dentium doloribus decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Manfa pituitam extrahit. Sudores ciet, inuncta ex oleo. Diuturnis rigoribus efficax. Contra refrigeratas partes corporis ac resolutas eximie conducit.


EX GALENO.

Pyrethri radice potissimū utimur urentem facultatem obtinente, qua utiq; dentium etiam refrigeratorum dolores mitigat. Et ad rigores ante circuitum cum oleo infricatur. Ad hæc stupidos & resolutos adiuuat.

EX PAVLO.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentium qui frigori patuerunt dolores lenit. Item ad febrium rigores ante circuitum infricatur cum oleo. Ad hæc ijs quorum corpora ex refrigeratione stupent, & resoluta sunt, efficacissimè adhibetur.

DE PYXO.




PYRETHRUM

Bertram.

hh 3

642



BVXVS

Buchbaum.

NOMINA.

ΥΞΟΣ Græcis, Buxus Latinis, Germanis Buchsbaum dicitur.

FORMA.

Arbor immortalis coma uirens: folio Myrti, exiguo, subrotundo; flore herbaceo; semine rufo & rotundo, omnibus animantibus inuiso.

LOCVS.

Gaudet frigidis & apricis, plurimamque ubique Buxus.

TEMPVS.

Perpetua fronde uiret, neque ei ullo tempore decidunt folia. Quo nomine potissimum hanc celebrat germanica illa cantilena, eiusdem ac Salicis contentionem continens.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores temperatam eius arboris essentiam esse statuunt, id quod ob multas causas, quas recensere superuacuum est, non uidetur uerisimile. Haud dubie uero adstringit, atque adeo exsiccat.

VIRES.

Non admodum magnus, Buxi in medicina usus est. Folio eius in lixiuio decocto rufant, aut flauescere efficiunt capillos. Scobem eius decoctam in aqua alui profluuium sanare tradunt. Somnum capere sub hac arbore, cerebro uehementer incommodat, quod eius odor naturæ prorsus aduersetur. Ferunt serpentes uulneratas eius radice degustata, statim sanitatem recuperare.

DE PETASITE CAP. CCXLVIII

NOMINA.

ΠΕΤΑΣΙΤΗΣ Græcis, Petasites Latinis appellatur. Officinis penitus ignota, Germanis Pestilenzwurz nominatur, quod nimirum eius radix præsentaneum sit contra pestilentialia febres remedium. Petasites autem à petaso, pileum significante, dicta est, quod folium eius pediculo superpositum, petasi modo amplum, ut fungus dependeat.

Petasites quare dicta.

FORMA.


Pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, in quo petasi figura folium magnum, ut fungus dependet. Ex qua sanè descriptione satis perspicuum sit, herbam cuius picturam damus esse Petasiten. Hæc enim statim inter initia Martij, flores suos in albo purpureos, agglomeratos, & botri figuram referentes profert, citra quidem folia, quod Dioscorides omisit. Hi marcescentes sine fructu abeunt ac decidunt. Postea purpureos emittit pediculos, cauos, hirsutos, quibus folia superposita sunt magna, pilei ampli figuram obtinentia, supernè uiridia, infernè uerò candicantia: quæ in tantam crescunt amplitudinem, ut unum interdum, orbicularè mensam prorsus tegat. Radix illi crassa & longa, intus candida, uehementer odorata & amara. Quibus accedit quod uires huius herbæ à uiribus Petasites, ut ex sequentibus patebit, non discrepent: ut hoc nomine nihil euidentius sit, quam eam herbam esse planè ueterum Petasiten.

LOCVS.

Nascitur copiosissimè in pratis humidis & iuxta riuulos sitis.

TEMPVS.

Initio Martij mensis, ut comprehensum est, floribus suis conspicua est herba, qui Aprilis imminente statim citra fructum decidunt, Quo facto folia cum pediculis suis prodeunt,



PETASITES
Pestilenzwurtzel.

A Ex tertio est ordine desiccantiū, id quod amaritudo eius, quam gustu deprehendimus, facile monstrat.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Facit ad maligna & phagedænica ulcera tritum & illitum.

EX GALENO.

Ad maligna & phagedænica ulcera, ea utuntur. Idem etiam de Petasite tradit Paulus.

APPENDIX.

Experimento comprobatū est radicem hanc mirificè cōferre pestilentialibus febribus, quod sudorē uehementer moueat, si in puluerē redacta cum uino sumatur. Nec minori efficacia bibitur à mulieribus quas uterī tormina & præfocationes exercent. Valet etiam unicè ad enecandos lumbricos. Succurrit quoq; ijs qui spiritus difficultate laborant. Ducit urinā & menses. Efficax est ad uulnera præhumida, & ad reliquas cutis sceditates. Hęc uerò posse, amaritudo eius euidentissimè docet, cuius quidem hæ sunt facultates, ut ex ijs quæ saepe iam diximus, & Galenus lib. iiii. de simplic. medi. facult. cap. xvij. fusius docet, manifestum est.

DE PERICLYMENO CAP. CCXLIX.

NOMINA.



ΕΠΙΚΛΥΜΕΝΟΝ Græcis, Volucrū maius Latinis, Scribonio Largo Syluæ mater, uulgo Caprifoliū & Mater sylua, & nonnullis Lilium inter spinas dicitur. Germanis Geysblatt / Spect oder Waldgilgen / & Zeunling. Sic sanè dictum, quod circumuoluendo ad se uicinas ar-

Syluæ mater.
Caprifolium.
Lilium inter
spinas.
Periclymenon
unde dictum.

B bores aut frutices uocet.

FORMA.

Simplex frutex est, ex interuallis folia spargens ipsum amplectentia, subcandida, Hederæ similia: flores candidos, Fabæ similes, subrotundos, quasi in folium procumbentes: semen durum, & quod difficilè uellitur: radicem crassam, rotundā. Ex qua quidem descriptione perspicuū sit, fruticem quem pictum exhibemus esse Periclymenon: siquidem caulibus suis uicina amplectitur, gemina per interualla umbilicata folia habens, à terra cæstis, supernè herbosis, ad Hederæ similitudinē: flores albos, Fabæ non dissimiles, subrotundos, potissimum antequam dehiscant, baccas hederaceas aut Rusci, radicem crassam.

LOCVS.

Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se uicinis fruticibus. Nunc in hortis etiam passim plantatur.

TEMPVS.

Floret Junio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Uehementer calefacit & desiccet, id quod gustu etiam ipso deprehenditur. Folia siquidem acrimoniam quandam præ se ferunt gustata.


VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius semen postquā maturuit collectū, & in umbra siccatur, drachmæ pondere datur in uino quadraginta diebus, ut lienē minuat absumatue, & lasitudinē discutiat. Orthopnceæ & singultui prodest. Urinā cit à sexto die cruentā. Partum accelerat. Habent easdem uires & folia: quæ triginta septem diebus pota, sterilitatē facere produntur. In periodicis febribus cum oleo inuncta, earū horrores mitigant.

EX GALENO.

Periclymeni utilis est tum fructus, tum folia, adeò uehementer incidentis & excalefa-

646



PERICLYMENUS

Seyssblatt.

calescentis facultatis, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentã efficiant. Principio quidem urinam tantum mouent: porro foris cum oleo illita calfaciunt. Iuuãt & lienosos, & difficulter spirantes. Cõpetens potionis mensura est, drachmæ unius pondus cum uino. Cæterum desiccatur quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatẽ omnino bibentibus asserere. Sunt etiam qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, quemadmodũ Dioscorides, qui septem & triginta dies eos tradidit refert. Hic quoque cruentam urinam reddi à sexto die memorat.

EX PLINIO.

Semen eius in umbra siccatur tunditur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in uini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, cumq; urina cruenta, aut per aluum absumit, quod intelligitur à decimo statim die. Urinam cient & folia decocta, quæ & orthopnoicis profunt.

APPENDIX.

Ex iam cõmemoratis facultatibus nemo non intelligit fruticem hunc esse Periclymenon: cum enim gustu acrimoniã præ se ferat, necesse est omnia hæc quæ ueteres Periclymeno tribuunt, possit. Quibus accedit, quod recentiores etiam herbarij suo Caprifolio eadem uires assignent. Exsiccare enim ipsum tradunt ulcera humida & fordida, sanare impetigines, & alias cutis fœditates, lienem absumere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere, & alia posse quæ non attinet referre.

DE PYRO▷ CAP▷ CCL▷

NOMINA.

ΠΥΡΟΣ Græcis, Triticum Latinis dicitur, Officinæ antiquum latinum nomen retinuerunt. Germanis Weyssen appellatur. Triticum uerò dicitur, quod tritum ex spicis sit, ut autor est Marcus Varro.

Triticum unde dicitur.

GENERA.

Tritici summa genera tria obseruant qui frumentariæ rei periti sunt. Primum quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstet. Germanis simpliciter Weyssen nominatur. Secundum trimestre, & nonnullis Sitanium dicitur. Trimestre quidem, quod tertio ferè satum mense maturescat: id quod tamen nostro in orbe non fit, in quo Martio mense satum, quinto tandem, hoc est, Iulio mense metitur. Germanis Amelkorn dicitur, haud dubiè non alia ratione, nisi quod ex hoc genere tritici amyllum optimum conficiatur. Eius picturam dare hoc tempore non potuimus. Tertium genus tritici, non undiquaq; notum, Germanis welscher Weyssen / & Weyssentolb dicitur.

Primum.

Secundum.

Tertium.

FORMA.

Primum tritici genus culmo est quàm hordeũ altiore, tribus geniculis constante, folio arundineo, spica à folijs remotiore, incondita, & in nullos uersus disposita. Exteritur in area, ut alia quædam frumenta. Alterũ culmo, geniculis, granisq; priori simile, nec ab eo differt, nisi quod spicam multis aristis uallatam, & in duos uersus dispositam obtinet. Tertium genicula habet quaterna, aliàs præcedenti per omnia propemodum simile.


LOCVS.

Passim prouenit Triticum primi & secundi generis. Postremum in Alsatia, & agro Tubingensi gignitur.

TEMPVS.

Floret, ut alia ferè omnia frumenta, Iunio mense: in Iulio autem metitur.

TEMPERA-




TRITICI PRI
MVM GENVS.

Weyßen.

TRITICI TERTIVM
GENVS.

Welscher Weyssem.



C

TEMPERAMENTVM.

Triticum ut medicamentū foris impositum, primi est ordinis excalefacientiū, non tamen nec resiccare, nec humectare manifestò potest. Porrò quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est, tum siccus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Optimum ad secundæ valetudinis usum Triticum habetur quod recens & iam perfectè adustum, & colorem mālī refert. Crudum in cibis rotundos lumbricos gignit. Canum moribus prodest mansum & illitū. Confectus ex eius similitudine panis, plus alit quàm cibarius, quem Græci *συγυμις* uocant. E Sitanij farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facili in membra demandetur. Farina eius cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorū fluxiones. Item contra intestinorū inflationes. Lentigines ex oxymelite tollit. Furfures autem acri in aceto elixi & calentes illiti, lepras pellunt. Incipientes etiam inflammationes omnes illiti leniunt. In Rutæ uerò decocto elixi, mammas turgentes sedant. Viperarū ictibus auxiliantur, & torminosis profunt. Confectū ex farina triticea fermentum calefaciendū extrahendiq; uim habet. Priuatim quæ in plantis pedum sunt extenuat. Cetera tubercula, furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitanij farina contra uenenatos ictus cum aceto aut uino cōmodè illinitur. Eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruenta excreantibus succurrit. Contra tussim & exasperatam arteriam, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnē discutit inflammationē. Panis & cum melicrato coctus & crudus inflammationes omnes illitus mulcet, cum emolliat, & quadantenus refrigeret, mixtus herbis succisq; quibusdā. Vetus autem & aridus per se, adiectisq; alijs quibusdā, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus & illitus, uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similitudine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

EX GALENO.

Triticum quiddam lentoris, & obstruentis naturæ habet. Quod uerò ex pane fit cataplasma, uim obtinet magis digerentem, quàm quod ex Tritico: nimirum quum & sale & fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum uim habeat attrahendū digerendiq; ea quæ in alto resident. Plura de Tritico petenda erunt ex capite primo, libri primi de alimentorum facultatibus, quo in loco uarię panis species exponuntur.

EX PLINIO.

Grana Tritici ferro combusta, ijs quæ frigus uerberit præsentaneo sunt remedio. Farina ex aceto cocta, neruorū contractionibus auxiliatur: cum rosaceo uerò & sicco sicca myxisq; decoctis. Item suppuratis neruis cum hyoscyami succo illinitur. Ex aceto & melle lentigini. Furfures tonsillis faucibusq; gargarizatione profunt. Sex Pompeius prætorij uiri pater, Hispaniæ ceterioris princeps, quum horreis suis uentilandis præsideret, correptus dolore podagræ, misit in Triticum sese super genua, leuatusq; siccatis pedibus mirabili modo, hoc postea remedio usus est. Vis tanta est, ut cados plenos siccet. Paleam quoq; tritici uel hordei calidam imponi ramicum incōmodis experti iubent, quæq; decoctæ sunt aqua foueri.



651

POTAMOGETUM
Samraut.

ii 2

C

NOMINA.

Potamogeton un
de dicta.
Stachyites.



POTAMOGETON, ἡ σταχυίτης græcè, Fontalis & Potamogeton Latinis dicitur. Officinis ignota est herba. Germanis *Samtra* aut uocatur. Potamogeton autem quasi fluminibus uicina dicta est: siquidem aquosis & palustribus locis nasci amat. Stachyites uerò quasi spicata, ob caulem quem ex se mittit floribus & semine spicatum.

FORMA.

Folium Betæ simile habet, densum, & paulum extra aquã eminent. Ex qua quidem breui admodum deliniatione satis intelligi potest, herbam cuius picturam damus esse Potamogetona. Caulem nanq; rotundũ habet, geniculis intersectũ, è quibus pediculi exeunt folijs Betæ aut Plantaginis uestiti, paulum supra aquam eminentibus. Flores etiam spicatos, Plantaginis instar, profert, ac subinde femẽ. Quid multa? folia huius herbæ planè referunt folium Indum uocatum officinis,

LOCVS.

Nascitur in lacustribus & aquosis locis.

TEMPVS.

Floribus prægnans est Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat, ut gustus etiam abundè docet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Refrigerat & adstringit: pruribus, ulceribusq; uetustis, & ijs quæ pascendo serpunt, confert.

EX GALENO.

D Adstringit & refrigerat similiter Polygono, sed essentia eius crassior quàm Polygoni est.

EX PLINIO.

Potamogeton ex uino dysentericis & cœliacis medetur. Peculiariter refrigerat, spissat. Vtus in folijs, cruribus uitiosis utilia, & contra ulcerum nomas, cum melle uel aceto.

DE PEDE ANSERINO CAP. CCLII

NOMINA.



Pes anserinus
cur dicta.

VO nomine ueteribus tum Græcis tum Latinis sit appellata hæc planta, nondum cognoscere potui: quapropter nouam ut illi nomenclaturã inderem necesse fuit. Aliam autem & cõmodiorem non licuit inuenire præter eam, quam alludentes ad germanicam appellationem imposuimus. Nam si folia eius spectes in ambitu laciniata, planè anserini pedis formam ac similitudinẽ repræsentant. Hinc appositissimè Germanis nostris uocata est *Genßfiss* / oder *Genßfüßle*. Quum uerò eadem herba suis inimica admodum sit, atque adeo mortem inferat, factum est ut à mulierculis etiam sit nominata *Sewrod* / & *Schweinfrod*. Etsi uerò in officinis eius herbæ nullus sit usus, tamen quia passim nascitur, & temerè fortassis à nonnullis uires eius ignorantibus usurpari posset, eam silentio transire nolimus, quò scilicet facultas tam uulgaris herbæ omnibus patefieret.

FORMA.

Caulem profert cubitalem, striatum: folia ad Halicacabi formam accedentia, in ambitu tamen laciniata, atque adeo anserini pedis speciem referentia; flores exiguos ruben-

PES
ANSERINVS.

Sanguis.



C rubentes, semen racematim, ueluti in atriplice syluestri, singulis ramis insidens: radicem obliquam, multasq; adnascencias habentem.

LOCVS.

Parsim in hortis, alijsq; locis ubi simum reponitur, nasci solet.

TEMPVS.

Iulio mense potissimum floret.

TEMPERAMENTVM.

Haud dubie in secundo refrigerat ordine, non secus atque Solanum hortense.

VIRES.

Suis exitium affert herba hæc comesta, id quod experientia cognitum est. In humano corpore idem potest quod Solanum hortense. Quare facultates eiusdem suo quæres loco.

DE PETROSELINO CAP. CCLIII.

NOMINA.

Apium saxatile.



*Officinæ er-
ratum.*

ΕΤΡΟΣΕΛΙΝΟΝ Græcis, Apium saxatile Latinis, & Petroselinum appellatur. Germanicè frembder Peterfilien nominari commodè, ad alterius quod Oreoselinum est, ut suo diximus loco, differentiam, potest. Officinæ eius herbæ cuius nunc picturam damus semine pro Amomum utuntur, non tamen sine magno errore, quum constet omnibus, modò conferre inter se utriusque historiam non pigeat, Amomum ab ea herba esse diuersissimum. Nos ut tandem sciremus è qua stirpe semen hoc decerperetur, terræ illud mandauimus, & hæc cuius pictura formã ostendit herba erupit, quam nos uerum esse Petroselinum, ut paulò post ostendemus, credimus.

FORMA.

*Dioscorides ne-
gligentia in simu-
latur.*

Petroselinum, inquit Dioscorides, semen Ammi simile obtinet: odoratius tamen, acre, & aroma olens. Breuis quidem deliniatio hæc est, atque imperfecta, ut nihil mirum sit, nos hæctenus quod uerum esset Petroselinum non potuisse cognoscere. Meritò itaque hoc loco, ut compluribus etiam alijs, Dioscorides negligentia in simulari potest, ut qui mancas ac mutilas plerasq; posteritati relinquere stirpium historias uouerit. Si uerò quispiam paucas etiam has notas expendat, haud dubie herbam hanc cuius picturam oculis subiecimus, Petroselinum esse comperiet. Semen enim eius Ammi tam simile est, ut ab eo uix discerni queat: odoratius etiam existit, & acre, ac aroma olet. In summa, nulla est nota quæ illi nõ respondeat, ut hoc nomine uerum Petroselinum esse credam. Quinetiam tota eius herbæ forma, quæ non multum à nostro & Germanico Petroselino abest, atque odor, Selini speciem esse docent, ut pro Petroselino usurpare hanc ipsam officinæ tutò possint: semen enim quo hodie utuntur, non Macedonicum Petroselinum, sed Hippofelinum, ut suo diximus loco, existit.

LOCVS.

In Macedonia frequens optimumq; nascitur, hinc Macedonicum dicitur: inq; saxis & præruptis potissimum locis, unde cepit appellari Petroselinum. Nascitur & alijs in locis, ut lib. i. de antidotis testatur Galenus, at minus laudatum.

TEMPVS.

Floret Augusto mense, atque subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Petroselinum ut gustu acre est cum amaritudine, sic & in operibus calidum. Fuerit itaq; & ipsum tertij ordinis tum exalfacientium, tum desiccantium.

VIRES.



PETROSELINVM
Frembder Peterfilien

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Urinam cit, & menstrua ducit. Stomachi & colli inflationibus auxiliatur, & torminibus. Laterum quoque, renum & uesicæ doloribus in potu sumptum succurrit. Miscetur antidotis urinam cientibus.

EX GALENO.

Petroselinii semen maximè usui est, quum tota etiam herba unà cum radice similem, sed imbecilliorè, facultatem fortiatur. Incidendi etiam uim habet: hinc menses & urinas largiter prouocat, Flatus quoque extinguit.

APPENDIX.

Sunt qui hanc herbam quàm pro Petroselino damus, Sisona esse putent: quorum sententiæ cur non magnopere repugnè, facit in primis Dioscorides, qui Sisona perinde atq; Petroselinum suis notis haud descripsit. Dein quod uiribus non discrepent, atque adeo in usu huius aut illius nullum sit periculum. Nos tamen nostram sententiam propter adductas paulò antè rationes deferere, nisi euidentibus conuicti argumentis, non possumus.

DE ROSA CAP. CCLIIII.

NOMINA.

Ῥῶδον græcè, Rosa latinè, officinis eodem seruato nomine appellatur. Germanicè *Rosen*. Rhodon autem Græcis, Plutarcho auctore, nominatur, quod largum odoris effluuium emittat.

GENERA.

Theophrastus libro sexto, cap. vi, de plantarum historia, genera rosarum multa esse tradit, quæ foliorum multitudine, paucitate, asperitate, leuitate, colore & odore differunt. Plinius etiam lib. xxi. capite quarto, ex loci diuersitate multa rosarum genera colligit. Nos simpliciter duo duntaxat illarum genera faciemus, syluestres scilicet & domesticas. Syluestres, quæ etiã Caninæ rosæ uocantur, asperiores tum uirgis, tum folijs sunt, ac odore, colore, magnitudine à domesticis superantur. Germani *Heydrofen* & *Wildrosen* uocant. In utroque uerò genere duplices existunt, punicæ nimirum & candidæ. Nos utrunque genus una pictura complexi sumus.

FORMA.

Vulgò omnibus nota est Rosa. Virgas siquidem fuscis maculis tinctas, & aculeis plenas emittit: folia incisuris diuisa, nigricantia & aspera. Germinat primum inclusa granoso cortice, quo mox intumescente, & in uirides alabastris fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantis complexa luteos apices staminatq; capillamentis insidentia, quæ propriè flores dicuntur. Syluestris spongiolas etiam producit, quas pleræq; officinæ Germaniæ nostræ, non sine detestando errore pro Bedegar usurpant: fructum quoq; parit rotundum, initio uiridem, dein puniceum.

LOCVS.

Domestica passim in hortis prouenit. Syluestris etiam nusquam non in campestribus & dumetis nascitur.

TEMPVS.

Rosa ut nouissima inter uernos flores erumpit, ita etiã statim deficit. Decerpenda itaq; erit Iunio mense ubi primum erupit, ne mox nusquam compareat.

TEMPERAMENTVM.

Rosarum uis ex aquea calida substantia duabus alijs qualitatibus, adstringenti uidelicet & amaræ mista, composita est. Flos earum magis etiam ipsis Rosis adstringit, ac proinde sanè exiccatorius est.

VIRES.

Rhodon cur
dictum.



D



ROSA

Rosett.

C

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca magis adstringit. Succus recentibus folijs *Vnguis.* exprimendus, detracto forfice ungue. Sic appellatur quod candidū est in folio: reliquū mortario premi & teri debet in umbra donec densetur, & ita ad oculorū circumlitiones recondi. Siccantur etiam folia in umbra crebrò uersata, ne mucescant. Ex aridis rosis in uino decoctis expressus liquor, ad capitis, oculorum, aurium, gingiuarum, sedis, recti intestini ac uulug dolores penna illitus, collutus in fufusue, conducit. Eadem sine expressione contusa & illita, præcordiorum inflammationibus, stomachi humiditati, & sacris ignibus medentur. Siccæ ac tritæ femoribus insperguntur. Misceri solent compositionibus quas antheras uocant, & uulnerarijs antidotis. Vruntur folia ad honestandas palpebras. Flos qui in medijs Rosis inuenitur siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota, aluum profluentem, & sanguinis reiectiones sistunt.

EX PLINIO.

Vfus succi ad aures, oris ulcera, gingiuas, tonsillas, gargarizatu: stomachū, uuluas, sedis uitia, capitis dolores. In febre per se, uel cum aceto ad somnos, nauseas. Folia uruntur in calliblepharum. E siccis femina asperguntur. Epiphoras quoque aridas leniunt. Flos somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum, maximè albas, in posca potus, & sanguinis excreationes. Stomachi quoque dolores, quantum in uini cyathis tribus. Semen his optimum crocinum, nec anniculo uetustius, & in umbra siccatur. Nigrum inutile. Dentium dolori illinitur. Vrinam ciet. Stomacho imponitur. Item igni sacro non ueteri. Naribus subditum caput purgat. Capita pota, sanguinem & uentrem sistunt. Vngues Rosæ epiphoris salubres sunt: ulcera enim oculorū Rosa fordescunt, præterquàm in itijs epiphoræ, ita ut arida cum pane imponatur. Folia quidem uitijs stomachi, rosionibus, & uitijs uentris, & intestinorū, & præcordijs utilissima uel illita. Cibo quoque Lapathi modo condiuntur. Cauendus quoque in ijs situs celeriter insidens. Et aridis & expressis aliquis usus. Diapasmata inde fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida abluantur. Syluestris cum adipe urfino alopecias mirificè emendat.

EX SYMEONE SETHI.

Odorata calidis capitibus prodest, humida uerò offendit, eaq; destillationi obnoxia reddit. Sumpta uerò ad febres ex flaua bile procreatas iuuat, & roborat stomachum & iecur. Proprietate autem quadam testes lædit, prohibetq; acres exhalationes ne ad caput ferantur.

APPENDIX.

Spongiolæ ac fructus Cynorrhodi seu syluestris Rosæ mirificè ualent contra calculum, & urinæ difficultates, si leuigatæ in puluerem exhibeantur.

DE RAPHANO CAP. CCLV.

NOMINA.


Raphanus unde dicitur.



Radix.

ΑΦΑΝΟΣ, ἡ ραφανίς Græcis: Raphanus, Radix, Radicula Latinis dicitur. Hæc autem generis sunt nomina, ideoq; errant non pauci nostræ ætatis medici & herbarij, qui Radiculæ nomen ad fatiuū duntaxat Raphanum transferunt. Raphanus autem sibi nomen ἀφ τοῦ ῥα φαίνεσθαι id est, quod facile appareat, adsciuit; nam die tertio à fatu profilit. Radicis uerò nomen sibi arrogauit, quod cæteras amplitudine corporis superet, uel quam paucissimis magnitudine cedat. Etenim plerunq; in tantam molem coalescit, ut frigidis locis quibus gaudet, sicut in Germania, Plinio lib. xix. cap. v. teste, infantium puerorum magnitudinē æquet. Et memini me stupendæ magnitudinis Raphanos Erfordię, Turingiæ celeberrimo oppido, uidisse.

GENERA.




RAPHANVS
SATIVVS.

Rutabaga.

669

RAPHANVS
SYLVESTRIS.

Steud.



G E N E R A.

A Raphani Græci duo faciunt genera, fatiui & syluestris. Satiuus officinis hodie peculiariter Raphanus minor dicitur, Germanicè *Rettich*, Syluestris Latinis *Raphanus minor* Armoracia appellatur. Germani ad uocem Romanā alludentes, *Werrētich* & *Kren* nominant. Nostri hodie herbarij, sua potius quàm ueterum autoritate freti, Radicem simpliciter, generis nomine, uocant. Nonnulli Raphanū maiorem appellant, propter folia ipsa, quæ fatiui folia magnitudine superant; aut quia acrimonia maiore, aut uiribus efficacioribus præditus est. *Raphanus maior*

F O R M A.

Radix fatiua caudice uno assurgit nonnunquā arboreo, radice ad Rapi similitudinē, folijs laciniatis, angulisq; horrida; floribus candidis, & semine in siliquis. Syluestris dicta Armoracia fronde copiosior quàm corpore, folia fatiuæ ferè similia habet, magis tamen ad Lampsanæ formā accedentia, longa & acuta; radicē gracilem, mollem, Sinapi instar acerrimā, ad eò ut caput tentet, & lachrymas incitet. *Satiuaradix.*
Syluestris.

L O C V S.

Raphanus in hortis nascitur. Amat autem terram pinguem, Palladio lib. ix. cap. quinto teste, solutam & diu subactā. Syluestris etiam hodie in hortis habetur, sicq; translatus ad culta, edomita feritate mitescit meliorq; fit. Crescit aliàs circa margines itinerū, & loca arenosa, in q; pratis nonnunquā sua sponte copiose prouenit, ut fit in prato ad oppidum Tubingam sito, sacrificorū uocato.

T E M P V S.

Cum frigoris patientissimus sit Raphanus, non solum estate, uerum etiā hyeme colligi potest. Estq; illius usus quotidianus. Floret æstate.

T E M P E R A M E N T V M.

B Raphanis fatiua excalefacit quidem ordine tertio, desiccet uerò secundo. Syluestris autem in utroq; efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Raphanus fatiuus excalfacit, flatus gignit, ori suauis est, sed stomacho inimicus. Ructus & urinam cit. Bonam facit aluum. Si quis à cibo ipsum sumpserit, distributioni eius magis conferet. Presumptus autem, cibum subleuat. Prodest ante cibum datus uomituris. Sensus exacuit. Decoctus contra ueterem tussim, & crassitiem in thorace natam prodest. Cortex eius cum oxymelite sumptus maiori efficacia uomitiones citat. Hydropicis utilis. Illitus lienosis etiam confert. Cum melle ea quæ serpendo pascunt sistit. Sugillata tollit. Contra uiperarum ictus auxiliatur. Alopecias pilis explet. Lentigines cum farina loliacea exterit. His qui à fungis strangulantur subuenit. Menses trahit. Semen eius uomitum proritat, urinamq; mouet. Cum aceto potum lienem extenuat. Coctum cum oxymelite calido angina laborantibus utiliter gargarizatur. Contra Ceraftis morsum ex aceto potum auxilio est. Cum aceto illitum gangrænas efficaciter dirumpit scarificatūte. Syluestris tam folia quàm radix olerum modo in cibo coquuntur. Excalefacit autem, urinam cit, æstuosus est.

E X G A L E N O.

Facultas inest Raphano discutiendi, itaque ad sugillata, & alios id genus liuores ob eam facultatem conducit. Radix eius ex eorum numero est quæ obsonij potius quàm nutrimenti nomine frequenter comeduntur. Vis illi extenuatoria, cum qua conspicuè unā excalfacit: acris enim in ea qualitas exuperat. Verno tempore caulem in altum assurgentem producere solet, ceu alia quæ nata sunt excaulescere. Hic elixus estur ex oleo, garo & aceto, ut Rapæ caulis, Sinapi & Lactuæ. Et sanè caulis hic magis quàm crudus Raphanus nutrit, ut qui acrimoniam in aqua deponat: quanquā minimam sanè & ipse alendi potestatem habeat. *kk lem, sed*

Clem, sed unà Raphanos ipsos elixantes comedunt Raparū modo. Cæterum cum medicos, tum idiotas illos mirari subit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuandæ gratia edunt. Ipsi quidem se experientia id abundè compertū habere dicūt, nullus tamen exemplum illorum sine damno imitari potuit. Hactenus Galenus, cuius equidem uerba eò libentius recitauimus, quod uulgi errorem Raphanos à cœna comedentis lepidè notare uideantur.


EX PLINIO.

Raphani decocti mane poti ad ternos cyathos, cōminuunt & eijciunt calculos. Iidem in posca decocti, contra serpentū morsus illinuntur. Ad tussim etiam mane ieiunis prodest Raphanus cum melle. Semen eorum tostum, ipsumq; cōmanducatum ad lagonoponon: In aqua folijs eius decoctis, bibere uel succum ipsius cyathis binis. Contrà phlegmoni ipsos illinire tusos utile. Inchoantibus autem recentem corticē cum melle, ueternosis uerò quamacerrimos mandere. Semenq; tostū, dein contritū cum melle suspiriosis, lidem & contra uenena profunt. Cæterum cerastis, scorpionibus aduersatur, uel ipso semine infectis manibus impunè tractantibus. Imposito Raphano scorpionibus, moriuntur. Salutare & contra fungorū aut hyoscyami uenena equè, ut Nicander tradit. Et contra ixiā quoq; dari duo Apollodori iubent, sed Citicus semen ex aqua tritum, Tarentinus succum. Lienem item extenuant, iecinri profunt & lumborum doloribus. Hydropicis quoque ex aceto & sinapi sumpti, & lethargicis, Praxagoras & iliosis dandos cenfet. Plistonius & colicis. Intestinarū ulcera sanant. At purulenta præcordiorū, si cum melle edantur. Quidam ad hæc coquere eos in luto illitos malunt, sic & fœminas purgari. Ex aceto & melle sumpti intestinarū animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum potu cum uino enterocelis profunt. Sanguinem quoque inutilem sic extrahunt.

D Medius ad hæc & sanguinè excreantibus coctos dari iubet. Et puerperis ad lactis copiam augendā, Hippocrates capillos mulierū defluos fricari Raphanis, & super umbilicum imponi, contra tormenta uuluar. Reducunt & cicatricē ad colorem. Semen quoque ex aqua impositū sistit ulcera quæ phagedanas uocant, Democritus Venere hoc cibo stimulari putat, ob id fortassis uoci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis tantum nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Vbi uerò acrior Raphani medicina admota sit, Hyssopū dari protinus imperant. Hæc antipathia est. Et aurium grauitati succum Raphani instillant, Nam uomituris, summo cibo esse eos, utilissimū est, Syluestris urinæ duntaxat eijciendæ utilior.

DE RIBE ▶ CAP ▶ CCLVI ▶

NOMINA.

Ribes  **R** AECIS cognitus fuerit nec ne frutex ille, nondum compertū habeo. Mauritanis & officinis hodie Ribes nominatur. Germanis **S. Johans** treublin oder beerlin/ quod scilicet circa diui Ioannis Baptistæ diem fructus eius fruticis ad maturitatem pertingant,

FORMA.

Frutex est nullis spinis horridus, sed topiarius magis, uitis pusillæ folijs, baccis rubentibus ex pediculis longis dependentibus refertus, ut pictura ipsa abundè docet. Vnde manifestum fit Mauritanorū Ribes à nostro diuersum esse, quod non uitis, sed lata potius, magna, rotunda & uiridia folia habeat. Quanquam non lateat Arabes etiam in Ribes descriptione non admodum concordēs esse.

LOCVS.



RIBES

S. Johans beerlin.

kk 2

C

LOCVS.

Pafsim in hortis nascitur, ac eorundem puluinos & areas sepit.

TEMPVS.

Circa diui Ioannis Baptistæ natales ferias, & Iulio potissimū mense, baccis acutis rubentibus frutex ille ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Folia & fructus uehementer adstringunt, Mauritani frigidum & siccum faciunt in secundo ordine.

VIRES EX MAVRITANIS.

Baccæ acido sapore placent, Refrigerant æstuantē stomachū; sitim restinguunt, quæ cum alios, tum maximè febricitantes excruciat. Cibi fastidia discutunt, & appetentiam inuitant, Fœdam uentris proluuiem cohibent, Vomitiones sistunt, stomachum firmant. Alui profluuiū quod bilis attulit, retinent: erosiones & uellicationes eiusdem tollunt, Sanguinis feruorē demulcent, & bilis acrimoniā domant. Seplasiarij succū eius fructus condiunt, ad anni totius usum, Rob de ribe appellantes.

DE RHODIA RADICE ▶ CAP ▶ CCLVII ▶

NOMINA.

Rhodiæ radix
cur dicta.



ΡΟΔΙΑ ρίζη græcè, Rhodiæ radix latinè nominatur. Officinis ignota, germanicè Rosenwurz uocatur. Rhodiam autem tam Græci quàm Latini dixerunt, quoniam contrita Rosas redolet. Quapropter Rosæ, quas Græci ρόδω nominant, non Rhodus insula, ut imperiti putant, huic radici nomen fecerunt.

D dici nomen fecerunt,

FORMA.

Radix rhodiæ Costo similis est, leuior tamen minorisq; ponderis, & inæqualis, odorem Rosarū cum teritur reddens. Reliqua eius facies Telephiū refert, nisi quod flore & semine carere uidetur, id quod Galenus etiā asserit, & in Corollario suo annotauit Hermolaus, Dioscorides etiam illorum nullam facit mentionem.

LOCVS.

Nascitur potissimū in Macedonia, Nunc in multis Germaniæ hortis plantatur.

TEMPVS.

Radix autumnò effodienda.

TEMPERAMENTVM.

Rhodiæ radix in calefaciendo secundū ordinis, aut certè tertij incipientis.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtilis est capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum modico rosaceo imponitur.

EX GALENO.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis.

DE SAMPSV-



RHODIA RADIX

Rosenwurz.

kk 3

NOMINA.

Maiorana.

Duplex Amara-
racis.

ΑΜΥΥΧΟΝ, ἡ ἀμαράνση Græcis: Maiorana, Amaracus Latinis: officinæ latinam appellationem retinuerunt, Germanis *Waiorran* / uel *Weyran* dicitur. Animaduertendū autem nos hic de Amaraco ea loqui quæ iucundo placet odore. Duplex enim Græcis Amaracus est. Vna quæ Dioscoridi alio nomīue Parthenium dicitur, ingrato prorsus & uiroso odore prædita, meritoq̃ ea de causa hodie Cotula fœtida nominata. Altera de qua hic agimus, odorata, quam Sampſuchon Græci priuatim nominant, Id, ne imperitis uox illa *πολύσημος* imponeret, monendum esse duximus.

FORMA.

Herba est Sampſuchum surculosa, per terram serpens: folijs hirsutis & rotundis, Calaminthæ tenuifoliæ similibus, admodum odoratis. Hæc deliniatio adamus-
sim herbæ Maioranæ uulgò dictæ fauet: est enim surculis lentè rubentibus, folijs pilosis, & rotundis, iucundo odore, semine copioso, quod bullulis quibusdam continet: flore candido & exiguo. Serpit etiam per terram: uerum id non ubiq̃ fit, interdum enim rectà surgit in altum.

LOCVS.

Pæssim in hortis & siccilibus uasis prouenit. Gaudet autem locis umbrosis, aqua & fimo.

TEMPVS.

Æstate dum floribus prægnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

D Sampſuchum tenuium partium, & digerentis est facultatis: desiccatur enim & calefacit ordine tertio.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi uim obtinet, & coronamentis apta. Decoctiū eius potum, incipienti aquæ inter cutē prodest, & hys quos urinæ difficultas, & tormina discruciant. Arida folia ex melle illita, sugillata tollunt. In pectore subdita menses ducunt. Contra scorpionis ictum ex sale & aceto illinuntur, Luxatis cerato excepta imponuntur. Similiter & cedematis. Aduersus oculorum inflammationes cum polline polentæ illinuntur, Miscentur acopis & malagmatis calefaciendi gratia.

EX PLINIO.

Sampſuchum scorpionibus aduersatur ex aceto & sale illitum. Menstruis quoque multum confert impostum. Minor est eidem potu uis. Cohibet oculorum epiphoras cum polenta. Succus decocti tormina discruciat. Vrinis & hydropicis utile. Mouet & narium sternutamenta. Fit ex eo oleum quod Sampſuchinum uocatur, aut Amara-cinum, ad excalfaciendos emolliendosq̃ neruos. Vuluas calefacit. Et folia sugillatis cum melle, & luxatis cum cera profunt.

Oleum Amara-
cini.



AMARACVS

Staiosan.

kk 4

N O M I N A.



*Spanachia cur
dicta.*

*Spinacia unde
uocata.*

Hispanicum olus

SPANACHIA Græcis recentioribus, Spinacia uel Spinaceum olus Latinis appellari potest. Arabicæ factionis principes Hispanach, hoc est, Hispanicum olus nominant. Germani *Spinet / oder Spinnat*. Spanachiam haud dubiè ab oleris raritate dixerunt Græci: rarò enim illo utebantur medici, quod cibo magis forsitan, quàm medicinæ nata esset, nec quicquam illustre sortita. Vel, quod etiam simile uerè est, ab alijs nationibus emendicato spinaceo nomine. Spinacia uulgo dicta est ab insigni seminis spiculorum nota: etsi enim herba ipsa glabra & mollis sit, semen tamen in spinas occalescit. Hispanicum uerò olus nominauere, forsitan quod inde primum duxerit originè, ad cæteras tandem nationes translata.

F O R M A.

Exit septem diebus à satu, folio primùm triangulo, molli, mox intybi, plerunq; quàm pediculo cohæret laciniato, inertis sapore, exigua radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, nonnunquã altiore, intus cauo: floribus in uertice rotundis, racematim coeuntibus, exiguis: semine spinulis horrido.

L O C V S.

Nullum solum respuit, sed ubicunque satum fuerit hic lætissimè prouenit.

T E M P V S.

Seritur Septembri mense, non horrens hyemis frigora, ut uerno tempore cibũ suppeditare possit. Martio etiam mense seritur, Iunio autem & Iulio mensibus semen & flores profert.

T E M P E R A M E N T V M.

D Spinachia primè refrigerantium & humectantium ordinis est.

V I R E S.

Aluum emollit. Melius Atriplice suppeditat alimentũ, sed aluo parum hærens facile exigitur. Flatus colligit, & uomitiones concitat, nisi excrementitius humor abijciatur. Ventrem decoctæ ius proluit. Stomacho inutile. Et cæteras ferè omnes Atriplicis uires sibi fertur arrogasse.



SPANACHIA

Spinet.

670



SANICULA
FOEMINA.
Sanicel wable.



SANICULA
M. A. S.

Sanicel menne.

C

NOMINA.



Diapensia.
Sanicula cur
cicta.

ERBA quam omnes hodie Saniculā uocant, à nullo, quod sciam, ueterum descripta est, sed à recentioribus inuenta, ut multæ aliæ uulnerarię herbæ. Sunt autē qui Diapensiam nominent. Germanis *Sanickel* dicitur. Nomen Saniculam à sanandis uulneribus traxisse uulgò constat.

GENERA.

Duū est generū. Vna quæ propriè appellatur Sanicula, ideoq; marem, ut certius esse discrimen, appellauimus. Germanicè *Sanickel mennle*. Altera ab omnibus ferè herbarijs pro specie *Osteritij* uulgò uocati habetur, sed falso, quando neq; in folijs, neque in radice ulla appareat acrimonia, sed perinde atque in mare Sanicula, amaritudo & adstrictio. Germanis errore etiā quodam *die Klein Weisterwurg* nominatur. Nos eandem cum & forma & facultate ad ueram Saniculam, quam marem fecimus, proximè accederet, Saniculam fœminam nuncupauimus. Germanicè *Sanickel weible*.

FORMA.

Sanicula uera, atque adeo mas herba est folio uitis, aut *Apij*, in quinque partes dissecto, rubentibus in sine sectionū maculis quibusdam: surculis quoq; rubris ad radicem, quæ multis ei capillamentis fibrata subest: capitulis in summis coliculis pusillis, herbacei coloris & subnigris. Fœmina quod ad folia attinet priori similis, rubentibus tamen maculis caret, itemq; rubris ad radicem surculis, quod in ea hæc singula candida sint. Flores in summo candidos, ac subinde semen striatum & oblongum profert.

LOCVS.

Nascitur in syluis & umbrosis locis.

D

TEMPVS.

Carpenda cum suis capitulis Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Non est simplicis nature, sed, ut indicio est gustus, adstringit simul & amara est, ut hoc nomine calefactoriam & exicatoriam esse nulli dubium sit. Statuunt autem calidam & siccam ordine secundo.

VIREs.

Saniculæ herbæ succum uulneratis in potu mirificè conferre experientia compertum est. Tumores quoque reprimere decoctam herbam impositam, aut eius succum illitum tam in homine quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud præsentius est auxilium, cum ad fauces uel pulmones uitium decubuit. Et in summa, omnia quæ *Symphyton*, præstat etiam Sanicula, Potissimū uerò sanguinis sputo, dysenteria, renumq; uitij medetur.

DE SONCHO.

NOMINA.



ορχος græcè, Sonchus, Cicerbita latinè dicitur. Sunt qui Lactucellā & Lacteronem appellent, quod scilicet caulis eius dissectus copioso diffluat lacte. Germanicè *Wosf/oder Genßdistel* uocatur. Sonchus autem sibi nomen uendicauit *εξ τοῦ σῶου χείρ*, eò quod salubrem fundat succum, utpote qui sua sorbitione stomachi rosiones leniat, & lactis abundantiam nutribus sumministret, genitalibusq; locis collectione laborantibus præsidio sit. Cicerbitę tamen uocabulū, quo omnis Hetruria adhuc utitur, recens esse adiectitiumq;, & ex non multo tempore Dioscoridī accreuisse uidetur.

Sonchus cū dicta.

Cicerbita.

GENERA.

Sonchi duo sunt genera. Alterum syluestrius, aculeatius, & nigrius, quod *Genß distel* germanicè uocatur. Alterū tenerius esculentumq;, ac minus nigrum, Germanis *Wasentöl* dicitur. Et Apuleio Lactuca leporina, quod cum leporē animus defecit æstu, hac sibi herba mederi solet.

Sonchus aspera.

Non aspera.

FORMA.

Cubitalis & angulosus Soncho caulis est, cauus & aliquando rubescens, & qui fractus copioso lacte manat. Folia habet per interualla in ambitu scissa. Florem luteum, qui, ut Senecionis, breui digestus abit in pappos, uanescitq; in lanugines.

LOCVS.

Vbiq; ferè in macerijis hortorum, potissimū autem in uincis Sonchus prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus Sonchus uterq;.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentū eius quodammodo mixtum est: constat enim ex aqua terreaq; essentia, utraq; leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps. Et siue cataplasmatis in morem imponatur, siue edatur, manifestè refrigerat. Postea uerò quàm planè resiccatus fuerit, terrestre eius temperamentū redditur, modicam habens caliditatem.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vis utriq; Soncho refrigeratoria, modicèq; adstringens. Proinde stomacho æstuanti & inflammationibus illiti profunt. Succus eorū in sorbitione datus stomachi rosiones morfusue mitigat, & lactis abundantia efficit. In lana appositus, sedis ac uulua inflammationibus opitulatur. Tam herba quàm radix illita scorpionum icibus subuenit.

EX GALENO.


Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Cæterum uiridis etiamnū & tener estur perinde ut cætera olera syluestria.

EX PLINIO.

Albus qui è lacte nitor, utilis orthopnoicis Lactucarū modo. Brasistratus calculos per urinam pelli eo monstrat, & oris graueolentiam cōmanducato corrigi. Succus trium * cyathorū mensura in uino albo & oleo calefactus adiuuat partus, ita ut à potu ambulent grauidæ. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit lactis abundantia nutribus, coloremq; meliorē infantii: utilissimus ijs que lac sibi coire sentiant. Instillat auribus succus, calidusq; in stranguria bibitur, cyathi mensura: & in stomachi rosionibus cum femine Cucumeris, nucleisq; pineis. Illiniū & sedis collectionibus. Bibitur cōtra serpentes scorpionesq;, radix uerò illinitur. Eademq; decocta in oleo punici mālī calyce, aurii morbis præsidium est. Hæc omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet uesci, ut morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinem tauri demonstrat succo eius uti. Refrigeratoria tamen uim esse cōuenit nigro, & hac causa imponendū cum polenta. Zeno radice albi stranguria docet sanari,


* *al. obolorum*

674



SONCHUS
ASPERA.

Sensibilis.



SONCHVS
NON ASPERA.

Gasenföl.

C

NOMINA.




ΕΡΙΣ Græcis, Seris & Intubus Latinis uocatur. Reliqua quæ illi sunt nomina, in generum distinctione mox dicemus.

GENERA.

- Satiuus Intubus.** Intubum Latini in duo genera digesserunt, in satiuū & erraticum. Satiuū, qui non nisi cultu & humana diligentia prouenit. Erraticū uerò, qui suæ spontis & liber, sub nulla olitoris lege uagatur & errat, dixerunt. Satiuus Intubus, quem priuatim, Plinio lib. xx. cap. viij. teste, Serin nominarūt ueteres, in duas distrahitur species. Vna latiore folio constat, Lactucæ similior. Hæc corrupta ab Intybo uoce, in Hetruria passim Endiuiā appellatur. Et debet in omnibus pro uera Endiuiā usurpari officinis. Nam qua hodie sub hac uoce utuntur, non est uera Endiuiā, sed Lactuca syluestris, ut suo diximus loco. Germanicè *Endiuien* uocari potest. Altera angustiora folia habet, & subamara est. Hæc diminutiuo à Seris nomine Seriola dicitur, quod deinde corruptentes recentiores Scariolam fecerunt, germanicè *Scariol* appellari poterit. Erraticus iterum Intybus in duas species, Plinio loco antea citato auctore, degenerat. Vna, quæ Græcis ab insigni amaritudine *πικρὴ, ἢ λυχνόρον* nominatur, Latinis autē Ambubeia. Vulgus herbariorū & officinæ Cichoreā uocant, Germani *Wegwarten*/quasi uiarum custodem, uel *Wegweiss*/quod peregrinis quasi uiam indicare uideatur. Altera, quæ latiore folio prodit, Plinio Hedypnois nominatur, haud dubiè non alia ratione, nisi quod suauiter dormire, somnumq; irrepere faciat. Vel, si paulò durior hæc uidetur interpretatio, quod flos eius præter alias Serides suauiter admodū spiret. Theophrasto libro septimo de plantarū historia, capite septimo, & Plinio lib. xxi. cap. xv. Aphaca alio nomine appellatur; diuersa tamen ab ea quam supra descripsimus, & quæ aliàs Vitia syluestris dicitur. Vulgo **Dens leonis**, quod folium sinuatim per lacinias denticulatū sit, & **Rostrum porcum**, quod rostrum porci nomen nominatur. Officinis nostris, quæ barbaris delectantur uocibus, **Taraxacon**, aut **Altaraxacon** dicitur, Germanis *Körlkraut*/ *Pfaffenörlein*/ *Pfaffenblatt*.

FORMA.

- Satiuus Intubus.** Satiuus Intubus caulem edit magnum, rotundum, striatum, frequentibus surculis brachiātū. Germinat foliatu statim à radice uenoso. Flos illi in ramusculis cœruleus, & nonnunquam etiam candidus emicat. Prima autem eius species, ut diximus, folio latiore, altero angustiore constat. Erratici Intubi genus primum, quod **Cichorium**. Cichorium uocant, germinat à radice post Vergilias, folio Betæ laciniato, ferè semper in solo procumbente: caule magno, fistuloso, frangi cõtumace, multis ramulis usque in autumnū erumpente, qui nubilo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper compressus, & interdum hircens. Hinc panditur rudissimus quorundā error, qui hanc herbā quam Germani *Wegwart* nominant, Heliotropiū esse cõtendunt, cum tamen primum folia repugnent, quæ non sunt Ocimo similia, neque candida, sed nigricantia magis. Deinde non candidum, sed magna ex parte cœruleū florem habet. Radix denique eius, ut Heliotropij, non inutilis, sed, experientia teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cum alijs satiujs Intubis similitudo, quæ una satis docet Intubū esse syluestre, & non Heliotropiū. Vt quorundam temeritatē non satis mirari queam, qui contra apertam ueritatem, & omnium medicorum cōsensum, secus pronunciare audent.
- Leonis dens.** Alterum, quod Leonis dens nominatur, folijs multis constat, utrinq; denticulatis, in terra selsilibus, cauliculis dodrantalibus, concauis, leuibus & enodibus, flore luteo, sti-



INTYBVM SATIVVM
LATIFOLIUM.

Mentha.




INTYBVM SATIVVM
ANGUSTIFOLIVM.

Scariol.



INTVBVM SYL.
VESTRE.

Wegwart.



HEDYPNOIS

Röhlkraut.

A teo, stipantibus in circulum foliolis coronato, qui senescens euanescit in lanuginē, quæ cum aura raptim fertur.

LOCVS.

Satius non prouenit nisi in hortis cultu & diligentia humana; haud tamen difficulter ubi satus fuerit, emergit. Erratici prima species passim iuxta itinera nascit̃. Altera in hortis, & passim ferè etiam sponte sua gignitur.

TEMPVS.

Satius Iunio & Iulio mensibus floret. Cichoriū eodem ferè tempore incipit florere, & in autumnum usque durat, Hedypnoidis in Martio erumpunt flores, & in æstatem usque perdurant.

TEMPERAMENTVM.

Seris olus est subamarū, & magis quod syluestre est, quod ob id ipsum Picrida quidam nuncupant, quidam uerò Cichorium appellant. Est autem ea sicca frigidaq̃ temperatura, utrunq̃ secundo abscessu. Porro domestica magis etiam quam syluestris refrigerat. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit. Vtraque autem adstringentis qualitatis particeps est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Omnes adstringunt & refrigerant, & stomachū adiuuant. Aluum sistunt coctæ, si cum aceto assumantur. Syluestres autem stomacho meliores. Comestū imbecillū & æstuantem leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinuntur. Podagris & oculorū inflammationibus succurrunt. Herba & radix illita, percussis à scorpione subuenit. Ignibus sacris cum polenta medetur. Succus eorum cum cerusa & aceto utiliter ijs quæ refrigerationem desiderant inungitur.

EX PLINIO.

B Intubi quoq̃ nō extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Idemq̃ cum uino potus, iecinoribus & uesicæ & epiphoris imponit̃. Cichoriū refrigerat. In cibo sumptum & illitum collectiones, succusq̃ decoctū uentrem soluit. Iecinori & renibus, & stomacho prodest. Item si in aceto decoquatur, urinæ tormina discutit. Item morbum regium è mulso, si sine febre sit. Vesicam adiuuat. Mulierum purgationibus quidem decoctū in aqua adeò prodest, ut emortuos partus trahat. Adijciunt magi, succo totius cum oleo perunctos fauorabiliores fieri, & quæ uelint facilius impetrare. Hedypnois stomachum dissolutū adstringit cocta: crudaq̃ sistit aluum. Et dysentericis prodest magis cum lente. Rupta & conuulsa utroque genere iuuantur. Item quibus genitura uoletudinis morbo effluat. Seris utraq̃ stomacho utilissima, præcipuè quem humor uexat. Cum aceto in cibo refrigerant uel illita, discutuntq̃ & alios quam stomachi. Cum polenta syluestrium radices stomachi causa forbentur, & cardiacis illinuntur super sinistra mammam ex aceto. Omnes hæ & podagricis utiles, & sanguinè reijcientibus. Item quibus genitura fluit, alterno dierum potu.

*Hedypnoidis facti-
cultates.*

EX SYMEONE SETHI.


Stomacho bonum est Intubum, si cum aceto quis eo utatur. Postquam decoctū est, aluum sistit. Obstructiones auferendi uim habet, ut nullum aliud olus. Sanguinis feruorem sedat, & inflammationes iecoris discutit, & ictericos iuuat. Iecur proprietate quadā corroborat. Mediocriter somnū inducit. Tradunt quidā post uenæ sectionē, aut cucurbitas, si quis cum aceto utatur, iecinoris sanitatē conseruare. Veneris appetentiā extinguit, & semen genitale in ijs qui frigidam habent temperaturam, minuit. Vtile est ad sanguinis excreationē. Huius etiam decoctum iecinori admodum utile. Semen febres ex flaua bile

ortas iquat; at lieni nocet.



PASTINACA SATI
VA PRIMA.

Jam Pasteney.



DAUCUS SATI
VA ALTERA.
Seelrüben



PASTINACA ER
RATICA.

Wilde Pasteney.

A

NOMINA.



ΤΑΦΥΛΙΝΟΣ græcè, Pastinaca latinè dicitur, Germanicè *Pastiney* / oder *Pastnachen*. Pastinacæ uerò nomen à pascendo dictum uidetur: *Pastinaca unde dicta.* natura enim ei calens, sapor uehemens, alit corpus, & Venerem cit.

GENERA.

Duplex Pastinacæ genus. Vna enim fatiua est, quæ iterum duorum est generū. Vnum genus quod uulgò Carota dicitur, Germanicè *zam Pastiney* / & rot *Xüben*. Alterū, quod quidam inter Rapa connumerant. Hinc est quod Germani *geel Xüben* uocant. Syluestris altera, quæ propriè Staphylinus Græcis nominatur, germanicè autem *wild Pastiney* / oder *Vogelneß*.

FORMA.

Folia Gingidij habet Pastinaca syluestris, latiora tamen & subamara. Caulem rectum, asperumq̃, umbellam Anetho similē obtinentē, in qua flores candidi, exiguum quiddam purpurei in medio habentes, & ferè ad croceū accedentis. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta mandit̃. Hortenses syluestribus per omnia similes sunt, nisi quod flores in medio purpureū quiddam non habeant, & radix unius in suprema sui parte purpurea sit, alterius autē magis lutea.

LOCVS.

Pasim circa itinera, loca petrosa, & hortorū maceries sua sponte proueniunt erraticæ. Satiuæ in hortis nascuntur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus flores & semina Dauco similia producit utraq̃.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & abstergit utraq̃, magis tamen syluestris.

B

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Erraticæ semen potum aut appositū menses ducit. Vrinæ difficultatibus, hydropticis, & pleuriticis in potu confert. Contra uenenatorum morsus & ictus utile. Ferunt non lædi à uenenatis qui id præsumperint. Cōceptus adiuuat. Radix ipsa urinam cit, & Venerem stimulat. Fœtus ex utero pellit apposita. Folia trita cum melle imposita ulcera depascentia expurgant. Hortensis Pastinaca cibo aptior est. Ad eadem, sed minori efficacia, prodest.

EX GALENO.

Pastinaca fatiua imbecillior, syluestris ad omnia potentior. Vrinas mouet, & menses prouocat cum herba quidem tota, tum maximè semen & radix. Habet porrò etiam absterforium in se quippiam: quamobrem pascentia ulcera quidam folijs eius cum melle, quò pura reddant, illinunt.

EX PLINIO.

Pastinacæ erraticæ semen contritum, & in uino potum, tumentē aluum, & suffocationes mulierū doloresq̃ lenit in tantum ut uulvas corrigat. Illitum quoq̃ è passo uentri earū prodest. Viris uerò cum panis portione æqua tritum. Ex uino potum contra uentris dolores. Pellit & urinā, & phagedenas ulcerū sistit recens cum melle impositū. Vel aridæ faring̃ inspersam radicē eius Dieuches cōtra iecinoris & lienis, ilium, lumborū & renū uitia, ex aqua mulsā dari iubet. Cleopantus & dysentericis ueteribus. Philistion in lacte coquit, & ad stranguriā dat radicis uncias quatuor. Ex aqua hydropticis, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis, & comitialib. Habentes eam ferri à serpentibus negantur, aut qui antè gustauerint, non lædi. Percussis imponit cum axungia. Folia contra cruditates mandunt̃. Orpheus amatorū inesse Staphylino dixit, fortassis quoniā Venerem stimulari hoc cibo certum est: ideo cōceptus adiuuare aliqui prodiderūt. Ad reliqua & fatiua pollet, efficacior tamen syluestris. Semen fatiuæ quoq̃ contra scorpionū ictus, ex uino aut posca salutare est. Radice eius circumsalpti dentes, dolore liberantur.



SOLANVM
HORTENSE.

Nachtschatt.

687.




HALICACABVM
VVLGARE.
Judendocken.

mm 3




HALICACABVM
PEREGRINVM.
Welsch Schlitten.



SOLANVM
SOMNIFERVM.

Dollkraut.

mm 3



STRAMONIA.

Ranchöpfelkraut.

NOMINA.



ΣΤΡΥΚΝΟΣ græcè, Galeno per unius literæ abiectionem $\pi\sigma\lambda\upsilon\sigma$, Solanum latinè, officinis Solatrum, uulgo Cuculus, Vua lupina, Vua uulpis, Morellaç dicitur. Germanicè Nachtschatt.

Solatrum.

Morella.

GENERA.

Quatuor, Dioscoride & Galeno autoribus, Solani sunt genera. Primū hortense dicitur, quod scilicet olim in hortis cum alijs oleribus quæ edendo sunt, seminabatur. Hodie sua sponte, & inuitis cultoribus prouenit. Nigrum alio nomine, à nigris nimirum folijs, aut in extrema maturitate fructu nigro, appellatur. Germanis simpliciter Nachtschatt uocatur. Secundum, quod priuatim Halicacabum nominatur. Vesicariā quoq; uocant à folliculis quos producit, uesicarum in animantibus speciem imitantibus, uel quod uesicæ caclulis medeatur. Officinæ Arabes secute, corrupto Halicacabi nomine, Alkakengi appellant. Germani nostri Judenhutlin/ oder Doctlin/ Judentirsfen/ Schlitten/ Boberellen/ Rot Nachtschatten. Est præterea alia Halicacabi species nuperrimè inuenta, & aliunde in Germaniam allata, cuius nemo antiquorum scriptorum, quod sciam, mentionem fecit. Nos discriminis gratia Halicacabū peregrinū nominauimus. Germanicè welsch Schlutten non ineptè nuncupauimus. Tertium Solanum somnificū, ab effectu scilicet nominant. Sunt qui Solatrum dormitoriū uel marinum dicant, quod rupibus non longè à mari inueniatur. Quartum Græcis $\mu\alpha\upsilon\sigma\upsilon\upsilon$, hoc est, furiosum nominatur, officinis Solatrum mortale.

Solanum hortense.

Halicacabum. Vesicaria.

Alkakengi.

Solanum somnificum.

Solanum furiosum.

FORMA.

Solanū hortense frutex est esculentus, exilis, alas multas habens, folia nigra. Cimo maiora & latiora, fructum rotundū, uiridem, cum autem maturuerit nigrum, aut rufum. Flos huic candidat. Halicacabū folijs priori simile, latioribus tamen. Caules eius postquam increuerunt in terram inclinant. Fructum fert in folliculis rotundis uesicis similibus, rufum, rotundum, leuem, uuarum acinis similem, quo coronarij utuntur texentes coronas. Peregrinum planta est pergulis operiendis aptissima: latissimè enim suis clauiculis sese diffundit. Folia habet oblonga, & laciniata. Flores candidos, uesiculas Halicacabo similes, in quibus semen includitur pisif aut ciceribus simile, in cuius medio effigies ueluti cordis humani insculpta & incisa apparet. Somnificum frutex est ramos habens multos, densos & lignosos, difficile fragiles, folijs pinguibus refertos, mālī cotonei similitudine, florem rubrū, grandem. Semen in siliquis croceum. Radicem corticem habentem subrubrum, grandem. Furiosum folium obtinet Eruçæ simile, maius tamen, satis ad spinam quam Pæderota uocant accedens. Caules à radice proceros decem aut duodecim emittit, ulnarū cubitorū uel quatuor altitudine, capitulum effigie oliuæ insidens, sed hirsutum ut Platani pilulæ, maius tamen & latius. Florem nigrum, post hunc fructum racemosum, rotundum, nigrum, denis aut duodenis acinis constantem, Hederæ corymbis similibus, mollibus ut uuæ. Radicē candidam, crassam, cauam, cubitalem. Cæterum plantatur nunc in hortis Germaniæ herba Italis uocata Stramonía, & pomum spinosum, quam nonnulli inter Solani species numerant, non quod descriptioni respondeat, sed quod eius folia optj odorem referre uideantur. Quare ut alijs occasionem daremus cogitandi de hac planta, hoc loco eius picturam inferere placuit. Flores huius herbæ suauem Liliij spirant odorem. Videtur uiribus parum à posterioribus generibus Solani distare. Germanicè à pomis appellare libuit, *stechend* oder *rauch* *spffeltraut*.

Hortense.

Halicacabum.

Somnificum.

Furiosum.

C

LOCVS.

Hortense passim in opacis locis, & semitis obuiū est. Nascitur & in hortis. Halicacabum in uineis copiosissimè prouenit. Somnificū in saxosis nec procul à mari locis producitur, Furiosum in montanis, ac uento perflatis locis, & ubi Platani nascuntur.

TEMPVS.

Hortense tota ferè æstate floret, autumnō autem fructus eius maturescit. Halicacabum uescas illas suas in fine Augusti, & inter initia Septembris mensis colore primum uiridi, mox paulatim rubefcente profert.

TEMPERAMENTVM.

Hortense refrigerat & adstringit in secundo ordine, mediū autem absolutè in humectando & exiccando, Galeno lib. v. simpl. cap. ix. teste. Idem faciunt Halicacabi folia. Somnificum tertij est refrigerantiū ordinis. Manici seu furiosi cortex radicis refrigerat secundo ordine incipiente, & desiccet in secundo iam completo, & tertio incipiente.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hortense refrigerandi facultatē obtinet, quapropter folia ignibus sacris, herpetibus cum farina polentæ illita profunt. Per se autem trita & imposita ægilopas, capitiscq; dolores sanant. Stomacho æstuantī auxiliantur. Parotidas cum sale trita & illita discutunt. Succus eius ualet aduersus ignes sacros, & herpetas, cum cerusa, rosaceo & lithargyro. Ad ægilopas uerò cum pane. Infantium quoq; ardori, quem syriam uocant Græci, cum rosaceo perfusus proficit. Miscetur collyrijs pro aqua aut ouo contra acres fluxiones ad inunctiōes. Aurium dolori instillatus prodest. Mu liebria profluuiā in lana appositus sistit. Succus fuluo gallinarum in domibus oberantium fimo subactus & linteo appositus ægilopis remedio est. Halicacabum uim usumq; hortensis Solani habet, uerum non comeditur. Fructus eius potus, eò quod urinā mouet, regium morbum expurgat. Vtrorumq; herba exprimitur, & succus siccatus in umbra reponitur, ad eadem utilis. Somnifici radicis cortex in uino drachmæ pondere potus somnificam facultatē obtinet Papaueris succo mitior. Fructus uehementer urinam cit. Corymbi eius ferè duodecim hydropicis dantur. Plures autem poti ecstasin faciunt. Remedio est aqua mulsā copiosa potui data. Succus eius medicamentis dolorem leuantibus & pastillis miscetur. In uino decoctus & in ore retentus dentiū doloribus succurrit. Radicis succus cum melle inunctus oculorū hebetudines tollit. Furiosi radix in uino drachmæ unius pondere pota non illepidas neq; iniucundas imagines speciēsue efficit. Duarū uerò drachmarum pondere pota, ad tres usq; dies ecstasin affert. Quatuor autē drachmæ haustæ interimunt. Remedio est aqua mulsā maiore copia pota, & uomitione reiecta.

EX GALENO.

Solanum esculentū quod in hortis nascitur, notū est omnibus, utunturq; illo ad omnia ea quæ refrigerari & adstringi postulant. Cæterorū uerò non esculentorum unum quidem nuncupatur Halicacabum, fructum habens rufum, acino uuæ tum figura, tum magnitudine ad similem, quo etiam ad coronas utuntur. Alterū autem fruticosum, quod somnificū, & tertium quod furiosum dicitur. Halicacabum igitur in foliorū facultate hortensi simile est, fructum habens ciendæ urinæ idoneum; proinde multis compositis facultatibus quæ ad iecur, ad uescam & renes accommodantur, miscetur. Solani uerò somnifici cortex radicis si cum uino bibatur, somnū accersit drachmæ pondere sumptus. Sed & ad cætera Papaueris succo persimilis est, nisi quod eousq; imbecillior est, ut ipse tertij habeatur ordinis refrigerantiū, quum hic in quarto sit constitutus. Huius semen urinā mouendi facultatem habet. Si autem plus

Atem plus duodecim corymbis hauseris, dementiã furiãque adsciscet. Porrò quod reliquum est ex dictis Solanis, ad medicationes que in trò in corpus adhibentur, inutile est. Nam si quatuor eius drachmæ sumantur, mortem inferent: si pauciores, insaniam. Vna certè innoxie offertur, cæterũ nec ipsa utile quid obtinet. Verum si foris corpori illinatur, ulcera maligna & depascentia curat, Sed ad talia radice cortex optimus est.

EX PLINIO.

Strychno, quam quidam Trychnon scripsere, utinam nec coronarij in Ægypto uterentur, quos inuitat Hederæ florũ similitudo, in duobus eius generibus. Quorum alterum cui acini coccinei, granosi folliculi, Halicacabũ uocant. Nostri autem uescariam, quoniam uescicæ & calculis prodest. Frutex est surculosus uerius quàm *Vescaria* herba, folliculis magnis latisq; & turbinatis, grandi intus acino, qui maturefcit Nouembri mense. Tertio folia sunt Ocimi, minimè diligenter demonstranda. Remedia enim, non uenena tractamus: quippe insaniam facit paruo quoq; succo. Quamquam & Græci autores in iocum uertere. Drachmæ enim pondere lusum pudoris gigni dixerunt, species uãnas imaginesq; conspicuas obuersari demonstrantes. Duplicatum hunc modum, legitimã insaniam facere. Quicquid uerò adijciatur ponderi, repræsentari mortem. Hoc est uenenum quod innocentsissimi autores simpliciter Dorycnion appellauere, ab eo quod cuspides in prælijs tingerentur illo passim nascente. Quin & alterum genus soporiferum est, atq; etiam opio uelocius ad mortem. Laudatum uerò à Diode & Euenore: quippe præsentaneum remedium ad dentes mobiles firmandos, si colluerentur; huic tamen exceptionem addidere, ne diutius id fieret: delirationem enim gigni eo. Cõmendatur & in cibis tertium genus, licet præferatur hortensis saporibus. Et nihil esse corporis malorum, cui non salutare sit Strychnos, Xenocrates prædicat. Somnifici radicem bibunt qui sunt uaticinandi callentes, quod furere ad confirmandas superstitiones aspici se uolunt. Remedio est (id enim libentius retulerim) aqua copiosa multa calida potui data. Nec illud præteribo, aspidum naturæ Solanũ somnificum in tantum aduersum, ut radice eius propius admota soporentur, illud sopore enecante uim earum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur.

APPENDIX.

Quod nos somnificum esse dicimus Solanum, aliqui hortense non sine maximo errore esse putant, plurimumq; suis conferre, ac easdem à letalibus morbis præferuare asserunt. Nos tamen non laboramus magnopere quomodo suis succurrat, sed quid in homine possit magis consideramus, quum constet pleraque alijs animantibus esse cibum, quæ homini uenenum sunt. Experientia uerò cognitum est, geminos pueros statim ex esu acinorum huius generis Solani mortuos esse. Quod sanè exemplum nos mouet ut somniferum esse credamus, potissimũ cum in uniuersum ferè illi descriptio quadret, uno hoc dempto, quod semen non habet in siliquis croceum. Sunt autem notæ quædam in hortensis etiam deliniatione que illi non conueniunt. Neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborescens: neque etiam florem candidum, sed spadiceum obtinet. Quod uerò ad flores & fructum attinet, uidetur accedere ad historiã Solani furiosi, ut suspicio ferè sit duorum horum generum historiã esse confusas: quam quidem auget Theophrastus, qui in eorundè descriptione non nihil à Dioscoride uariat. Quicquid uerò sit, certum est Solani esse speciem, quod forma ipsa foliorũ abundè docet: atq; huic uehementè refrigerandi uim, maximè si paulò copiosius sumat, inesse, ut hoc nomine pro somnifero Solano eius usus medicis nullo periculo esse queat. Nos uulgi sententiã sequuti, appellauimus *Dollkraut*. Possent etiam germanicè uocari *Schlaff Nachtschatt*. Sunt qui *Sewkraut* nominant. Quod si tamè hæc nonnullis haud satisfecerint, certè necesse erit *Mandragoræ* speciem esse fateantur tertiã, quam pingit Theophrastus lib.

C frus lib. vi. de hist. plant. cap. ij. ijs uerbis: ἰδιὸς δὲ ὁ κερπὸς τῷ μανδραγόρῃ τῷ μέλας τε καὶ γὰρ γῶδνος καὶ οἰνώδης ἐστὶν τῷ χυμῷ. hoc est, fructus Mandragoræ peculiaris, quia niger, acinosusq̃, & uinosus suo sapore sentitur. Hæ enim omnes notæ in fructu huius fruticis reperiuntur. Sed plura ea de re in capite de Mandragora diximus.

DE SYMPHYTO MAGNO ▷ CAP▷ CCLXV▷

NOMINA.

Symphytum curdium.



ΥΜΦΥΤΟΝ, ἢ σὺμφύτῳ μέγα Græcis, Symphytū & Solidago Latinis, officinis & herbarijs Consolida maior, Germanis *Walwurß*/Schwarzwurß/Schmerwurß/großß beynewell. Nomen illi apud Græcos Latinosq̃ egregia constringendi & conglutinandi uis fecit.

FORMA.

Consolida maior
Obiectio diluatur

Caulem emittit binūm cubitorum, aut maiorem, leuem, crassum, angulosum, Sonchii modo inanem, circa quem folia sunt non magnis interuallis distantia, hirsuta, angusta, oblonga, ad Buglosii foliorum figuram accidentia. Habet caulis secundum angulos eminentias quasdam productas. Folium tenue ex singulis alis prodit. Flores lutei, & semen Verbasci. Totus uerò caulis & folia quandam lanuginē modicè asperam, tactu pruritem mouentem, habent. Radices in superficie extræ nigræ, intus candidæ & glutinosæ, quarum est usus. Hæc siquidem delinatio adamussim huic herbæ quæ uulgò Consolida maior appellatur, competere uidetur, quod nulla prorsus sit nota quæ illi non quadret. Sed obtrudet quispiam, florum colorem non respondere, quem Dioscorides luteum esse dicit, quum in nostra Consolida alius sit. Cui ita responsum uolo. Coloris ista in floribus diuersitas non tanti momenti est, ut aliud à Consolida maiori Symphyton esse, conuincere possit: neque enim ubique terrarum, etiam earundem herbarum, flores similes sunt. Exemplo est Buglossum, quod Boraginem hodie officinæ uocant: hoc enim interdū albos, quos nos Norimbergæ & Culmachij sæpe uidimus: magna autē ex parte purpureos producit flores. Sic quoque Symphytum frequenter flore subrubro, uel leniter purpurascete, ut Onoltzbachij, rarius candido conspicitur. Tubinge tamen omnia flore albo uisuntur. Luteis floribus nullum in Germania uidisse me memini. Quod autem alios quàm luteos nonnunquam proferat flores Symphytum, satis docet Apuleius in cōmentariolo illo quem de herbis conscripsit, qui illius flores nigros esse tradit, subrubros aut subpurpureos haud dubiè innuens. Nos una pictura utrosq̃ flores exhibemus. Germani candidis floribus Symphytum sceminā, subrubris uerò marem appellant. Cæterum non est quod in Symphyti descriptione te perturbet aut remoretur, quod idem caulis simul leuis & angulosus dicitur: id enim sic intelligendum uenit, quod caulis nō perpetuò leuis aut angulosus sit, sed modo hunc, modo illum producat pro soli diuersitate.

LOCVS.

Locis aquosis, palustribusq̃ abundè prouenit.

TEMPVS.

Per integram æstatem floret. Radix tamen in autumno carpenda uenit.

TEMPERAMENTVM.

Modicè, ordine scilicet secundo, calefacit, exiccat & contrahit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radices tritæ & potæ cruenta expuentibus, ruptisq̃ profunt. Recentia uulnera illitæ glutinant. Carnes si unà coquantur cogunt. Inflammationibus, sedis potissimum, cum Senecionis folijs utiliter illinuntur.



SYMPHYTUM
MAGNUM.

Walwurtz.

C

EX GALENO.

Symphytū magnum similem petræo facultatem habet, non tamen gustantibus dulce, neq; odorantibus odoratum apparet, sed ijs sanè ab illo diuersum est. Cæterum quatenus uiscositatē quandam & mordacitatē obtinet, Scillæ simile est. Vritor eo ad omnia quæ petræo. Potest autem petræum collectū in thorace, pulmoneq; pus expurgare. Habet etiam contrahendī uim, qua sanguinis eiectionibus auxiliatur. Enterocelijs imponitur, & ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. In uino decoctum ad dysenteriam, & profluuium muliebre rubrum constringendum exhibetur.

EX PLINIO.

Symphyti radix illita, enterocelas cohibet. Vulneribus sanandis tanta præstantia est, ut carnes quoq; cum coquuntur, conglutinet addita, unde & Græci nomen imposuere. Olsibus quoque fractis medetur.

SYMPHYTI PETRAEI VIRES.

Quum Dioscorides & Galenus ad Symphyti facultates lectorem in Symphyti magni historia ablegent remittantq;, necesse est ut illas ordine cōnumeremus more quidem nostro primum ex Dioscoride, deinde ex Galeno & Plinio.

EX DIOSCORIDE.

Decoctum in aqua mulsa & potum Symphytū petræum, quæ in pulmone sunt expurgat. Sanguinē reijcientibus & renum doloribus cum aqua datur. Ad dysenteriam & rubra sceminarum profluuia in uino decoctum bibitur. Ad conuulsa & rupta ex aceto mulso sumitur. Cōmanducatum sitim arcet. Gutturis asperitatibus prodest. Recentia uulnera glutinat, & intestinorū ramices illitum coërcet. Carnes

D cum unā coquitur conglutinat.


EX GALENO.

Symphytū petræū ex contrarijs constat facultatibus; habet enim incidendī uim quampiā, qua collectū in thorace & pulmone pus expurgare potest. Habet etiam quandam contrahendī facultatem, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quædam non immodicè calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundum. Mansum sitim extinguit, & arteriæ asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarū uirium mistionē simul digerere abundè potest, simulq; corpora contrahere & constringere. Proinde enterocelijs imponitur, & ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. Cæterum qui ipsum in uino decoctum ad dysenteriam, & rubrum muliebre profluuium exhibent, tanquam desiccante & contrahente utuntur. Qui uerò ad nephritin renūmue dolorem, tanquam expurgante & incidente.


EX PLINIO.

Vtilissimū lateribus, lienibus, torminibus pectoris, pulmonibus, sanguinem reijcientibus, faucibus asperis. Bibitur radix trita, & in uino decocta, & aliquando superlinitur. Quin & cōmanducata sitim sedat, præcipueq; pulmonem refrigerat. Luxatis quoque imponitur & cōuulsis, lienī, interaneis. Aluum sistit coacta in cineres. Detractis quoq; folliculis trita cum piperis nouem granis, & ex aqua

potā. Vulneribus sanandis tanta præstantia est, ut carnes quoque cum coquuntur, conglutinet addita, unde & Græci nomen imposuerunt. Olsibus quoque fractis medetur.




CUCUMIS SATIVUS
VULGARIS.
Cucumern.




658

CUCUMIS TUR-
CICUS.
Turkish Cucumber.



CUCUMER
MARINVS.


Beer Cucumber.



CUCUMER
CITRVLVS.
Citrullen.

PEPO
Pfeben.

nn 3



C

NOMINA.



Cucumer unde dicitur.

Sicys.

Adagium.

Tetrices magna ex parte impudice.

ΙΚΥΣ, καὶ σίκυς ἢ μάρϕ Græcis, Cucumis & Cucumer Latinis dicitur. Officinæ latinam appellationē retinuerunt. Aëtius Anguriū etiam uocari tradit. Germani Cucumerem uocant. Cucumer autem, ut Varroni placet, dicitur à curuore, quasi Curuimer. Sicyn uerò Græci ex aduerso ἀπὸ τοῦ σόβειν καὶ κίβειν, quod scilicet appetentiā concumbendi minimè stimulet, nominasse uidentur. Hinc celebratum Græcis prouerbiū est, ut ex Athenæo annotauit Hermolaus: Texens pallium mulier cucumerē deuoret. quòd tetrices magna ex parte, si Aristoteli credimus, impudicæ sint, & opportuna Veneri. Ut ergo hīs impetus infrenei & elanguescat, adagiū edendos cucumeres tetricibus consulebat.

G E N E R A.

Pepones, Melopepones.

Melones cur dicitur.

Cucumis.

Anguria.

D

Citreoli aut Citruli.

Pepon.

Melon.

Cucumis.

Cucumerū genera sunt Pepones & Melopepones, in quos statim degenerant, figura tantum & quantitate inter se disidentes. Siquidem qui magnitudine excedunt, aut in longitudinē procedunt, quales multis locis nascuntur, Pepones quondam uocati fuerunt. Sed qui formam & effigiē māli referunt, & humi rotundantur, Melopepones Græcis uocantur, facto ex Pepone & mālo nomine: neq; inter Pepones & Melopepones aliud quàm quod sumitur ex figura quondam, ut diximus, discrimen fuit. Totum hoc genus Palladius Melones, quasi *μήλωνες*, id est, pomeos, à mālorum figura appellauit, quo nomine maior pars hodie medicorū simul cum officinis utitur. Sunt itaq; in uniuersum tria Cucumerū fatiuorum genera. Primum genus absolutè Cucumis, à nostræ ætatis herbarijs, cum adiectione Cucumis citrinus, hoc est, flauus, à colore quem habet cum maturuerit, appellatur. Aëtius, quod equidem sciam, primus Anguria uocari tradit, quæ ueteribus *σίκυς*, id est, Cucumeres nominantur. Horum sanè plura sunt genera, nos quatuor potiora commemorabimus, quorū etiā picturas exhibemus. Primi generis est uulgaris Cucumer, fructū obtinēs oblongū & maculosum, germanicè uocāt *gemeyn Cucumerem*. Sunt qui illum priuatim Anguriā appellent. Ad quod sanè nomen alludentes Germani nostri, alio nomine *Gurcken* nominant. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem uulgus Turcicū nuncupat, priori multò maior ac procerior folijs, floribus & fructu, qui ut in primo nō est maculosus, sed tamen oblongus etiā. Germani *Türckisch Cucumerem* appellant. Fructus eius admodū flauus existit, hinc est quod multi eundē priuatim Citrulum & Citreolū, quasi citrinū, hoc est, flauū uocent. Huius semina alba & lata sunt. Tertij generis Cucumer est qui marinus dicitur, Turcico, quod ad folia, flores & semina attinet, ferè similis, nisi quod in hoc omnia sint minora. Fructus uerò rotundus, ut pictura monstrat. Vulgus Zucco marino uocat. Germani *meer Cucumer*. Officinis perinde atq; Turcicus ignotus. Quarti generis Cucumer est, quem officinæ hodie Citrulū uocant. Folia habet ferè Colocynthidis, multifariā dissecta & incisa: fructū rotundū, herbacei coloris, & in eo semina lata, & colore spadicea, hoc est, in rufo atra. Nos officinas respicientes nominauimus hunc Cucumerē citrulū, germanicè *Citrullen*. Alterū genus Cucumeris est, qui nunc simpliciter Pepon, ἀπὸ τῆς πεπαινιδου, hoc est, maturescere dicitur. Is enim mitis ac tener maturitate flaccescit. Germani *Pfeben* appellant. Tertij genus Cucumeris hodie Melon ab omnibus uocatur, Germani *Melaun* nominant. A priorē forma & suauitate differt: rotundior siquidē & māli cotonei quasi formā referēs, mitiorq; existit. Discrimen hoc sentientes posteriores Græci *σίκυς* simpliciter dixerunt, quem nos priuatim modo Cucumerē uocamus. Adiecta autem Peponis uoce, hunc quem nostra ætas priuatim Peponē nominat, *σίκυς πεπονας*, id est, Cucumerē Peponē dixerunt, mitē scilicet & maturitate tenerū Cucumim inuenientes. Sub quo eum etiā, quem à tereti ac rotunda māli effigie *μήλωνες* peculiariter dixerunt, complexi sunt.

F O R M A.

Cucumis sarmentis uiticulisq; prælongis serpit, in ramosq; uitis modo se diffundit, ta-

A dit, tamen ob caulis infirmitatē humi spargitur, ni propius adsit cui caducus incumbat: folio anguloso, flore luteo, fructu cartilagineo, & interdum maculoso, coloris tum herbacei, tū citrini, tum nigri. Pepo uite serpit praelonga, flagellis ultro citroq̄ ^{pepo} reptantibus, uitigineis ferē frondibus, scabris, flore luteo, fructu cartilagineo, orbiculatim striato, prominulis puluinoꝝ toris, strigilibus in uertice pomi & umbilico coeuntibus, ibidemq̄ stellatim decussatis, cute aspera uelut lentiginibus occupata, carne intus suauis, seminibus in utero liratim digestis.

LOCVS.

Pingui gaudet solo, locisq̄ apricis uberior prouenit Cucumis. Nascuntur & pepones bene cultis locis, eoq̄ lætius si subinde rigentur. Amant tamen aprica loca, & sole irradiata: ideoq̄ cum annus est pluuiosus & nubilus, non æque ut in siccis annis proueniunt. Libertate etiam gaudent, qua possint ultro uagari. Magna copia Peponum & Melonum apud Norimbergam, celeberrimū Germaniæ nostræ opidum, prouenit.

TEMPVS.

Ætatis fine, Iulio potissimū mense, maturescunt. Citius tamen Melones, quā priuatim Cucumeres dicti.

TEMPERAMENTVM.

In Cucumeribus superat humida & frigida temperies, non tamen uehementer, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed iam desiccantis, idq̄ in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

B Satiuus Cucumis bonam facit aluum, stomachoq̄ accommodatus est. Refrigerat, nec corruptionē sentit. Prodest uesicæ. Olfactu animo deficientes restituit. Semen eius mediocriter urinā cit. Cum lacte aut passo uesicæ exulcerationibus subuenit. Folia eius cum uino illita, morsus canum sanant, cum melle uerò epinyctidas. Peponis autem caro comesta urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Superior eius cortex contra aduersionem infantium, quam siriasin uocant, syncipiti imponitur. Fronti ut oculorum fluxiones auertat, imponitur. Mixtus farinæ, & cum semine in sole siccatus succus, smegma fit ad extergendā cutem, & nitorem in facie conciliandum. Radix sicca, & cum hydromelite drachmæ pondere pota, uomitiones mouet. Quod si quis modicè à coena uomere cupiat, gemini oboli fatis erunt. Sanat & ulcera in modum faui concreta, ceria uocant, cum melle illita.

EX GALENO.

Cucumis esculentus maturus quidē tenuioris essentiae est, qui uerò immaturus est, crassioris. Sed & abstergendi & incidendi facultate participant, quare & urinā mouent, & corpus splendidum reddunt: at magis si quis semine arefacto contusoq̄ atq̄ cribrato, uice pulueris abstergentij utatur. In semine & radice maior abstergendi facultas, quā in fructu ipsius carne. Vniuersa Peponū natura frigidior cum larga humiditate existit. Habent & quandā abstergendi uim, ideoq̄ urinam cient, & deorsum expeditius quā Cucurbita & Melopepones rapiuntur. Quod porro abstergant, discere licet sordidam cutem defricando. Quamobrē maculas etiam solis calore factas, & lenticulas faciem occupantes, & in superficie alphas extergere possunt. Semen quod in eorum ueluti carne continetur, ad hoc efficacius, adeo ut renibus etiam calculo infestatis sit accommodatum. Gignit in corpore uitiosum succum, potissimū quando non rectē concoquitur. Tum uerò morbū etiam qui cholera dicitur, inducere consueuit. Etenim priusquam ad corruptionem peruenit, uomitioni quoque idoneus est: largiusq̄ ingestus, nisi quis aliquid eorum quæ boni sunt succi supermandet, omnino uomitum concitabit. Melopepones minus hu-

C midi quàm Pepones sunt, nec adeò prauis succi, segnius item prouocant urinam, tardiusq̃ deorsum descendunt. Ad uomitū excitandum non eandem uim Peponibus obtinent, sicut nec celeriter in uentriculo, quando illic prauus humor coaceruatur, aut alia corruptionis causa illum infestauerit, corrumpunt. Uentriculo haudquam ceu Pepones officiant. Cucumeres autem urinam mouendi facultatem, perinde atque Pepones habent, sed imbecilliorē: minus nanque substantia humidī, ideoq̃ nō facile, ut illi, in uentriculo corrumpuntur. Inuenias qui hos ceu alia multa, quæ bonæ hominum parti concoqui non possunt, conficiant, ob totius scilicet naturæ cum eis proprietatem.

EX PLINIO.

Pepones qui uocantur, refrigerant, maximè in cibo, & emolliunt aluum. Caro eorum epiphoris oculorum, aut doloribus imponitur. Radix sanat ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant. Eadem contra uomitiones siccatur, in farina tusa datur, quatuor obolis in aqua mulsā, ita ut qui biberit, quingentos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adijcitur. Cortex quoque uomitionē mouet, faciem purgat. Hoc & folia cuiuscunq̃ satiui illita. Eadem cū melle epinyctidas sanant; cum uino canis morsus. Cucumis odore defectum animi.

EX SYMEONE SETHI.

Anguria, quæ Cucumeres dicuntur, secundum uerò cōmunem sermonem Tetrangura, ob frigidū & humidum temperamentū noxia sunt, & mali succi. Ex ijs autem parua magnis anteferre oportet. Hæc urinā ducunt, & si in aceto macerentur, in acutis præsertim febribus, mitiorē calorem reddunt. Crebrior uerò horum usus semen genitale minuit, in Veneremq̃ impetū aufert. Semen autem horū deficcātū, caliditatem quandā possidet, contrariamq̃ his actionē efficit, urinamq̃ magis prouocat. Pituitā glutinosā Tetrangura in uentriculo gignunt, quæ cruda per uenas diffunditur. Propterea qui his crebrius utuntur, illi propter humores temporis spatium in uenis, & alijs corporis cauitatibus coactos, longis corripiuntur febribus. Semen uerò horum urinā cit, sed minus quàm Peponū, quoniam celerius in uentriculo corrumpuntur. Meliora in his sunt quæ habent semen exiguū. Calidos autē & siccos stomachos iuuant, & si in ardente febre cum aceto porrigantur, ualde profunt. Propriū uerò horum est nauasas uentriculi calore excitatas, sedare. Horum autem interiora esse oportet; nam quæ foris sunt, mali succi existunt, & difficulter admodū concoquuntur, & ferè uenenata. Habent uerò & alias proprietates, ut animo deficientes propter excedentē calorem reficiant. Si autē pituitā in uentriculo nanciscant, nauasas faciunt, & colicos affectus, & hypochondriacas passiones.

DE SICYSYLVESTRIBUS CAP. CCLXVII.

NOMINA.

Cucumis anguinus.
Cucumer asininus.



IKYΣ ἀγγυρῶν ἢ ἐλατθῆσιον, sic autē propriè uocatur succus eius Græcis, Cucumis anguinus, syluestris & erraticus Latinis, officinis & barbaris Cucumer asininus, Germanis wild Cucumer / uel esels Cucumer appellatur.


FORMA.

Solo fructu à satiui Cucumere distat, quem multo minorē habet, glandibusq̃ longiusculis similem. Folia & sarmenta satiui similia, Radicem albam & magnam. Totus frutex amarus.

LOCVS.

Ruderibus sabulosisq̃ locis prouenit. Nusquā tamen in Germania, quod sciam, nisi fatus nascitur.

TEMPVS.



CUCUMIS SYL-
VESTRIS.

Wild Cucumber.

C

TEMPVS.

Augusto mense floret, atque subinde autumno fructum tempestiuū producit, qui seminibus ac succo plenus est, qui decerpto pediculo confestim exilire solet.

TEMPERAMENTVM.

Calidus & siccus est Cucumis syluestris, ut ex uiribus latius patebit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Foliorū succus instillatus aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix omne uetus oedema discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Decocta ex aceto & illita podagras discutit. Ischiadicis infunditur eius decoctum, eoq̄ in dolore dentes colluuntur. Arida trita, alphas, lepras & impetiginē abstergit. Cicatrices nigras, & in facie maculas expurgat. Radicis succus selquioboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq̄ desijciunt, praesertim in hydro picis. Purgat uerò citra stomachi iniuriam. Radicis felibram accipere oportet, inq̄ duobus uini, praesertim Libyci, sextarijs conterere, ac dandi ex eo terni cyathi, donec tumor abundè subsederit. Quod uerò Elateriū uocatur, ex fructu huiusce Cucumeris paratur ad hunc modum. Eligito Cucumeres qui tacti saliendo succum ex se profundunt, ac nocte una repositos dimitte. Postridie cribrum rarius neque crebra foramina habens crateri superponito, supinoq̄ cultro sursum uersus aciem habente sigillatim Cucumeres utrisq̄ manibus prehensens diuidito, & per cribrum in subiectum craterem humorem exprimito, simulq̄ carnosum in eis quod iam cribro adharet exprimito, ut & illud descendat. Quae expressa sunt in paratā peluim cōijcito, Coaceruatis autem in cribro quae antea dissecta fuerunt, ea dulci aqua perfundito, & cum expresseris abijcito. Humorē in pelui agitatam, & linteo opertum, soli exponito, dumq̄ steterit totam supernatantē aquam, cum humore cōcreto, percolato. Facitoq̄ id saepius donec supernatans aqua subsidat, quam cum diligenter excolaueris, coniectum in mortarium sedimentū terito, & in pastillos conformato.

Elaterij confectio.

Vires Elaterij.

Elaterium uerò à bimatu ad decenniū purgationibus utile. Integra quantitas obolus est, minima semiobolus, pueris chalciduo. Copiosius enim in animo potum, periculū adfert. Pituitā & bilem per inferna pariter & superna trahit. Optima autem per ipsum difficulter spirantibus fit purgatio. Quod si itaque in animo est per aluum purgare, adiecto salis duplo, & stibij quod colorari sufficiat, ex aqua catapotia erui magnitudine dato. Postea cyathus unus aquae tepidae sorbeat. Ad citandas uerò uomitiones aqua diluens Elaterium, subiectas linguae partes penitissimè penna oblinito. Quod si quispiam difficiliter uomat, oleo aut unguento irino diluito. Somnum inhibeto. Porro ijs qui supra modum purgantur, uinum cum oleo mixtum continuo dare conuenit; etenim uomendo emendantur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quae stomachum densare possunt offerenda sunt. Ciet Elateriū menses. Foetus enecat in pello subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Diurnos capitis dolores finit. Efficaciter angina laborantibus inungitur, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

EX GALENO.

Cucumeris syluestris, & fructus ipsius succus, quem Elaterium uocant, & non minimè radicis ac foliorū, ad medicationes perutilis est. Elateriū itaq̄ menses ciet, & foetum interim appositum, ceu alia omnia amara & subtilium partiū, maximè si aliquam habeant caliditatē, ueluti Elaterium. Summè siquidem amarum est, leuiter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientiū. Porro tale protinus quoq̄ digerendi uim obinet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo uetere. Bonū item est regio morbo affectis fusum cum lacte in nares. Hoc etiam usu dolores capitis sanat. Atq̄ Elateriū quidem eiusmodi est. At radicis succus, ut & foliorum, licet similem uim habeat, imbecilliorē tamen, Sed & ipsa radix adfimi-

A ad similem facultatem possidet, abstergit nanque, digerit atque emollit, Porro cortex eo potentius desiccatur.

EX PLINIO.

Ex Cucumere sylvestri fit medicamentū quod uocatur Elaterium, succo expresso è fructu. Cuius causa nisi maturius incidatur, succus exilit, oculorū etiam periculo. Obscuritates & uitia oculorū sanat, genarumq̄ ulcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus uitium, non attingi uuas ab auibus. Radix autem ex aceto cocta podagris illinitur, succoq̄ dentium dolori medetur. Arida cum resina impetiginē & scabiem, quam p̄foram & lichenas uocant. Parotidas & panos sanat, & cicatricibus colorem reddit. Et foliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Nullum ex medicamentis Elaterio longiore æuo durat. Incipit à trimatu. Melius autem quo uetustius erit, quod iam ducentis annis seruatum esse autor est Theophrastus. Et usq̄ ad quinquagesimū lucernarū lumina extinguit. Hoc enim ueri experimentum est, si ad motū prius quàm extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Efficax est contra scorpionū ictus Elateriū, & ad purgandū uterum, aluumq̄. Modus portione uirium à dimidio obolo ad solidū. Copiosius necat. Sic & contra phthiria sin bibitur & hydropsifas. Illitū, anginas & arterias cum melle, & oleo uetere sanat.

DE SMILACE HORTENSIS

CAP. CCLXVIII


NOMINA.



SMIACE *σμιλαξ* græcè, Smilax hortensis latinè, officinis inusitata: recentiores Græci ac herbarij, & qui Arabum, præsertim Serapionis & Aui-cennæ, sectantur placita, Phasiolos uel Faseolos. Galenus & alij uete- Phasioli.
Dolichi.
res Græci Dolichos appellant. Germani *Saselen / welsch oder wild*
Wonen uocant.

FORMA.

Folia Hederæ similia habet, molliora tamen: caules tenues, & capreolos uicinis fruticibus se implicantes, in tantum incrementos, ut tabernacula effingere possint. Fructum Fcenogræco similem profert, longiorem tamen maioremq̄, in quo semina renibus similia, non unius coloris, sed ex parte subrufa continentur. Ex qua certè deliniatione sole clarius fit Smilacem hortensem Dioscoridis non esse nisi phaseolos uulgò uocatos, cum sint folijs Hederæ, mollioribus atque uenosis, cauliculis tenuibus, clauiculis propinquis fruticib. se implicantibus, ramis incremento suo tentoria & hortorū cameras fornicesue facientibus, siliquis Fcenogræco haud dissimilibus, longioribus autem & maioribus, seminibus intus uersicoloribus, & renibus in uniuersum similibus. Quæ certè unica nota ad docendum Smilacē hortensem esse Phaseolos sufficere possit. Accedit quod Phaseolorū apud Serapionē descriptio non sit alia quàm apud Dioscoridē Smilacis hortensis, id quod manifestè patebit utraq̄ conferenti. Cæterum etsi duo Phaseolorū uideantur esse genera: sunt enim aliqui candidi, nonnulli uerò rubentes, tamen quia in folijs nulla est prorsus diuersitas, & Dioscorides quoque innuat semina hæc non esse unius coloris, sed ut Serapion interpretatur, quædam ad candorē, quædam uerò ad ruborem accedant, ideo sub unica pictura utriusq̄ coloris Phaseolos exhibemus: neq̄ enim distant alia ratione, quàm quod albi producant flores candidos, rubentes uerò purpurascens. Licet non ad candidos & rubentes tantum hæc Dioscoridis uerba, *ἐν ἰσχυραῖς*, referenda esse existimem, sed ad alios etiam: sunt enim nōnulli fusci, alij uerò gilui, cœrulei & cæsi, alij maculis & orbibus atris uarietati, nisi quis omnes iam dictos colores sub candido & rubro, ex quibus ij cōmixti esse uidentur, completū uelit.



SMILAX HOR-
TENSIS.

Welsh Bonen.

LOCVS.

A Smilax de qua hic agimus, ut ex nomine satis constat, in hortis sata provenit, & cum longis serpat flagellis, propè poni ridicè palùe debent, quas capreolis suis, ubi increuerit, complectatur.

TEMPVS.

Æstate florent, ac subinde siliquas & in ijs semen producunt.

TEMPERAMENTVM.

Symeon Sethi & Mauritani in primo ordine calidos & humidos esse Phascolos statuunt. Galenus etiam in libro primo de alimentorū facultatib. humidiores natura esse asserit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Olerū modo esui apta est siliqua cum semine Asparagi modo elixa. Vrinam pellicit, in somniaq; graua & tumultuosa facit.

EX GALENO.

Dolichi non minus quàm Pifa nutriunt, similiter etiam flatu carent; sed quod ad suauitatē attinet & deiectionē, peiores sunt. Alibiles itaq; sunt, nisi quando integri & etiam nū uirides unā cum suis siliquis ex olco & garo ab hominibus ingeruntur. Aliqui uinum etiam adhiçunt. Sed horum in repositione, ut Pisorū, nullus est usus: quippe quum natura sint humidiores, citò corrupti cōsueuerunt. Attamen si quis hos tutò reponere cupiat, siccare prius diligenter & exactè oportebit. Siquidem eo modo & à putrefactione, & à corruptione tota hycme uindicantur, eundem quem nobis Pifa usum exhibentes,

EX AETIO.


B Siliquæ seu Lobi qui nunc passim uocant, apud omnes antiquos Dolichi & Phasioli appellati, de genere Pisorum sunt, similes illis quantū ad minimam flatus generationem: quantum uerò ad iucunditatē cibi & egestionem, peiores. Peculiariter autem Lobi dicuntur, quoniam ferè isti tantum eorum omniū quæ siliqua uestiuntur, cum siliquis suis comeduntur.

EX SYMEONE SETHI.

Qui ex ijs magis rubri sunt, calidiores. Manifesta quoque in ijs humiditas, quod citò putrescant. Humorē generant crassum & pituitosum. Medium locum habent, ut ait Galenus, inter ea quæ facillè & difficulter cōcoquantur, celeriter & tardè transeunt, inflant & non inflant, parum & multum nutriunt. Ante alios cibos cum sapa sumpti, uentrem proritant. Cum sinapi oblati, plurimum noxæ deponūt. Albi igitur Phasioli crassiores, & difficilioris coctionis, ac humidiores sunt quàm rubri. Proprietate autem quadam turbulenta somnia facit, sed ad bonam habitudinē corporis conferunt, & urinas mouent. Et horum decoctum menses mouet.

DE SATYRIO TRIFOLIO CAP. CCLXIX.]

NOMINA.

 SATYRION *τριφυλλον* Græcis, Satyrium trifolium Latinis, officinis nostris incognitum aut inusitatū: uulgo Testiculus uulpis aut sacerdotis, *Testiculi uulpis.* Germanis *Stendelwurç* nominatur. Satyrio autem nomen fecerunt *Satyrium unde dictum.* Satyri, qui primi syluestres dii colludentes nymphis per syluas & antra, ad firmiorem Venerem herbam hanc inuenerunt. Trifolium uerò, quoniam tria *Trifolium.* fert folia ad terram uersa.

FORMA.

Folia tria fert Rumici aut Lilio similia, minora tamen & rubentia. Caulem nudum, longum, cubitalem, Florem Lilio similem, album, Radicem bulbo similem,



SATYRION
TRIFOLIUM.

Stendelmurtz.

A mālī modo extuberantē, foris rufam, intus ouī modo albam, gustu dulcē & origram. Quod uerò hic dicimus Lilio similem, non sic intelligendū uenit quasi quantitate & tota figura Lilio similis flos sit, quando euidentissimū sit Liliū quantitate sua Satyrīj florem multis modis superare. Deniq; nec figura etiam per omnia respondet: quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiam referri potius debet, quæ planè eadem est cum Liliū colore & essentia, id quod conferenti hos duos flores manifestum fiet.

LOCVS.

In montosis & apricis nascitur.

TEMPVS.

In Iunio mense potissimum compâret.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & humidum est, quamobrem gustu dulce apparet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix in uino austero, nigro, ad opisthotonū bibitur, Ferunt etiam hanc impetum ad Venerem excitare.

EX GALENO.

Satyriō excrementitiā & flatuosam humiditatē possidet, quocirca ad Venerē incitat. Hæc uerò & herbę ipsius radix præstare potest, Porrò ut nonnulli scribunt, cum uino nigro austero potum opisthotonum sanat.

EX PLINIO.

Radix cum Satyriō gemina sit, eius inferior pars & maior mares gignit, superior ac minor fceminas.

DE SATYRIO BASILICO

CAP. CCLXX.

NOMINA.



ATYPION *Baccharis* posterioribus Græcis, Satyrīū regium Latinis, officinis Palma Christi, Arabibus Bucheiden, Auicennæ Digiiti citrini, Germanis *Ärenghlänen* uocantur. Palmā Christi propter similitudinem quam eius radix cum humana habet manu, dixerunt.

*Palma Christi.
Digiiti citrini.*

GENERA.

Duo eius sunt gênera, quorum alterum mas folia non maculosa, floresq; purpureos habet. Alterum fcemina maculosis est & paulò latioribus folijs, floribus in purpureo albescentibus. Radicum etiam in colore est differentia, quod mas quidem radix flauescat citra albedinem, fceminæ autem cum albedine. Quam sanè differentiam Auicenna etiam expressisse uidetur, dum unam ex flauo & albo cōmistam esse colore, alteram uerò ex flauo sine albedine inquit.

*Mas
Fcemina.*

FORMA.

Folia cum reliqua superficie Cynosorcho similia sunt. Radix tamen ei subest lutea aut flauescens, instar manus ramosa: modo enim quatuor, modo quinque, modo sex aut plures radices prodeunt, quæ ferè humanos digitos imitari uidentur.

LOCVS.


Prouenit in montibus, & locis soli expositis.

TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus inuenitur, Mas quidem Iunio, fcemina uerò Maio.

TEMPERAMENTVM.

Viruncq; amarū est, magis tamen amarum quod maculosis constat folijs. Ideoq;



SATYRIUM BASI
LICVM MAS.

Kreuzblüm menale.



SATYRIUM BASILI
CVM FOEMINA.

Kreuzblum weiblich.

C non perperam censent Auicenna & alij quidam ex recentioribus medicis, qui calidum esse & siccum in secundo ordine tradunt.

VIRES EX RECENTIORIBVS.

Vfus eius ad erugandã cutem, ad neruorũ dolores, & contra noxia medicamenta. Fertur & amuletum esse radix gestata. Semen ex uino sumptum nouem diebus, comitiales sanat. In eundem effectum uinum diluitur herbę decocto. Scobs radices propinatur in uino ad arcendam quartanã, quam & uomitione curat paulò ante acceptionem pota. Plura in præsentia rescire de huius facultatibus non licuit.

DE SVCCISA ▶ CAP ▶ CCLXXI ▶

NOMINA.



Succisa.

Morsus diaboli.

VO nomine ueteres aut posteriores Græci appellauerint hanc herbam, cognitamq; illam habuerint nec ne, nobis nondum constat. Nonnulli Geum esse arbitrant. Nos Succisam nominare uoluimus, partim quod id nominis latinum esset, & pulchrè huic herbæ quadraret, cuius radices circumrosæ sunt, partim quod antiquus manuscriptus herbarius sic uocaret. Vulgus superstitione quadam motum credit cacodemona, tantæ efficacię radicem inuidere hominibus, atque hac ratione ubi succreuerit statim eam undiquaq; circumrodere. Hinc est quod Diaboli morsum appellitent. Quam etiam superstitionem plusquam muliebrem secuti Germani, *Teuffels abbiß*, hoc est, præmorsam à diabolo, nominant.

FORMA.

D Binũm cubitorum fastigiatur altitudine, folijs Plantaginis minoris, aut Cirsij leuioribus, solidioribusq; leniter laciniatis. Floribus purpureis. Radicib. subnigris, succisis & circumrosis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis & montanis, saltibus, ac interdũ etiam pratis & dumetis.

TEMPVS.

In Augusto eius magna est passim in locis iam dictis copia.

TEMPERAMENTVM.

Supra modum amara est, unde calidam & siccam esse satis constare cuius potest.


VIRES.

Præsentaneo remedio ad maturandos, atque adeo sanandos carbunculos adhibetur, si herba uiridis trita imponatur, aut uinum in quo decocta fuerit bibatur. Radix per se estur, aut uinum eius decocti in uulug doloribus bibitur. Hæc manuscriptus herbarius. Hodie, cum habeat facultatem discutiendi & incidendi, utuntur ea ad dissoluendos sanguinis grumos.



SVCCISA

Teuffels abbiß.



SCABIOSA.

Apostemtranc.

NOMINA.

Hæc herba quo nomine Græcis uocetur, fatemur nos ignorare. Sunt qui Aëtio *Ἰσχυρὴ* dictam uelint: uerum cum nomine tenus eam tantum prosequatur non adiecta descriptione, nihil certi constitui potest. *Vul-*gus Scabiosam uocat, quo nomine nobis utendum erit donec legitimū *Scabiosa* compertū fuerit. Germani *Scabiosen* / oder *Apostemtra* aut nominant. Scabiosam *Scabiosa unde dicta.* uerò aut à scabro herbæ habitu, aut quod scabiei medeatur appellatam esse euidentissimum est: id quod etiam Plora uox prætereundum uidetur. *Stoeben* Dioscoridis non esse multis argumentis constat, quæ prætereo. *Scabiosa non est Stoebe.*

FORMA.

Folia carnosæ, Erucae modo laciniata & multifida habet, subhirsuta, non tamen aculeis horrentia. Flores speciosos, diuturnos, coloris ex cæsis aut purpureo albicantis. Radicem crassam.

LOCVS.

Parsim in omnibus, potissimū autem humidis pratis prouenit.

TEMPVS.

In Iunio, antequam gramine denudentur prata, parsim floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum sit uehementer amara, calidā & siccam esse nemo nescit, idemq; cum Succisa temperamentum habet.

VIRES.

Eisdē quas Succisa facultates obtinet. Potissimū autem scabiem & tussim sanat.

DE SMILACE ASPERA CAP CCLXXIII

NOMINA.

MΙΛΑΞ *πικρῆ* Dioscoridi, *μίλαξ* Galeno, Smilax aspera Latinis dicitur, officinis nostris incognita, germanicè *groß stechend* oder *scharpff Windt*: ab aculeis quos habet, nominari aptè potest. *Smilax et Milax*

FORMA.

Folia habet Peryclimeno similia, uel, ut Theophrastus ait, hederacea: ramulos multos, tenues, Paliuri aut Rubi modo aculeatos. Circūuoluitur arboribus sursum deorsum se circūagens. Florem candidū, fructum racemosum fert, cum maturerit rubentem, gustu leuiter mordentē. Radicem crassam & duram.

LOCVS.

In palustribus & asperis nascitur, Plinio autem teste in conuallibus opacis.

TEMPVS.

Smilacē quidem asperam nascentem, non uidi: sicca enim aliunde ad me transmissa est, ita ut certò indicare quo tempore floreat aut fructum producat, haud possum. Id quod ideo referre uolui, ne nos calumniandi ansam habeat osor peruersus, si non ex omni parte picturam nativæ ipsius herbæ formæ respondere uiderit. Cogitet enim non uiridem, sed siccam nos pingendam tantum dedisse. Theophrastus tamen libro iij, cap. ult. de histor. plant. hanc uerno tempore florere scribit.

TEMPERAMENTVM.

Quale sit eius temperamentū, uires satis declarant, & folia ipsa atq; fructus, quæ singula in gustu lenem quandam mordicationē præ se ferunt, ut calidam esse & siccam haud dubium sit.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius folia & fructus si antè & post bibantur cōtra letalia uenena efficacia sunt.
Traditum

718

SMILAX
ASPERA.

Großstachelnd Winder.



A Traditum est, quod si quis tritum eorum aliquid nuper genito infanti bibendū dederit, nullum illi postea uenenum nociturū. Conciditur etiam in alexipharmaca.

EX GALENO.

Milax aspera clauiculis plena est, ut arboribus sursum deorsum diuersimodè circumuoluatur. Folia gustata acrimoniā aliquam habent, & alioqui si illis utaris calescunt.

EX PLINIO.

Coronam ex ea factam impari foliorū numero, aiunt capitis doloribus mederi. Contra uenenata efficacissimi acinorū corymbi, in tantum ut acinorū succo infantibus saepe instillato, nulla postea uenena nocitura sint.

DE SMILACE LEUI CAP. CCLXXIII

NOMINA.



MIAX ^{ἰσὶα} Dioscoridi, ^{μίλαξ} Galeno & Paulo dicitur. Latinis Smilax leuis. Officinis & herbarijs Volubilis maior, à nonnullis Campanella, & Funis arborum, Germanis Windentraut / glatte Winden / oder weiß Glocken uocatur. Laeuis autem non alia ratione, nisi quod aculeis careat, dicta est.

Volubilis maior.

Funis arborum.

Smilax laeuis cui

nominata.

FORMA.

B Hederae similia folia habet, molliora tamen, laeuora & tenuiora. Ramulos supra dictae similes, aculeis carentes. Conuoluitur & haec arboribus, ut prior. Fructū fert Lupino similem, nigrum, paruum, super quem semper flores albi, copiosi, & orbiculati per totam Smilacē exeunt. Aestate tabernacula per ipsam fiunt, autumno autem folia cadūt. Ex qua descriptione planum fit omnibus, herbam hanc quam uulgus herbariorū Volubilem maiorem uocat, esse Smilacem laeuem, quod illi scilicet singulae notae à nobis commemoratae conueniant. Id quod etiā pictura Smilacis asperae, si cum hac cōferas, satis demonstrat, quam uno hoc nomine dedimus, ut ex eiusdem collatione manifestius leuis ipsa agnosceretur. His accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, qui Smilacem leuem, Volubilem maiorem interpretatur. Eius etiam pictura, Volubilem quam maiorem appellamus, penitus exprimit.

LOCVS.

Nascitur passim per fruteta, & sepibus sese inuoluit. Amat culta, & in his etiā potissimum gignitur.

TEMPVS.

Aestate floret, autumno semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Modicam amaritudinem in gustu praese fert.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius semen cum Dorycnio, & utrunque trium obolorū pondere potum, somnia multa & turbulenta facere fertur.

EX GALENO.

Milax laeuis facultate quodammodo praedictae similis est.

EX PLINIO.

Nullius est effectus.

APPENDIX.

Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidas utuntur passiones, capitis potissimum & oculorum.



SMILAX
LEVIS.

Großglatte Winde

NOMINA.



SISYMBRION Græcis, Sisymbriū Latinis appellatur. Sisymbriū dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit ueteribus comcedijs meretricula. Coronam etiam Veneris nonnulli dixerunt, uel quod ob odoris suauitatē quam præ se fert, eo iuuentus quæ amoribus gaudet coronata, in comestrationibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras cōmendaret. Vel potius, quod Sisymbrij caulis articulatim per internodia uerticillato florum ambitu concinnè coronetur.

Corona Veneris
cur dicitur.

GENERA.

Sisymbrij duo sunt genera. Vnum quod simpliciter Sisymbriū dicitur: hoc seplasiarij Balsamitā, ut manuscriptus etiam testatur herbarius, uulgus autem Menthā aquaticam, Germani *Sischmünz*, *Wassermünz*, oder *Bachmünz* uocant, Alterum cum adiectione Sisymbriū cardamine nominatur. Officinis Nasturtiū aquaticum, Germanis *Brunnentref*. Sic uerò dictum, quod sapore Cardamum, hoc est Nasturtium, imitetur.

Balsamita.
Mentha aquatica.
Nasturtiū aquaticum.

FORMA.

Sisymbriū hortensi Menthæ simile, quadrato caule, quadantenus purpurascente, folijs Menthæ, ferratis, latioribus & odoratoribus: floribus internodia geniculatim coronantibus, uerticillato semper ambitu. Sisymbriū cognomento cardamine folia inter initia orbiculata habet, cum autē creuerint ut Eruce folium laciniatim fiunt. Caule proslit cauo, sesquipedali, ima sui parte pluribus radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarū cauis cirri frequentes sinuatim erumpunt. Flore candido, Semine Eruce instar in siliquis acri & exiguo.

Sisymbrium.

Sisymbrium cardamine.

LOCVS.

Virunq; riguos tractus amat. Primum autem potissimū circa stagna & piscinas nascitur. Alterum nusquam non in aquatilibus.

TEMPVS.

Æstate, potissimū uerò Augusto mense, cum Mentha florent.

TEMPERAMENTVM.

Sisymbriū primū exalfacit atq; resiccat in tertio ordine. Alterū autē quum siccū est, itidem tertij est ordinis exalfacientij & exiccantiū: quum humidū & uiride, secundū.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sisybrium primum uim calfaciendi obtinet. Semen eius ad strangurias & calculos cum uino potum prodest. Tormina & singultus sedat. Folia temporibus & fronti illinuntur contra capitis dolorem. Aduersus etiam apum & uesparum ictus ualent. Vomitiones potum sistit. Alterum cardamine cognominatū calefacit, urinam ciet. Comeditur quoq; crudum. Lentigines & cutis à sole nigriciem & asperitatem exterit tota nocte illitum, mane autem ablutum.

EX GALENO.

Sisybriū primum tenuiū partium est, digerentis, calefacientis & exiccantis facultatis. Semen quoque eius tenuium partium est & calidum. Quocirca ipsum quidam cum uino exhibent singultientibus, & tormina patientibus. Sisybriū quod quidā Cardaminem uocant, quandoquidē Cardamo, id est, Nasturtio simile quiddam gustu præfert, eadem ferè potest.

EX PLINIO.

Virunq; Sisybriū efficax aduersus aculeata animalia, ut sunt crabrones & similia. Sedant capitis dolorē, item epiphoras. Alij panē addunt. Alij per se decoquunt in uino. Sanat & epinyctidas, cutisq; uitia in facie mulierum intra quartum diem noctibus imposiū, diebusq; detractū. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi

pp dissolu-



SISYMBRIVM

Fischmüntz.



SISYMBRIVM
CARDAMINE.

Blumenfresser.

C dissolutiones cohibet siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendū grauidis nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum eijcit. Mouet urinam cum uino potum. Syluestre & calculos, Quos uigilare opus sit excitat infusum capiti cum aceto,

DE SIO CAP. CCLXXVI

NOMINA.

SION, *ἡ ἀναγallis ἕνυδρο* Græcis: Sion, Lauer & Anagallis aquatica Latinis dicitur. Officinis ignota herba. Germanis *Wasserpungen/ Bachpungen/ oder Pungen* appellatur. Sion autē nomen sibi adsciuit à concussu, quod Græci *σέσημ* dicunt; nam excutiendi uim nactum est, utpote quod à renibus calculos pellat, urinā & menses ducat. Anagallis aquatica, quod flores eius Anagallidis fœminæ floribus per omnia respondeant. Lauer nomen *Lauer.* haud dubiè à lauando cōtraxit, quod sonantibus aquis enatū semper elui gaudeat.



Sion unde dicitur.

Anagallis aquatica.

Lauer.

FORMA.

Puillus est frutex, rectus, pinguis, folijs latis, Olusatro similibus, minora tamen; & odorata. Quæ deliniatio prorsus astipulatur huic herbæ quam Germani *Wasserpungen* nominant. Hæc enim riuulis gaudet, frutex puillus pinguisq; est, latis folijs, Hippofelino similibus, & digitis leniter friata iucundū expirantibus odorē. Floribus cœruleis, Anagallida fœminam referentibus.

LOCVS.

Inuenitur in aquis citato lapsu repentibus, aut etiam resedibus. Sæpe uerò intumescens demersum uidetur.

D

TEMPVS.

Iunio mense floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Quum amara admodū sit hæc herba, ut calefaciat & exiccet necesse est. Atq; hinc iterum colligere licebit, ut patebit ex uerbis Aëtij, eam esse Sium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sij folia cocta crudaq; comesta calculos cōminuunt & excernūt. Vrinās mouent. Fœtus & menses educunt. Dysentericis utiliter comeduntur.

EX GALENO.

Sium quantum gustu odoratū est, tantum etiam calefacientis facultatis est particeps. Digerit autem & urinā mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

EX AETIO.

Sium quatenus gustu odoratū est, eatenus calefacit, & exiccat. Discutiendi etiā uires habet, urinā mouendi, calculos in renibus dissoluendi, ac menses ciendi.

EX PLINIO.

Prodest urinis, renibus, lienibus, mulierumq; mensibus, siue ipsum in cibo sumptum, siue ius decocti, siue semē è uino drachmis duabus. Calculos rumpit, aquisq; quæ gignunt eos, resistit. Dysentericis prodest infusum. Item lentigini illitum, & mulierum uitijis in facie, noctu illitū momento cutem emendat, & ramices lenit, & scabiem equorum.

APPENDIX.

Veterinarij in hodiernū usq; diem hac herba in tumoribus discutiendis, & scabiæ equorum sananda utuntur, ut hinc manifestū fiat illam esse Sium.



SIVM

Wasserpungen.

PP 3

DE STRATIOTE MILLEFOLIA

CAP. CCLXXVII.

NOMINA.

Millefolium.

Stratiotes unde
dicitur.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ὁ χιλιόφυλλον Græcis, Stratiotes millefolia Latinis, officinis & herbarijs Millefolium, Germanis Garben/Schafgarben/Schafstipp/Tausendblatt/& Gerwel nominatur, Stratiotes uerò Græcis, id est, militaris dicta est, quod uulnera ferro facta sanet, atque adeo in militia & castris multus eius usus sit.

FORMA.

Frutex est exiguus, dodrantalis & maior. Folia habet pulli auium pennis similia. Suntq; foliorum exortus admodū breues, incisuris diuisi. Breuitate uerò & asperitate Cumino syluestri maximè assimilantur, & etiamnum breuiora. Huius denique umbella densior & plenior: surculos enim in cacumine paruos habet, in quibus Anethi modo umbellæ sunt, Flores illi candidi & exigui sunt.

LOCVS.

Nascitur in agris asperis, & præcipuè circa uias ac semitas.

TEMPVS.

Per integram floret æstatem.

TEMPERAMENTVM.

Nonnihil adstrictionis habet, atque adeo exiccat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eximie utilis est herba ipsa ad sanguinis eruptionē, & ad ulcera tætera ac recentia: item ad fistulas.

EX GALENO.

D Vulnera glutinare potest, & ulcerib, utilis est. Sunt qui ea ad sanguinis eruptiones utantur, & ad fistulas.


EX PLINIO.

Hetruria Millefolium appellat herbam in pratis tenuem, à lateribus capillamenti modo foliosam, eximij usus ad uulnera. Boum neruos abscissos uomere, solidari ea, rursusq; iungi addita axungia affirmant.

APPENDIX.


Recentiores ad eisdem usus Millefolium suum adhibent, ad sananda nimirum omnis generis uulnera, dissoluendum sanguinem concretū, & ad constringendos menses. Vnde à Stratiote millefolia non esse diuersum omnibus perspicuū fit.

DE SARRA-



STRATIOTES
MILLEFOLIA.

Garben.



SOLIDAGO
SARRACENICA.

Heidnisch Wundkraut.

NOMINA.



VVM nobis non constet quo nomine ueteribus nominata sit herba hec, placuit usitatā ac tritam nostri temporis herbarijs appellationē usurpare, donec uerorem comperire contingat. Non tamen latet à nonnullis corrupta uoce Cartafilaginē, uel magis deprauata Filaginem nominari, cum dicendum esset Ceratophylacē, quia nimirum partem oculorū ceratoīda, hoc est, corneam, defendat, salutiq; percussam ac læsam restituat. Cur uerò hoc nomine non appellandā censeam, facit in primis quod descriptio Ceratophylacis illi non conueniat. Dein quod pictura eiusdē in manuscripto herbario illi herbe quam Fortem uocant, prorsus non respondeat. Herbam itaq; Fortem, uel ut alij habent Sortis, nominamus eam quæ Germanis heydnisch Wunderkraut uocant, quod fortē à Sarracenis reperta putetur. Hinc, ni fallor, à quibusdā Consolida Sarracenicā dicitur, Fortis uerò à uehementi odore.

Herba Fortis nō est Cartafilago, seu ut rectius dicam, Ceratophyllax.

FORMA.

Caulem rubescentē, duūm triūmue cubitorum ac cauum habēt, è quo prodeunt folia oblonga, in extremitatibus serræ modo incisa, Saliciq; similia. Flores luteos in pappos euanescentes. Radicē multifidam, forisq; rubentem.

LOCVS.

Nascitur in syluis & in montibus altis. Copiose autem in monte post arcem Turingensem, quem germanico nomine die ðden burg uocant, prouenit.

TEMPVS.

Augusto mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit, modicēq; amara est, atque adeo siccare euidentissimū est.

VIRESEXRECENTIORIBVS.

Vulneraria herba est, id quod germanica appellatio abundē satis monstrat. Imposita itaq; uulneribus carnem primum generat, dein statim glutinat. Sicca in puluerem trita recentia uulnera, si inspergatur, celeriter sanat. Fistulis etiā medetur, malignaq; ulcera mundificat, ac confestim sanat.

DE SAXIFRAGA▶ CAP▶ CCLXXIX▶

NOMINA.



ΑΡΞΙΦΡΑΓΟΝ, ἢ σαφξίφαγον, ἢ ἔμπετρον Græcis, Saxifragon & Saxifraga Latinis. Officinis quibusdam perperam Capillus Veneris dicitur, ut in Adianto docuimus. Rectius muraria ruta uocaretur. Sunt qui Saluiā uitam hodie nominent. Germanis Maurrauten & Steinnrauten appellant. Saxifragon, quod calculos è corpore pellat frangatq;. Empetron uerò, quoniam in faxis proueniat. Officinę hodie alias præter hanc latinorū Saxifragas ostendunt, de quibus suo dicemus loco.

Officinarū error

Saxifragon cuius dictum. Empetron.

FORMA.

Surculofus frutex faxis hærens, iuncis tenuibus, Epithymi non dissimilibus, nigris, breuibus, folijs Trichomanis, maioribus, interius leuibus, auersa uerò parte annexa puncta habentibus, sine flore, sine semine, radice nigra, superuacua.

LOCVS.

In faxis & asperis locis prouenit. Ideo eius magna copia inuenitur apud uetusta ædificia, in lapidum cōmissuris,

TEMPVS.



SAXIFRAGA

Maunrauten.

TEMPVS.

Vere & æstate inuenitur, potissimum autem Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Satis ex facultatibus eius gustuq̃, in quo manifesta quædam adstrictio apparet, colligitur hanc herbam calidam & siccam esse.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

In uino cocta & pota, febricitantibus opitulatur, stranguriæ & singultui medetur, Lapides uesicæ frangit, & urinam mouet.

EX PAVLO.

Saxifraga urinam ciet, & calculos conterit.

DE SILIQVASTRO CAP. CCLXXX.

NOMINA.



SILIQVASTRVM conuenientissimo nomine à Plinio lib. xx. cap. xvij. dicta est herba hæc, à siliquis nimirum magnis & oblongis quas producit. Eadem etiam ab eodem Piperitis, quod semen eius gustatum piperis saporem & acrimoniam præ se ferat, nominatur. Alia tamen est ab ea quam uulgò Piperitum appellant, ut supra etiam monuimus. Sunt qui piper Hispanum, alij piper Indianum, nonnulli etiam piper ex Chalechut uocant. Auicenna uero datur appellare Zinziber caninum. Germanicè dici potest Chalechutischer oder Indianischer Pfeffer.

Siliquastrum.

Piperitis.

Piper Indianum.

Zingiber caninum.

GENERA.

Maius & minus est Siliquastrum. Maius siliquas producit maiores, & colore subnigras, aut fuscas. Minus contra minores profert, & colore puniceas. Nos tamen utrunq̃ genus una pictura complexi sumus, utq̃ hiantes duæ pingerentur siliquæ curauimus, non sanè quod sponte sua sic rumpantur, sed ut quale intus esset semen cerneretur. Præter hæc, genera alia sunt bina, quorum unum longissimas & colore puniceas, alterum uerò latiores multoq̃ breuiores producit siliquas. Damus itaq̃ quatuor Siliquastrum distincta genera, ut ex pictura manifestissimè deprehendit. Horum primum discriminis gratia maius, alterum minus, tertium longum, quartum latum appellauimus Siliquastrum.

FORMA.

Herba est caule rubro & longo, crebris geniculis, folijs Lauri, floribus candidis, semine in siliquis oblongis & magnis albo, uel potius flauescente, tenui, gustu Piperis acerrimo. Radice unica, subalba, capillamentis fibrata. Ex qua nimirum deliniatione satis constat herbam cuius picturam damus esse Plinij Siliquastrum seu Piperitum. Caule siquidem, ut ex Castore collegit Plinius, rubro & longo, densis etiam geniculis, unde folia Lauri folijs similia erumpunt, semine albo, tenui admodum, gustu piperis. Quibus omnibus etiã Siliquastrum & Piperitidis nomenclaturæ, quæ huic optimè quadrant, accedunt.

LOCVS.

In Germania iam in fictilibus ac testaceis satum passim ferè prouenit. Perpaucis autè annis Germanis incognitum fuit.

TEMPVS.

Æstate quidem floret, atque mox decedente flore siliquæ primum herbaceæ, dein puniceæ aut fusci coloris subnascuntur, plenæ semine.


TEMPERAMENTVM.

Valenter excalfacit atque desiccet, id quod seminis immensa acrimonia, & foliorum amaritudo euidentissimè monstrat; ut certè non temerè pleriq̃ hoc semine loco ueri



SILIQVASTRUM
MAIVS ET MINVS.


Calechutischer Pfeffer.



SILIQVASTRUM
TERTIVM.

Langer Indianischer Pfeffer.

734



SILIQVASTRVM
QVARTVM.

Breyer Indianisch
Pfeffer.

A co ueri Piperis utantur; eadē enim facultates haud dubiè habet, quas etiā ex Dioscoride sumptas subiiciemus.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Piper cōmuniter calefaciendi facultatē habet, urinā mouendi, cōcoquendi, extrahendi, discutiendi, & quæ pupillas oculorū obtenebrant exterendi. Prodest rigoribus circuitu certo inuadentibus potū & inunctū. Venenatorū moribus succurrit. Fetus ex utero ducit. Tussi & omnibus thoracis affectibus, in eclegmate & potu sumptum auxiliat. Cum melle inunctū angina correptos iuuat. Tormina cum teneris Lauri folijs potū soluit. Pituitā ex capite purgat cum Staphysagria cōmanducatū. Dolores leuat, ualetudinemq̃ tuetur. Appetentiā mouet. Concoctionē adiuuat ad intinctus additū. Strumas cum pice exceptū discutit. Cum nitro alphas abstergit.

EX PLINIO.

Siliquastrū utile gingiuis, dentibus, oris suauitati, & ructibus.

APPENDIX.

Auicenna Zinziber caninum abstergere cutis & faciei maculas, lentesq̃ tradit. Item strumas aliosq̃ tumores, eius semen digerere scribit, ut hinc etiā eadē cum uero Pipere habere facultates colligere liceat.

DE SCORODO CAP. CCLXXXI

NOMINA.



ΚΟΡΟΔΟΝ græcè, Allium latinè appellatur. Officinæ latinum nomen retinuerunt. Germanicè Knobloch/oder Knobloch. Scorodon autē dicit, ut nōnullis placet, quasi *σκαδὸν γόδου*, id est, rudis Rosa, quod asperè supra modum redolet, & olfacientiū nares offendat. Latini Allium à Græco fortassis uerbo *ἀλλεδα*, id est, exilire, uocāt, quod nimirū exiliendo crescat.

GENERA.

Tria in uniuersum Allij sunt genera. Vnum hortense & satiuū domesticū uel, quod Germani *garten oder heymisch Knobloch* uocant. Alterū syluestre, quod Græci *ἰσθηρόγόδου*, id est, anguinū Allium nominant, in aruis ac campestribus spon- te nascens. Cuius nos duo genera damus, quorum primū Germanis *wilder Knobloch* dicitur, alterum uerò *feldknobloch*. Tertium itidem syluestre, urfinum cognominant, in syluis proueniens, Germanis *Waldknobloch* appellatur.

FORMA.

Allium hortense fronde uiret cępitia, caule tereti & inani. In cacumine flores globum circumaguntur, in quo semē emicat. Radicis bulbus tenuis, uelatur membranis, mox pluribus coagmentatur nucleis, & ihs separatim uestitis, in cuius uertice complures fibræ cirrorum exemplo crispantur, tedioso habitu, & aspero sapore. Syluestre folijs constat prælongis, teretibus, intus concavis, iunceā speciem representantibus, caule procero, leni, purpureos flores ostentante, cacumine tum colore tum forma conspicuo, radice bulbosa & capitata, nucleis spicatum cōpacilibus intumescente, summo uertice capillamentis fibrato. Vrsinū odore molli, folijs grandibus, & Ephemeris non letalis folijs similibus, floribus in summo candidis, capite prætenui.

LOCVS.

Hortense passim in hortis satum & plantatū prouenit. Syluestre sponte in aruis, ut diximus, & campestribus nascitur. Vrsinū autem in nemoribus.

TEMPVS.


Hortense & syluestre æstate florent. Vrsinū autē uere, Aprilis & Maio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Allia desiccant & calfaciunt quarto excessu.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Facultas Allio est acris, calfacit, flatu excernit, aluum turbat, stomachū exiccat.




ALLIVM
HORTENSE.

Gartenknoblauch.



ALLIVM SYLVE
STRE PRIMVM.


Wilder Knoblauch.



ALLIVM SYLVE
STRE ALTERVM.

Feldknoblouch.

739



ALLIVM VR-
SINVM.

Waldknobloch.

4 pp

C Sitim efficit. Inflationes permutat alteratue, & summam corporis cutem exulcerat. Eadem potest Anguinum allium. Comestū latos uentris lumbricos expellit. Urinas ducit. Contra uiperarū morsus & hæmorrhoidū prodest, ita ut non aliud magis, si uinum iugiter fumatur, aut in eodem tritum bibatur. Contra rabioforū morsus utiliter illinitur. Allium ipsum in cibo sumptum contra aquarū mutationes confert. Asperas arterias clarificat. Veterem tulsim crudum & coctum comestū lenit. Cum Origani decocto potum, pediculos & lendes enecat. Vstum & cū melle subactum illitumq̄, hypopya & alopecias sanat. Exanthemata cum nardino unguento, sale & oleo curat. Alphos, impetigines, lentigines, achoras, lepras, furfuresq̄ eximit. Cum teda & thure decoctum, si in ore contineatur, dentium dolorem leuat. Contra muris aranei morsus cum ficulneis folijs, & Cumino illinitur. Comæ decoctum in infesionibus mensēs & secundas trahit. Eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Græci *μυρωτόν* uocant, urinā cit, & obstructions aperit, Vtile etiam hydropicis.

EX GALENO.

Excalefacit corpus, crassos in eo humores extenuat, glutinososq̄ incidit. Bis tamen aut ter in aqua decoctū, acrimonia spoliatur: quanquā nec sic quidem uim perdit extenuandi, uerum facultatē quandam obscurissimā alendi corporis acquirit, cuius antea quā coqueretur, nihil prorsus obtinebat. Cæterū Allium non modo ut obsoniū, uerum etiam ut medicamentū sanitati accomodum, quod obstructa soluere & discutere possit, usurpatur. Est autem Allium ex eorum ciborū genere, qui & flatum discutiant, & minimè sitim inferant. Ophioscorodon domestico, uel reliqua omnia syluestria, ualentius est.

EX AETIO.

D Allium comestū flatu discutit, sitim reprimit, crassos & lentos humores incidit. Habet tamen quidpiā uirosum, & mali succi, quod amittit si aqua elixetur. Ab eius assiduo usu præsertim calidas temperaturas cauere oportet.

EX PLINIO.

Allio magna uis, magnæ etiam utilitates contra aquarū & quorumlibet locorū mutationes. Serpentes abigit & scorpiones odore: atq̄, ut aliqui tradidere, bestiarum omnium ictibus medet, potu uel cibo, uel illitu. Priuatim contra hæmorrhoidas prodest, cum uino redditū uomitu. Ac ne contra araneorū murum uenenatū morsum ualere miremur, aconitū, quod alio nomine pardalianches uocatur, depellit: item Hyoscyamū: contra canū morsus, inq̄ uulnera cum melle imponitur. Ad serpentū quidem ictus potū cum restibus suis, efficacissimè ex oleo illinitur. Attritisq̄ corporū partibus, uel si uestica intumuerit. Quin & suffitu eo, secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorū cum oleo, capitis ulcera manantia sanitati restituens. Suspiriosis coctum, aliqui crudum id dedere. Diocles hydropicis cum Centaurea, aut in fico duplici ad euacuandā aluum: quod efficacius præstat uiride, cum Coriandro in mero potum. Suspiriosis aliqui & tritū in lacte dederunt. Praxagoras & contra morbū regiū uino miscuit: & contra ileum in oleo & pulte, sicillinens. Strumis quoque. Antiqui & infanientibus dabant crudum. Diocles phreneticis elixum. Contra anginas tritum imponi & gargarizare prodest. Dentū dolorem tribus capitibus in aceto tritis imminuit: uel, si decocta aqua colluantur, addaturq̄ ipsum in caua dentū. Auribus etiam instillatus succus cum adipe anserino. Phthiriasēs & pruriginēs potum, tulum item in aceto & nitro. Cōpescit & destillationes cum lacte coctū, uel tritum permixtū me caseo molli: quo genere & raucitatem extenuat: uel phthisin, in fabæ sorbitione. In totum autē coctum utilius est crudo, elixumq̄ tosto, sic & uoci plus confert. Tineas & reliqua animalia interaneorū pellit, in aceto mulso coctū. Tenasmo in pulte medetur. Temporū doloribus illitum, elixum, & pustulis coctum cum melle, deinde tritum. Tulsī cum adipe uetusto deco-

fito decoctū, uel cum lacte. Aut si sanguis etiā excreetur, uel purulenta sint. Et pituita sub pruna coctum, potum, & cum mellis pari modo sumptū. Cōuulsis & ruptis cum sale & oleo. Nam cū adipe tumores suspectos sanat. Extrahit fistulis uitia cum sulphure & resina, etiam harundines cum pice. Lepras, lichenas, lentigines exulcerat, sanatq; cum origano, uel cinis eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sugillata aut liuentia ad colorē reducit, cōbustum ex melle. Credunt & comitialē morbum sanare, si quis in eo cibo utatur aut potione. Quartanas quoq; excutere potū caput unum cum Laserpitiū obolo. In uino austero tussim, & alio modo acceptum. Suppurationes quantaslibet sanat, fracta incoctū faba, atq; ita in cibo sumptum, donec sanitatē restituat. Facit & somnos, atq; in totum rubicundiora corpora. Venerem quoq; stimulat cum Coriandro uiridi tritum, potumq; ē mero. Cæterū contra pituitam & gallinæ & gallinaceis prodest. Mixtum farre in cibo, iumentis urinam reddere, atq; non torqueri iradunt, si eo trito natura tangatur.

EX SYMEONE SETHI.

Cōmodissimū est crassum & tenacē, aut crudum humorē aggregantibus: eum enim incēdit, & obstructiones ab eo factas tollit. Habet uerò quippiam mali succi, quod decoctū aqua abijcit. In frigidis temperaturis sæpe sanitatē præseruat. Temperatura uerò calidos, lædit, & maximè oculos, caput, pulmonem, & renes eorum. Proprietate autem quadā sitim à falso humore factam sedat, & lumbricos eijcit, & flatus discutit. Etsi uerò sanum uisum offendat, nihilominus tamen eius hebetudinem propter humiditatē ortam sanat. Semen in calidis corporibus exiccat. In frigidis uerò & humidis corporibus idem calefacit, Veneremq; excitat. Est etiam remedium contra uenena, & morsus uenenatorū, perinde atq; theriaca: unde & Galeanus hoc theriacam rusticorum uocat. Hoc ipsū fugiunt serpentes, tanquam Rutam. Quapropter Persæ coquinas ipsorum Allijs replent. Non solum autem flatus discutit, sed etiam horum generationē prohibet. Colicos affectus à flatibus ortos, & diurnos coxendicū qui à pituita proueniunt dolores, iuuat. Alimentū & sanguinē extenuat, & faciem rubificat, asperamq; arteriam purgat. Si uerò assetur, & corrosis dentibus aut propter humiditatē dolentibus imponatur, prodest. Non solum uerò sumptum ad uenenatorū morsus confert, sed etiam postquā tritum est, superpositum. Lædit prægnantes & lactentes, mensesq; ducit.

DE SANCTI IACOBI FLORE

CAP. CCLXXXII.

NOMINA.



VM herba hæc ueteribus Græcis & Latinis cognita fuerit, nondum cetero affirmare aut inficiari audeo. Vulgus tamen herbariorū sancti Iacobi florem aut herbam nominat. Officinis incognita est. Germani S. Jacobs blüm appellat.

FORMA.

Herba est fruticosa, cauliculo rubente, multifariā striato, folijs exiguis, Erucae instar confectis, floribus luteis, forma Chamemeli floribus haud dissimilibus, radice adnascantias multas habente.

Locus.

Nascitur in agrorū marginibus, & aquarum ripis, locisq; arenosis.

TEMPVS.


Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Amara est & adstringit, ideoq; calidam & siccam esse constat.

VIRES.

742



S. IACOBI
HERBA.

S. Jacobs blum.

A

VIRE S.

Recentiorū medicorum experientia cognitū est, herbam hanc uulneribus mirificè mederi, & ad interanea prodesse. Fistulas quoque ijdem curare, & ne ultrà ser- pant prohibere, impositam tradunt. Quæ sanè omnes facultates pulchrè eius tem- peramento respondere uidentur.

DE SELINO HORTENSI

CAP. CCLXXXIII.

NOMINA.



SELINON *λεπιδιον* Græcis, Apium hortense aut fatium Latinis uocatur. *Apium hortense*
 Officinæ latinum retinuerunt nomen. Germanis *Epffich* / oder *Ep-*
pich nominatur. Selinon autem Græci uocant, quasi *ἑλός σέλινον*, hoc *Selinon quare*
 est, paludibus impulsū : paludosis enim gaudet, & in ijs enatum læ- *dictum.*
 tius exurgit.

FORMA.

Apium hortense sæpe cubitalem æquat altitudinē: caule rotundo, tenuiter stria- to, multisq; ramulis brachiato: folijs tripartitò dissectis, & leniter crispis, in extremi- tatibus laciniatis: flosculis candidis, & quibus minores haud temerè reperias: semi- ne exiguo: radice singulari, longa, capillata. Hæc itaq; herba, cuius picturā damus, est uerum Apium, quod illi omnes respondeant notæ, adeò ut temerè nonnulli pu- tent esse uulgare nostrum Petroselinum.

LOCVS.

In hortis satum prouenit: amat autem loca potissimū aquosa. Hinc est quod sua
 B sponte nō procul à Canstadio Ducatus Wuirtembergensis oppido in paludosis pro- ueniat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret ac semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, & siccum in medio tertij.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.


Ad oculorū inflammationes cum pane aut tenui polenta illitū prodest. Astum stomachi mulcet. Mammæ grumis induratas dissicit. Crudū aut coctum comestū urinā mouet. Decoctum eius radicūq; potum, letiferis medicamētis aduersatur, uomitū ciens. Aluum cohibet. Semen efficacius urinam cit. Succurrit & ferarū mor- sibus, & ijs qui lithargyrū hauserunt. Inflationes discutit. Miscetur etiam utiliter medicamentis dolorem leuantibus, theriacis, & tussī medentibus.

EX GALENO.

Apium usque adeo calidū est, ut & urinas & menses cieat. Flatus quoq; discutit, & magis semen quàm herba ipsa. Ori, stomachoq; gratissimum.

EX PLINIO.

Rami Apij largis portionibus per iura innatant, & in cōdimentis peculiarē gratiā habent. Oculis illitū cum melle, ita ut subinde foueant feruenti succo decocti, alijsq; membrorū. Epiphoris per se tritum, aut cum pane, aut polenta impositū, mirè au- xiliatur. Pisces quoq; si ægrotent in piscinis, apio uiridi recreantur. Verū apud eru- ditos non aliud erutum terra in maiore sententiarū autoritate est. Ad cibos non est admittendū, imò omnino nefas: nam id defunctorū epulis feralibus dicatū existi- mant. Ipsi quoq; uisus claritati inimicū. Eos qui ederint sterilescere mares scemi- nasq; tradunt. In puerperijs uerò ab eo cibo comitiales qui ubera hauriunt. Inno- centiorē tamen esse marem. Ea q; causa est, ne inter nefastos frutices damne. Mam- marum duritiā impositis folijs emollit. Suauiores aquas potui incoctū præstat. Suc- co maximè radice cum uino lumborū dolores mitigat. Eodem iure instillato gra- uitatem



APIVM
Epfich.

A uitatem aurium. Semine urinā ciet, menstrua ac secundos partus. Et si foueantur semine decocto fugillata reddit color, cum oui albo illitum. Aut ex aqua coctum potumq̄ renibus medetur. In frigida tritum oris ulceribus. Semen cum uino, uel radix cum ueteri uino uesicæ calculos frangit. Semen datur ex tribus cyathis ex uino albo.

EX SYMEONE SETHI.

Vrinam cit, obstructions tollit, non inflat, magis uerò flatus discutit, & menses ducit. Difficiliter autem concoquitur, atq̄ ob eam causam oportet ipsum in medio ciborū sumi. Paululum quid uentrem sistit. Proprietate uerò quadam comitiales lædit, & oportet hos omnino abstinere. Sæpe enim quidam qui ferè ex hoc morbo conualuere, parati autem eum incidere, ex eius usu iterum comitiales facti sunt. Offendit etiam testes. Semen autem quàm folia ualidius & efficacius, & eo radix. Prodest ad singultus à crasis excrementis profectos. Abstergit renes & uesicā. Obstructions in uenis & arterijs factas aperit. Semen præsumptū, ebrietatem arcet. Conferet etiam ad bonum * corporis odorem, multiq̄ crebriore huius usu grauem * cor-
 * al. oris
 * oris

poris odorem abegerunt. Mulieres ad rem ueneream promptiores facit. Si in huius decocto calculosi desidant, calculos, ut ferunt, eijcit, & difficultatē urinæ sanat, & renes curat. Lactantes mulieres oportet ab eius usu abstinere; minuit enim lac.

S ▶ B A R B A R A E H E R B A ▶

CAP. CCLXXXIIII.

NOMINA.



EQVE huius herbæ aliud nomen, quàm quo uulgò appellatur, afferre potuimus. Superstitione enim quadam ducti prioris temporis herbarij, diuæ Barbaræ herbam nominarunt. Nec nos aliud nomen utcun-
 que inuestigantes ex herbariæ rei peritis extorquere potuimus. Germanis S. Barbara erant uocatur.

S. Barbara herba cur dicta.

FORMA.

Caulem habet rotundū, solidum, striatum, folia Erucae modo laciniata, flores luteos, siliquas teretes, semine refertos, radicem ex obliquo prodeuntē, & oblongam.

LOCVS.

Pasim in campestribus nascitur.

TEMPVS.

Maiō & Iunio mensibus floret, ac subinde in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Gustanti primum subacris esse, dein parum etiam adstringere uidetur, ut calidā & siccam esse nemo dubitare debeat.


VIRES.

Vulnerariam herbam esse & temperamentū eius & experientia docet. His uerò potissimū ulceribus medetur quæ impura sunt, & in quibus caro supercrescens fuerit; nam quia ualenter siccatur, ideo sordes extergere, & carnes minuere potest.



S. BARBARAE
HERBA.

S. Barbara kraut.



SAXIFRAGA MA
IOR SEV ALBA.

Hoher Steinbrech.

DE SAXIFRAGA MAIORE

CAP. CCLXXXV.

NOMINA.



Nueteribus Græcis & Latinis herba hæc cognita fuerit, nondum mihi constare ingenuè fateor. Vulgus herbariorū & officinæ Saxifragā maiorem, & albam, quod scilicet mirificam in cōminuendis frangendisq; calculis uim, ac flores albos habeat, hodie uocant. Germani *hohen Steimbrech*/uel *weissen Steimbrech* appellant.

FORMA.

Caulem habet lanuginosum, subrubicundū, folia exigua, rotunda, in extremitibus incisa, flores candidos, radicem exilem, cui granula Coriandri feminis quantitatem referentia adhærent, partim alba, partim rubea, quibus officinæ pro semine eius utuntur.

LOCVS.

In pratis & montibus, potissimum siccis, prouenit.

TEMPVS.

Maior mense floret, dein statim euanescit.

TEMPERAMENTVM.

Quum flores, folia & radix gustanti amara sint, calidam & siccam in ordine tertio esse uerisimile existit.

VIRES.

Vrinā mouet, calculos frangit & conterit. Stranguriæ itaque confert: abstergit enim expurgatq; & quæ in uenis est crassitiem, sicut omnia alia quæ amara sunt, incidit. Menfes quoque cit, crassaq; ac glutinosa ex thorace educit.

D

DE SAXIFRAGA LVTEA

CAP. CCLXXXVI.

NOMINA.



NOMEN hoc in præsentia fingere adlubuit, cum scilicet aliud quo herbam hanc appellarem non occurreret, ut hac ratione à priori discerni posset. Saxifragā autem uocare placuit, quod nimirū calculos frangat. Ad quod sanè nomē alludentes Germani *Steinblee* nominant, quod idem ualeat, ac si *Trifolium* frangens lapidem dicerent. Alio nomine *gulden oder geelen blee* & quod sententiam nostram confirmat, *Steimbrech*/à cōminuendo lapide appellant. Luteā uerò diximus à luteis floribus, uolentes eam ab alba discriminare Saxifraga. Commodissimè itaq; germanicè *geeler Steimbrech* uocabitur. Perperam ea officinæ nonnullæ pro *Meliloto* usurpant, ut suo etiam loco indicauimus.

Saxifraga cur
dicta.

Officinarum
error.

FORMA.

Caulem cubiti ferè altitudine obtinet, folia scenogræco similia, in quouis pediculo tria: floribus pisi, multo tamen minoribus, luteis, odoratis, deorsum nutantibus, semine per ramulos diffuso rotundo, radice subcandida.

LOCVS.

Parsim in aruis & segetibus prouenit.

TEMPVS.

Floret tota æstate, potissimū autem Iulio mense, in quo semen etiam producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse gustus abundè docet: amara enim & subacris existit.

VIRES.

Abstergit, expurgat, & quæ in uenis est crassitiē incidit, atque adeo obstructions iecinoris




SAXIFRAGA
LYTEA.

Grosser Steinklee.

Ciccinoris & lienis tollit. Vrinā mouet, menses cit, lapidem frangit, & quā in thora-
ce sunt glutinosa extenuat & educit. Rectē itaq; recentiores in obstructionibus re-
num & uescicæ, earundemq; partiū calculis hac herba utendum esse docent. Succus
etiam eius herbæ ac florum eiusdem ad caliginē oculorum instillatus confert.

DE SISARO CAP. CCLXXXVII

NOMINA.

Sifer.  *SISARON* Græcis, *Sifer* Latinis, uulgo *Pastinaca*, quod ei congener sit,
appellatur. Sunt qui extritis priorib. literis diminutrice forma *Serullū*,
Serullum pro Siferculo. aut *Seruillam*, aut *Cheruillā*, pro *Siferculo* nomenclant. Germani ad cor-
ruptam hanc appellationē respicientes, *Gerlin* & *Geirlin* uocant.

GENERA.

Duo sunt *Sifari*, *Plinio* lib. xx. cap. v. autore, genera. Vnum *fatiuū*, quod iterum
duūm est generum: unum enim magnum dicitur, Germanis *groß zam Wozen*.
Alterū uerò minus, quod hōdem priuatim *Geirlin* / *weiß Wozelen* / *Klein zam Wo-*
ren / uel *Wozhelen* nominant. Alterum *erraticum*, quod *wild Wozen* appellant.
Baucias. *Officinis* nonnullis *Baucias* dicitur.

FORMA.

Sifaron fatiuum. *Sifaron fatiuū* caulem habet angulosum, folia oblonga, & in extremitatibus in-
cisa, flores magnū luteos, minus uerò candidos, semen latum & foliaceū, radices in-
Erraticum. tus candidas, iucundi gustus, esuiq; gratissimas. *Erraticū* caule est bicubitali, folijs
Pimpinellæ, sed maioribus, flore luteo & umbella *Anethi*, semine lato & rotundo,
ut *fatiuum*, radice tenui ac longa.

D

LOCVS.

Copiose in *Germania* nostra prouenit: gaudet enim frigidis locis. *Satiuum* qui-
dem in hortis, *erraticū* uerò passim in incultis, uberius autem in apricis pratis.

TEMPVS.

Vtruncq; æstate floret, atque subinde semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Sifaron *Paulus* in tertio ordine, *Galenus* autem rectius in secundo calidum esse
statuit. *Satiuum* autem siccum quidem simul in primo ordine, quandoquidē *Vene-*
rem stimulat: *erraticum* uerò, quoniam adiectam habet amaritudinē quandā cum
leuicula adstrictione, siccus existit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Suaui orielixa *Sifari* radix, stomacho utilis, urinā cit, & appetentiā excitat.

EX GALENO.


Sifari radix cocta, stomacho grata est, & urinam mouet.

EX PAVLO.

Sifari radix cocta, stomacho utilis est, & urinæ ciendæ. Semen tenue est & dis-
cussorium, ualidumq;: idcirco hys quos singultus & tormina male habent, cum ui-
no exhibetur.

EX PLINIO.

Sifer *erraticum* *fatiuo* simile est & effectu. Stomachū excitat, fastidium discutit.
Ex aceto laerpitiato sumptum, aut ex pipere & mulso, uel ex garo, urinam cit, ut
Opcion credit, & *Venerem*. In eadem sententia est *Diocles*. Præterea cordi conue-
nire conualescentiū, aut post multas uomitiones perquam utile. *Heraclides* contra
argentum uiuum dedit, & *Veneri* subinde offensanti, ægrisq; se recolligenti,
bus, *Satiui* priuatim succus cum lacte caprino po-
tus, sistit aluum.



SISARVM SATIVVM
MAGNVM.

Großsam Wozen.



SISER
SATIVUM.

Serlein.



SISER SYL-
VESTRE.

Wild Stoen.

Ficus.



ΥΚΗ *ἡμῶν* Græcis, Ficus sativa Latinis & officinis, Germanis Feigen-
baum dicitur.

F O R M A.

Ficus sativa arbor est non magnopere procera, quanquã amplissimæ
quædam inueniantur, uel pyris emula magnitudine, caudice breui, cortice leui, me-
dulla carnosa, folio perquam magno umbrosoq̃, profundè admodũ laciniato, sine
flore, pomo quod supra folij pediculũ nascitur, tubinato, molli, intus granoso, suc-
co cum maturescit lacteo, postea melleo; radicibus multis, obliquis ac longis.

L O C V S.

Iam in plerisq̃ Germaniæ nostræ hortis plantatur, at in paucissimis fructus ma-
turos producit. Calidiora & aprica loca amat; arbor enim omnium ferè tenerrima &
delicatissima, gelicidia & glacies horret.

T E M P V S.

Germinat sub Arcturum post uer, aut paulò ante solstitium.

T E M P E R A M E N T V M.


Ficus arbor calidæ temperaturæ est, tenuiumq̃ partiũ, ceu indicant tum liquor
eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum uterq̃ calidus est. Ficus quoque
recentes & aridæ primo ordine completo calefaciunt, aut secundo incipientes; desic-
cant uerò in medio primi.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Fici mature, teneræ recentisue stomacho noxiæ. Aluum soluunt, sed facilè ab eis
contracta fluxio sistitur. Exanthemata & sudores prouocant. Sitim sedant, calorẽ
D restringunt. Siccæ nutriunt, calefaciunt, sitim magis afferunt, bonam faciunt al-
uum. Fluxionibus tamen stomachi & uentris inutiles; arteriæ uerò, uesicæ & reni-
bus utiles. Amicæ etiã ijs quos longa ualetudo decolorauit, asthmaticis, comitia-
li morbo laborantibus & hydropicis. Decoctæ cum Hyssopo & pota, quæ in tho-
race sunt purgant. Veteri tussi, & diuturnis pulmonis affectibus profunt. Aluum
moliunt, tusæ cum nitro & croco manducata. Decoctũ earum arteriæ & tonsilla-
rum inflammationibus gargarizatu confert. Cum hordeacea farina cataplasmati
miscetur, & in muliebria fomenta cum scenogræco, aut ptisana. Cum Ruta deco-
ctæ, in torminibus infundunt. Coctæ, trita illitæq̃, duritias discutunt, parotidas
ac furunculos emolliunt. Panos maturant, maximè iride, nitro, aut calce addita.
Crudæ cum antedictis tusæ, eadem efficiunt. Cum malicorio, pterygia purgant.
Cum atramento sutorio difficiles curatu & maleficas tibiæ fluxiones sanant.
Quin cum uino decoctæ, addito absinthio & hordeacea farina, hydropicis illitæ au-
xiliantur. Crematæ & cerato cõmixtæ, perniones sanant. Crudæ & trita sinapi hu-
mido exceptæ, ac auribus impositæ, sonitus & pruriges curant. Succus tam sylue
stris quàm satiuę Fici, coaguli modo lac coagulat, concretumq̃ ut acetum dissoluit.
Exulcerat corpora, ac uenarum ora aperit. Soluit aluum. Vterum laxat, cum Amy-
gdala trita potus. Menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut tyrrhenica cera. Po-
dagricorũ cataplasmatis cum farina scenigræci & aceto utilis. Lepras, lichenas, dis-
colorem à sole cutem, alphos, scabies, achoras, cum polenta expurgat. Instillatum
plagæ percussis à scorpionibus, uenenatorũ ictibus, & rabiosi canis moribus au-
xiliatur. Dentium doloribus lana exceptus prodest, & cauis eorum inditus. Myr-
meciam tollit cum adipe circumlita in ambitu carne.

E X G A L E N O.

Fici arboris liquor, & succus foliorũ eius non mordicat tantũ, aut abstergit uehe-
menter, sed & ulcerat, & ora uasorũ referat, & myrmecias eijcit. Verum & purgare
potest.



FICUS SA-
TIVA.
Feigenbaum.

C potest, Ficus aridæ tumores duros concoquunt, eosq̄ statim discutunt. Atq̄ ipsæ per se illitæ eiusmodi uim obtinent. Sed & decoctū earum eiusdem utiq̄ nature est. Verum ubi magis cōcoquere consiliū est, miscenda est farina triticea: ubi uerò plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio est. In præsentiarū hæc de caricis nouisse sufficiat. Scire uerò oportet, quod quæ pinguiores sunt, magis possunt concoquere: quæ uerò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Cæterū quod ex ijs plurimū in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed & facultate. Porro Ficus uirides comelæ propter admistam humiditatē facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen aluum utraq̄ tum humidæ tum siccæ. Præterea Ficus cōmeabiles sunt, & facile in totum corpus peruadunt, penetrantq̄. Nam & abstergendi ui pollent haud obscura: cuius gratia cōmansæ, è calculosis renibus arenularū uim propellunt. Caricę licet multiplici utilitate cōmendentur, si quis tamen crebrò largiterq̄ estauerit, sentiet non esse innoxias. Non admodū enim probum sanguinē gignunt, quapropter pediculorū quoq̄ agmen eas comitatur. Incidendi extenuandiq̄ uim habent, quo nomine aluum stimulant ad excretionē, renesq̄ expurgant. Iecori autem lieniq̄ inflammatione obfessis efficiunt, uelut Ficus quoq̄, cōmuni ratione omnium dulcium epularū, non peculiari quadam eximia facultate. Obstructis autē illis, aut scirrhotentatis, ipsæ ex sese proprijs uiribus nihil profunt, nec obsunt: sed incidentibus, extenuantibus, & abstergentibus iunctæ, non medio critere auxiliantur: ideoq̄ medici nonnulli in dictis lienis iecorisq̄ affectibus eas longè ante cibum cum thymo, aut pipere, aut zingibere, aut pulegio, aut satureia, aut calamentha, aut origano, aut hyssopo dare soliti sunt. Ad eundē modum cum alio quouis acrem qualitatem, aut omnino incidendi extenuandiq̄ uim gerente caricas assumere, nō solum ita affectis, sed sanis quoq̄ ex usu fuerit. Siquidē iecoris meatus,

D per quos fertur alimentū, patentes apertosq̄ seruari non solis laborantibus, sed bene ualentibus etiam tutissimū est. Proinde hoc pacto Ficus extenuante sale, aceto garoq̄ conditas uulgo comedunt, experimento id utile esse cōpertum habentes.

EX PLINIO.


Fici succus lacteus, aceti naturā habet: itaq̄ coaguli modo lac contrahit. Excipitur ante maturitatē pomi, & in umbra siccat ad aperienda ulcera, cienda menstrua, appositus cum luteo oui, aut potus cum amylo. Podagris illinitur cum farina scæni-græci & aceto. Pilos quoq̄ detrahit, palpebrarumq̄ scabiē emendat. Item lichenas & pforas. Aluum soluit. Lactis ficulni natura aduersatur crabronū, uesparrumq̄, & similia uenenis, priuatim scorpionū. Idem cum axungia uerrucas tollit. Folia & quæ non maturuere Fici strumis illinuntur, omnibusq̄ quæ emollienda sunt discutendæ. Præstant hæc & per se folia. Et alij usus eorū, tanquam in fricando liene & alopecijs, & quæcunq̄ exulcerari opus sit, & aduersus canis morsus. Ramorū teneri cauliculi cuti imponunt. Idem cū melle ulceribus quæ ceria uocantur, illinuntur. Extrahunt infracta ossa cum Papaueris folijs syluestris. Canum rabiosorū morsus, folio trito ex aceto restringunt. E nigra Ficu candidi cauliculi illinuntur furunculis, muris aranei morsibus cum cera. Cinis earum è folijs, gangrænis, consumendisq̄ quæ excrescunt, Fici maturæ urinā ciunt, aluum soluunt, sudorē mouent, papulasq̄. Ob id autumno insalubres, quoniā sudantia huius cibi opera corpora refrigerant. Nec stomacho utiles, sed ad breue tempus. Nec uoci contrariæ intelliguntur. Nouissimæ salubriores quàm primæ. Medicatæ uerò nonnunquā iuuenum uires augent. Senibus meliorem ualeitudinē faciunt, minusq̄ rugarū. Sitim sedant, calorem refrigerant: ob id non negandæ in febribus constrictis, quas stegnas uocāt. Siccæ Fici stomachū lædunt, gutturi & faucibus magnificè utiles. Natura ijs exalfaciendi. Sitim afferunt. Aluū molliunt, rheumatismis eius & stomacho contrariæ. Vesicæ semper utiles, & anhelatoribus, ac suspiriosis. Item iecinorū, renum, lienum uitijs. Corpus & uires adiuuant, ob id antè athletæ hoc cibo pascebantur.

Pythago.

A Pythagoras exercitator, primus ad carnes eos transtulit. Recolligentibus se à longa uoletudine utilissimæ. Item comitialibus & hydropicis, omnibusq; quæ maturanda aut discutienda sunt, imponuntur. Efficacius calce aut nitro admixto. At coctæ cum hyssopo pectus purgant, pituitam, tussim ueterem. Cum uino autem ad fedem, & tumore maxillarum, & furunculos, panos, parotidas, decoctæ illinuntur. Viles & decocto earum fouere scæminas. Decoctæ quoq; eadem cum scenogræco utiles sunt pleuriticis & peripneumoniacis. Cum Ruta coctæ, torminibus profunt, Tibiarū ulceribus cum æris flore, Pterygijs cum punico mâlo. Ambustis, per nionibus cum cera. Hydropicis coctæ in uino, & cum absinthio & farina hordeacea, nitro addito, Aluum sistunt manducata. Scorpionū ictibus cum sale tritæ illinuntur. Carbunculos extrahunt in uino coctæ & impositæ. Carcinomati, si sine ulcere est, quam pinguisimâ Ficum imponi, penè singulare remediū est: item phagedænæ. Cinis non ex alia arbore aciem purgat acrior, conglutinat, replet, adstringit. Bibitur & ad discutiendū sanguinem concretū. Item percussis, præcipitatis, cõuulsis, ruptis, cyathis singulis aquæ & olei. Datur tetanicis & spasticis. Item potus uel infusus cœliacis, dysentericis. Et si quis eo cum oleo perungat, exalfacit. Item cum cera & rosaceo subactus, ambustis cicatricē tenuissimâ obducit. Lusciosos ex oleo illitus emendat, dentiumq; uitia, crebro fricatu. Produnt etiam, si quis inclinata arbore, supino ore aliquem nodum eius morfu abstulerit nullo uidente, atq; in aluta illigatum licio è collo suspenderit, strumas & parotidas discuti. Cortex tritus cum oleo, uentris ulcera sanat. Crudæ grossi uerrucas & thymos nitro farinaq; additis tollunt, spodijq; uicem exhibet fruticum à radice exeuntiū cinis. Bis tostus adiecto psimythio digeritur in pastillos, ad ulcera oculorum & scabritiam.

EX SYMEONE SETHI.

B Ficus admodū nutriunt, non tamen adstrictam & robustam carnem efficiunt, ut panis ac caro, sed laxam. Ventrem flatibus implent, nisi probè coquantur. Minus uerò quàm cætera opora sunt mali succi, & uentrem proritant, & faciliè exeunt. Effatu dignā extergendi facultatē obtinent: proinde arenosa multa si edantur nephreticis excernuntur. Maturæ Ficus nihil ferè obsunt, proximeq; ad caricas accedunt, quæ multa utilia habent. Malum hoc illis inest, quod sanguinem non admodū bonum gignunt, unde & pediculi procreantur. Oportet autem post usum Ficuum, alimentum quod extenuet, ingerere. Ad hæc Fici pulmonem & thoracem iuuant. Aiunt insuper cõtra uenena facultatē habere, si quis singulis diebus ieiunus ijs utatur. Caricæ pectus iuuant, & tusses. Urinam ciunt, satisq; nutriunt, corporis etiam bonam habitudinē efficiunt. Ante cibum sumptæ, uentrem irritant, sed nisi celerius uentrem pertranseant, non bonum sanguinē gignunt. Quapropter si ad satietatem usque eduntur, scabiem & pruritum excitant. Cibus autem bonus est, & aduersus uenena remediū, si cum nucibus aut amygdalis comedantur. Renes expurgant, & iecoris, lienisq; obstructions auferunt, uerum calefaciunt, & sitim inferunt, & flauam in calidioribus temperamentis bilem procreant. Impositæ parotidibus & reliquis abscessibus, emolliunt & concoquunt, potissimum in ijs quibus sunt carnes molliores. Podagrîcis cum scenogræco & aceto impositæ, non parum iuuant.



SPARTVS

Pfimmen.

NOMINA.



SPARTON, ἰσπαρτίον Græcis, Spartum Romanis uocatur. Officinis incognitum. Germanis Pstrimmen appellari potest. Sparton uerò dixerunt, quod funiculi ac uinculi usum in alligandis uitibus præbeat.

Spartum unde dicitur.

FORMA.

Frutex est uirgas longas proferens, sine folijs, ualidas, difficulter fragiles, quibus uites ligant. Siliquas phaselorum modo fert, & in ijs semina lentis formam habentia. Florem luteum, ueluti Leucoion.

LOCVS.

Aridum solum amat, estq; ueluti terræ iuncus.

TEMPVS.

Floret circa Idus Iunias, ac subinde siliquas producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse, & gustus & uires indicant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sparti semen & flores in aqua mulsa pota quinque obolorū pondere, per superna cum intensione ueluti Elleborus citra periculū purgat. Semen per inferna purgat. Quinetiam maceratis in aqua uirgis eius, deinceps uerò tulsis & expressis, si succus cyathi unius mensura ieiunis bibatur, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur. Quidam etiam muria, aut marina macerantes, ischiadicis clysterem infundunt. Strigmenta autem cruenta elicit.

EX GALENO.

Sparti, quo & uites apud nos alligant, tum semen, tum uirgarum succus, non infrenuè trahentis est facultatis.

EX PAVLO.

Sparti, quo uites ligant, & semen & flos cum mulsa pondere quinque obolorum pota, per superiora purgant ueratri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

EX SYMEONE SETHI.

Sparti, quo uites ligantur, semen & flores cum aqua mulsa si bibantur pondere obolorum quinque, per superna purgant, ut Elleborus albus, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virgæ uerò ischiadicis profunt.

DE SMYRNIO. CAP. CCXC.

NOMINA.



SMYRNION Græcis, Smyrnion Latinis, officinis Leuisticū, Germanis Liebstickel dicitur. Smyrnion dictū, quod huic idem sit odor qui Myrrha. Errant qui Leuisticum hodie nominatā herbam, eam esse putant quæ Dioscoridi Ligusticum appellatur. Neq; enim caulem geniculatum, neque etiam folia Meliloto similia profert. Tolerabilior est sententia eorum qui arbitrantur secundam esse Dauci speciem.

Smyrnion cui dicitur. Leuisticum non est Ligusticum.

FORMA.

Caulem habet Apio simile, adnascentias obtinentē multas. Folia latiora Apio, ad terram contracta, subpinguia, robusta, cum acrimonia odorata, medicataq; & colore sublutea. Umbellā supra caulem Anetho similem. Semen rotundū, nigrum, sapore acre. Radicē acrem, odoratā, teneram, succosam, fauces mordentē, foris nigram, intus pallidam, aut subalbidā. Ceterū si quis singulas has notas uelit expendere, facile perpendet Smyrniū eam esse herbam quam hodie Leuisticū nominant. Siquidē ea ut Apiū caulem profert concauū, ac stolones multos. Folia quoq; Apij,

Smyrniū esse Leuisticum.



SMYRNIVM

Liebstöckel.

A at latiora, ad terram contracta, subpinguia, firma, cum quadã acrimonia odorata, odore tamen medicato, colore in luteum languido: muscariũ in capitibus caulium Anetho simile: semen rotundũ, nigrum, acris sapore: radicem odoratã, acrem, gustu fauces mordentem, succosam, mollem, foris atram, intus subalbidam, aut pallidam. His accedit quod Leuisticũ forma & odore Apio ualde simile est, ita ut nonnulli hac ratione moti putauerint esse Apij speciem quandã: ut congenerẽ esse herbam, quemadmodũ testatur Galenus, nemini dubiũ esse debeat. Vnde iterum li-
*Leuisticũ formã
 et odore Apio si-
 mile.*

quidò colligi potest esse Smyrnion, quòd certè statim ab Apio Dioscorides, tanquã similem congeneremq; herbam, id ipsum describat. Conueniunt etiã utrarumque herbarum facultates, ut paulò post monebimus. Item Dioscorides scribit Pæoniã fœminã folia Smyrnij habere. Quid uerò folijs Pæoniæ fœminæ, quã folia Leuistici hodie nominati magis simile: ut nemo dubitare debeat subinde Smyrnion esse Leuisticum.

LOCVS.

Nascitur hodie passim in hortis. Humida autem loca amat.

TEMPVS.

Floret æstiuo tempore.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

B Calefaciendĩ facultatem habent radix, herba & semen. Olerũ modo comeduntur folia muria macerata, aluumq; sistunt. Radix serpentium moribus pota succurrit. Tussis & orthopnceas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Illita recentia cedemata, phlegmonas, & duritias discutit. Vulnere ad cicatricem perducit. Feruefacta & subdita, abortus facit. Semen eius lienis, renum & uesicæ uitij prodest. Menses & secundas pellit. Cõmodè datur ischiadicis cum uino. Inflationes stomachi lenit. Sudores & ructus ciet. Potũ peculiariter hydropicis, & febrũ circuitibus prodest.

EX GALENO.

Smyrnion est eiusdem generis cum Apio & Petroselino: fueritq; Apio quidem ualidius, Petroselino autem imbecillius. Menses itaque & urinas mouet. Cilices in Amano monte natum Petroselinũ uocant. Est quidem & ipsum Smyrnion, minus uerò Petroselino & Smyrnio acre est. Proinde & ulceribus imponi potest, quia uidelicet sine molestia desiccet. Sed & digerere quæ indurata sunt, ualet. Reliqua facultas eius Apio & Petroselino similis est. Quocirca & semine utimur ad menses, urinas & asthma. Hæc Galenus. Ex ijs Galeni uerbis liquidò apparet duplex esse Smyrnion, unum quod alio nomine Hipposelinon, de quo suo diximus loco, dicitur: alterum autem quod in Amano nascitur monte, de quo hic nobis sermo est.

EX PLINIO.

Vrinã & menses ciunt folia & radix. Aluum sistit semen. Radix suppurationes recentes, & collectiones discutit: item duritias illita. Prodest contra phalangia, ac serpentes, admixto cachry aut polline, aut apiastro in uino pota, sed particulatim, quoniam uniuersa uomitiones mouet, qua de causa nonnunquã cum ruta datur. Partus adiuuat, & secundas pellit. Medetur tussi & orthopnceæ radix uel semen. Item thoracis, lienis, renum & uesicæ uitij. Radix autem ruptis, conuulsis auxiliatur. Sudores ciet & ructus, ideo inflationem stomachi discutit. Vulnere ad cicatricem perducit. Datur ischiadicis in uino cum crethmo. Exprimitur succus radice, utilis fœminis, thoracis & præcordiorũ desiderijs: calefacit enim, concoquit, & purgat. Semen peculiariter hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur. Concoctiones facit. Sapore simillima piperi, ideo ad obsonia utuntur cum mulso, oleo & garo, maxime in elixis carnibus.

C

APPENDIX.

Confer cum iam dictis facultatibus eas quas Leuistico recentiores tribuunt, & comperies prorsus easdem esse. Tradunt enim eius semē mouere menses & urinas, inflationes tollere, serpentium moribus mederi, calculos confringere, sudores ciere, uulnera conglutinare, lienisq; obstructiones auferre: adeo ut hinc iterum constet, Leuisticum à Smyrnio non esse, saltem uiribus, diuersum.

DE SILPHIO CAP. CCXCI.

NOMINA.



*Ostritium cur
dictum.*

ΙΑΦΙΟΝ Græcis, Laser, & Laserpitium Latinis dicitur. Vulgo & officinis corrupta uoce, deflexa tamen quadam à Laserpitio pristini nominis umbra, Osteritiū uocatur. Primum siquidē, ut dictum est, Laserpitium, dein deprauata nomenclatura, Osteritiū, postremo Ostritium cœpit appellari. Qui sanè lapsus facilis admodum fuit. Abiecta namq; prima litera, Asteritiū, & dein a mutato in o, Osteritiū, ac postremo magis concise Ostritium nominare imperiti cœperūt. Veteribus Germanis haud dubie *Laserwurz* dicta est hæc herba, quam quidem uocem, utpote semilatinā, posterius non rectè intelligentes, in *Weysterwurz* mutarunt, Qua quidem appellatio ne adhuc hodie omnes utuntur Germani.

FORMA.

Caulem ferulæ similem habet, folia uerò Apij, aurei coloris, semen latum, foliaceum, radicem quæ corticem nigrum obtinet, à qua liquor etiam modicè rubens, translucidus, myrrhamq; redolens, ac odoratus destillat. Ex qua quidē descriptione luce clarius constat, herbā hanc cuius picturā damus, esse Laserpitiū, saltem germanicū. Caulis enim ei fœniculaceus, seu ferulæ, hoc est, geniculatus, folia Apij in auri colorē languescētia, semen foliaceū & latum, nempe quod figura exile foliolū exprimit: radix crassa & multa, foris nigricans, intus candida, miraq; flagrans iucunditate, quæ si uulneratur, liquor profluit lentus, ac modicè rufus, sua uisissimumq; spirans odorem, & linguam sua acrimonia uellicans, ut sanè nulla sit prorsus nota quæ reclamare uideatur. His accedit quod facultates Ostritij nominati à Laserpitij uiribus non discrepant, quemadmodum ex sequentibus patebit.

*Laserpitium ger
manicum.*

LOCVS.

Nascitur in Syria, Armenia, Media & Africa. Quod ex Armenia & Africa affertur sua uisissimum odorem habet, præsertim Cyrenaicum, unde & ὀπὸς, id est, succus Cyrenaicus appellatur. Ne hoc Laserpitium aliud est quàm concretus ille succus, quem officinæ Belzuinum, uel Ben luinum uocant. Quod uerò ex Media & Syria affertur, Dioscoride teste, uirosū odorem obtinet, ac putrilaginē respicit, ideoq; uidetur esse id quod hodie officinæ passim Alam fœtidam nominant. Quod etiam hinc colligi potest, quod in hodiernum usque diem ex Syria Alexandrina, & hinc Venetias deportatur. Nostrum in montosis locis prouenit, ac in omnibus ferè hortis nunc plantatur.

*Succus Cyrenaicus.
Belzuinum est
Laserpitium.
Asa fœtida.*


TEMPVS.

Iunio mense flores admodum exiguos ac candidos, instar Anisi, profert, atque subinde semen latum,

TEMPERAMENTVM.

Silphij liquor calidissimus est. Verumenimvero & folia, & caulis, & radix fat strenuè excalfaciunt. Nostrum etiam Laserpitiū in inuersum calidius atq; acrius est pipere ipso, adeoq; calefacit & exiccat in tertio ordine. Radix autem & semen, folia & caulem superant, ut in eo etiam efficacissimus omnium aliarum partium sit liquor, secundo loco folia, postremo caulis,

VIRES.



763

LASERPITIVM
GERMANICVM.

Stechwurz.

C

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Laserpitij liquor acris est, inflat. Inunctus cum uino, pipere & aceto, alopecias sanat. Oculorū aciem exacuit. Incipientes suffusiones cum melle inunctus dissipat. Cauernis dentium in eorundem dolore inditur, aut cum thure in linteo circumponitur, aut colluitur eo os cum Hyssopo, & Ficus coctis in posca. His prodest, quos bestia in rabiē efferata momorderit, uulneribus impositum. Valet aduersus omnia animantia quæ uirus ei aculantur, uenenata tela, potus aut inunctus. Scorpionum plagis oleo dilutus circumliniē. Gangranis † antea scarificatis immittitur. Carbunculisq̄ cum ruta, nitro & melle, uel per se. Clauos, callosq̄ prius circumscarificatos tollit, cerato, aut aridorū Ficuum carne præmollitus. Recentes lichenas ex aceto sanat. Excrescentias carnis, polyposq̄, si aliquot diebus cū atramento futorio aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Diuturnis asperæ arteriæ asperitatibus opitulatur. Vocem subito exasperatā irrauescentē mue, dilutus aqua & absorptus confestim restituit. Vuam cum melle inunctus reprimit. Angina laborantibus ex aqua mulsa utiliter gargarizatur. Coloris bonitatē ijs qui eo uescunt auget. In sorbili ouo datus tussi auxiliatur, pleuriticisq̄ in sorbitionib. Suffusis felle, & hydropicis cum aridis Ficis utiliter exhibetur. Cum pipere, thure & uino potus, rigores soluit. Neruorum distentione laborantibus, opisthotonicisq̄ datur oboli pondere deuorandus. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatū cum aceto deijcit. Ad lac intus in grumos concretū. Comitialibus ex oxymelite sumptus succurrit. Menfes ciet cum pipere & myrrha potus. Cœliacos in acino uuæ sumptus iuuat. Cum lixi uio potus, repentinis conuulsionibus & rupturis prodest. Ad potiones dissoluitur amaris amygdalis, aut ruta, aut calido pane. Foliorū liquor eadem potest, sed multo minori efficacia. Cum oxymelite manditur ad expediendam asperam arteriam, præsertim amissam uocem. Utuntur eo cum Lactucis, pro eruca comedentes.

† πνευματικὴ
δυσίαρ λεγέ-
ται.

D

EX GALENO.

Omnes Silphij partes flatulentæ magis sunt essentiæ, ac proinde concoctū difficile. Foris tamen impositæ corpori, efficaciores, & omnium potissimū liquor, admodum trahentē facultatē obtinens. Attamē excrescentias imminuendi, & liquandi uim quandam propter iam dictam temperiē habent. Liquor Cyrenaicus quidē omnes & caliditate & tenuitate exuperat, ac proinde etiā omnium maximè discutit.

EX PLINIO.

Folia Silphij ad expurgandas uulvas, pellendosq̄ emortuos partus, decoquuntur in uino albo odorato, ut bibatur mensura acetabuli à balneis. Radix prodest arterijs exasperatis, & collectionibus sanguinis illinitur. Sed & in cibis concoquitur agrè. Inflationes facit & ructus. Urinæ quoque noxia. Sugillatis cum uino & oleo amicissima, & cum cera strumis. Verrucæ sedis crebriore eius suffitu cadunt. Liquor eius per se algores excalfacit. Potum neruorum uitia extenuat. Fœminis datur in uino. Et lanis mollibus admouetur uulvæ ad menses ciendos. Pedum clauos circumscarificatos ferro, mixtus ceræ extrahit. Urinam ciet ciceris magnitudine dilutus. Andreas spondet, copiosius sumptum nec inflationes facere, & concoctioni plurimum conferre senibus & fœminis. Item hyeme quàm æstate utilius, neruntamen aquam bibentibus, cauendumq̄ ne qua intus sit exulceratio. Ab ægritudine recreationi efficax in cibo. Tempestiue enim datus, cauterium obtinet: assuetis etiam utilius quàm experibus. Ad externa corporum, indubitas confessiones habet. Venena telorum & serpentium extinguit potus: ex aqua uulneribus his circumliniē. Scorpionum tantum plagis ex oleo. Ulceribus uerò non maturescen-
tibus, cum farina hordeacea, uel fico sicca. Carbunculis cum ruta, uel cum melle, uel per se uisco superlitū ut hæreat. Sic & ad canis morsus. Excrescentibus circa sedem, cum tegmine punici mâli ex aceto decoctus. Clauis pedū, qui uulgò morticini appellant, nitro mixto, antè subactus. Carnes replet cū uino & croco, aut pipere, aut
murium

A murium fimo & aceto. Perniones ex uino fouet, & ex oleo coctum imponitur: sic & callo. Clauis pedum superrasis præcipuè utilitatis. Contra aquas malas, pestilentes tractus, uel dies. In tussi, uua, fellis ueteri suffusione, hydropicis, raucitatibus: confestim enim purgat fauces, uocemq; reddit. Podagras, in spongia dilutus posca lenit. Pleuriticis in sorbitione uinum poturis datur, contractionibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine cera circumlitus. In angina gargarizatur. Anhelatoribus & in tussi uetusta, cum Porro ex aceto datur, atq; ex aceto his qui coagulum lactis sorbuerint. Præcordiorū uitijis, syntecticis, comitialibus in uino, in aqua mulla lingue paralyfi. Coxendicibus & lumborum doloribus cum decocto melle illinitur. Non censuerim, quod autores suadent, cauernis dentium in dolore inditum cera includi, magno experimento hominis qui se eadem causa præcipitauit ex alto.

APPENDIX.

Laserpitiū nostrum ex traditione recentiorū unicè uenenis aduersatur. Item pestilentie populariter grassantis arcet contagia. Lentitiam pituitosorū humorum incidit ac discutit: quapropter tussi quam frigus attulit, medet. Crassa quæ in thorace coeunt, discutit. Coloris corporis bonitate ijs qui eo uescuntur, efficit. Concretum in corpore lac & sanguinem resoluit. Stomachū esu corroborat. Pituitam uentriculi deijcit, & elanguescentē appetentiam inuitat. Menses & urinam ciet. Rabiosi canis morsu, aut serpentis ictu liberat, si contrita folia uulneri indantur. Hypochondriorū uitijis auxiliatur. Item lumborum doloribus. Carbunculos cum polenta tritum & impositū sanat. Cum uino potum rigores discutit. Herba ipsa in uino & aqua cocta uulnera interna glutinat: & in summa, omnia quæ Angelica uocata herba, & maiori efficacia, potest. Vt hinc etiam constet Ostreritium à nostris nominatum, eandem habere quas ueterum Laserpitium, inefficacioris tamen, facultates.

Laserpitij germanici facultates.

B Quare cum metus sit ne Laserpitiū adulterinum, aut saltem non optimū ad nos afferatur, præstat nostro uti, quod scilicet exigua admodū pecunia comparari possit, & uiribus satis efficax sit. Nam eadem quæ Dioscorides & Plinius Laserpitio assignant, recentiorum testimonio præstare ualet.

DE STACHY CAP. CCXCII

NOMINA.



T A X V Z Græcis, Stachys Latinis dicitur, officinis ignota. Germanis *riehender Andorn* nominatur. Stachys uerò dicta, quod uerticillato florum ambitu, & orbibus spicarum caules cingentibus coronetur,

Stachys unde dicta.

FORMA.

Frutex est Marrubio similis, sed altior, folia ferens plura, sed rara, hirsuta, dura, odorata, incana. Virgas ab una radice plures emittit Marrubio candidiores. Ex hac descriptione perspicuum sit omnibus, herbam quam pictam damus, esse Stachyn: est enim fruticosa, Marrubijq; similitudinem refert, nisi quod altior est; folia quoq; plura, at rara obtinet, item hirsuta, dura, odorata & albicantia. Virgulas denique, etsi pictura id ipsum non ostendat, ab una radice plures emittit, candidiores quam Marrubium. Quibus omnibus florum purpureorū uerticillatus accedit ambitus, ac orbes spicarum, qui caules circundant.

LOCVS.

Asperis locis, montibus ac collibus prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Stachys gustu acri & amaro est, tertijq; ordinis excalfacientium. Vnde iterū liquet hanc herbam esse Stachyn, quod gustata acris & amara uideatur.

VIRES.



STACHYS

Riechender Andorn.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet excafactoriã & acrem. Ideoq; decoctum foliorum eius potum, menses & secundas pellit.

EX GALENO.

Menses prouocat, abortum facit, & secundas eicit.

EX PLINIO.

Pellit menstrua.

DE SECALE CAP. CCXCIII.

NOMINA.



SECALE dicitur Plinio lib. xvij. cap. xvi. & Farrago, Germanis *Xocten* & *Roum* nominatur. Magno in errore uersantur qui hoc frumenti genus Siliginem esse existimant. Siquidem ex hac, Plinio lib. xvij. cap. ix. teste, lauitissimus fit panis, tener, candidus, & primatum tenens: ex illo cibarius, ater, & pondere precipuus, ad arcendam pauperum famem tantum utilis, qui ueterascens acorem etiam contrahit. Item Siligo habet spicam erectam, Plinio loco iam citato, cap. x. autore, nec rorem continet, quæ rubiginem faciat: hoc uerò procumbentē, & ideo quod imbres retineat, rubigini opportunū. Siligo præterea grano est candido, leui, & multipliciter tunicato: hoc contra nigro, striato, & glumis ferè explicito. Deniq; Siligo sine arista est, hoc uerò aristis horret. Postremū ex Siligine pistrinarū opera fiunt laudatissima, ex Secale nullum ferè tentatū est. His itaque rationibus euidentissimū esse puto, hoc frumenti genus quod Germani nostri *Xocten* uocant, non esse Siliginem.

Secale non est Siligo.

FORMA.

Secale frumenti genus uulgò notissimū, stipula est culmo triticeo, graciliore & proceriore, geniculis ut plurimū quatuor, spica innocentiorib. aristis horrente, non erecta, sed semper propemodum procumbente, grano glumis explicito, & ob id caduco, tristi, nigricante, strigoso. Plinius cap. xvi. libri xvij. scribit, Secale fecunda, sed gracili stipula esse præditū, nigritia triste, sed pondere præcipuū. Quæ singula fatis monstrāt, frumentū quod *Xocten* uocant Germani, esse secalen, & nō siliginē.

LOCVS.

Gignitur qualicumque solo, ideoq; passim in Germania, præsertim Rhetia, & Vindelica feritur.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, metitur autem Iulio.

TEMPERAMENTVM.


Magis uidetur excafacere quàm Triticum, minus tamen refrigerare quàm Hordeum. Magis item exiccare quàm Triticū, minus tamen quàm Hordeū aut Zea.

VIRES.

Habet aliquid lentoris & obstructiuis naturæ. Hinc panis ex eo confectus, potissimum si à furfuribus non sit probè purgatus, stomacho grauis esse solet. Reliquæ uires ex capitibus de Triticō & Hordeo colligendæ.


DE SIDE-

768



SECALE

Rochen.



SIDERITIS
PRIMA.

Glöckner.

*Chamæpitys
adulterina.*



*Sideritis cur
diæta.*

ΙΑΗΡΙΤΙΣ Græcis, Sideritis prima Latinis dicitur. Magna officinarū pars hac herba pro Chamæpity uera utitur, non sine errore, cum satis ex forma illius constet, ut paulò post monstrabimus, non esse Chamæpityn. Germanis Glidtraut appellatur. Sideritis uerò nominata, quod glutinandis uulneribus apta, præcipuum in bello habeat usum.

FORMA.

Herba est folia Marrubio similia habens, longiora tamen, ad saluæ aut quercus figuram accedentia, uerum minora & aspera. Caules fundit quadratos, dodrantales, aut longiores, gustu non iniucundos, aliquo modo adstringentes, in quibus per interualla uelut in Marrubio uerticilli in orbem circumacti, & in his semen nigrum. Ex qua quidem deliniatione sole clarius cõstat, herbam cuius hic picturam exhibemus, esse Sideritin primam. Siquidẽ folia Marrubij habet, sed longiora, ad saluæ similitudinem aspera & rugosa, minora tamen. Caulem quadratum & hirsutum, non iniucundi gustus, aliquantum subadstringentis, quem per interualla uerticillati orbes coronant, ut in Marrubio uidere licet, in quibus flores subcandidi ac lutei, & subinde semen nigrum. Radicem exiguam & subluteam, quod silentio transiit Dioscorides. Non esse uerò hanc herbam Iuam arthriticam, nec Chamæpityos generibus posse annumerari, hinc conijcere licebit: primũ, quod non sit pumila, sed in altum surgat, fruticis uerius quàm herbæ specie. Quod uerò neque primum neq; secundũ genus Chamæpityos dici queat, hinc manifestũ fit, quod utrunque folijs Semperviui minoris sit, à quibus saluæ, qualia hæc habet, diuersissima sunt. Neq; etiam tertium, quia folia eius non sunt exilia.

LOCVS.

Nascitur asperis, petrosis & incultis locis.

TEMPVS.

Iunio mense florere incipit, nec desinit nisi in Autumni fine.

TEMPERAMENTVM.

Sideritis habet quandam abstergendi facultatẽ, id quod amaritudo eius satis indicat: & pauculam adstrictionem. Plurima tamen eius pars humida est, & mediocriter frigida.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia eius illita uulnera glutinare, & inflammationẽ arcere possunt.

EX GALENO.

Phlegmonem sedat, & glutinandi uim obtinet.


EX PLINIO.

Sideritis tantam uim habet, ut quamuis recenti gladiatoris uulneri illigata, sanguinem claudat.

SORGI

Welscher Hirz.

tt 2.



DE SORGI CAP. CCXCV

NOMINA.



PERGRINVM est hoc genus frumenti, & ex Italia ad nos allatū, ideoq̃ Germani welschen Dirſ uocant. Alij Sorgsomen / quod scilicet in Italia Sorgi nominetur. Neq̃ constat quo nomine ueteribus sit appellatum, nisi farris genus sit, quod in Gallia nunc rubrum & barbatū frumentum nuncupant. Probè enim illi hæc nomenclatura uidetur couenire, quod nimirum eius spica rubra & barbata sit. Certò tamen nihil affirmare audemus, nam Panicum etiã referre, quamuis magnitudo repugnet, uidetur.

FORMA.

Culmos habet quatuor aut quinq̃ altos, crassos, geniculatos, rubicundos, folijs uestitos longis, latis, & in summitate acuminatis, harundini non disimilibus: spicã quã Panicū maiorē ac densiorē, rufam & barbatã, in qua semen rufum, rotundū, lentis magnitudine, & acuminatū. Florem luteum. Radicem multis fibris capillatã.

LOCVS.

Non prouenit nisi satum, & nunc in multorū hortis colitur ac plantatur, non tamen facillè emergit.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, flore, ut diximus, luteo, nec nisi extrema ferè autumnii parte ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Semen dulce est, & Panicum planè in gustu refert, ideoq̃ temperamento ab hoc minimè differre putamus.

VIREs.

Tametsi de illius facultatibus nihil comperti habeamus, tamen quia Panicū gustu refert, easdem illi facultates obtinere existimamus, quas suo loco inuenies.

DE SERPENTARIIS OFFICINARVM

CAP. CCXCVI.

NOMINA.



Officina-
rium.

VO nomine ueteribus medicis Græcis & Latinis appellatæ sint, nemo hætenus, quod sciam, indicare potuit. Recentiores herbarij & officinæ non sine magno & intolerando errore Serpentarias uocant, non certè quod in nomenclatura tantum sit situm, sed quod forma & uiribus plurimum ab ea herba quam Græci *σπανόριον*, Latini autem Dracunculū ac Serpentariam nominant, plurimum discrepent, ut suo loco latius demonstrabimus. Germani nostri has herbas *Waterwurſ* sua lingua appellant.

GENERA.

Duo sunt Serpentariæ recentiorū & officinarū genera, forma non multum uariantes. Vnum quod leuibus admodū folijs, & radice in se contorta constat. Hinc *Bistorta* est quod herbarijs nostri temporis Bistorta dicatur. Nos certioris discriminis gratia marem fecimus, germanicèq̃ *Waterwurſ* *mennle* uocauimus. Alterum rugosioribus folijs, maioriq̃ radice, & minus intorta, ac multum capillata uidetur. Vulgares herbarij Colubrinã nuncupant. Nos *scemina* cõstituimus, ideoq̃ germanicè *Waterwurſ* *weible* uocauimus. Serpentarias uerò utrunq̃ genus dixerunt, propterea quod ubi primum è terra prodeunt, linguæ serpentinæ pelle tenui uestitæ, formam obtinent.


FORMA.

Cauliculo constant tenui ac iunceo, glabrescente, per ima tantum foliato, spicoso florū uertice, quibus dilutioris purpuræ color inest: folio Rumicis à terra castio, superne



SERPENTARIA MAS
SEV BISTORTA

Waterwortz mennle.



COLUBRINA SEV SER-
PENTARIA FOEMINA

Wasserküetz weib.

A pennè uiridi & herbaceo: radice, mas quidem draconis modo inuoluta & contorta, fœmina uerò oblonga, maiore ac capillata, extrà nigricante, intus rubefcente.

LOCVS.

Nascuntur locis umbrosis & humidis, pratis potissimū Martianæ syluæ.

TEMPVS.

Florent Maio mense & Iunio, quo maximè tempore, ut omnes aliæ quę floribus ornantur plantæ, dignosci ac inueniri possunt.

TEMPERAMENTVM.

Vtriusq; radix mirificè adstringit, ut refrigerandi ac exiccandi facultate præditas esse nemini sit dubium. Antiquus manuscriptus herbarius frigidas & siccas esse in tertio ordine censet.

VIRE S.

Radices illarum glutinant uulnera, fœctum in utero retinent, uomitū biliosum reprimunt, dysenteriam sanant. Hæc antiquus herbarius. Nostræ uerò ætatis medici, aliorū errata impudenter sectantes, ad longè diuersos usus Serpentariæ utriusq; radices adhibent, nempe ad eos ad quos Dioscorides, Galenus & alij ueteres suum Dracontium, cum tamen uiribus inter se maximè discrepent, quod gustus etiã abundè testatur, cum Dracontij radix acris sit, illarū uerò uehementer adstringat. Vt igitur errorè hunc relinquunt, subinde medicos & seplasiarios hortor, nisi fortè perdere magis quàm sanare in delitijs habeant: sciantq; Serpentarias suas non alias quàm Britannicā habere facultates, adstringendi nimirum, priuatim ad ea quæ in ore & tonsillis sunt depascentia ulcera accommodatas, & ad omnia alia quibus adstrictione opus est. Folia etiam in farinam trita labiles dentes confirmant.

DE SCORDIO CAP. CCXCVII.

NOMINA.



ΚΟΡΑΙΟΝ Græcis, Latinis Trixago palustris dicitur. Officinis ferè omnibus incognita. Germanis allusione quadam ad Romanā appellatio nem aptè Wasserbatenig nominabitur. Scordion autem Græcis ab Allijs dicta est herba hæc, quod nimirū eius folia affricta, Allij, quod Græcis Scorodon uocatur, odorè referant. Ab hoc mali & ingrati odoris sensu, ijdem etiam *δι' Ἰσχυρῶν* appellata est. Vt uerò Trixago dicta sit, similitudo fecit: Trixagini enim, quæ Græcis Chamædryis nominatur, similis est, Palustris autem, quoniã humentibus ac palustribus locis nascatur.


Scordion inde dictum.

Dysofomon: Trixago palustris cur uocata.

FORMA.

Folia Trixagini seu Chamædryi similia habet, maiora tamen, nec sic in ambitu incisa, odore aliquantū Allium referentia, gustu adstringentia & amara. Caules quadrangulos, in quibus flos subrubescens. Hæc deliniatio sic refert herbã hanc, cuius picturã damus, ut ouum ouo non sit tam simile. Folio siquidem est Trixaginis, maiore, & per ambitum non ita profundè serrato & inciso, odore aliquatenus Allium reddente, adstringentis & amari gustus, quadrangulis caulibus: flore in caulibus, instar Chamædryos & Teucrij, subrubro, & minimè in summis caulibus, ut aliqui putant, quemadmodū pictura ipsa abundè docet. Hæc itaque herba in theriacos pastillos inferenda erit, & non syluestre Allium, ut maximo in errore uersentur seplasiarij in stitiores, qui pro re tam salutari atq; omnibus putridis marcoribus, Galeno lib. i. de antidotis autore, aduersante, syluestre Allium usurpant. Sed indignius erratum, quàm quod multis explodi debeat. In hunc autem eisdem uicinitate uocabulorū potissimū incidisse errorem, libro primo Paradoxorū, cap. xxiiij. abundè monstrauius.

Seplasiariorum error.



SCORDIUM

Wasserhempig.

LOCVS.

Nascitur in montanis & humentibus locis. Nec inter se pugnant Dioscorides & Plinius, dum hic in campis humidis pinguibusq̄, ille autem in montanis nasci scribit. Vterq̄ enim uerum dixit: in campestribus siquidem & montanis, non tamen omnibus prouenit, sed, quod Dioscorides etiam adiecit, humentibus tantum. Plantatum autem Scordium non difficulter nascitur, & possunt de uno duntaxat ramo complures prouenire, modò solo humido cõmittantur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, flos tamen non nisi diem unum durare uidetur, sic continuo unus alium sequitur.

TEMPERAMENTVM.

Tum ex saporibus, tum etiam facultatibus paulò post exponendis satis constat Scordiũ calidum esse. Nam, Galeno etiam teste, amarum quid obtinet, & acre.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba uim calefaciendi habet, & urinam cit recens trita & pota. Arida quoque cum uino decocta contra serpentiũ morsus, & letalia uenena bibitur. Ad stomachi rofiones, dysenteria, & urinæ difficultatẽ pondere duarum drachmarũ cum hydromelite. Purgat crassa purulenta è thorace. Facit ad ueterẽ tussim, rupta, conuulsa, cum nasturtio, melle & resina in ecligmate arida cõmixta. Hypochondriorũ uetustas inflammationes excepta cerato lenit. Succurrit eadem podagris cum acri aceto circumlita, aut ex aqua illita. Menses supposita mouet, uulnera glutinat, uetusta ulcera purgat, & cum melle ad cicatricẽ ducit. Siccata carniũ excrescentias reprimat. Succus præterea ex ea expressus ad prædicta uitia bibitur.

EX GALENO.


Expurgat simulq̄ excalfacit uiscera, tum menses urinamq̄ mouet. Præterea conuulsa ruptaq̄ & laterũ dolores ab obstructione & frigore natos sanat potum. Deniq̄ uiride illitum magna uulnera conglutinat: uerum sordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum.

EX PAVLO.

Scordium uarium existit, ut quod amarũ, acerbũ & acre sit. Purgat igitur simul & calfacit uiscera, urinas & menstrua cit, refrigerata omnia recalfacit, uulnera glutinat, repurgatq̄, aridum illitum cicatricem inducit.

DE STICHADE▶ CAP▶ CCXCVIII▶

NOMINA.

 **STIXAS** græcè, Stichas uel Stoechas latinè appellatur. Officinæ cognomento Arabicam uocāt. Germanis nominatur *Stichas* austr. Stichas uerò nomen accepit à Stoechadibus ex aduerso Malsiliæ sitis Gallia infulis, in quibus prouenit. Arabę factionis autores patriam Stichada reliquis omnibus prætulerũt, hinc sequaces illorum gentili cognomento Arabicã nunc cuparunt.

*Stichas arabica.**Stichas unde dicta.**Arabica quare uocata.*

FORMA.

Herba est tenuibus ramulis, comam similem Thymo habens, longiore tamen folio, & gustu acris, & aliquantũ subamara. Hactenus Dioscorides, qui flores atq̄ spicam prorsus omisit. Sunt autem flores, ut pictura abundè monstrat, exigui & ceerulei, spica uerò flauescit, semine referta exiguo, triquetro, & coloris spadicei. Radix illi est tenuis & lignosa.

LOCVS.

Nascitur, ut antea est cõmemoratũ, in insulis Gallia è regione Malsiliæ, quæ Stichades appellantur, à quibus etiam gentilitiam appellationẽ accepit. Prouenit etiã in Arabia, alijsq̄ cõpluribus locis, & in multis etiam Germania nostræ hortis.

TEMPVS,



STICHAS

Stichaskraut.

TEMPVS.

A Floret eo quo Lauandula tempore, nimirum ante Solstitium æstiuum, hoc est, Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Stœchadis qualitas gustu quidē amara est, & mediocriter subadstringens. Temperamentū uerò compositum ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit; & ex tenui, altera, quæ terrena est, copiosiore, à qua utiq; amara est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius, quemadmodum & Hyslopi, ad thoracis uitia efficax est. Miscetur antidotis utiliter.

EX GALENO.


Obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tum omnia uiscera, tum totum corpus est nata.

EX PLINIO.

Menses cit potu, thoracis dolores leuat. Antidotis quoq; miscetur.

DE STRUTHIO. CAP. CCXCIX.

NOMINA.

 TPOYΘION Græcis, Radicula, siue Lanaria herba Latinis, Mauritanis & officinis Conditi, nonnullis herba fullonum, uulgò Saponaria, Germanis Seyffentia aut dicitur. Vnde uerò Græci hanc herbam Struthiū appellauerint, non satis constat, nisi fortè à foliorū positura, quæ auium alas quadantenus imitant, nomen illi indiderint. Nam gens ea *σπυθῶν* & *σπυθῶν* passerem, & minores alias aues appellat. Vel forsitan quod Venerem stimulet, Græci enim, ut dictum est, *σπυθῶν* passerem uocant, & ab eius aui salacitate lasciuos, & in Venerem procliuiores homines *σπυθῶς*, quasi passerem uocant. Porrò struthium, ut est apud Festum, nuncupant obscenā uirilem partem. Qua imitatione Martialis & Catullus passerem pro uirili membro in suis uersibus usurpasse uidentur. Lanariam uerò dixerūt, quod ad candorem & mollitiem lanarū ea usa fuerit antiquitas. Nam cum succidæ lanæ cespito spurcatae colores respuerent, prolutæ huius radicis succo, ad quoscunq; suffectus imbibendos præparabantur, quibus cespitum erat impedimento. Sic fordescentes lanas ueteres hac herba eluebant, ad munditiē contrahendam, quæ primum ab infectoribus quærebatur, sordidis colores aspernantibus. Sic quoq; à præcipua & utiliore parte, Radicula Romanis est appellata. Saponaria recentiorib, dicta est, quoniam eluendis uestimentorū maculis, fordibusq; lanarum expurgandis, saponis uicem exhibet. Herba autem fullonū nominata est, quod ea interpollandis uestibus, & mangonio poliendis fullones utantur.

Radicula.

Lanaria.

Conditi.

Saponaria.

Struthium unde nominatum.

σπυθῶν.

Lanaria cur dicta.

Radicula quare appellata.

Saponaria cur uocata.

Herba fullonum.

FORMA.

Struthion herba est caule lanuginoso, folijs oleæ prodeuntib, ex interuallo quasi geniculatim, plerunq; quinis in unum coeuntibus, in summo coliculorū floribus candidis; radice, quam summo cespite non in altum ultrò citroq; per longitudinem fundit, magna, tereti & oblonga, quæ conciditur purgandis lanis.

LOCVS.

Nascitur in Asia Syriaq; saxosis & asperis locis præcipuè. Nunc in hortis quibusdam plantatur.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio maximè mense, sed per duos cōtinuos menses floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum temperamento, ex quarto quodammodo ordine.

VIRES.



STRVTHIVM

Seyffenkraut.

A VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix eius acris est, urinam cit, iccinorosis auxiliatur, tussi & orthopnceis cum melle cochlearis mensura sumpta. Aluum subducit. Eadem cum Panace & Capparis radice sumpta, calculos frangit, & per urinam exturbat. Lienem induratū minuit. Subdita menses elicit, & fœtum manifestè enecat. Cum polenta & aceto illita, lepras tollit. Cum farina hordeacea in uino elixa, tubercula discutit. Miscetur præterea collyrijs & malagmatis quæ ad claritatē oculorū conficiuntur. Sternutamenta cit, & trita cum melle naribus infusa, per os purgat.

EX GALENO.

Struthij radice potissimū utimur, gustu acri quidem existente. Sed & abstergit, & irritat, ideoq; sternutamenta mouet, ceu cætera omnia quæ gustu acria sunt, & temperamento calida.

EX PLINIO.

Medetur morbo regio ipsa radix decocta, & ius potum; item thoracis uitij. Vri nam cit, aluum soluit, & uulvas purgat. Ea & ex melle prodest magnificè ad tussim orthopnceæ cochlearis mensura. Cum polenta uerò & aceto lepras tollit. Eadem cum Panace & Capparis radice calculos frangit, pellitq;. Panos discutit, cum farina hordeacea & uino decocta. Miscetur & malagmatis & collyrijs, claritatis causa. Ad sternutamenta utilis inter pauca. Lieni quoq; ac iccinori. Eadē pota denarij unius pondere ex mulla aqua, suspiriosos sanat.

DE SCILLA ▶ CAP ▶ CCC ▶

NOMINA.

B ΚΙΛΑΑ Græcis, Scilla Latinis, Squilla, exemplo Varronis, omnibus nunc officinis uocatur. Germanis autem *Wierzwibel*.

FORMA.

Scillæ radix capæ modo multipliciter tunicata corticosaq;, ex qua prius, ut in croco, caulis profilit, tum ex eo flos in luteo candidus emergens insidit, qui cum senuerit folia demum multis post diebus emicant lata, nullo nixa pediculo, capitia quadam specie, & pleraq; ex ijs in terram deflexa.

LOCVS.

Scilla undique, ut capæ & allia, prouenit.

TEMPVS.


Scillam ter florere, triaq; tempora sationū ostendere, Theophrastus libro septimo capite duodecimo tradit. Primum enim florum prouentū, arandi primum tempus significare scribit, secundū medium, tertium nouissimū. Quot enim fuerint isti, totidem & arari tempora fermè occurrunt. Scillæ præterea flos, ut est Berytius autor, uirgata specie profiliens, modò celeriter nō emarcescat, largos frugum prouentus, ac uberem annonam nobis promittit.

TEMPERAMENTVM.

Admodū incidentem facultatē obtinet, non tamen admodū calidam, sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat excalfacientū.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vim acrem & feruentē habet. Assata uerò multiplicè obtinet usum. Pasta aut luto oblita, in clibanū conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec circumlita pasta sufficienter tosta fuerit. Qua amota, si non emolle scat, altera pasta aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt. Nam quæ ita non assatur, noxia magis est, præsertim interaneis data. Torretur item in olla indito operculo, & in clibanū coniecta. Sumitur ex ea, abiectis extimis partibus, quod maximè mediū est, quod concisum, effusa priore aqua, coquitur, nouaq; superinfusa usq; dum nec amaritudinē, neque



SCILLA

Seesquibel.

A acrimoniam habeat aqua. Siccatur autem in umbra difsecta, & lino traiecta, ita ut ne taleolæ inuicem se contingant. Sic igitur secta, ad oleum, uinum, acetumq̄ scilliti cum utimur. Ad rimas uerò pedum crudæ Scillæ interanea pars in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta imponit̄. Decocta in aceto demorsis à uisera cataplasma est. Assæ eiisdē pars una tosti salis partibus octo subigitur, daturq̄ ieiunis cochlearis unius duorumue pondere ad emolliendā aluum. Additur potionibus & odoramentarijs medicamentis, & ijs cum quibus urinam ciere uoluerimus, hydropicisq̄ & stomachicis, quibus innatant cibi, & morbo regio, torminibus, in uetere tussis, asthmaticis, cruenta reijcientibus. Trium uerò obolorum pondus in delinctu ex melle sumplisse satis est. Coquitur eadem cum melle, sumiturq̄ in cibo ad eadem, maximè coctionē adiuuans. Strigmentitia per aluum ducit. Cocta & simili modo sumpta, idem potest. Cauendus Scillæ usus ijs, quibus interaneū aliquod exulceratum erit. Prodest uerrucis & pernionibus assam inungere. Semen eius tritum, cum caricis aut melle exceptum, si manditur, aluum emollit. Pro foribus domus suspensa tota amuletum est.


EX GALENO.

Præstat assam aut elixam sumere: sic enim uirium eius uehementia exoluitur.

EX PLINIO.

Scillarum in medicina alba est quæ masculus, femina nigra. Scilla quæ candidissima fuerit, utilissima erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquū ē uino est, confutum suspendit̄ lino modicis interuallis, postea arida frustra in cadum aceti quàm asperrimi pendentiā immerguntur, ita ne ulla parte uas cōtingant. Hoc fit ante Solstitium diebus quadraginta octo. Gypso deinde oblitus cadus, ponitur sub tegulis, totius diei solem accipientibus. Post cum numerū dierum tollitur uas, Scilla exhibitur, acetum transfunditur. Hoc clariorē aciem facit. Salutare est stomachi laterumq̄ doloribus, parum sumptum binis diebus. Sed tanta uis est, ut auidius haustum extinctæ animæ momento aliquo speciem præbeat. Prodest & gingiuis & dentibus, uel per se cōmanducata. Tineas & reliqua uentris animalia pellit ex aceto & melle sumpta. Linguae quoq̄ recens subiecta præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur pluribus modis in olla, quæ coniiciatur in clibanum aut furnum, uel adipe aut luto illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccat, deinde cōciditur, coquiturq̄ in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoq̄ purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vfus sic coctæ ad hydropicos. Ad urinam ciendam tribus obolis cum melle & aceto potē. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant ulcus, quibus innatet cibus. Ad tormina, regios morbos, tussim ueterem cum suspirio. Discutit & ex folijs strumas, quadrinis diebus soluta. Furfures capitis, & ulcera manantia illita, ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maximè uti coctionem faciat. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, & mixta resinæ. Semen eius lumborū dolori ex melle imponitur. Pythagoras Scillam in limine ianue suspensam, malorum medicamentorum introitum pel-
lere tradit.

784



STAPHIS AGRIA

Bismintz.

DE STAPHIDE AGRIA

755

CAP. CCCI.

NOMINA.



ΣΤΑΦΙΣ ἀγρία Græcis, herba Pedicularis & Pituitaria Latinis, officinis Staphisagria, Germanis *Bismünz*. Pedicularis autem Pituitariaque Latinis à uiribus quas habet, dicta est: erumpentibus enim è corpore pediculis ex oleo inuncta aduersatur, & cōmanducata feruore multam pituitam trahit.

Pedicularis quare dicta. Pituitaria unde.

FORMA.

Folia habet Labruscæ, incisuris diuisa, coliculos rectos, molles, nigrosque, flores latis similes, semen in uasculis uiridibus similibus Ciceri triangulū, asperum, in nigro subrufum, intus candidū, gustu acre. Hæc descriptio herbæ huic cuius hic effigiem damus per omnia quadrat, floribus tantum exceptis, qui minimè latis similes sunt, neque in colore, neque in quantitate. latis enim flores lutei sunt, & exigui, huius contrà subcasti, ac multò maiores, ut hinc ferè suspicer eam herbam non esse quam ueteres pingunt Staphida agrian. Cæterū cum proximè tamen ad picturam accedat, neque uiribus distet admodū, inter Staphidis agrias species rectè à plerisque hodie herbarie rei studiosis cōnumeratur. Folia enim fert plerumque septem, aliquando etiam paucioribus incisuris diuisa, coliculos rectos, nigros, & in folliculis herbaceis semen triquetrum, in nigro subrufum, intus candidum, gustu acre, ita ut illi omnes notæ, demptis floribus, respondeant.

LOCVS.

Nascitur, Plinio auctore, in opacis. Ea cuius picturam exhibemus, nunc passim in hortis plantatur.

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Quum urendi uim habeat Staphis agria, consequitur eandem in quarto ordine esse excalfacientium & desiccantium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eius grana quindecim si quis trita in aqua mulsâ dederit, crassa per uomitū purgant. Sed qui biberint, ambulare debent, Quinetiam assidue attendere oportet, & aquam mulsam potui dare, quod strangulationis pericula inferant, & fauces deurant. Trita eadem, & ex oleo inuncta, pediculationi, prurigini & scabiei auxiliatur. Plurimā cit pituitā cōmanducata. Decocta in aceto, dentium dolori, si ea colluantur, subuenit. Gingiuarū rheumatismū sistit. Ulcera oris, aphthas nominant, cum melle sanat. Miscetur præterea urentibus malagmatis.

EX GALENO.

Vehementer acrem obtinet facultatē, adeò ut ex capite purget pituitam, abstergatque ualenter. Itaque ad scabiē accommodata est. Sed & urendi uim aliquam habet.

EX PLINIO.

Nucleis eius ad purgationes uti non censuerim propter ancipitē strangulationē, nec ad pituitā oris siccandā: fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquū corpus liberāt triti. Facilius admixta sandaracha. Item pruritu & psoris. Ad dentiū dolores decoquuntur in aceto. Ad auriū uitia, rheumatismū gingiuarū, ulcera oris manantia. Flos tritus in uino contra serpentes bibitur. Semen enim abdicauerim, propter nimiam uim ardoris. Quidam eam Pituitariā uocant, & plagis serpentium utique illinunt. Item phthiriasi, qua Sylla dictator consumptus est. Nascuntur quoque in sanguine ipso hominis animalia exesura corpus. Resistitur Staphidis agrias succo, cum oleo perunctis corporibus. Hæc quidem in aceto decocta, etiam uestes eo tædio liberat.

786



SESELI
MASSILIENSE

Sescl.

NOMINA.



ΣΕΣΕΛΙ τὸ μαοσαλεωλεῖον Græcis, Sefeli Massiliense Latinis, officinis Siler *Siler montanū.* montanū dicitur. Semen tamen quod à seplasiarijs hoc nomine uenditur, non Massiliensis, sed, si amaritudinē respicias, Æthiopicū, uel, quod magis uero simile est, Peloponnesiacū (neutrius enim integram imaginē uidimus) Sefeli semen est: latius enim, odoratius, & carnosius Massiliensi existit, Germanis incognita hæctenus planta fuit, ob id Sefel rectē illam appellabunt.

FORMA.

Folia gerit Fœniculi, crassiora tamen, Caulem uegetiorē, umbellam Anetho similem, in qua semen est oblongum, angulosum, & degustanti confestim acre: radicem longam, & odoratam. Ex qua Dioscoridis delineatione satis constat stirpem, cuius picturam damus, esse Sefeli Massiliense, quod huic nimirum, nulla prorsus nota reclamante, tota descriptio suffragetur. Quid multa? dato etiam quod singulæ illi non responderent notæ, tamen cum eas quas ueteres Sefeli attribuerunt facultates obtineat, citra omne periculum pro eo usurparetur.

LOCVS.

Optimū iuxta Massiliam, teste Dioscoride, Galliæ urbem nascitur, unde etiam cognominatū est Massiliense. Prouenit autem alijs quoq; in locis calidioribus, & nunc in plerisq; Germaniæ hortis, sed non nisi satum & cultum.

TEMPVS.

Floret æstate, & semen subinde producit.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in secundo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen & radix calefaciendi uim obtinent, Stranguriæ, orthopnœæ, uteri suffocationibus & comitialibus pota medentur, Menfes & foetus ex utero ducunt, Interraneis omnibus profunt, & diutinas tusses sanant, Ipsum semen cum uino potum coctioni confert, tormina discutit, & epialis febribus utile est. Ad arcenda in itinere frigora cum pipere & uino bibitur. Datur capris alijsq; quadrupedibus bibendū, ut partus iuuat.

EX GALENO.

Sefeli & radix & semen usque adeo excalfacit, ut admodum urinā mouere queat. Sed & tenuium est partium, ut & comitialibus, & orthopnœis competat.

EX PLINIO.

Prodest homini ad tussim ueterē, rupta, cōuulsa, in uino albo potum. Item opiosthotonicis, & iecinorū uitijs, & torminibus, & stranguriæ, duarum aut trium ligularum mensura. Sunt & folia utilia, ut quæ partus adiuuent etiam quadrupedum. Hoc maximè pasci dicuntur ceruæ parituræ. Illinitur & igni sacro. Multum in summo cibo concoctionibus confert, uel folio, uel semine. Quadrupedum quoque aluum sistit, siue tritum potui infusum, siue mândendo cōmanducatum e sale. Boum morbis medetur, uel si contritum infunditur.



SANGVISORBA
MAIOR.

Groß Köhleskraut.

SANGVISORBA
MINOR.

Klein Köhleskraut.



NOMINA.



*Sanguisorba cur
dicta.*

*Error eorum qui
Pimpinellā cum
Sanguisorba con-
fundunt.*

VVM ignoraremus quo nomine stirpem hanc ueteres Græci & Latini, si modo ips cognita fuit, appellarint, maluimus interea uulgari uti nomen clatura, donec aliud certius nomen inueniremus. Elatinen tamen esse iudicarem, si folia pusilla, pilosa, & rotunda obtineret. Nunc quum neque pusilla, neque pilosa, neque rotunda, sed mucronata esse uideantur, certi statuere nihil possum. Sanguisorba uerò dicta est hæc herba, non quod uulneribus iniecta ferrū & spicula facile & citra sensum doloris exigat, ut nonnulli arbitrantur: id ipsum enim non posse mirifica quæ illi inest adstringendi facultas abundè ostendit: sed potius quod ei in sistendo sanguine undecumque emanarit, mira admodū in sit efficacia, adeo ut hunc ipsum quasi absorbere uideatur. Erroris autem huius nulla alia causa est, nisi quod hanc stirpem multi cum ea quæ hodie Pimpinella uocatur, confundant, quæ certè propter caliditatē quam obtinet haud exiguam, quandā etiam trahendi facultatē habere uidetur, adeo ut infixæ corpori extrahere facile queat. Quod uerò cum Pimpinella confuderint non alio factum est nomine, quàm quod huius folia proximè ad Pimpinellæ folia, quæ itidem ut hæc ferrata sunt, accedere uidentur. Sed hæc confusio non caret errore, ut paulò post dicemus. Germanis hæc herba *Blutkraut* / à capitellis quæ rufescentibus punctis maculata sunt, dicitur. Nonnulli etiam Germanorum *Hergots bårtilin* nominant, Quidam etiam à sistendo sanguine *Blutkraut*.

GENERA.

Duo sunt eius herbæ quæ Sanguisorba uocatur genera. Vna enim maioribus constat folijs ac longioribus, coliculis tamen tenuioribus, ideoque ab hac foliorū forma maior à nobis dicta est. Altera minoribus folijs, coliculis autem maioribus esse deprehenditur, quare ab ista foliorū effigie rectè minor appellari potest, ut inter eas aliquod discrimen esse herbariæ rei studiosi hac ratione animaduertant.

FORMA.

Herba est à radice crassa & longa, statim foliosa, minor potissimū, coliculos habens plurimos rubentes, folia aspera, in extremitatibus latè crenata & ferrata, in summo coliculorū capitella rufescentibus punctis maculata, quæ si hiant flores exeunt herbacei, in medio croceam comam ostendentes.

LOCVS.

Nascuntur locis incultis, aridioribus, & soli expositis. Vnde iterum colligere licebit non esse Elatinen, utcumque à facultatibus illius non discrepet, quòd Dioscoride & Plinio testibus, Elatine in cultis & segetibus proueniat.

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Gustantibus adstrictionē haud uulgarem ac uiscositatē herba præ se ferre uidetur. Quapropter siccam admodum consistentiā naçta est, simulque corpora contrahere, & constringere potest, atque adeo emplastica, eo quòd glutinosa sit, facultatem obtinet.

VIRE S.

Ex ips quæ diximus abundè constat utranque Sanguisorbam in restringendis ac suppressendis sanguinis profluuijs esse efficacissimas, adeo ut nonnulli constanter asserant, eas etiam manibus gestatas sanguinem undecumque manantē sistere posse. Experientia certè compertū est ad muliebre profluuiū sanandū, nullum posse reperiri præsentius ips stirpibus præsidium. Glutinant etiam uulnera illarū folia, carcinomatosisque & fistulis medentur. Generosum denique ac strenuum remediū eisdem esse ad dy.

A ad dysenterias, & reliquos uentris fluxus, si ex aqua aut uino bibantur, nemini non notum est. Quid multa? Elatines herbæ, cuius certè hæc duæ stirpes genus esse uidentur, facultates habent. Quare toto cælo errant qui herbas has, ut supra etiam commemoratum est, cum Pimpinella confundunt, quod hæc ipsa acris admodum sit & multum calida: illæ contra sapore, haud secus atq; Elatine, adstringente. Verum non tantum differunt facultatibus, imò etiam odore, coloreq; foliorum, maximè uerò florum diuersitate, ut quiuis ex utriusq; herbæ picturæ collatione statim deprehendet.

Pimpinella nõ folium facultatibus, uerum etiam forma à Sanguiforba diuersa.

DE SCOLYMO CAP. CCCIIII

NOMINA.



ΚΟΛΥΜΟΣ Græcis, Carduus & Strobilus Latinis, Columellæ Cinara dicitur. Sunt qui hodie Arcocum corrupta uoce nominent, primam uocis syllabam articuli uice præponentes. Alij paulò rectius Alcocalum uocant: Cocali siquidem nomine, nux pinea, cui Scolymi capitulum simile est, uenit. Nunc uulgo herbariorum ab articulo statim duabus interioribus literis Articolalus, aut expuncta uocali a, Articoclus, uel magis curtato, ut ferè fit, uocabulo, Articolus uel Articoa nuncupatur. Germani instar uulgi Articoa nominabunt, aut Strobilodon. Strobilum autem Romani hanc stirpem non alia ratione dixerunt, quàm quod eius capitulum, ut diximus, structili nucleorum serie pineam nucem referre uidetur. Cinaram uerò sunt qui appellatam putent, quod satum & cultum cineribus gaudeat. Alij à Cinara potius puella, quæ in eius speciei Carduum mutata est, dictam esse uolunt.

Carduus.
Strobilus.
Cinara
Alcocalus.
Cocalus.

Articolalus.
Articoa.
Strobilus curdicia.
Cinara quare appellata.

FORMA.

Folia habet Chamæleontis, & spinæ albæ uocatae similia, nigriora tamen ac crassiora. Caulem emittit oblongum, foliosum, in quo capitulum spinosum. Radicè uerò nigram & crassam. Hæc Dioscorides. Cæterum caput eius & uertex in squarosum extuberat globum, corticosis unguibus turgentem, spicisq; squamatim coagmentatum, quorum orbis exterior uiret, interior niueo candore nitescit. Flos purpureo rutilat colore, qui tandè euanescit in pappos. Caput uetustate tandem disilit in corticeas laminas, semen ostendens Cnici figura. Nos tamen integrâ Scolymi faciè ac picturâ hoc tempore dare non potuimus, quod primo anno fructum suum nõ ostendat. Curabimus autem alio tempore ut studiosi integram eius habeant picturam.

LOCVS.

Nusquam, quod sciam, in Germania prouenit Cinara, nisi sata & culta. Quare Scolymus qui in hortis colitur & plantatur, uerè Cinara existit. Quod ideo monendum esse duximus, quia inter Græcos esse constat, ut est Paulus & Aërius, qui Scolymum à Cinara discriminant. Non est autè aliud inter eas stirpes discrimen, quàm quod Scolymus ferus est & syluester, Cinara uerò domita cultu, ideoq; à nonnullis Carduus altilis nominatur.

Scolymus horatensis propriè Cinara dicitur.

Scolymus.
Cinara.
Carduus altilis.

TEMPVS.


Quum Solstitium æstiuum agitur, Scolymi flos erumpit, Hesiodo in lib. ij. cui titulus Opera & dies, teste, qui ea florente cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audissimas, uirosq; in coitum pigerrimos, capite, genibus, ac toto corpore præ Sirij æstu arefcntibus, scribit.

TEMPERAMENTVM.

Quæ secundum qualitatem editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamentum indicat, siccum uerò in secundo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Scolymi illita graueolentiam alarum, & totius corporis emendat. Item si decocta in



SCOLYMVS

Stroblhorst.

A cta in uino bibatur. Urinā etiam copiosam fecundamq̃ pellit. Herba cum recens nascitur tenerescitue, asparagorum modo in olera transit.

EX GALENO.

Scolymi radix copiosam urinam graeolentē elicit, si quis eam in uino coctā bibat: ideoq̃ graeolentiā sanat, tum alarum, tum totius corporis. Atq̃ hoc sanè medicamēto ex tota inest essentia, utpote eius succo existente purgatorio. Et in libro secundo de alimentorū facultatibus: Praui succi edulium est Cinara, præcipuè cum iam durior euaserit: tum enim biliosi humoris copia abundat, totaq̃ eius substantia durior existit, adeoq̃ ut ex ipsa melancholicus, ex succo uerò eius tenuis & biliosus humor producat. Proinde coctam edere præstiterit adiecto Coriandro, dein ex oleo, garo, uinoq̃ sumatur. Si tamen in patina aut sartagine ad esum præparetur, absq̃ ijs comedatur, Plerique enim sic eius ueluti cacumina comedunt, quæ spondylos nominant,

EX PLINIO.

Urinam ciere Scolymum præcipuè traditur. Sanare lichenas & lepras ex aceto. Venerè stimulare in uino, Hesiodo & Alceo testibus, qui florente ea cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis auidissimas, uirosq̃ in coitū pigerrimos scripsere, uelut prouidentia naturæ hoc adiumento tunc ualentissimo. Item graeolentiā alarū emendat radicis emedullatæ uncia, in uini falerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balneo ieiuno, itemq̃ post cibum cyathis singulis pota. Mirū est, quod Xenocrates promittit experimento, uitium id ex alis per urinam effluere.

DE SPHATVLA FOETIDA

CAP. CCCV.

NOMINA.



ERBA quam officinæ Sphatulam foetidam uocant, quod grauem exhalet odorē, quomodo ueteribus sit appellata nondum certò scire possum. Nomen quidem ipsum Xiphij seu Gladioli speciem esse docet: Sphata siquidem Latinis gladium significat. Non esse autem Xiphium radix eius euidenter admodū ostendit, quæ non est bulbosa, nec gemina, ita ut altera alteri insideat, sed capillamentis fibrata. Neq̃ etiam Sparganiū esse partim folia eius quæ in terram non procumbunt, partim etiam semina, quæ non in pilulis, sed folliculis aut siliquis profert. Non uidetur etiam esse Xyris, quod illa radicem habeat longam & rufam, Sphatula uerò foetida nec longam nec rufam, sed rotundam, albam & capillatam. Tamen quicquid sit gentilem ijs esse foliorum similitudine constat. Germani eam *Wandteußer* aut à necandis cimicibus appellant.

Sphatula foetida cur dicta.

sphata.

sphatula foetida non est Xiphium.

Non est Sparganium.

Non est Xyris.

FORMA.

Folia Iridi similia habet, minora tamen & angustiora. Caulem ex se mittit, in cuius summo folliculos aut siliquas Pæoniæ sceminae non dissimiles profert, quibus dehiscuntibus semen in ijs apparet rotundum & rubrum. Radicem obtinet capillamentis multis fibratam.

LOCVS.


Circa sepes & dumeta nascitur, frequens in Italia, nusquā tamen in Germania, quod sciam, nisi fata prouenit.

TEMPVS.

Fructum seu siliquas suas autumnò profert, ac subinde in ijs, ubi dehiscunt, semen ostendit.

TEMPERAMENTVM.

Vehementer ærem qualitatem obtinet, adeò ut gustata, fauces quasi urere uideatur. Proinde calidam & siccam admodum esse constat.



SPHATVLA
FOETIDA.
Wandkleeſtraut.

VIREs.

Non multum à Staphidis agricæ uiribus abesse apparet: ualenter enim abster-
git. Hinc ad scabiem, eius potissimū succus, abigendam utilis est. Surculos etiam &
spicula, perinde atque Xiphium & Xyris, sine dolore extrahit. Cimices quoque ne-
cat atque fugat.

DE TRICHOMANE CAP. CCCVI

NOMINA.



TRICHOMANES græcè, Trichomanes, Capillaris latinè uocatur. Of-
ficinis Polytrichon falso dicitur: id enim nominis Adianto herbe,
quam hodie Capillum Veneris uocant, Dioscoride & ueteribus
alijs testibus, debetur. Germanicè Widertodr/oder Abthon ap-
pellatur. Trichomanes autè à facultate sua Græci nominauerunt,
quod scilicet fluentem capillum expleat, & subnasci faciat: *μυώνυ*

*Polytrichon offi-
cinarum.*

*Trichomanes
cur dictum.*

Capillaris.

enim ea gens rarum uocant, *τρύχ* autem capillum. Hoc etiam nomine Capilla-
rem Latini dixerunt.

FORMA.

Filici simile est Trichomanes, paruum admodum. Ex utraq; parte ordine quo-
dam folia habet tenuia, Lentis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splen-
descendentibus, subnigris & auferis. Cuius equidem descriptionis notæ omnes, nulla
penitus reclamante, herbæ illi quam hodie officinæ Polytrichon uocant, pulchrè
quadrant. Siquidem cauliculis iunceis, quincuncialibus, à radice statim penè folia-
ris constat, folijs rotundis, lenticulæ forma, aduersis inter se pediculis, ramulis sub-
nigris & nitentibus, sine flore, sine semine.

LOCVS.

Nascitur in palustribus atque umbrosis locis, humentibus muris, & iuxta fon-
tes, haud secus atque Adiantum.

TEMPVS.

Carpitur æstate & autumnii initio.

TEMPERAMENTVM.

Trichomanes in caliditate quidem & frigiditate symmetrum est, uerum desic-
cat, extenuat & digerit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.


Eadem potest quæ Adiantum. Cum itaque Adiantum aliunde in Germaniam
sit deportandū, & Trichomanes passim proueniat, licebit hoc in alterius inopia uti.
Et consultius multò ut Trichomane utantur officinæ, quàm Adianto adulterino.
Prodest igitur Trichomanis decoctū potum asthmaticis, dyspnoicis, felle suffusis,
lienosis, urinæq; difficultatibus. Calculos frangit. Aluum sistit. Venenatorū mor-
bus, & stomachi fluxionibus in uino potum medetur. Menses & secundas ducit,
sanguinis autem reiectiones sistit. Crudum illinitur uenenatorū moribus. Alope-
cias explet, strumas disijcit. Furfures & achores cum lixiuio exterit. Cum ladano,
myrtino, fusino, aut hyssopo & uino capillos defluentes continet. Decoctū etiam
eius cum lixiuio & uino si eo abstergantur, idem potest.

EX GALENO.

Alopecias densat, & strumas & abscessus discutit, lapidesq; frangit potum. Vi-
scosorum crassorumq; ex thorace pulmoneq; excreationibus non mediocriter con-
fert. Ventris profluuiū sistit, nullam tamen manifestam caliditatē affert, sicut nec
frigiditatem.

EX PLINIO.

Calculos è corpore mirè pellit, frangitq; utique nigrum. Qua de causa potius
quàm quod in saxis nasceretur, & à nostris Saxifragum appellatum crediderim.



TRICHOMANES

Widerodt.

A Bibitur è uino quantum terni decerpere digiti. Vrinam cient, Serpentiũ & araneorum uenenis resistunt. In uino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex ijs sedat. Contra scolopendræ morsus illinuntur, crebrò auferendi ne pereant. Hoc & in alopecijs. Strumas discutunt, furfuresq; in facie, & capitis manantia ulcera. Decoctum ex his prodest suspiriosis, & iecinori, & lieni, & felle suffulis, & hydropicis. Stranguriæ illinuntur, & renibus cum Absinthio. Secundas cient & menstrua. Sanguinem sistunt ex aceto, aut Rubi succo poti. Infantes quoque ulcerati perunguntur ex ijs cum rosaceo & uino prius. Folium in urina pueri impubis, tritum quidẽ cum aphronitro, & illitum uentri mulierum, ne rugosus fiat, præstare dicitur. Perdices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in cibum eorum additis, pecoriq; esse utilissimos.

DE TELI CAP. CCCVII.

NOMINA.



HAΪΣ, κεραιίτις, αἰγώνος, βόνος Græcis, Fœnumgræcũ Latinis: officinæ genuinum nomen retinuerunt: Germanis *Bockshorn* / oder *Kühorn* dicitur. Magna græcarum appellationũ pars à siliquarum quas producit figura desumpta est: hæ enim corniculis similes existunt. Hinc Ceraitis à cornu simpliciter dici cœpit: κέραις enim Græcis cornu est. Aegoceros autem à caprini cornu similitudine, quemadmodum à bubuli Buceros, quod sanè nomen Theophrastus libro quarto de historia plantarum illi imposuit. Cum itaque corniculis similes habeat siliquas, factum est ut illam Columella simpliciter Siliquã nominauerit, Plinius Siliciam, Varro Siliculam.

Ceraitis cur
dicitur.
Aegoceros
Buceros.

B

FORMA.

Cauliculis emicat exilibus, rubicundis, folio penè Trifolij, flore candido & exiguo, femine in siliquis oblongis, ac cornu instar incuruis fuluo. Radice subrotunda & oblonga innititur.

LOCVS.

Satum Fœnogræcum passim ferè prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, & unà siliquas producit. Semen tamen in Augusto maturum legitur.

TEMPERAMENTVM.

Fœnumgræcum calidum est secundi ordinis, desiccatur primo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Molliendi & disijciendi facultatem habet Fœnogræci farina. Facit ad inflammationes quæ intus forisq; sunt si cum aqua multa decocta trita illinatur. Lienem cum nitro & aceto subacta & illita minuit. Decoctũ eius in fessu ad muliebria mala, quæcunque per inflammationes aut præclusiones consistunt, utile est. Expressus Fœnogræci in aqua decocti succus, capillos, furfures & achores exterit. Cum anserino adipe pefsi uice apponitur, loca quæ iuxta uterum sunt emolliens & relaxans. Viride cum aceto imbecillis & exulceratis locis prodest. Decoctũ eius aduersus tenebricosos, & grauiter olentia dysentericorũ excrementa confert, Oleum eius cum myrtino capillos & in genitalibus cicatrices abstergit.

EX GALENO.

Fœnumgræcũ feruente inflammationes irritat. Quæ uerò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

EX AETIO.

Fœnumgræcũ habet etiam abstergendi uires. Varijs modis comeditur, sed copiosius sumptum caput tentat, At cremor decocti Fœnogræci cum modico melle

xx 3 exhibi,

798



FOENOGRAECVM

Bockshorn.

A exhibitus, omnes deprauatos intestinorū humores educit. Permodicū esse oportet quod permiscetur mel, ne erodat. In diuturnis uerò doloribus qui sine febris thoracem infestant, pingues simul palmulæ elixantur, inde succo expresso melleq; admixto suppositis carbonibus rursus decoquuntur usq; ad congruam consistentiam. Datur id diu ante cibum, obseruariq; oportet ne ijs exhibeatur quibus faciliè caput dolet; palmulæ enim capiti infestæ sunt.

EX PLINIO.

Vis eius siccare, mollire, dissoluere. Succus decocti sceminarum pluribus malis subuenit: siue duritia, siue tumor, siue contractio sit uulug, fouentur, insidunt. Insu sum quoq; prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur. Item ex aceto, Siciecinori decoctū. Diocles difficilè parientibus semen eius dedit acetabuli mensura tritum in nouem cyathis sapæ ad tertias partes bibere, ut qui biberent in calida lauarentur. Et in balneo sudantibus dimidiū ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquum, pro summo auxilio. Farinā Fcenogræci cum hordeo aut lini semine decoctam aqua mulsa cōtra uulug cruciatus subiecit. Itemq; imposuit imo uentri. Lepras, lentigines, sulphuris pari portione mista farina curauit, nitro antè preparata cute, sæpius die illinens, perungi q; præcipiēs. Theodoros Fcenogræco miscuit quartā partem purgati Nasturtij acerrimo aceto ad lepras. Damion Fcenogræci semen acetabuli dimidia mensura cum sapæ & aquæ nouem cyathis ad menses ciendos dedit potu. Nec dubitat quin decoctū eius utilissimum sit uuluis, interaneisq; exulceratis, sicuti semen articulis atq; præcordijs. Si uerò cum Malua decoquatur, postea addito mulso potus, ante cætera uuluis interaneisq; laudatur: quippe cum uapor quoque decocti plurimū proffit. Alarum etiam graueolentiā decoctum Fcenogræci semen emendat. Farina porrigines capitis furfuresq; cum uino & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem decocta addita axurgia genitalibus medetur. Item parotidi, podagre, chiragre, articulis, carnibusq; que recedūt ab ossibus. Aceto uerò subacta luxatis. Illinitur & lienii decocta in aceto, & melle tantum. Carcinomata subacta ex uino purgat, mox addito melle perfanat. Sumitur & sorbitio è farina ad pectus exulceratū, longamq; tulsim. Diu decoquitur donec amaritudo desinat, postea mel additur.

DE TELEPHIO CAP. CCCVIII.

NOMINA.



ΗΛΕΦΙΟΝ, ἢ ἀσίζωρον ἄγριον Græcis, Telephiū & Illecebra Latinis, officinis & uulgo Crassula maior appellatur. Sunt qui Fabam crassam, à foliorū quam cum faba habent similitudine, nominēt. Germanis Wundttraut / Knabenttraut / Fozzwang / Fozwein dicitur. Telephiū uerò dictum est, quod ulceribus malignis & deploratis, quibus Telephus Mysiæ rex ab Achille uulneratus consenuit, quæ eam etiam ob rem Telephia uocantur, auxilietur.

Crassula maior
Faba crassa.

Telephium unde dictum.


Telephia ulcera.

GENERA.

Dioscorides duo genera facit. Vnum floribus albis, quod nobis Telephiū album nominare placuit, germanicè Wundttraut das weible. Alterum floribus luteis, quod Norimbergæ me uidisse memini. Damus pro illo Telephiū purpurascens appellare uoluimus, germanicè Wundttraut das mennle. Præter flores qui in primo candidi sunt, in hoc autem purpurascens, foliorum etiam colore differunt, qui in candido uiridis & herbaceus existit, in purpurascens autem paulò pallidior. Cætera omnia in ijs similia apparent, folia potissimū, quæ fabacea prorsus sunt, nisi quod pinguiora, & crassiora existunt.


Telephium album.

Telephium purpurascens.



TELEPHIUM
ALBUM.

Wundkraut weiblich.



TELEPHIUM
PURPURASCENS.

Wundkraut mennle.

C

FORMA.

Folijs & caule Portulacæ similis herba Telephium. Alas binas in singulis foliorum geniculis inhærentes habet. Ramuli à radice seni septemive prodeunt, referri folijs cœruleis, crassis, glutinosis, carnosis; flores illi lutei, uel albi, uel purpurascens: radix ima, quod Dioscorides omisit, innumeris tuberibus scætet. Non est autem cur diuersum Telephiũ hoc nomine ab ea herba, quam herbarij hodie Crassulam maiorem nominant, suspicemur, cum omnes reliquæ notæ à Dioscoride cõmemoratae, illi adamusim conueniant. Et solenne certè est Dioscoridi ut multas notas, in his potissimũ herbis quæ ipse non uidit, atque adeo ex aliorũ fide pingit, easq; maximè quidem necessarias omittat, & silentio transeat. Quibus etiã accedit locus natalis, & facultates Telephij, quæ eadem sunt cum ijs quæ Crassulæ maiori recentes herbarij adscribunt. Sunt qui alterum acetabulũ esse putent, quorum sanè sententiam non admodum absurdam esse iudico.

LOCVS.

Nascitur inter uites, locis cultis & incultis humidis.

TEMPVS.

Vere statim profilit, Iulio autem & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Telephiũ exicat ordine secundo intenso, aut certè principio tertij, nõ tamen insigniter calida, uerum in hoc forsã quispiam ipsum primi esse ordinis censeat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia senis horis illita, albas uutiligines sanant; sed oportet postea hordeacea farina illinere locum. Quinetiã alphos tollunt cum aceto in sole inuncta. Sed ubi inauerint, absterguntur.

D

EX GALENO.

Telephiũ detergendi & exiccandi facultate est præditũ; proinde ad putrida ulcera conuenit, & leucas & alphos cum aceto sanat.

EX PLINIO.

Illinitur lentigini, & cum inaruit teritur. Illinitur & uutiligini, ternis ferè mensibus senis horis noctis aut diei, postea farina hordeacea illinitur. Medetur & uulneribus & fistulis.

APPENDIX.

Recentiores herbarij sua Crassula maiori in curandis uulneribus, & sistendo sanguinis profluuiũ utuntur, ut eandem esse cum Telephio uel hoc saltem nomine nemo dubitare debeat. Magna autem efficaciam habere in internis potissimũ uulneribus & ulceribus, mirificeq; herniosis prodesse ijdem tradunt.

DE TRINITATIS HERBA

CAP. CCCIX.

NOMINA.



Iouis flos.
Herba Trinitatis
unde dicta.


Iaced.

VO nomine priuatim planta hæc Græcis aut Latinis appellata sit medicis, ignorare me fateor. Constat tamen Violæ inodoræ genus esse, & mea quidem sententia Iouis florem. Vulgus à triplici colore floris, herbam Trinitatis nominat. Sunt qui laceam, & herbam clauellatã appellant. Germani Dreyfeltigeyer blümen, & Freyschamtrant uocant.

FORMA.

Herba hæc folio est initio rotundo, per ambitum serrato, processu temporis oblongiore, cauliculo triangulo, intus cauo, leuiter striato, ex interuallis geniculato, prodeuntibus ex alarum sinu pediculis longis, in quibus summatim elucent flores

figura



HERBA TRI
NITALIS,

Fryschamkraut.

C figura & specie uiolarum purpurearū, superiore parte purpurei, in medio candidi, inferiori uerò lutei, radijs quibusdam nigris distincti, Quibus decidentibus semina protuberant.

LOCVS.

Sua sponte in aruis interdum prouenit. In hortis tamen ut plurimum plantatur, speciosiorq; nascitur.

TEMPVS.

Vere uiola hæc post purpuream emicat, & tota æstate floret.

TEMPERAMENTVM.

Herba in gustu lentorem quandam, atque modicam acrimoniam seu mordacitatem præ se fert, atque adeo à Symphyti temperamento non admodū abesse uidetur, id quod etiam ex facultatibus quas illi recentiores tribuunt facillè apprehenditur. Calida itaque & sicca est.

VIRE S.

Quum acrimonie ratione incidendi uim quampiã habeat, ideo rectè recentiores asthmaticis, pulmonisq; phlegmonibus prodesse tradunt: collectū siquidem in thorace & pulmone pus expurgare potest. Hac ratione puerorum etiam comitialibus morbis auxilio esse solet. Ceterū non parum ad pruritū & scabiem confert, omniaq; cutis uitia emendat, idq; mediocris acrimonie & siccitatis ratione. Ulcera etiã, quia uiscositate obtinet, glutinare potest.

DE TEVTLO CAP. CCCX.

NOMINA.

D
Σβύτλον unde
dictum.
Beta cur dicta.



ΒΕΥΤΛΟΝ, ἢ σβύτλον Græcis, Beta Latinis appellatur. Germanis Wangelolt / oder Pießer. Σβύτλον autem Græci ab impulsu nominarunt, etenim cultus ratione quadam incrementū capesit arboris, neque ulli horrentium latitudo foliorū maior. Betæ nomen sibi adsciuit, quoniam figuram ἑ literæ græcæ dum semine turget referre uidetur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtinet. Id quod testatū nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu horrorum ita canens:

*Nomine tum graio, ceu litera proxima primæ,
Pangitur in cera docti mucrone magistri,
Sic & humo pingui ferratæ cuspidis iclu
Deprimitur folio uiridis pede candida Beta.*

GENERA.

Candida Beta. Eius à colore omnes duo genera faciunt, candidam & nigram. Candida alio nomine Sicula, ut Theophrastus libro octauo de historia plantarum, & Plinius libro decimonono, capite octauo, memoriæ prodiderunt, appellatur. Et nunc extrita litera una ferè omnibus nostri seculi medicis Sicla nominatur. Germanicè weisser Nigra Beta. Wangelolt, Nigra ad atrum uidetur tendere colorem, & à Germanis roter Wangelolt uocatur.

FORMA.

Caulem habet striatū, bicubitalem, folium ferè triplicis, flores exiguos luteos, semē in caulibus copiosum: radicē unicam in longum protensam, è cuius lateribus alia, modò singulæ, modò binæ, nonnunquã ternæ fundunt, fibris multis refertæ.

LOCVS.

In hortis passim, & cultis locis nascuntur Betæ,

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floribus & semine turgent.


TEMPERA-

BETA CAN
DIDA.

Weisser Mangolt.



YY



BETA
NIGRA.
Roter Mangold.

TEMPERAMENTVM.

A Nitrosa qualitate particeps est. Nigra tamen adstrictionis quippiam adiunctū habet, & magis in radice quàm in alijs partibus, Symeon Seihi calidam & siccam esse in tertio ordine asserit.

VIREs, EX DIOSCORIDE.

Nigra Beta cum lente cocta aluum efficacius cohibet, multoq; magis radix. Candida aluo utilis est. Vtraq; uerò propter nitrosam uim quam habet mali succi est, Vnde succus earum cum melle naribus inditus caput purgat, Auriū etiam doloribus auxiliatur. Decoctū radicum & foliorum, furfures & lendes deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis folijs alphos nitro prius perfrictos, alopecias prurientes, atq; depascentia ulcera illini prodest. Cocta exanthematis, erysipelatis, & ambulantis medetur.

EX GALENO.

Beta nitrosæ facultatis est particeps, qua tum extergit, tum digerit, & per nares purgat. Cæterum cocta nitrositate omnem exiit, fitq; facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter discutientis. Porrò ad detergendū digerendumq; ualidior est Beta alba. Nam nigra adiunctū habet quippiā adstrictionis, & magis in radice quàm alijs partibus. Beta itaq; absterforius inesse succus conspicitur, adeò ut aluum ad excretionem extimulet, & nonnunquā stomachū demordeat, præsertim ijs quibus ille sensilior obtigit; eoq; largius commansa, stomachum infestat. Huius ceu aliorum oleorum, exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quàm Malua, aptius accommodatur, magis autem ubi cum Sinapi estur, aut aceto, Lienosos item similiter manducata, mirificè iuuat.


EX PLINIO.

B Nec Beta sine remedio est utraq;. Siue candidæ, siue nigræ radix recens & madefacta, suspensa funiculo, contra serpentū morsus efficax esse dicitur. Candida Beta cocta, & cum Allio crudo sumpta, contra tineas. Nigræ radices ita in aqua coctæ, pruriginē tollunt, atq; in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores ueteres & uertigines, item sonitum aurium sedat, infusus ijs. Ciet urinā. Medetur dysentericis iniecta, & morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus. Et contra serpentium ictus ualet, sed huius radici duntaxat expressus. Ipsa uerò decocta, pernionibus occurrit. Albæ succus epiphoras sedat, fronte illita. Aluminis pauco admixto, ignem sacrum. Sine oleo trita licet, adustis medetur. Et contra eruptiones papularum cocta. Eadem contra ulcera quæ serpunt. Illinitur & alopecijs cruda. Et ulceribus quæ in capite manant. Succus eius cum melle naribus inditus, caput purgat. Coquitur & cum lenticula addito aceto, ut uentrem molliat. Validius cocta, fluctuationes stomachi sistit & uentris.

EX SYMEONE SETHI.

Eius succus mediocriter abstergit. Hic etiam uentrem ad effluxū proritat, & stomachum aliquando uellicat, eorum præsertim qui hunc ualde sensilem obtinent. Quapropter edulium est stomacho infestum, si plurimū comedatur. Exiguum est eius alimentū, sicut cæterorū olerum. Vtilis uerò est ad iecoris obstructiones cum aceto comesta. Pari modo si edatur, & lienis obstructionib. bonum fit medicamentum. Constat autem Beta ex contrarijs facultatibus. Succus enim eius calidus est, uentrem constringit, & sitim asserit. Eius uerò corpus crassarum partium, flatuosum, concoctu difficile & frigidum, uentremq; sistit, maxime si aqua in qua coctum est, subinde abijciatur.

808



TINCTORIVS FLOS

Silbblüm.

DE TINCTORIO FLORE

809.

CAP. CCCXI.

NOMINA.



N herba hæc ueteribus cognita fuerit nondum compertū habemus: quapropter ad germanicam alludentes appellationē, Tinctoriū florem interim dum certius nomen nacti fuerimus, nominabimus. Germani *Gilb* oder *Streich* oder *Serbblimen*/ quod florū illius in tingendis libris & alijs quibusdam usus sit, nuncupant. Sunt qui *Ackerpsimmen* uocant.

FORMA.

Genistæ non admodū dissimilis est hæc herba: ramos enim herbaceos, ut illa habet, ac scabros, folia tamen paulò longiora & latiora, ad Hyssopi ferè formam accidentia, florem luteum, Piso similem, semen in siliquis Lenticulæ haud ab simile, radicem planè ligneam.

LOCVS.

Prouenit locis altis, incultis & aridis, atque pratis nonnullis.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atque deinceps semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Amara est, haud aliter quàm Genista, ut calefacere illam & siccare in altero ordine sit euidentissimum.

VIREs.

Vt forma & temperamento Genistæ similis est, sic etiam facultatibus haud dubiè eidem respondet. Has igitur suo loco reperies.

DE TORDYLO CAP. CCCXII.

NOMINA.



ΟΡΥΛΟΝ, ἢ τordύλιον, ἢ σέσλι κρητικόν Græcis: Tordylon & Tordylion, & Sefeli Creticū Latinis, Paulus Gordylion appellat. Germanis *Beerwurz* dicitur, ut supra in capite de Dauco quoque diximus. Nam cum Dauci semen hirsutum sit, utcunq; cætera respondeant, hoc uerò minime, non est cur Daucum esse credamus.

Sefeli Creticum.

FORMA.

Fruticosa est herbula, semen habens rotundū, geminatum, clypeo simile, subacre & odoratum. Quæ sanè omnes notæ huic herbæ, quæ à Germanis *Beerwurz* dicitur, respondent, ut eius pictura, quam in capite de Dauco reperies, abundè docet. Hanc autem propter radicum similitudinē inter Daucorum effigies habere locum uoluimus.

LOCVS.

Nascitur in Amano Ciliciæ monte. In multis etiam Germaniæ nostræ locis copiosissimè prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calfacit & exiccat, ut ex facultatibus eius abundè colligere licet.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Potum eius semen contra urinæ difficultatē, & ducendis mensibus prodest. Succus uerò caulis seminisq; adhuc uirentis trium obolorum pondere haustus decem diebus in passo, nephriticos sanat. Efficax etiam radix; cum melle siquidem linctā, quæ in thorace sunt educit.

C

EX PAVLO.

Gordylon alij Sefeli appellant, urinæ & mensibus ducendis habile. Radix ipsius ex melle linctâ, quæ in thorace hærent, educit.

EX PLINIO.

Combusta potu ciet menses, & pectoris excreationes, efficaciore etiamnum radice. Succus eius ternis obolis haustus renes sanat. Additur radix eius & in magmata.

DE TITHYMALIS CAP. CCCXIII.

NOMINA.



Lactaria herba
cur nominata.

Lactuca caprina
quare uocata.

ΙΟΥΜΑΛΟΣ, ἢ τιθυμάλου Græcis, Lactaria herba, & Lactuca caprina aut marina Latinis, barbaris & officinis Esula, Germanis Wolffsmilch dicitur, Lactariâ autem herbam cōmuni appellatione, ob cōmune omnibus lac, uniuersum hoc genus uocauerunt. Lactucam uerò ob eandem causam, quia scilicet ex hac herba haud secus atq; ex Lactuca secta lac fluit, Caprinam, quod capræ Tithymalis uescantur.

GENERA.

Septem sunt, Dioscoride & alijs ueteribus testibus, Tithymalorum genera. Primus Characias, id est, uallaris dicitur, quod uallis septisq; muniendis idoneus sit. Secundus Myrsinites, à Myrti foliorū figura: aut à nucibus, quibus similē fert fructum, Caryites nominatur. Hunc fructum sunt qui Nucem uomicam, Germanis Kronâglin uocatam, esse putent. Tertius Paralius, id est, marinus, quod in maritimis nascatur, appellatur. Quartus Helioscopius, hoc est, solisequus, quia eius coma ad solis cursum circumagitur, nominat: germanicè Sonnenwendede Wolffsmilch uocari potest. Alijs nominatur groß Wolffsmilch. Quintus Cyparissias à Cupressi similitudine nuncupatur. Germanicè cypressene Wolffsmilch nominari potest. Sextus Dendroedes, à ramorū copia dicitur. Septimus Platyphyllos, id est, latifolius, à latitudine foliorū nominatur. Germanicè breytletterte Wolffsmilch/ alij groß Teuffelsmilch uocant. Nos ex ijs generibus tria tantum depicta damus, quod reliqua uidere nondum nobis licuerit. Proferent fortè alij longè plura.

FORMA.

Nos ea tantum genera quorum picturas exhibemus, omisis alijs, describemus. Helioscopius itaque Portulacæ similia folia obtinet, tenuiora tamen atque rotundiora. Ramos autem à radice prodeuntes quatuor aut quinque mittit, dodrantales, tenues & rubentes, copioso lactis liquore plenos. Caput huic est Anetho simile, & semen ueluti in capitulis inclusum. Circumagitur huius coma cum sole, unde & Helioscopij nomen accepit. Cyparissias caulem emittit dodrantalem, aut maiorem, subrubrum, ex quo germinant folia pini similitudine, teneriora tamen ac tenuiora. Et in uniuersum pino nuper natæ similis est, unde & nomen traxit. Abundat hæc etiam succo candido Platyphyllos Verbasco similis est, longioraq; reliquis folia habet.

LOCVS.

Helioscopius in ruderibus potissimum, & circa oppida nascitur. Cyparissias in campestribus frequentissimus occurrit. Platyphyllos uerò in syluis.


TEMPVS.

Semē Tithymalorū autumnō legitur, succus uerò in incipiente pomorū lanugine.

TEMPERAMENTVM.

Vincentem habent acrem calidamq; facultatē, incst uerò & amaritas. Ex quarto itaque calefacientium sunt ordine, & ualenter desiccant,

VIRES.



TITHYMALVS
HELIOSCOPIVS,

Sonnenwendede Wolffsmilch,



TITHYMALVS
CYPARISSIAS.

Cyp:essene Wolffsmilch.



TITHYMALVS
PLATYPHYLLOS.

Breytblettere Wolffsmilch.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

C Vim habet Characiæ liquor lacteus aluum per inferna purgandi, pituitã & bilem ducens, duorum obolorũ pondere ex posca sumptus. Cum melicrato autem uomitum cit. Appetente uindemia lacteus colligitur liquor. Depilat liquor hic recens ex oleo in sole inunctus, renascentesq; flauos & exiles efficit, tandemq; omnes destruit. Cauernis dentium inditur, leuatq; doiores: sed cera dentes oblinendi, ne effluens fauces aut linguam uitiet. Idem inunctus myrmecias, acrochordonas, thymos & impetigines tollit. Valet etiam aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas, gangrænas, fistulasq;. Semen & folia eadem lacteo succo præstant, dimidij acetabuli pondere pota. Radix drachmæ pondere cum hydromelite insparfa & pota, per inferna purgat. Decocta cum aceto, colluto ore, dentiũ dolori auxiliatur. Helioscopius eandem priori uim habet, non tamen usque adeo intentã, Nec diuersam facultatem obtinent Cyparissias & Platyphyllos.

EX GALENO.

Validissimus Tithymalorũ liquor est. Secundũ locum tenet semen & folia, Sed & radix earundem facultatum particeps est, sed non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentiũ sanat, maximè qui illis erosio proueniũt. At liquores ut qui ualentiorẽ uim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur. Cæterum si aliam corporis partem contigerint, continuo adurunt, ulcerantq;: quapropter foris illis cera circumlinitur. Sic pilos quoque succus inunctus tollit. Porrò quum uehementior sit, oleo miscetur: & si id sæpe fiat, tandem prorsus radices pilorum adustæ corrumpent, corpusq; depile reddetur. Eadem facultate myrmecias, acrochordonas, pterygia & thymos auferunt, detergentq; lichenas & pforas, quia scilicet abstergendi illis facultas inest, propter amaritudinẽ. Præterea ulcerum phagedanica, anthracæde & gangrænoide, quia ualenter calefaciunt & abstergunt, si in tempore & moderatè quis utatur, iuuare poterunt. Verumenimvero & fistularũ callos, eadem facultate adimunt. Porrò hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerrimè nanque ab illis in uertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Cæterum quum septem sint eorum genera, ualentissimus est quem Characiam nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur ad modum arboris: deinceps qui Verbasco adsimilis est, & Cyparissias: post Paralius, denique Helioscopius, Proportionẽ uerò comprehensæ illorum facultatis & cinis & lixiuium erit.

EX PLINIO.

Tradunt toties purgari hydropicos fico sumpta, quot guttas lactis Characię exceperit. Est & semen in usu cum melle decoctum ad catapotia soluendæ alui gratia. Semen & dentium cauis cera includitur. Colluuntur & dentes succo radici decoctæ in uino aut oleo. Illinunt & lichenas succo, bibuntq; eum ut purgent uomitiones, & aluo soluta, aliàs stomacho inutilem. Trahit pituitã sale adiecto in potu, bilem aphronitro. Si per aluũ purgari libeat, in posca: si uomitione, in passo aut aqua mulsa. Media potio tribus obolis constat. Ficos à cibo sumpsisse melius est. Fauces urit leniter. Est enim tam feruentis naturæ, ut per se extrã corpori impositũ, pustulas igniũ modo faciat, & pro caustico in usu sit. Helioscopius trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo. Cæteri usus qui Characiæ, Cyparissia eadem uis quæ Helioscopio aut Characiæ, Platyphyllos pisces necat, aluum soluit, radice uel folijs, uel succo in mulso, aut aqua mulsa drachmis quatuor, Detrahit priuatim aquas.



TRIFOLIUM
ODORATUM.

Sibengezeit.

NOMINA.

Trifolium odora-
tum cur dictum.



ΤΡΙΦΥΛΛΟΝ Græcis, Trifolium odoratū Latinis, officinis simpliciter Trifoliū dicitur. Germanis Sibengezeit/propterea quod singulis diebus septies odorē suum habeat, & toties etiam amittat, quandiu in horto creuerit. Decerptum enim & exiccatum, odorem suum perpetuò retinet. Qui certè pluuiosa temporis constitutione ac tempestate instante multò uehementior est, sic sanè ut totas ædes, in quibus hæc herba reposita est, odore suo compleat. Potest etiam appellari cōmodissimè *woltrichender Klee*.

FORMA.

Frutex est cubito altior, uirgas habens tenues, nigris, iunceisq; adnascentijs multis præditas, in quibus folia Loto arbori similia sunt, terna in singulis germinationibus. His recens enatis odor Rutę inest, auctis uerò iam, bituminis. Florem emittit purpureum, semen modicè latum & subhirsutū, ex altero extremo apicem obtinens. Radix illi tenuis, longa, ualida. Ex qua quidem deliniatione fatis constat herbam, cuius picturam damus, esse Trifolium odoratum: siquidem cubito altior est, caules tenues obtinens, unde ramusculi multi nigricantes quodammodo, ac iuncea oriuntur, qui singuli terna folia producant odorata. Flores etiam habet in purpureo cœruleos. Semen quoq; Milio haud dissimile in folliculis modicè latis, pilosis, & in summitate aculeum habentibus, profert. Radicem deniq; longam, candidam ac ualidam habet, ut prorsus nihil sit quod descriptioni non respondeat.

LOCVS.

Sponte sua in Germania non prouenit. Satum uerò nulla difficultate prodit.

TEMPVS.

D Iulio mense floret, ac subinde semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est & siccum in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen & folia in aqua pota lateris dolore laborantibus, difficultati urinæ, comitialibus, incipienti aquæ inter cutem, uuluaq; strangulationibus auxiliantur. Menses etiam ducunt. Oportet autem seminis tres, foliorū uerò quatuor drachmas dare. Succurrunt & uenenatorū morsibus folia trita cum oxymelite & pota. Referūt quidam, si totius fruticis, radice & foliorū decocto foueantur facti ex serpentū morsibus dolores, eos mitigari. Si uerò alius ulcus habens eodem illo decocto quo quispiam sanatus fuerit foueatur, eadem sentit quæ morfi à serpentibus. Dant quidam etiā in tertianis bibenda folia eius tria, aut totidē semina cum uino, in quartanis autē quatuor, ueluti quæ circuitus soluere possunt. Miscet uerò eius radix & antidotis.

EX GALENO.

Triphyllum potum laterum dolores ab obstructione natos iuuat, urinā & menses prouocat.

EX PLINIO.

Trifolium scio credi præualere contra serpentū ictus & scorpionū, ex uino aut posca, seminis granis uiginti potis, uel folijs, & tota herba decocta, serpentesq; nunquam in Trifolio aspici. Præterea celebratis autoribus cōtra omnia uenena pro antidoto sufficere uiginti quinque grana eius.

APPENDIX.

Debet eius Trifolij odorati usus esse subinde in omnibus officinis, quod mirificè uenenis aduersetur, & ad ulcera malefica sananda perquam utile sit.



817

TRIFOLIUM PRATENSE
PURPUREUM.


Braun Wyszetlee.

ZZ



TRIFOLIUM PRATEN
SE ALBUM.

Weiß Wysesle.



819

TRIFOLIUM PRATEN-
SE LVTEVM.

Geeler Wyfentlee.

ZZ 2

DE TRIFOLIO PRATENSI

CAP. CCCXV.

NOMINA.



ΤΡΙΦΥΛΛΟΝ ἢ χέριον πέντας ἡνθώμιλον Græcis, Trifolium pratense Latinitinis dicitur. Officinæ latinum nomen retinuerunt, & simpliciter Trifolium uocant. Vtendum uerò illis esset odorato Trifolio, quemadmodum altero abhinc capite diximus. Germanis *Wysentlee* nominatur.

GENERA.

Tria genera pratensis Trifolij.
Purpureum.
Candidum.
Luteum.

Tria apud nos passim in pratis prouenientia Trifolij inueniuntur fastigia, quorum primum à floribus purpureis, Trifoliū pratense purpureū, germanicè *braunt Wysentlee* / alterum itidem à floribus suis candidis, Trifoliū pratense candidum, germanicè *weiß Wysentlee* / & tertium luteum, germanicè *geel Wysentlee* appellauimus. Quod ad folia ipsa attinet, non admodum differunt: quoduis enim horum generum tribus constat folijs, quæ in primo sunt latiora & herbacea, in secundo autem longiora & angustiora, magisque palleſcentia candidantiæ. In tertio sunt minorra & rotunda, atque ad Fœnigræci folia accedentiã. Sunt qui hoc genus Lagopum esse putent. Sed de Lagopo suo diximus loco.

FORMA.

Caulem rotundū, cubitalem obtinent, ramos exiles, folia per interualla tria: flores in summo aut purpureos, aut candidos, aut luteos; radicē longam & lignosam.

LOCVS.

Scatent ijs prata omnia, unde etiam nomen nacta.

TEMPVS.

D Florent Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Adstrictiorē cuiusdam qualitatis sensum in gustu præ se ferunt, non tamen multum admodum, ut nihilominus sint tenuium partium & exiccatoria, quandoquidem etiam exigua quasi acrimonia prædita uideantur.

VIRE S.

Haud dubiè mediocriter concoquendi & exiccandi uim possident, ut non temerè quidam ex recentioribus herbarijs tradant, Trifolia hæc albo muliebri profluuio mirificè conferre. Eadem etiam inflammationibus imposita, eas cōcoquant, & ad maturationem perducunt.

DE TRAGOPOGONE

CAP. CCCXVI

NOMINA.

Hirci barba.



ΤΡΑΓΟΠΟΓΟΝ, ἢ ἡνθὸν Græcis nominatur, Latinis Hirci barba, & Coma: officinis ignota est herba. Germanis *Bocksbart* & *Gauchbrot* dicitur. Hieronymus herbarius Braunschuuigenſis magno errore hypocisthida in hac herba nasci putauit. Sic autē eam Græci uocarunt, quod à calyce eius promissæ pendeant barbæ, uel rectius quod lutei illius flores in uolucres barbulas euancſcant.

Tragopogon curdica.

FORMA.

Caulem habet exiguum, longum tamen, & bicubitalem interdum, geniculatū, folia Croco similia, radicem longam & dulcem, supra caulem calycem magnum, & in eius summo semen nigrū, florem luteum, qui in canescentes barbulas fatiscit. Hæc etiam cum carpitur lacte manat.

LOCVS.

Sua sponte in pratis nascitur.

TEMPVS.



821

TRAGOPOGON

Beck's bart.

ZZ 3

C

TEMPVS.

Maio & Iunio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedo quæ in radice ac tota ferè planta apparet, satis monstrat eam esse caliditate tepida præditam, & modicè humidam.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Herba & cruda & cocta edendo est.

APPENDIX.

Ex recentiorum traditione, & temperamenti ratione, æstuanti stomacho utilis est herba, thoracis & iecoris vitrijs, renum item & vesicæ malis, Succus eiusdem mirificè laterum doloribus auxiliatur.

DE TYPHA▷ CAP▷ CCCXVII▷

NOMINA.



TYPH Græcis, Typha Latinis, officinis inusitata, Germanis *Moss/ oder Narrentolb* dicitur. A nonnullis *Knospen vnd Liesen*.

FORMA.

Foliū profert Cyperidi simile, caulem læuem, enodem, cuius in summo capite flos obducitur densus, euadens in pappum seu lanuginem. Quæ descriptio huic plantæ sic quadrat, ut nulla sit nota quæ reclamet. Folio siquidem Cyperidis erumpit, caule alto, læui, plano, enodi, cuius cacumen densa florum congerie stipatur, & ueluti spissa cingitur lanugine, quæ in pappos tandem euanescit.

LOCVS.

D Gignitur in palustribus & stagnantibus aquis.

TEMPVS.

Iulio mense caulis lanosa floccorū densitate obducitur, Augusto autem in pappos abit, & euanescit.


TEMPERAMENTVM.

Quantum ex uiribus eiusdem colligi potest, non euidenter, potissimū eius flos, calefacit & refrigerat, modicèq; abstergit, atque adeo exicat. Quum enim ambustis medeatur, & ambusta, Paulo libro quarto, capite undecimo teste, medicamenta quæ mediocriter citra insignem caliditatem aut frigiditatem abstergunt, requirant, sequitur hoc quale diximus temperamentum obtinere.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Flos eius cum suillo adipe uetusto eloto exceptus ambustis medetur.

DE TVRCICO



TYPHA

Narrenfolben.

zz 4

NOMINA.

Turcicū frumentum cur dictum.



HOC frumentum, ut alia multa, ex eorum est genere quæ aliundè ad nos translata sunt. E Græcia autem & Asia in Germaniam uenit, unde Turcicum frumentum appellatū est: Asiam enim uniuersam hodie immansissimus Turca occupat. Germani etiā ad loca unde affertur respicientes, Turcisch Korn nominant.

GENERA.

Quatuor huius frumenti reperiuntur genera. Quoddā enim grana rufa, quoddam uerò purpurea, aliquod lutea, aliquod subcandida grana profert. Spicarū seu panicularum etiā in ijs est diuersitas: etsi enim omnes muticæ sint, tamen alia candidos, alia luteos, alia purpureos, prout scilicet grana colorata erunt, flores obtinet. Aliās, quod ad formam attinet, in ijs nulla est differentia.

FORMA.

Culmum habet crassum, rotundum, altum longūmque, infima eius parte purpureum, geniculis interfectum: folia oblonga & harundinacea, in summitate paniculas, aut spicam muticam, & granis uacuam, instar Secales florentē, nunc luteo, nunc candido, nunc purpureo colore, prout fructus quem profert coloratus est. Fructū uerò & grana triangula, diuersis iam cōmemoratis coloribus tincta, in foliaceis, rotundis ac crassis membranis ac uaginis, quæ è lateribus geniculorum ferè singulorū prodeunt, contenta obtinent, coaceruata ac penitissimè iuncta, in q̄ octo aut decem uersus ordine digesta. E fastigio uaginarū capilli tenues, iam candido, iam luteo, nunc purpureo colore maculati dependent, ut pictura satis ostendit, que **D** unica quidē tibi omnia genera repræsentabit. Hæc in una uagina quatuor tibi granorum colores monstrat, cum tamen quæuis unius duntaxat coloris grana, nempe aut lutea, aut purpurea, aut rufa, aut subcandida omnia habeat. Quod nos, ne aliquem pictura deciperet, monendum esse duximus.

LOCVS.

E Græcia uel Asia, ut dictum est, primū ad nos peruenit, Nunc autem passim in omnibus hortis prouenit.

TEMPVS.


Seritur mense Aprilī, nec nisi sub finem Augusti & initia Septembris ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedinē & lentorem quendam grana gustu præ se ferunt, ut haud dubiè idem cum Tritico habeat temperamentum.

VIRE S.

Cum idem cum Tritico habere uideatur temperamentū, easdem etiam obtineat facultates necesse est. Grana itaque teruntur in candidissimam farinam, quæ in panificia subinde cogitur. Panis tamen ille lentioris quiddam & obstruentis nature habet. Hinc est quod in Asia & Turcia illius nullum in cibo usum esse, nisi cum anno-næ premit inopia, dicunt. Cæterum foliorum succum refrigerandi facultatem obtinere tradunt, hinc ad erysipelata utilem admodum esse coniiciunt.



TVRCICVM
FRUMENTVM.
Turckisch Korn.

C

NOMINA.

Serpillum Romanum.

Thymus unde dictus.



YMOΣ Græcis, Thymus Latinis, herbarijs uulgaribus Serpyllū Romanum, haud dubiè ab odore quem cum Serpyllo cōmunem habet, dicitur. Officinæ antiquum nomen retinuerunt. Germanis Thym / & Römischer quendel uocatur, Thymus autem Græcis ab excitando, quod *θύειν* dicunt, nomen inuenit. Nonnullis potius hoc placet etymum, ut Thymos quasi thyæmos, hoc est, sanguinem impellens dicatur.

FORMA.

Thymus furculosus frutex est, minutis multis & angustis folijs circumdatus, in summo capitula floribus purpureis referta habens. Ex qua sanè deliniatione omnibus conspicuū fit, herbam cuius picturam damus esse Thymum. Dodrantalis enim & furculosus frutex est, folijs exiguis, flosculis ex purpura candicantibus, suauissimi odoris, capitella specie complicatarū formicarum, radice lignosa, enascentias uirides multas obtinente, quibus in terra radicatur.

LOCVS.

Nascitur petrosis & tenuibus locis: neque enim locum pinguem, neq; stercoreatum, sed apricum desiderat. Nunc in hortis multis Germaniæ prouenit.

TEMPVS.

Floret serò, quod Theophrastus etiam libro sexto de historia plantarū, capite secundo testatur, circa Solstitia, cum & apes decerpunt, & auguriū mellis est.

TEMPERAMENTVM.

Thymus uehementer calefacit. Itaque in calefaciendo & exiccando in tertio ordine statuendus est.

D

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Potus cum sale & aceto, pituitā per aluum ducit. Decoctū eius cum melle orthopnoicis & asthmaticis prodest. Lumbricos uentris, menses, fetus & secundas pellit. Urinam ciet. Mixtus melle in eclegmate, excreabilia efficit thoracis uitia. Recentia cedemata cum aceto illitus discutit. Sanguinis grumos dissoluit. Thymos & uerucas pensiles tollit. Ischiadicis cum uino & polenta impositus auxiliatur. Hebetibus oculis in cibo sumptus opitulatur. Vtilis etiā pro condimento in sanitatis usu.

EX GALENO.


Thymus incidit, & calefacit manifestè: ob id & urinā & menses prouocat, scetum euellit, & uiscera potus expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert.

EX AETIO.

Hæc experimentis de Thymo comperta sunt. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho. Bilem enim reliquosq; humores atq; acrem saniem euacuat. Facit & ad uescæ mata. Ventre inflatis, ubi intumescere cœperint, drachmā unam dato ieiuno cum cochleari aquæ mulsæ. Ad lumborū coxendicumq; dolorem, laterisq; & thoracis, ac hypochondriorū suspensiones, ac inflationes, pondere trium drachmarū cum oxymelite temperato, mensura cochlearij ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timoreq; detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati cochleari præbeto. Dato item ieiunis & ante cenam aduersus lippitudinē, & uehementem oculorum dolorē. Præterea contra podagram, etiam quæ motum omnino interceperit, cum uino utilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes, ieiunis trium drachmarum pondere exhibeatur.

EX PLINIO.

Oculorū claritati multum conferre existimatur, & in cibo, & in medicamentis. Item diutinæ tussi eclegmate faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguinē concrefcere non patitur è melle. Longas faucium destillationes extrā illita cum Si-
napi,



THYMVS

Römisch quendel.

C napi, extenuat: item stomachi & uentris uitia. Modicè tamen utendum est, quoniã excalfacit, quamuis sistat aluum: quæ si exulcerata sit, denarij pondus in sextarium aceti & mellis addi oportet. Item si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace. Præcordijs medentur ex aceto cum melle: quæ potio datur & in alienatione mentis & melancholicis. Datur & comitalibus, quos correptos olfactus excitat Thymi, Aiunt & dormire eos oportere in molli Thymo. Prodest & orthopnoicis & anhelationi, mulierumq; mensibus retardatis. Vel, si emortui sint in utero partus, decoctum in aqua ad tertias. Viris uerò contra inflationes, cum melle & aceto. Et si uenter turgeat, testésue aut uesicæ dolor exigat. E uino tumores & impetus tollit impositū. Item cum aceto, callum & uerrucas. Coxendicibus imponitur cum uino. Articularibus morbis trium obolorū pondere in tribus cyathis aceti & mellis. Et in fastidio, tritum cum sale.

DE TEUCRIO CAP. CCCXX

NOMINA.

Teucrium uide
dictum.



Teucrium hoc di
uersum ab He-
mionitide, quod
multi non obser-
uant.

ΕΥΚΡΙΟΝ, ἢ χερμαίδριος Græcis, Teucrium Latinis appellatur. Officinis ignotum. Germanis groß Bathengel dicitur. Teucrium autem uocatum est Græcis pariter & Latinis, quod Teucer Aiacis frater hoc inuenit. Inuentum uero ab eo sic tradit Plinius. Quum exta in sacrificio super id proiecta fuissent, lienī adhæsit, eumq; exinaniuit. Proinde quod casus ostendat, obseruatumq; à Teucro fuit, ad æternū humani beneficij decus & famam illi accreuit. Diuersum tamen hoc Teucriū ab Hemionitide, quod à Plinio etiam Teucrium appellari diximus. Chamædrydrys autem nominata est hæc herba, quod Chamædry simillima sit, adeo ut uicissim etiam Chamædrydrys hoc nomine, ut suo dicemus loco, dicta sit Teucrium. Maius tamen est Teucrium quam sit Chamædrydrys,

D ut merito Germanis groß Bathengel nuncupari queat.

FORMA.

Herba est uirgæ referens effigiem, Chamædrydrys similis, tenui folio, non multum Ciceri dissimile. Hæc quanquã breuissima sit Teucrij delinatio, tamẽ abundè monstrat herbam hanc, cuius picturã exhibemus, esse uerum Teucriū, cum nihil Chamædrydrys magis simile dici queat, si diligenter utriusq; plantæ notas expendas.

LOCVS.

Nusquam, quod sciam, sponte sua in Germania prouenit. Satum tamen copiose nascitur. In Cilicia plurimum habetur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, ac subinde semen producit.

TEMPERAMENTVM.

In secundo excalfacientium, tertio autem exiccantium existit ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


Viride cum posca potum, aut aridum decoctum ac haustum, lienem potenter minuit. Lienosis cum ficis & aceto illinitur. Venenatorum autem moribus cum aceto sine ficis.

EX GALENO.

Teucrium incidendi, & tenuium partium facultatis est, quare lienes sanat.

EX PLINIO.

Recens Teucria in posca, uel sicca deferuefacta, potu lienem efficaciter cõsumit. Item ex aqua illinitur. Pota arida & decocta quantum manus capiat, in aceti heminis tribus lienī medetur. Ad uulnus illinitur eadem cum aceto, aut si tolerari non possit, ex fico uel aqua, Serpentium plagis imponitur cum aceto tantum.




TEUCRIVM

Großbathengel.

aaa

C

NOMINA.



Perforata.

Androsæmon.
Chamæpitys.

Euga dæmonū.

ΠΕΡΙΚΟΝ, *ἀνδρόσαμον, χαμαίπυτος* Græcis, Hypericū Latinis dicitur. Nomen latinum in officinis seruat. Vulgus herbariorū Perforatam uocat, quod folia soli obiecta innumeris foraminibus scateret, & omni ex parte punctis quibusdā pertundi uideantur. Herbam quoq; diuī Ioannis appellant. Germanis S. Johans traunt nominatur. Androsæmon ob florem eius qui digitis confricatus sanguineū emittit liquorem, dixerunt. Chamæpitys uerò ab odore feminis resinaceo nominata est. Fugam dæmonū aliqui, quod superstitione quadam inducī, fugare posse dæmones crediderint, appellauerunt.

FORMA.

Folia Rutæ similia habet, furculosus frutex, dodrantalis, rubescens. Florem luteum, qui digitis attritus sanguineum emittit succum, qua ratione Androsæmon, quasi humanum dixeris sanguinē, appellatur. Siliquas gerit subhirsutas, in rotunditate oblongas, hordei magnitudine, in quibus semen nigrum, resinam obolens. Cuius nimirum descriptionis notæ ita herbæ illi, quam Perforatam uocant nostri temporis herbarij, respondent, ut nemo nisi prorsus præfracto sit animo Hypericū esse deinceps reclamare possit. Siquidē furculosa est herba, dodrantalis, subrubens, folio Rutæ, flore luteo, quem si digitis libeat terere, manus profectò inuenies sanguineo succo cruentatas. Siliqua denique terete, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo itaq; in Perforata inueniuntur, quæ esse Hypericū certam tibi faciūt fidem, cruentus nempe floris triti succus, odorq; feminis resinaceus, qui diuersum sentiunt haud dubiè Marcelli Florentini interpretatione falsa seducti sunt, qui flore albo constare Hypericum asserit, cum tamen in Dioscoride sit, *ἄβουλον* hoc est, florem luteum habens.

Marcelli Florentini erratum.

D *ἄβουλον*, hoc est, florem luteum habens.

LOCVS.

Gignitur in cultis, & asperis locis.

TEMPVS.

Aestate floret, Julio potissimum & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Hypericum calefacit & exiccat, tenuisq; substantiæ est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, menstrua ducit appositū. A tertianis quartanisq; cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta.

EX GALENO.

Menses & urinas prouocat: sed ad hæc totus fumendus est fructus, non tantum semen. Cum folijs illitis uiridis ad cicatricem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Cæterū si sicca contusa inspergas, humida & putredinosa ulcera sanabis. Sunt nonnulli qui ischiadicis bibendum exhibent.

EX PLINIO.

Natura semini Hyperici spissandi. Aluum sistit, urinam cit, ad calculos uesicæ cum uino bibitur.




HYPERICVM

S. Johans kraut.



aaa

NOMINA.

Altercum.  **Hyoscyamon uin de dictum.** **Apollinaris.** $\Theta\varsigma\kappa\upsilon\alpha\mu\omicron\varsigma$ Græcis, Hyoscyamus, Apollinaris Latinis dicitur. Arabibus Plinius Altercū uocari testatur. Officinis corrupta uoce Iusquia-mus dicitur. Germanis *Bilsamtrant* uel simpliciter *Bilsen*. Hyoscyamon autem Græci uidentur appellare quasi fabam suillam aprinām ue, quod, ut in historia sua Helianus inquit, pastu huius herbe conuellantur sues apri-ue, præsentī mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Adeuntq̄ aquas non ut proluant se tantum, uerumetiam ut caneros uenentur: ijs enim nactis protinus sanitati restituantur. Atque hinc est quod à nonnullis etiam Germanis *Sewbon* nominetur. Apollinarem uerò Latini ab Apollīne medicīnæ inuentore dixerunt.

GENERA.

Niger Hyoscyamus. Tria sunt Hyoscyami genera. Vnum purpureos fert flores, folia Smilaci similia, semen nigrum, cytinos duros & spinosos. Hoc nigrum herbarij appellant. Alterū **Flauus.** flores luteos ceu māli effigie, folia & siliquas teneriores, semen subflauū ceu Iriont **Albus.** flauum uocant. Et hoc est quod pictum damus. Tertium utile ad medicinam, placidissimum existens, pingue, tenerum, lanuginosum, flore & semine candido: album nominant. Quod si uerò illud non adfit, utendum flauo erit. Nigrum ut deterrimum improbandum.

FORMA.

Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, incisa, nigra, hirsuta. Per caulem deinceps flores prodeunt ueluti māli punici cytini, clypeolis septi, semine, ut Papaueris, plenis. Quid multa: frutex est tristi aspectu, folio lato, longo, pingui, **D** hirsuto, uenoso, & laciniato: caulibus crassis, è quorum latere flores prodeunt tanquam mālorum punicorum cytini, muricatis calycibus, ramos continua serie uescentibus, semine intus Papaueris refertis.

LOCVS.

Primum genus in Galatia nascitur. Alterum passim circa littora, & inter ruinas & rudera prouenit. Tertium in maritimis & rudibus.

TEMPVS.


Semen nullum nisi postquam inaruerit legendum. Floret ferè per integrā æstatem, potissimum Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Candidus ex tertio quodammodo ordine refrigerantium est. Reliqua duo genera uenenosa.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Exprimitur succus ex tenero semine, folijs, caulibusq̄, in quem usum tunduntur omnia, expressusq̄ in sole siccatur. Vfus eius ad annum usq̄: facile enim putrescit. Exprimitur priuatim etiam succus ex arido semine, aqua calida perfuso, tuso & expresso. Est uerò succus liquore prestantior, & magis dolores finit. Herba autem uirens contusa, & trimestri farinæ mixta in pastillos cōformatur & reconditur. Prior uerò succi expressio, & quod à sicco semine exprimitur, collyrijs dolorem lenientibus cōmodè miscetur, & contra acres calidasq̄ fluxiones, dolores aurium, & uuluae uitia. Cum farina autem aut polenta, contra oculorū, pedum, aliasq̄ inflammationes. Semen eadem potest. Facit ad tussim, destillationē, oculorum fluxionē, uehementes dolores, muliebria profluuiā, aliasq̄ sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaueris semine, & aqua mulla potum. Confert podagrīs, testibus inflatis, mammisq̄ à partu turgentibus, si tritum cum uino illinitur. Miscetur utiliter & alijs cataplasmatibus dolorem leuantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per se, & cum polenta mixta utiliter illinuntur, Recentia ad mitigandos omnes



HYOSCYAMVS
FLAVVS.

Bilsam.

C omnes dolores illinunt. Tria aut quatuor cum uino pota, hepialas febres sanant. Decocta olerū modo, & triblij mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si in colo ulcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

EX GALENO.

Hyoscyamus cuius semen atrum est, insaniam & soporem affert. Huicis cui semen mediocriter flauum est propinquam facultatē obtinet, Fugiendi autem utriq; sunt ut inutiles & uenemosi, Ceterū cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes uel maximē idoneus est.

EX PLINIO.

Hyoscyamū contra canum morsus ualet, inq; uulnera cum melle imponit. Contusum cum folijs ex uino datur peculiariter contra aspidas. Bius succus sanguinem excreantibus medetur. Nidor quoq; accensū tuhsientibus. Vius feminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & caulibus folijsq; utuntur, & radice, temeraria in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiam folijs constat mentem corrumpi, si plura quàm quatuor bibantur. Etiam antiqui in uino febrē depelli arbitrabantur. Et oleum fit ex semine, quod ipsum auribus infusum tentat mentem.

DE HYACINTHO ▷ CAP▷ CCCXXII▷

NOMINA.



AKINΘOZ Græcis, Hyacinthus Latinis, officinis incognitus, Germanis *Blaw Werdzenblümlin* / quod uidelicet cum Viola purpurea in Martio & primo uere erumpat, appellatur.

GENERA.

D *Albi Hyacinthi.* Duplices sunt Hyacinthi, albi & cœrulei, ut ex hoc Columellę carmine colligi potest: Necnon uel niueos, uel cœruleos hyacinthos. Albos uerò non intelligas profusus candidos, sed eos potius qui si cum cœruleis cōferas pallefcere uidentur, quemadmodū pictura affabre tibi demonstrat. Germani album fecminā, sicut cœruleum marem uocant. Sunt qui ad ætatem hanc differentiam coloris referre uolunt, quorum ego sententiā ueriorē esse existimo: cum enim adolescunt, pallefcere incipiunt. Cœruleū autem Hyacinthū nostra terra triplicem producit, ut ē pictura manifestē cernere licet: maximū, maiorem, & minorē. Minor floribus differt plurimū à maiore: in illo enim maiores ac patientiores, in hoc autē minores & quasi orbiculati sunt flores. Omnibus autem descriptio, ut ex ijs quæ statim subijciemus planū fiet, pulchrē conuenit, ut hinc congeneres herbas esse consjcere cuiuis liceat.


FORMA.

Folia Bulbo similia habet, caulcm dodrantalē, leuem, minimo digito tenuiorē, uiridem, comam adiacentē incuruam, plenam florum purpureorū, radicē & ipsam bulbosam. Hęc certē descriptio ita picturis quas damus quadrat, ut nulla profusus sit eius nota quæ illas nō appositisimē exprimat. Folia siquidē Bulbi protinus à radice prodeunt, caulis dodrantalis, leuis, & minimo digito tenuior, herbaceus, comaprocumbens incurua, plena florum purpureorū, radix bulbacea. Verū possit aliquis cauillari, hos quos descripsimus flores non esse Hyacinthos, quod in ijs discurrentibus uenis græcarū literarum figura *AI*, ut Plinius lib. xxi. cap. xi. prodidit, & Poëtæ fabulantur, haud inscripta legatur. Cui sic respondemus: Hyacinthū, quem Dioscorides & alij historici describunt, diuersum esse ab eo de quo Poëtæ fabulantur. Cuius rei testis est Pausanias, qui refert florē qui natus est extincto Aiace apud Salamina, non esse Hyacinthū, sed literis Hyacintho similem uideri, ex candido rubentem, ac Lilio minorem, quemadmodū Ouidius, itemq; Virgilius describunt. Idem etiam autor Cosmofandalon dici florē apud Hermionenses, Trecentijs con-

fines


Ouidius xiiij. metamor. Ipse suos gemitus folijs inscribit, & ac ac flos habet inscriptum, fumes tag, litera ducta est.

Theo Idyll. Nūp. Et da. ad r. p. r. a. a. g. d. d. i. s. u. e. r. i. t. a. n. d. o. t.




HYACINTHVS COERV
LEVS MAXIMVS.

Blaw Wergenblüm die gröffer.




HYACINTHVS COERV-
LEVS MAIOR.

Blaw Mergenblümlein die kleiner.



HYACINTHVS COERVLEVS
MAS MINOR.

Blaw Herzenblümmele.



HYACINTHVS ALBICANS SEV
FOEMINA

Blawmergenblümlin weiblich.

A fines testatur. Cum itaque constet duplicem esse Hyacinthum, alterum rubentem, cum literis illis inscriptis, qui à Poëtis describitur; alterum uerò purpureū seu cœruleum (nihil enim refert utrum dixeris, quod Dioscorides per purpureum colorem uiolaceum dilutū, hoc est, clariorem & apertiorē, quem cœruleum uocamus, intellexerit: nam & Plinius lib. xxxvij. cap. ix. Hyacinthi colorem uiolaceū dilutum uocauit) sine literis, à Dioscoride alijsq; historicis descriptū: nihil enim Dioscorides in suo Hyacintho de literis cōmeminit: Haud igitur temerè in Virgilio ferrugineos hyacinthos, non cœruleos, sed rubentes ad similitudinē ferruginis quispiam interpretabitur, potissimum cum Poëtarum Hyacinthus, non cœruleus, sed rubens sit, quemadmodū alibi Virgilius & Pausanias docuere. Rubet etiā color ferrugineus. Neque obstat quod Nonius ferrugineos hyacinthos cœruleos interpretatus est: is enim cœruleū tantum Hyacinthū nouerat. Quod si uerò hæc morosis quibusdā non probabuntur, sed prorsus funestas literas inscriptas esse contendant, ijs ita responsum uolo. Quas in Hyacintho literas appellant Poëtæ, ueras non esse, sed potius notas quasdam nigras, id quod hinc palam fit. Plinius lib. xvij. cap. xij. ubi de leguminibus loquitur, literas lugubres in flore etiam fabæ ex sententia M. Varronis reperiri tradit, in quo tamen flore non literas ulla, sed nigras tantum notas, ut res ipsa & pictura docent, inspicere licet. Quod si nec ista satisfecerint, dicemus tum penitus fabulosum esse quod regum nominibus inscriptum Poëta, florem hunc canit. Si enim id credendū erit, credendum etiam quod idem ex puero transformato natus sit. Vel, quod uero similis est, de regijs floribus appellationib; Poëta iocum struxisse uidetur, cum pastorem inducit scilicitanē, quibus in terris inscripti nomina regum nascuntur flores: sunt enim complures flores quibus à suis inuentoribus regibus nomina sunt indita. Neq; nunc ulla prorsus regū permultorū extaret memoria, nisi in florū nomenclaturis, qui nominibus regum inscripti sunt, asseruaret.

Hyacinthos
poëticos.

Hyacinthos
scordis.

Ferruginei Hyacinthi qui apud
Virgilium.

Virgilius Ecol.
tertia: Et suauis
rubens Hyacinthos.

Literæ in Hyacintho
quales.

Virg. Dic quibus
in terris inscripti
nomina regū
nascuntur flores.
Ecol. iij.

LOCVS.

Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod Galli, apud quos, Plinij etiam testimonio, eximiè prouenit, ut in suis cōmentarijs de Natura stirpium uir eruditione clarus Ioannes Ruellius autor est, nemoralem uel agrestem cepam nominent. Et eius certè magna est copia uerno tempore in nemore haud procul à uico Luschnau iuxta Tubingam sito, ut uel ex natali etiam satis constet flores hos quos pictos exhibemus, esse genuinos Hyacinthos.

Ruellius.
Agrestis cepa.

TEMPVS.

Vere, mensibus nimirū Februario & Martio, cum uiola purpurea, Theophrasto lib. vi. de Stirpium historia, cap. ultimo teste, erumpit: hinc Martium florem Germanis nostris dictum esse supra monstrauius. Hoc potissimū tempore prorumpit is quem Hyacinthū minorem nominauimus. Exit etiam, eodem Theophrasto autore, cum Gladiolo, qui uernus etiam flos est. Quo sanè tempore is maximè floret, quem maiorem appellauimus. Proinde cum tempus etiam cōueniat, nemo est qui deinceps ueros esse Hyacinthos, dubitare meritò possit aut debeat.

Martius flos.

TEMPERAMENTVM.

Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi uerò completi, aut incipientis in refrigerando. Semen autem tertio quadantenus ordine desiccatur, in medio caliditatis & frigiditatis consistens.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hyacinthi radix pueris cum uino albo illita impuberes seruare creditur. Sistit aluum, Pota urinam ducit, & phalangiorū morsibus auxiliat. Semen magis adstringit, & cœliaciis prodest. Potum cum uino regium morbum emendat.

EX GALENO.

Radix pueros diutissimè seruare impuberes in uino illita creditur. Semen regio morbo affectis in uino exhibetur.

EX PLINIO.

C

EX PLINIO.

Radix Hyacinthi in uino dulci illita pubertatē coërcet, & non patitur erumpere. Torminibus & araneorū morsibus resistit. Urinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumq; regium, semen eius cum Abrotono datur.

DE HYSSOPO. CAP. CCCXXIII.

NOMINA.



ΣΣΝΡΟΣ græcè, Hyssopus & Hyssopū latinè, Officinæ nomen legitimum retinuerunt. Germanicè *Jspen/oder Jsoy* uocatur.

GENERA.

Hortensis.
Montana.

Duūm generū Dioscoridi Hyssopus est, hortensis & montana, Hortensis quæ in hortis prouenit, ac culinarū causa colitur, garten *Jspen* Germanis uocatur, Montana quæ in montibus nascit, & germanicè *birg Jspen* appellari potest.

FORMA.

Hortensis & non
sua Hyssopus est
uera & genuina.

Herba est pedali altitudine hortensis, fruticosa, folio Satureiæ fatiua, floribus in cœruleo purpurascens, thyrsos spicæ modo uestientibus, radice longa & lignosa. Montana priori haud dissimilis est. Errant qui nostram Hyssopum hortensem non esse ueram putant: habet enim planè folium origani, nisi quod angustius est. Nec plures sunt eius apud Dioscoridē notæ. Nam quæ de umbella quidam obijciunt, nihil ad Hyssopū attinent, cum simpliciter scribat Dioscorides, Origanum non habere umbellam rotæ speciem obtinentem, Id quod uerum est.

LOCVS.

In hortis, ut diximus, hortensis, in montibus uerò montana nascit, Cæteris præfertur quæ in Tauro monte prouenit.

TEMPVS.

Æstate floret, quo etiam potissimum tempore carpenda uenit.

TEMPERAMENTVM.

Hyssopū calefacit & desiccatur ordine tertio: sed & tenuium est partium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet extenuandi & calefaciendi. Decocta cum ficis, aqua, melle acruta, & pota, peripneumonicis, asthmaticis, tussi uetustæ, destillationi & orthopnœæ opitulatur. Lumbricos necat. Cum melle linctæ idem præstat. Decoctū eius cum oxymelite potum, crassitudinē per aluum ducit. Estur cum ficis uiridibus, aluum subducens. Vehementius purgat adiecto illi cardamomo, aut iride, aut erysimo. Colorem bonum præbet. Cum fico & nitro illinitur ad lienem, aquam intercutē. Cum uino ad inflammationes. Discutit sugillata cum aqua feruenti illita. Angina laborantibus cum decocto ficorum optimū gargarisma. Decocta cum aceto, dentium dolorem collutione mitigat. Inflammationes quæ circa aures sunt suffitu soluit.

EX PLINIO.

Hyssopum in oleo contritum phthiriali resistit, & prurigini in capite. Stomacho est contrarium. Purgat cum fico sumptum per inferna, cum melle uomitionibus. Putant & serpentium ictibus aduersari, tritum cum melle & sale & cumino.

DE HYDROPI.



HYSSOPVS
HORTENSIS

Garten Ispen.

bbb

C

NOMINA.

Hydropiper quare dicitur.



ΔΡΟΠΕΡΕΠΙ Græcis, Hydropiper Latinis, officinis incognitum, Germanis Wasserpfeffer / oder Wuckentrant nominatur. Hydropiper autem à locis quibus nascitur, & piperis sapore quem præ fert, quasi dixeris piper aquatile, appellatum est. Muscæ deniq; ab eo uehementer abhorrent: neque enim id quod succo eius aspersum est attingunt, hincq; ad eò alteram appellationem Germani illi indiderunt.

FORMA.

Caulem ædit geniculatū, robustū, circa quem alarum concauitates, & folia Menthe similia, maiora, teneriora, candidiora q; gustu piperis acri, non tamen odorato. Semen in ramulis fert secundum folia nascens, continua serie congestum, racemosum, & acre. Radicē exiguam & inutilē. Ex qua descriptione satis constat herbam hanc, cuius imaginē damus, esse Hydropiper: nulla siquidem nota est quæ illi non cōueniat. Caulis enim eius geniculatus, solidus, circa quem alæ panduntur, & folia Menthe cōsimilia, maiora tantū, hoc est, longiora multò, teneriora & albiora. Quæ singula faciliè diligens quispiam oculis iustrabit. Si uerò linguā consulat, folia meram piperis acrimoniam resipiunt, nullam tamen odoris suauitatē in eis deprehendet. Quod si reliquam faciem excusserit, offendet semen prope folia enatum racematim congestū, & quadā serie cohærens, ipsumq; acre. Accedunt deniq; natales, facultates, & alia, ut nullus planè ambigendi locus relictus sit. Damus hic etiam alterius herbæ quæ in aquis prouenit picturā, quam nōnulli Hydropiperis speciē esse arbitrantur, quæ ferè Hederæ folia obtinet, & secundū ea semen, Ari semini haud dissimile. Nos à colore seminis appellauimus Hydropiper rubeum, germanicè rot

D Wasserpfeffer. Huius herbæ & racemosus fructus, & folia acrimonia sunt prædita,

LOCVS.

Gignitur prope stantes aquas, aut quæ leniter fluunt. Copiose prouenit ad flumen Pegnicum haud procul à Norimbergo.

TEMPVS.

Floret Augusto mense floribus albis spicatum cohærentibus, ac subinde semen minutum profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est, non tamen usque adeo ut piper, & siccum: id quod gustus abundè docet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum semine illita, cedemata, ueteresq; duritias discutunt, Sugillata delent. Siccata & tusa pro pipere sali & obsonijs miscentur. Radix parua, nullius in medicina usus.

EX GALENO.


Hydropiper à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cum Pipere in gustu est, nomen sortitum est. Cæterum calidum est, sed minus quàm piper. Atq; herba ipsa etiamnum uiridis cum semine cataplasmatibus in modum imposita sugillata, & induratos tumores digerit.

EX AETIO.

Hydropiper herba est in aquosis nascens, ramusculis ac folijs Menthe similis, maior tantum, gustu acerrima ut piper, perexigua semina singulis folijs ferens. Calida quidem est, non tamen accedens piperi, quæ recens illita sugillata ac durities sanat. Hanc nonnulli condimentis piperis loco addunt.

APPENDIX.


Cum interea temporis dum sub prælo sunt nostri cōmentarij, quomodo ueteribus sit appellata herba quam Hydropiper rubeum uocauimus diligentius cogito, tertiam Dracontij apud Pliniū lib. xxiiij, cap. xvi. speciem esse cōperio: hanc enim ita pingit; Tertia demonstratio fuit folio maiore quàm Cornus, radice harundinea, totidem



HYDROPIPER

Wasserpfeffer.

bbb 2



HYDROPIPER
RVBEVM.
Rot Wasserpfeffer.

A totidem ut affirmabant geniculata nodis, quot haberet annos: totidemq̄ esse folia. Hi ea ex uino uel aqua contra serpentes dabant. Quæ quidem notæ huic etiam herbæ competere uidentur. Est enim folio maiore quàm Cornus, radice harundinea, nodisq̄ geniculata. An uerò tot nodis sit geniculata, quot habet annos, totidemq̄ folijs, nondum obseruare potuimus. Quinetiã uniuersa tum foliorum tum fructus forma, acrisq̄ sapor, Ariac Dracontij genus esse euidenter ostendunt. Facultas denique contra serpentes, quam Dioscorides suis etiam tribuit Dracontijs, abundè quod contendimus docet. Non est autem, ut quidã existimant, Plinij Aris, quod eius radix oliuæ grandis magnitudinem atq̄ formam non referat. Hanc nostram de hac stirpe sententiam hoc loco referre placuit, ne quis nos illam Hydropiperis esse genus pertinaciter asserere ac tueri uelle existimet.

DE PHLOMO CAP. CCCXXVI

NOMINA.



PΛΟΜΟΣ græcè, Verbasçū latinè, officinis Tapfus barbatus dicitur. Sunt qui Candelam regis, Candelariam, Lanariamq̄ nominent. Germanicè Wulltraut / Kergentraut / Unholden kerz / Himelbraut / Brenntraut uocatur. Phlomon autem haud dubiè dixerunt Græci, quòd ea pro ellychnijs utantur. Candelariã quoque recentiores nominarunt, quòd caulibus eius adipe, seuo, uel aliquo pingui illitis, nonnulli pro lucernis utantur.

GENERA.

B Verbasçū omnium ueterū testimonio duo habet summa genera. Candidū enim alterum folijs, nigrum alterū est. Candidum rursus in marem & fceminã digeritur. Præter tria hæc, & syluestre habetur, wild Wulltraut Germani appellant. Sunt etiã Verbascula duo, quæ à nostris herbarijs herbæ paralytis, & uulgo arthetice, cum arthetice dicendum esset, uocantur. Germanicè Schlüsselblümen. Horum unum est odoratū, alterum odoris expers. Prius germanicè simpliciter Schlüsselblümen / oder gelb Schlüsselblümen / Himelschlüssel / oder S. Peters schlüssel / alterum wild Schlüsselblümen / oder weiß Himelschlüssel appellant. Est & tertium Verbasculum, quod Lychnitum, alij autem Thryallida appellant, Germani Marienrosetten uocant. Hæc sunt genera Verbasçi quemadmodū à Dioscoride & Galeno commemorantur, quorū sanè omniū picturas damus, excepto ultimo, quod hoc tempore nondum floruerat. Quanquam distingui genera hæc, ut Plinius libro xxv. cap. x. ait, penè superuacuum sit, quum sint eiusdem effectus omnia.

FORMA.

Verbasculum candidum fcemina, Brassicæ similia folia habet, multò tamen hirsutiora, latiora & candida. Caulis eius cubitalis & amplior, candidus, subhirsutus. Flores albi aut subpallidi. Semen nigrum. Radix longa, acerba, crassitudine digiti. Candidum mas à foliorum candore Leucophyllon Græcis dictum, oblongioribus & angustioribus folijs, & tenui caule. Nigrum in cunctis candido simile, nisi latioribus nigroribusq̄ constaret folijs. Syluestre uirgas fert altas & arborescentes, folia Saluie similia. Habet uerò circa uirgas ramulos Marrubij modo. Florem luteum, auri fulgore. Verbascula duo hirsuta, terræ inhaerentia, humiliãue: folijs rotundis, & multò minoribus, rugosis, è quibus medijs stylus exilit tenuis, palmi altitudine, in canus, in cuius uertice terni, quaterni, & plures etiã dependent flores lutei, summis labris denticulati, in altero odorati, in altero inodori, calyculo in albū pallefcente. Lychnitis siue Thryallis folijs ternis, aut quaternis, aut etiam plusculis, crassis, pinguibus, hirsutisq̄, ad lucernarū lumina utilibus, floribus purpureis.




VERBASCUM CANDI
DVM MAS.


Weiß Wallkrant mèmele.

VERBASCUM CAN-
DIDVM FOEMINA.

Weiß Wollkraut weibl.



bbb 4



VERBASCUM
NIGRUM.
Schwarz Mullenkraut.



VERBASCUM
SYLVESTRE,

Wild wullkraut.




VERBASCVLVM
ODORATVM.

Seel Schlüsselblumen.

VERBASCUM NON
ODORATVM.

Weiß Schlüsselblüm.



LOCVS.

C Candidum & nigrum in campestribus, & in syluis etiam proueniunt. Syluestre in campestribus, potissimū siccis & lapidosis, nascitur. Verbascula duo passim in pratis & hortis producuntur. Lychnitis similiter alijs in campestribus nasci solet.

TEMPVS.

Verbascula duo primo statim uere emicant, certiꝫ huius appetentis nunciij. Hoc sanè tempore carpenda ueniunt, quod confestim fugacia euanescent; uita enim illis cum plurimum menstrua, nec temerè ad summum sesquimensem excedunt. Reliqua genera autumnò, dum florent & semen proferunt, colligenda.

TEMPERAMENTVM.

Omnium folia desiccandi & detergendi uim possident.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix priorum duorum adstringit: unde tali ludicri magnitudine in alui profluuio utiliter cum uino in potu datur. Decoctū eiusdem ruptis, conuulsis, contusis, & antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasculum cui flos aurei coloris, capillos tingit, & quocunqꝫ reponatur blattas in se contrahit. Folia in aqua decocta aduersus cedemata, & oculorū inflammationes illinuntur. Syderata ulcera cum melle aut uino, cum aceto autem uulnera sanat. Contra scorpionum ictus auxilio sunt. Syluestris folia ambustis illinuntur. Ferunt foeminae folia caricis interposita, incorruptas atqꝫ à putrefactione immunes seruare.

EX GALENO.

Priorum duorū radix gustu acerba est, & fluxionis affectibus prodest. Sed & ad dentium dolorem eam nonnulli colluunt. Folia tamen digerendi uim habent. Sic etiam aliorum folia, potissimū autem eius quæ aureos flores obtinet, Capillos quodque flauescere faciunt.

EX PLINIO.

Contra scorpiones bibitur radix cum Ruta ex aqua magna amaritudine, sed effectu pari. Verbasculum priuatim tonsillis in aqua potum medetur. Tribus obolis bibitur Verbasculū cuius flos aureus est, contra omnia pectoris uitia, tussim, & purulenta excreantibus. Tanta huic uis est, ut iumentis etiam nō tussientibus modò, sed ilia trahentibus auxilietur potus. Lateris & pectoris dolores Verbasculum cum Ruta ex aqua sedat. Panos sanat cum sua radice tufum, uino aspersum, & ita cinere calfactum, ut imponatur calidum. Semen ex uino decoctum & contritū luxatis medetur, dolorem & tumorē tollens. Radicis medulla collyrii tenuitate in fistulam additur. Contusis, euersis, & si febris sit potatur in aqua Verbasculum, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in struma. Semine ac folijs decoctis in uino ac tritis, omnia corpori infixā extrahuntur.

APPENDIX.

Recentiores duobus Verbasculis hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto uesicæ renuqꝫ obstructions soluentur. Ius herbæ propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata & liuentia. Quod uerò hæc eadem possint, temperamentū eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, amara, & modicè acra sunt: ut hoc nomine desiccandi & detergendi facultatē, quam illis Galenus ascribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis herbarij calida & sicca esse statuunt. Et mulieres formæ studentes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, quod maculas, rugasqꝫ, & alia eiusdem uitia mirificè detergeant. Ut hinc euidentissimū sit herbas, quas

Schlüsselblumen uocant Germani, esse
Verbascula,



FRAGARIA MAIOR
ET MINOR.

Erdbeer.

C

NOMINA.

Rubus Idæum uide-
tur esse Fragaria.



Fragaria unde
dicta.

RAECIS ut herba quæ fraga gerit nominata sit, certò constituere nobis nondum licet. Sunt tamen qui *Βάριον Ιδαίου*, hoc est, Rubum Idæum esse putent, eum potissimum qui sine spinis inuenitur. Quorum certè sententiam ob multas uariasq; causas, ut in sequentibus dicemus, minimè repudiandà existimamus. Apuleius Græcis *κίμαρον* appellari scribit, quod si uerum est, alia sit à Comaro quam Dioscorides, Galenus & alij quidam depingunt, necesse est: hæc enim arbor est, illa autem herba. Ego tamen uidi codicem manuscriptū, in quo hæc uerba: Comaron Græci, Romani Fragum nuncupant: non habebantur. Quicquid uerò sit, ex numero Mororū esse cōstat eius fructum optimi odoris: hinc à frago uerbo, quod odorē reddo significat, herba ipsa Latinis Fragaria, & fructus fragum dici cœperunt. Germani *Fruchtbeer* uocant. Græci autem si Comaron appellarunt, ob fructum arboris eiusdem nominis qui fragis ijs terrestribus similis est, haud dubiè sic dixerunt.

GENERA.

Duo Fragariæ sunt genera. Vna flores fructusq; paulò maiores, altera minores obtinet. Nos una pictura utranque expressimus.

FORMA.

Humi sine caule spargitur, multis à radice lanuginosis pediculis, quorum alij flore candido coronantur, alij trigemino comantur, folio per ambitum serrato atque uenoso, alij fructum gerunt exiguis quidem Moris haud absimilem, cæterum sui generis solidum, callosum, tenerū, quum maturuit rubentē, tum gustu, tum etiam odore suauissimum, Radice foris atra aut rubescente, intus candida, multo fibrata capillitio.

LOCVS.

In syluis, dumetis, & in opacis montibus, ac secus uias sponte nascitur. Vnde etiā colligi potest esse Rubum Idæum, quando & is in lucis proueniat. In hortis etiam nonnunquam ut grandiozem fructum ministret, colitur Fragaria.

TEMPVS.

Floret uere, & tota æstate, inq; maximā autumnī partem. Fructus tamen eius fugax, rarò nisi æstatis initio inueniri potest.

TEMPERAMENTVM.

De temperamento Fragarię recentiores diuersa tradunt. Serapio calidam & siccam in secundo ordine tradit. Alij frigidam & humidā in primo: nonnulli, qui tamen prorsus meo iudicio hallucinari uidentur, in tertio ordine scribunt. Nos folia ipsa gustu modicè esse amara, & adstringere deprehendimus, ut siccam esse hac ratione, & minimè humidā oporteat. Quapropter in tanta sententiarū de eius temperamento diuersitate animaduertendū, idem de Fragaria, quod de Rubo sentiendum esse, nempe quod folia, flores, fructus & radix adstringāt. Differre tamen inter se, quod folia potissimū recens nata plurimum in se habeant aqueæ substantiæ, parum uerò adstringant: adeò ut uerisimile sit de ijs locutos esse, qui frigidam & humidā in primo ordine Fragariam statuerunt. Est enim eorum temperies ex terrena frigida essentia, & aquea tepida. Fructus immaturus frigida terrea substantia præditus est, ut frigidus & siccus hoc nomine dici mereatur. Maturus autē non parum succi temperati calidi qui dulcis est, modicamq; adstrictionē habet, ita ut calidus & siccus dicendus ueniat. De fructu itaque intelligendū erunt, qui Fragariam calidam & siccam esse affirmant. Quare ubi de temperamento Fragariæ agitur, non simpliciter, sed cum prædicta distinctione respondendum est. Vnde cum idem ferè cum Rubo temperamentum habeat Fragaria, iterum hanc ab Idæo Rubo nihil differre uerisimile est.

VIRES.

VIREs.

Quum recentiores in cōmemorandis Fragarię facultatibus partim eas quas Dioscorides Rubo Idæo, partim etiam quas Comaro tribuit Apuleius, uires Fragarię ascripserint, opere præcium me facturum arbitror, si utriusq; de ijs uerba præmiserō, ut nimirum quisq; hac ratione, quapropter iuniores ijs facultatibus Fragariam ornauerint, certius intelligere queat.

EX DIOSCORIDE.

Idæus Rubus eadem potest quæ Rubus. Amplius eius flos cum melle tritus & illitus, oculorū inflammationibus auxiliatur, Sacros ignes extinguit, Stomachicis cum aqua potui datur.

EX APVLEIO.

Ad lienis dolorē herbæ Fragi succum ex mellis uncia potui datum mirificè proficere certum est. Ad suspiriosos eiusdem succus cum pipere albo & melle mixtus, potui datus, mirificum est remediū. Has facultates etiam antiquus manuscriptus herbarius Fragarię adscribit, nomine tamen Apulei in Dioscoridis nomen immutato. Addit tamen huius fructum comestum stomacho conferre, & ex succo eius os contra fetorem collui, id quod Serapion quoque tradit.

EX RECENTIORIBVS.

Herba Fragaria in cibo sumpta medet̃ lienosis, item succus ex melle potus. Idem cum pipere candido datur suspiriosis. Fraga sitim sedāt, stomacho profunt, sed præfertim bilioso. Succus Fragis exprimitur, uetustate uires accipiens, præsentaneo remedio ad faciei ulcera, oculorū suffusiones, neq; nō epiphoras. Radicis decoctū iecioris feruores mulcet matutino & meridie potū. Vtuntur hodie frequenter Fragaria ad glutinanda uulnera, aluum sistendam, menstrua cohibenda, gingiuas confirmandas, oris ulcera, eiusdemq; fetorē tollendum, quæ singula Rubus etiam Idæus potest, ut inde rursus conijcere liceat Fragariam ab eodem nihil differre,

DE PHV GERMANICO

CAP. CCCXXVIII.

NOMINA.



ov, ἡ ἀρρία ραφδ⊕ Græcis, Phu & Nardus syluestris Latinis, Valeriana officinis & herbarijs nostri temporis, Germanis Baldrion/ Dennenmarck/ oder Katzenwurzel/ oder Augenzurzel appellatur, quod scilicet catti odore radicis eius, quo eorū oculi roborant̃, impense delectent̃.

Nardus syluestris.
Valeriana.

GENERA.

Duo sunt præcipua Phu genera. Magnum, quod alio nomine Theriacaria uocatur. Hoc descriptioni per omnia respondet, germanicè groß Baldrion/ & Triacks appellatur. Vulgus herbariorū Valerianā maiorem nominat. Alterum uulgare, quod alio nomine Valeriana etiam uulgaris nuncupatur. Germanis gemein Baldrion/ & Katzenwurzel dicitur. Hoc etiam genus à pictura Dioscoridis, ut paulò pot̃ fufius docebimus, non abhorret.

FORMA.

Folia Elaphobosco, siue Olufatro similia habet. Caulē cubitalē, aut proceriorem, leuem, tenerū, purpurascētē, in medio cōcauum, geniculis intersectū. Flores ad Narcisi flores accedentes, minores & teneriores, in subalbido purpurascētes. Radices in superiore parte minimi digiti crassitudine. Adnascentes etiam radículas obliquas ueluti iuncus odoratus, aut ueratū nigrum, inuicē implicitas, subflauas, bene odoratas, nardum in gustu referentes, cum quadam uirosa grauitate. Ex qua certē descriptione sole clariū fit, herbam quam uulgare hodie Valerianā no-

Valeriana uulgaris.

PHV MAGNUM

Groß Baldrian.





PHY GER-
MANICVM.

Semein Baldrion.

C minant esse Dioscoridis Phu. quòd omnia ferè sic illi respondeant, ut prorsus nulla reclamare nota uideatur. Folia nanq; huius cum primùm erumpunt Elaphobosci præse ferunt imaginè: postea uerò dum adolefcit in Olufatri modum laciniantur. Caulis quoq; eius cubitalis, & maior (nò enim rarò ad trium cubitorū longitudinē caulis à nobis uisus est) læuis, potissimū in infima eius parte, deniq; tener, purpurascens, in medio cōcauus, geniculatus. Flores eiusdem qui summis caulibus emergunt, Narcissi certam exprimunt effigiē, quamuis minores sint, atque adeo teneriores. Ut hoc nomine cum Ruellio in grecis codicibus Dioscoridis ^{ἡ ἰσχυρὴ} pro ^{ἡ ἰσχυρὴ} legendum esse putem. Nisi quis existimet Phu Ponti, quod Dioscorides potissimū describit, fauentis cœli beneficio maiusculos habere flosculos. Prædicti etiā flores acruatim coeūtes in purpuram candicant. Radices quoq; in superiore parte minimi digiti crassitudinē obtinent, multasq; radículas obliquas, Scheni, aut nigri Veratri modo sibiipsis implicatas, subflauas, odoratas, Nardum, cum uirosa tamē grauitate, imitantes. Quum itaq; hæ omnes notæ, Valerianę nostrę respondeant, multorumq; cōsensus nobis subscribat, & facultates eius quas illi recentiores tribuunt, planè cum ijs quæ Dioscorides Phu adscribit cōueniant, quid impediatur cur non certò affirmemus Valerianam hanc uulgarem esse Phu Dioscoridis non uideo, præfertim cum manuscriptus etiam herbarius Phu esse Valerianā apertè doceat, ita ut mirari satis non queam cur aliquot docti uiri in Germania nostra diuersum astruere uoluerint.

L O C V S.

Nascitur in humectis locis, & prope aquas, hæcq; ad mirandā altitudinē surgit. Prouenit etiam in lucis & cæduis syluis, sed hæc in tantam proceritatē non emergit.

T E M P V S.

Floret integra æstate.

D

T E M P E R A M E N T V M.

Calidam & siccam esse in secundo ordine tradunt.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Phu calefacit. Sicca pota urinā mouet. Potest idem & decoctum eius, Ad lateris dolorem prodest. Menses ducit, & antidotis miscetur.

E X G A L E N O.

Odorata quodammodo est huius herbæ radix, Nardo uiribus similis, sed tamen ad plurima infirmior, Urinam plus mouet quàm Indica aut Syriaca Nardus, similiter autem ut Celtica.

E X P L I N I O.


Radix Phu datur potui trita, uel decocta ad strangulationes, uel pectoris dolores, uel laterum. Menses quoque cit. Bibitur cum uino.

A P P E N D I X.

Magni Phu radice hodie multi, magno cum errore, pro calamo aromatico utuntur, quod hoc in loco monere placuit.

D E P H A C O CAP. CCCXXIX.

N O M I N A.

^{Lens.}  Α Κ Ο Σ, ἡ φακὴ Grecis, Lens & Lenticula Latinis dicitur. Officinis & herbarijs latinum nomen retinuit. Germani *Qinsen* appellant.

F O R M A.

Lens racemosum legumen est, folijs Viciæ, sed minoribus, floribus exiguis in candido purpurascens, siliquis paruis, molliter in latitudinē fusis, in quibus tria aut quatuor grana, inter legumina minima, sunt.

L O C V S.

Prouenit passim in agris satum,

T E M P V S.



LENS

Linfa.

TEMPVS.

C

Iulio mense floret, & deinceps in filiquis grana profert.

TEMPERAMENTVM.

Lentes mediū tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamē in secundo ordine.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Lens crebrò comesta, oculorū aciem hebetat. Agrè cōcoquitur. Stomacho nocet, eumq; & intestina inflat. Aluum cum cortice suo comesta sistit. Præstat quæ facillimè concoquitur, & nihil atrī in maceratione reddens. Vim habet adstrictoriā: quapropter aluū sistit, si detractō antea cortice accuratè coquat, primaq; aqua intercoquendū effundatur. Primū enim eius decoctū aluum soluit. Somnia tumultuosa & grauiā facit. Neruis, pulmōni & capiti inutilis. Melius suo fungetur officio contra alui fluxiones, admixto illi cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut myrto, aut cortice punici māli, aut rosis siccis, aut melspilis, aut sorbis, aut pyrīs Thebanis, aut cotoneis mālis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionē abijciuntur, aut rhoīs quæ obsonijs inspargitur. Acetum autem cum eo diligenter percoqui debet, aliās aluum conturbat. Cōtra subuersionē stomachi triginta grana lentis suis corticibus denudata, deuorata profunt. Decocta cum polenta, & illita, podagram lenit. Sinus cum melle glutinat. Cruistas rumpit, & ulcera purgat. Decocta in aceto duritias & strumas discutit. Cum meliloto, aut cotoneo mālo, medetur inflammationibus oculorum & sedis, addito rosacco. In maioribus sedis inflammationibus & sinu amplo cum malicorio aut siccis rosis, adiecto melle decocta. Contra nomas gangrænicas similiter utuntur, aut adiuncta maris aqua. Aduersus autem pustulas, herpetas, erysipelata, pernionesq; ut antea dictum est. Contra mammas grumofum lac continentes, & lactis copia turgentes, in aqua maris decocta & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Lentes non ualenter adstringūt. Ipsum itaq; earum corpus desiccant & sistit uentrem: cæterum decoctū irritat. Proinde etiam prior aqua abijcitur, ubi retentionis causa adhibent. Cortex eius uehementer adstringit, carnea substantia tenuiter, quæ & crassi succi & terrestris est. Succus porrò Lentis adstringenti est cōtrarius. Quocirca si elixā in aqua iusculum sale garo oleoq; conditum bibatur, aluum deijciet. At quod ex bis decocta Lente ferculum apparatus, contrariam succo uim obtinet. Nam quæ uentri obueniunt fluxiones desiccant, os uentriculi, intestina, & totum deniq; uentrem corroborans. Quamobrem cœliaci & dysenterici accōmodatus est cibus. Lens uerò decorticata, ut illam adstringendi uehementiā, cumq; hac alia uidelicet omnia quæ cōsequuntur, amittit, ita alibilior quā integrā illa efficitur, crassum prauumq; succū gignens, tardè cōmeans: alui tamen fluores haud desiccant, uti ea quæ cortice non est spoliata. Iurē igitur qui modum in hoc edulio non seruant, elephantiam quam uocant, & cancrum incurrunt. Siquidem crassa siccaq; cibaria facile in melancholicos humores uertuntur. Quare ijs duntaxat quibus uitiosa est habitudo ob aquā in carne diffusam, Lens cibo utiliter præbetur, ceu aridis & squalentibus admodū damnose. Eandem ob causam uisum integrum & inculpatū hebetat, immoderatè exiccans. Ei uerò qui contrario modo se habet, humidiori uidelicet, opitulatur. Menstruis purgationibus inepta est: crassum enim & tardifluum sanguinem facit. At muliebri appellato profluuiō conuenientissima.

EX PLINIO.


Lens optima quæ facillimè coquitur, eaq; quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidem oculorū obtundit, & stomachū inflat: sed aluum sistit in cibo, magisq; discocta cœlesti aqua. Eadem soluit, minus percocta. Cruftulas ulcerū rumpit, eaq; quæ intra os sunt, purgat & adstringit. Collectiones omnes imposita sedat, maximèq; exulceratas & rimosas. Oculorū autem epiphoras cum meliloto aut cotoneo. Contra sup.

A tra suppurantia cum polenta imponitur. Decoctæ succus ad oris exulcerationes & genitalium adhibetur. Ad sedem, cum rosaceo aut cotoneo. In ijs quæ acrius remedium exigunt cum putamine punici, melle modico adiecto. Ad id demum ne celeriter inarescat, adijciunt & Betæ folia. Imponit & strumis panisq; uel maturis, uel matrescentibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua mulsa, & gangranis cum punici tegmine. Item podagrâ, cum polenta, & uuluis, & renibus, & pernionibus, ulceribus difficile cicatricem trahentibus. Propter dissolutionem stomachi triginta grana Lentis deuorantur. In cholericis quoque & dysenteria, efficacior est in tribus aquis cocta, in quo usu melius semper eam torrere aut tundere, ut quam tenuissima detur, uel per se, uel cum cotoneo mâlo, aut pyrâ, aut myrto, aut intubo erratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, neruosisq; omnibus, & fellis, nec somno facilis. Ad pustulas utilis, igniq; sacro, & mammis, in aqua marina decocta: in aceto autem, duritias & strumas discutit. Stomachi quidem causa, polentæ modo potionibus inspergitur. Quæ sunt ambusta, aqua semicocta curat, postea trita, & per cribrum effuso surfure, mox procedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad guttura.

EX SYMEONE SETHI.

Crassi succi est, & austeram uim atque qualitatem possidet. Si quis ergo in aqua coquat, & eam aquæ, oleo & sapæ cum sale misceat, potionem faciet quæ uentrem subducat. Bis autem cocta, uentriculum & ad ipsum defluxus sistit. Inducit autem stomacho robur, & intestinis, & uniuerso uentri. Quapropter utilis est cibus cœliaci & dysentericis. Si uerò cortice ablato sumatur, uehementiam adstringendi abijcit, magis uerò nutrit, cum tardi sit transitus, & crassi succi, non tamen adeo siccatur, ut antea dixi. Qui uerò hoc edulio crebrò utuntur, elephantiam contrahunt, & can-
 B cros, & duritias, & neruorum dolores, & melancholicos affectus. Aptus enim est crassus & siccus sanguis, ut fiat succus melancholicus. Quibus igitur habitus quispian malus aquosus in carne est, ijs solis utile est edulium, quemadmodum siccis & squalidis maximè noxium. Similiter uisum salubriter se habentem nimium exiccando hebetat, contra uerò affectum iuuat. Neque etiam ad menstruas purgationes utilis est, eò quod crassum & difficulter fluentem sanguinem efficiat. Ad hæc Veneris appetentiam, semen exiccando, extinguit; ideo castè uiuere uolentibus ad hoc maximè confert. Grauiæ etiam somnia facit, eò quod ex ea melancholici succi in totum distribuantur corpus. Cum Mentha decocta, plurimùm inflationis deponit. Nonnulli & Betam huius rei gratia eo quo decoquitur tempore iniiciunt. Lens uerò probè decocta & trita, si uulneribus ex iaculo aut telo facta imponatur, sanguinis fluxum uehementer compescit. Paruæ uerò Lentis decoctum sum-
 ptum, difficilem partum soluit. Auribus ex quibus pus emanat instillatum, succurrit.

DE PHILYRA.



TILIA FOE-
MINA.

Lindenbaum.

NOMINA.



PHILYRA Græcis, Tilia Latinis & officinis, Germanis *Linden* appellatur. Alia ab hac est arbor quæ Dioscoridi *Ϟμυρία* uocatur. Quod non animaduertentes uiri etiam nonnulli doctissimi, utraq; arbores magno errore confundunt, quod forma admodum discrepent, ut ex his quæ paulo post dicemus, & è Dioscoride & Theophrasto lib. iij. de plantarum historia, cap. x. inuicem collatis abundè constabit. Differunt itaq; inter se Philyra & Phillyrea, neque una utraq; uoce arbor significatur, sed diuersæ.

Phillyrea alia à Philyra.

GENERA.

Tiliæ, Theophrasto loco iam citato autore, duo habentur genera, mas scilicet & fœmina. Distantq; inter se tum materiæ, tum totius corporis forma, & quod altera fructifera, altera sterilis. Materies maris dura, flaua, nodosior, spinosiorq; : fœminæ candidior; & cortex maris crassior, detractusq; inflexibilis propter duritiã est: fœminæ candidior flexibiliorq;, ex quo cunas faciunt: item fœminæ odorator. Et mas sterilis, nulloq; flore est: fœmina, cuius tibi picturã damus, & florem & fructum gignit.

FORMA.

Folio est hederaceo, molliore, & in angulum acutiore rotundiore & prolixiore, & in orbem lentè crispo atq; serrato: flore tantisperdum calyculo continet herbaceo, ubi emerit flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semine præternue quantum triplicis, omnibus animantibus ingratum, cum foliorum pabulo maxime ducant, eorumq; mira dulcedine capiant. Nunc cum his confer ea quæ Dioscorides de Phillyrea tradit, & senties esse diuersissima. Nam quis unquam dixit Tiliam habere folia oleæ, & fructum ferre subdulcè ad similitudinem Lentisci, nigrum, uarum more congestum: Philyræ enim seu Tiliæ folia sunt hederacea atq; serrata, adeoq; ab oleæ folijs dissidentia: fructum deniq; fert non modò non subdulcè, sed qui à nullo mandari potest.

LOCVS.

Montes & ualles diligit Tilia, sed plus montibus gaudet aquis.

TEMPVS.

Floret Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calidã esse Tiliam, uel ex eo liquet quod frigidis cerebri malis, epilepsie & id genus alijs mirificè conferat. Amari tudo etiam cum glutinositate quadã in ea reliquis qualitatibus, præualere uidetur, si hanc degustes. Quare abstergendi planè facultatè cum modica adstrictoria, perinde atq; Vimus, cuius facultates illi Plinius, ut ex his quæ paulo post subiiciemus planum fiet, tribuit, habere euidentissimum est.

VIRES. EX GALENO.

Vlmi folijs aliquando recens uulnus glutinauimus, confidentes adstringentem pariter & extergentem illis inesse facultatè. Cortex amplius etiam subamarus est & adstrictorius, itaq; cum aceto lepram sanat. Porro uiridis etiam nunc & recens si uulneribus deligatur uice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem uim ob tinent: proinde & decocto earum quidã perfundunt fracturas quibus callo inducto opus est.

EX PLINIO.

Cortex interior Tiliæ lepras sedat, & folia ex aceto illita. Multi corticem comanducatum uulneribus utilissimum esse putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori. Humor quoq; è medulla castratæ arboris effluens, capillum reddit capiti illitus, defluentesq; continet. Humor deniq; cuti nitorè inducit, faciemq; gratiorè præstat. Folia ad infantium ulcera in ore comanducata profunt. decocta & pota, urinam ciunt & menses.

APPENDIX.

Quum Plinius ferè omnes facultates Vlmi etiã Tiliæ adscribat, ut ex eiusdem uerbis patet, ideo è Galeno quæ ille de Vlmo tradit produximus. Si uerò quispiã uires quæ à

C quæ à recentioribus Tiliæ tribuuntur, probè expendet, nihil ab ijs quæ ex Plinij & Galeni sententia retulimus differre comperiet. Nam maculas faciei abstergere scribunt Tiliam, si illa eius succo lauetur. Mederi etiam morbo comitali bibitum eius liquorem stillatitiũ, oculis claritatem inducere, calculum sanare, tumores discutere ijdem docent. Quid multa? omnes facultates Vlmi obtinet Tilia, ideoq; uulneribus etiam recentibus succurrit, & alia quæ à Dioscoride & Galeno in Vlmi historia cõmemorantur, potest.

DE CHELIDONIO MAIORE

CAP. CCCXXXI.

NOMINA.



Chelidoniũ unde dictum.

ΕΛΙΔΟΝΙΟΝ μέγα Græcis, Chelidoniũ maius Latinis, officinis Chelidonia, Germanis Scheltraut/Schelwurcz/groß Schwalbentraut dicitur. Chelidonio autem, uel si maius Hirundinarię, auis hirundo quæ Græcis χελιδών uocatur, nomen indidit, uel, ut autor est Plinius, quod hanc primũ inuenit, & ea oculis pulorum in nido restituit uisum, ut quidam tradunt, etiam erutis, uel quod floret aduentu hirundinum, discessuq; commarcescit: id quod de minore uerè dicitur.

FORMA.

Caulem emittit cubitalem & maiorem, gracilem, adnata folijs plena habentem. Folia Ranunculo similia, teneriora tamen, & colore subcæsia, iuxtaq; singula folia florem Leucoio similem. Succus illi croceus, acris, mordax, cum aliqua amaritudine & odoris grauitate. Radix supernè singularis, infernè autem plures. Fructus cornuti Papaueris instar tenuis, longus ueluti galeę conus, in quo exigua semina sunt, Papaueris semine maiora. Huius descriptionis notæ omnes Chelidonio nostro respondent. Siquidem fruticosa est herba, cubitali altitudine, cauliculis lanuginosis, teneris, folio Ranunculi, magis anguloso, tenuiori, aduersa parte cæso, auersa incano, flore luteo, Leucoio consimili, semine Papaueris, quod in corniculis seu filiquis longis exilibus clauditur. Vulnerata succum croceũ emittit, gustum uellicantẽ, Radix in superiore parte una, in inferiore parte multis luteis fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in opacis & parietinis.

TEMPVS.

Chelidoniũ hirundinum aduentu florem excitat, atque adeo toto deinceps uere & æstate floret, quibus etiam temporibus carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Herba hæc tertij ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Succus Chelidonij mixtus mellis, & in æneo uase in carbonibus decoctus, contra oculorum caliginem prodest. Exprimitur autem succus ex folijs, radicibus & floribus incipiente æstate, siccaturq; in umbra & in pastillos conformatur. Radix cum Aniso & uino albo pota, regio morbo medet. Sanat herpetas cum uino illita. Dentium dolores commanducata sedat.

EX GALENO.

Chelidoniũ admodum extergentis & calidæ facultatis est. Sed & succus eius ad acuendum uisum cõmodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur discussione indigens. Vñ sunt quidam radice eius ad morbum regium à iecoris obstructione proficiscentẽ, in uino albo eam potui exhibentes cum Aniso, Pari modo mansa, dentium doloribus confert.

EX PLINIO.



CHELIDONIVM
MAIVS.

Schelkraut.

ddd

C

EX PLINIO.

Florentibus succus exprimitur, & in aëreo uase cum melle Attico leniter cinere feruenti decoquitur, singulari remedio contra caliginēs oculorum. Utuntur & per se succo in collyrijs, quæ Chelidonia appellantur ab ea. Eadem oculorū aciem adiuuat, si addita aqua foueantur. Succus eius cum melle culices, nubeculas, obscuritatemque discutit, cicatrices extenuat. Albugines etiā iumentorum,

DE CHELIDONIO MINORE

CAP. CCCXXXII.

NOMINA.

Scrofularia minor cur dicta.



ΧΗΛΙΔΟΝΙΟΝ μικρὸν Græcis, Chelidoniū minus Latinis, officinis Scrofularia minor uocatur, quod strumosa radix multis granorum frumentigrumis uideatur coaluisse: uel quod strumis, quas imitatione græca Scrofulas uocant, medeatur. Germanis Feigwarzen oder Blaterntraut/ id est Ficariam, Psaffenhdlin/ Klein Schelwurz/ oder Schwalbenwurz/ oder Meyentraut nominatur. Chelidonium autem hæc herba uocata est haud dubie, quod, ut Theophrastus lib. vij. cap. xiiij. hirundinū aduentu florem excitet,

FORMA.

Herbula est à stolonibus pediculisue pendens, sine caule, folijs Hederæ figura, rotundioribus minoribusque, item teneris & aliquatenus pinguibus. Radices habet paruas multas, ex eodem callo prodeuntes, tritici modo acruatim congestas, quarum tres aut quatuor in longitudinem progrediuntur. Hæc Dioscoridis deliniatio prorsus herbae illi quam Scrofulariam minorem uulgo nominant, conuenire uidetur. Nam hæc herbula est à pediculis pendens, uidua caule, folijs Hederæ, rotundioribus multò minoribusque, teneris & modicè pinguibus. Radices ostendit ex eodem callo prodeuntes, paruas, complures in granorū tritici morem acruatim collectas, quarum tres uel quatuor in longum protenduntur. Flos ei Ranunculi ut maiori, luteo colore nitens. His accedunt locus, tempora, uires, & alia quæ iam commemorabuntur, quæ singula Scrofulariæ minori admodum quadrant, ut nemo hanc Chelidonium minus esse inficias ire sine magna impudentia possit.

LOCVS.

In palustribus, prope aquas, & in limitibus humidis, omnibusque uliginosis tractibus ac hortis passim gignitur.

TEMPVS.

Verno tempore, Martio mense, & præsertim hirundinū aduentu floret, nec longo post tempore marcescens euanescit, sic ut irrigui limites, qui largo foliorum florumque stipatu pubescebant, confestim ijs spoliati glabrescere conspiciantur.


TEMPERAMENTVM.

Chelidoniū minus, Galeno teste, quarti ordinis absoluti est in calefaciendo & de siccando, ideoque magnam præ se fert acrimoniā, gustum erodentem. Nostrum autem usque adeo acre non est, ut commanducando sæpe nullam prorsus sentias acrimoniam, potissimum in eo quod humido in loco natum sit. In hoc autem quod locis siccis prouenit, senties & amaritudinem & acrimoniam, sensim tamen gustum erodentem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Acrem uim habet, Anemones modo summam cutem exulcerantē. Scabiem & unguium lepras tollit. Ex radicibus expressus succus ad purgationem capitis addito melle naribus utiliter instillatur. Similiter decoctum eius cum melle gargarissatum, caput strenuè purgat, & omnia pectoris uitia,

EX GALENO.



CHELIDONIUM
MINVS,

Feigwartzenfraut.

C

EX GALENO.

Chelidoniū minus cum acrius sit maiore, illitum confestim cutem exulcerat, un-
guesq; scabros eijcit. Succus eius per nares purgat, utpote uehemēter acris existens.

APPENDIX.

Recentiores ea herba in exterdendis ficibus mariscisue, & strumis, magna expe-
riencia utuntur, ut inde certē Scrofularia nominari, quemadmodū diximus, merue-
rit. Antiquus etiam ac manuscriptus herbarius, sub nomine tamē Pedis uituli, quo
Aron nominatur, se à quodam qui expertus sit cognouisse scribit, quod hæc herba
contra marifcas ac strumas mirificē proficit.

DE CHAMAEDRY▶ CAP▶ CCCXXXIII▶

NOMINA.

ΑΜΙΑΡΥΣ græcè, Triflago latinè, officinis græcum nomen infedit,
uulgo Quercula minor, & à serratis folijs Serratula appellatur. Chamæ-
dryes uerò Græcis dicta est, quasi humilis ac terrestris quercus, quod sci-
licet folia Quercus habeat, & huius respectu quasi humi repat. Sunt qui
Serratā nominatā ideo putent, quod ab ea serra inuenta sit. Dioscorides hanc Teu-
crium etiā, propterea quod Teucrio similis admodū sit, appellari à nōnullis scribit.

GENERA.

Et si Dioscorides alijsq; ueteres unicā faciant Chamædryn, tamen nos, quia plures
herbas ad eius formam ac picturā accedere uidemus, duo eius genera produximus.
Quorum sanè primum uera Chamædryes existit, & germanicè Klein Bathengel
nominatur. Illius autem rursus duo sunt genera. Vnum enim quod præ cæteris o-
mnibus picturæ Dioscoridis maximè accedit, mas dicitur, alterum uerò scemina:
neque enim aliter nobis discrimen indicatē licuit nisi sexus ratione. Alterum genus
uulgaris est Chamædryes, quod iterum duū est generum, mas scilicet & scemina.
Mas germanicè Erdweirauch / scemina uerò Gamenderle / Blawmenderle /
Vergiß mein nit / appellatur.

FORMA.

Frutex dodrantalis, folijs exiguis, forma & diuisuris quernis similibus, amarisq;
flore subpurpureo, exili, semine in calyculis atro. Quæ utique descriptio ita herbis
illis quas pictas exhibemus respondet, ut nulla prorsus nota reclamare uideatur.
Sunt enim herbæ palmum altæ ut plurimum, exili folio, effigie & diuisura Quer-
cus, amaro, flore penè purpureo & exiguo, ita ut mirari satis non possim, cur non-
nulli alteram speciem genuinam Chamædryn esse negent, cum tamen Germanica
etiam appellatio pulchrè ad antiquum atque adeo græcum nomen alludat. Sed in-
stabit forsitan quispiam dicens, Chamædryes Dioscoridis palmum alta est, hæc tua
mensuram hanc excedit. Fateor sanè, attamē non multum exuperat, quod si etiam
plus exuperaret, non tamen hoc nomine alterius speciei herba putanda esset: neq;
enim adeò statam atque certam mensuram herbis tribuit Dioscorides, ut quando-
que ultra citraq; consistere non liceat: uerum cum alicui herbæ mensuram adscri-
bit, id ea ratione facit, ut maiori parti indiuiduorū illius speciei quadrare existimet.
In prioris itaque inopia, alterius usus esse potest.

LOCVS.

Nascitur asperis & petrosis locis, interdum etiam in montosis & campestribus
solidis.

TEMPVS.

Primum genus Iunio & Iulio mensibus floret. Alterum autem uere potissimū,
Carpuntur semine prægnantia.


TEMPERA-

Serratula.
Chamædryes un-
de dicta.




Serrata.

Obiectionis
solutio.



CHAMAEDRYS
VERA MAS.

Klein Buthengel.



CHAMAEDRYS VERA
FOEMINA.


Klein Bathengel weible.



CHAMAEDRYS VVLGARIS MAS.

Erdrweirauch.

ddd 4



CHAMAEDRYS VVLGA-
RIS FOEMINA.

Gamenderle.

TEMPERAMENTVM.

Ex tertio ordine calefacientiũ & desiccantium facit Galenus, Germanicæ tamen minus calefacere & desiccare uidentur, utpote in regione frigidiore nata.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Recens ac uiridis in aqua decocta & pota, conuulsis, tussientibus, lienii indurato, urinæ difficultatibus, hydropicis inter initia auxiliatur. Cit menses, foetusq; extrahit. Lienem ex aceto pota minuit. Aduersus uenenata cum uino pota & illita effi-
cax est. Trita ad prædicta in pilulas conformatur. Cum melle uetera ulcera purgat. Cum oleo trita, inuncta & illita, oculorum caliginem discutit.

EX GALENO.

Chamædrys uincentem qualitatē amarā habet, & est quodammodo acris. Quo circa meritò lienem colliquat, urinam & menses mouet, crassitudinē humorum incidit, & uiscerum obstructions expurgat.

EX THEOPHRASTO.

Trissaginis folia ad rupta, uulneraq; in oleo trita ualent, & ad depascentia ulcera. Semen bilem extrahit, & oculis quoq; beneficum est. Folium ad albugines tritum in oleo prodest.

EX PLINIO.

Aduersus serpentiũ uenena potu illituq; efficacissima. Item stomacho, tussi uetustæ, pituitæ in gula cohaerescenti, ruptis, conuulsis, lateris doloribus. Lienem consumit. Vrinā & menses cit, ob id incipientibus hydropicis effi-
cax, manualibus scopis eius in tribus heminis aquæ decoctis usque ad tertias. Sanat & uomicas, & for-
dida ulcera cum melle. Fit & uinum ex ea pectoris uitijs. Foliorũ succus cum oleo, caliginem oculorum discutit. Ad splenem ex aceto sumitur.

DE CHAMÆCYPARISSO

CAP. CCCXXXIIII.

NOMINA.



ΑΜΑΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Plinio dicta est, quasi pumila Cupressus. Apud Græcos, quod sciã, eius fruticis nulla fit mentio. Vulgo Cupressus, Germanis Cypress nominatur. Cupressus ab odore & forma foliorũ eiusdem nomenclaturæ arboris uocata est.

Cupressus unde dicta.

FORMA.

In arbusculi formam fruticat, folijs incanis, Abrotoni fœminæ modo scissis. Floribus in summo auri instar fulgentibus. Totus frutex odoratus est. Errat qui Chamæcyparissus esse arbitrantur; neque enim ut illa humi serpit, sed altius à terra, ut pictura monstrat, confurgit.

Chamæcyparissus non est Chamæcyparissus.

LOCVS.

In hortis passim ac figulinis prouenit.

TEMPVS.


Æstate floret. Paucos autē frutices inuenies in quibus flores intueri liceat, quando per uniuersam uitam non nisi unum hunc, cuius picturam damus, fruticem in quo flores apparuerint, uiderim.

TEMPERAMENTVM.

Apparet in ea, sicut gustus testificatur, leuis quidem acrimonia, sed maior amaritudo, multoq; etiam plus acerbatis in tota planta. Resiccata itaque absq; insigni caliditate.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Quum easdem quas arbor Cyparissus qualitates habeat Chamæcyparissus, necesse est



CHAMAECYPARISSVS.

Cypres.

A cesse est ut etiam facultates easdem obtineat. Arboris igitur hæ sunt uires. Adstrin-
git & refrigerat. Folia eius cum passo & myrrha modica pota, uesicæ fluxionibus
& urinæ difficultati medentur. Pilulæ tusæ, & cum uino potæ, contra sanguinis re-
iectionem, dysenterias, alui fluxiones, orthopnoeam, tussimq; profunt. Decoctum
earum idem potest. Tusæ cum fico duritiâ emolliūt, & polypos in naribus sanant.
Leprosos ungues cum aceto decoctæ & tritæ adiectis lupinis tollunt. Intestinorū
ramices illitæ coërent. Folia idem possunt. Pilulæ cum coma suffitæ culices abige-
re creduntur. Folia trita & illita uulnera glutinant, sanguinemq; supprimunt. Cum
aceto autem trita, capillos tingunt. Illinitur per se aut cum polenta ad erysipelata,
herpetas, carbunculos, & oculorum phlegmonas. Cerato mixta & imposita uen-
triculum firmant.

EX GALENO.

Cupressi folia, germina, pilulæ recentes & molles, magna ulcera in duris corpo-
ribus glutinant. Ex quo clarum est quod resiccandi uim habeat, absq; insigni acri-
monia & caliditate. Tanta inest ei acrimonia caliditasq;, quanta satis sit deducen-
dæ in altum acerbitati: nullam tamen mordicationē aut caliditatem in corporibus
efficit. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates,
sine molestia tutoq; depascitur, quum quæ calefaciunt & desiccant, eas quidem quæ
contentæ sunt absumant, cæterum acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic inte-
stinorū ramice affectos iuuat: siquidem exiccat & robur addit corporibus præ hu-
miditate laxis, utpote quum adstrictio in altum subeat, eò quod caliditas quæ illi ad-
mixta est deducat, ad eam quidem mensuram perueniens, ut præire quidem ualeat,
nondum tamen mordicare. Quidam ea utuntur ad carbunculos & herpes polen-
tæ miscentes, tanquam absumat citra calefactionem eos morbos efficientem humi-
ditatem. Sunt qui ad erysipelata utantur, admixta nimirum polenta cum aqua, aut
oxycrato aquoso.

EX PLINIO.

Cupressi folia trita serpentum ictibus imponuntur, & capiti cum polenta, si à so-
le doleat. Item ramici, qua de causa bibuntur. Testium quoque tumori cum cera il-
linuntur. Capillū denigrant ex aceto. Eadem trita cum duabus partibus panis mol-
lis, & uino Amineo subacta, pedum ac neruorum dolores sedant. Pilulæ aduersus
serpentium ictus bibuntur, aut si eiiciatur sanguis. Collectionibus illinuntur. Ra-
mici quoq; teneræ tusæ cum axungia & lomento profunt. Bibuntur ex eadem cau-
sa. Parotidi & strumæ cum farina imponuntur. Exprimitur succus tusus cum semi-
ne, qui mixto oleo, caliginem oculorum aufert. Item uictoriati pondere in uino po-
tus illitusq;, cum fico sicca pingui, exemptis granis, uitia testium sanat, tumores dis-
cutit, & cum fermento strumas. Radix cum folijs trita potaq;, uesicæ & stranguriæ
medetur, & contra phalangia. Ramenta pota menses ciunt, scorpionum
ictibus aduersantur. Chamæcyparissos herba ex uino
pota contra uenena serpentium omnium
scorpionumq; pollet.

*Chamæcyparissi
facultates.*



CHAMAECISSOS

Sundelreh.

A

NOMINA.



ΑΜΑΙΚΙΣΣΟΣ, ἢ γῆς σέφανος Græcis, Hedera terrestris, Terræ corona Hedera terrestris.
 Latinis appellatur. Officinæ nomen Hederae terrestris retinuerunt.
 Germanicè Gundelreb/corrupto sanè nomine uocatur, cum dicendū
 esset Grundreb/hoc est, humi repens uiticula. Nominatur etiam Ger
 manis Erdphew/& Erdentreglin. Chamæcissos uerò dicta est, quod nunquā Chamæcissos uerò de dicta.
 non repat humi, folijs Hederae similibus. Corona terræ, quod ramulos suos per ter
 ram spargens, folioso ueluti seruo eandem coronare uideatur. Corona terræ.

FORMA.

Folia Hederae similia habet, minora tamen & tenuiora. Ramulos dodrantes
 multos, folijs plenos, à terra quinq; aut sex prodeuntes. Flores Leucois similes, mi
 niores tamen, & in gustu uehementer amarus. Radix illi est tenuis, alba, & inutilis.
 Ex hac historia satis constat herbam hodie uocatam Hedera terrestris, esse Dio
 scoridis Chamæcissos. Siquidem folijs Hederae constat, minoribus tamen & te
 nuioribus, ac in circuitu incisis. Legendū enim esse *μυρότροπα*, & non *μακρότροπα*, res Dioscoridis locus emaculatur.
 ipsa docet: nam etsi folia Chamæcissi aliquatenus Hederae similia sint, tamen rotun
 diora, atque adeo minora etiam & tenuiora existunt. Et est hic lapsus ab *ι* in *α* apud
 Dioscoridem frequens, ut ex alijs etiam locis supra notatis liquet. Ramulis etiam
 dodrantalibus multis, foliosis, qui tamen antequam scindantur quinq; aut sex à ra
 dice procedunt. Flores denique eius Leucois similes sunt, non quidem luteis, al
 bis, aut purpureis, sed cœruleis: ita ut uehementer errent qui eius flores neque figu
 ra neque colore floribus Chamæcissi, qui Leucois adsimulantur, esse similes pu
 tant. Etsi enim colore neque albi, neque lutei sint, cœruleos tamen, qui color etiam
 Leucoiorū est, esse constat. In gustu deniq; sicut etiam folia, amari sunt. Radix quo
 que eius tenuis, & nullius prorsus usus est. His omnibus accedit, quod nomen etiā
 pulchrè quadrat: neq; enim Græcis aliud sonat Chamæcissos, nisi humilem achu Chamæcissos
 mi repentem Hedera. Cæterum non esse Elatine, præter alia multa quæ referre Hedera terrestris non est Elatine.
 superuacaneum arbitror, sapor manifestè ostendit, qui in Hedera terrestris amarus
 & modicè acris est, atque adeo calorem præ se fert. Elatine uerò refrigerat atque ad
 stringit. Sic non esse Asclepiada, ut taceam quod Securidacæ simile semen non pro
 ferat, uel unus locus natalis satis monstrat. Asclepias enim in montibus, Hedera au
 tem terrestris in decliuibus locis & uallibus, ut germanicum nomen *Grundreb*
 abundè indicat, prouenire solet. Quæ autem herba sit Asclepias, suo loco dictum à
 nobis est. Non est Asclepias.

LOCVS.

Nascitur in cultis locis, iuxta etiam sepēs & dumeta.

TEMPVS.

In Martio statim erumpit, & floret in magnam usq; æstatis partem.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudo exiguaq; acrimonia foliorū & florum satis monstrant herbam hanc
 calidam & siccam esse, ita ut hi qui frigidā esse statuunt, reprehensione non careant. Error quorundā notatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia eius triboli pondere in aqua cyathis tribus, quadragenis aut quinquage
 nis diebus pota, ischiadicis profunt. Morbum quoque regium in senos septenōsue
 dies similiter pota emendant atq; expurgant.

EX GALENO.

Chamæcissi flos quum sit admodum amarus, iccoris obstructions soluit. Sunt
 qui illum etiam ischiadicis exhibeant.

C

EX PLINIO.

Chamæcifson appellant Hederam non attollentē se à terra. Et hæc contusa in uino acerabuli mensura lieni medetur. Eius folia bibunt ischiadici tribus obolis, in uini cyathis duobus septem diebus, admodum amara potione.

APPENDIX.

Has omnes iam cōmemoratas facultates Hederæ terre stri recentiores tribuunt: neq; dubium est, quom sit admodū amara, quin eandem habeat, & alia etiam possit quæ illi adscribunt, ut euocare suppressos menses, urinam mouere, obtusum auditum remouere. Contra pestem etiam tradunt efficacem esse: id quod equites quoque sciunt: hi enim quoties fibula dicta pestis equum corripuerit, hac contra eandē herba magna efficacia utuntur.

DE CHRYSANTHEMO ▶ CAP ▶ CCCXXXVI ▶

NOMINA.

Chrysanthemum
unde dictum.

ΠΥΣΑΝΘΕΜΟΝ Græcis, Chrysanthemū Latinis, officinis inusitatum, Germanis Goldtblüm / Schmalzblüm / à pinguedine quæ contrito digitis fosculo apparet, & Dratblüm nominatur. Chrysanthemon uerò à fosculis auri splendorem & colorem præ se ferentibus, dictum est.

FORMA.

Herba est tenera, fruticis tamen speciem obtinens, leues proferens caules, & multifida folia: luteos flores, uehementer splendentes, & oculi in star circulares. Ex qua sanè descriptione satis clarum est, herbam quam pictam damus, esse Chrysanthemon, quod illi omnes à Dioscoride traditæ notæ, nulla prorsus reclamante, conueniant. Quibus Democriti in Hydrosopico accedit testimonium, qui herbam hanc quæ Batrachio similis est, Chrysanthemon Græcis appellari scribit, folijsq; Apij esse, maioribus tamen, flore auri colore splendente. Addit deniq; ab Aquilegijs mirè celebratā esse, eò quod aquam subesse certum sit, ubi solet emicare. Quæ quidē singula herbe illi quam depictā exhibemus respondent. Nam ut cætera omittam, ubi hæc nascitur aquæ latices subesse non est dubium. Quidam perperam Wasserhannfuss germanicè nominant: nam hoc nomine appellata herba, alia ab ea est, ut in capite de Batrachio docuimus. Nam cum hæc nostra acrimonia uacet, quanquam Batrachijs similis sit, tamen in numero illorum esse hoc nomine non potest.

LOCVS.

Nascitur prope urbes, in pratis humidis, & alijs locis aquosis.

TEMPVS.

Maiō mense eius floribus prata & loca humida splendescunt.

TEMPERAMENTVM.

Eiusdem esse cum Buphthalmo temperamenti, & gustus & facultates declarant. Calidum itaque esse & siccum constat.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eius flores cum cerato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis coloris bonitatem tempestiuè reddit, à balneo post longiorem in eo moram exitu pota.

EX PLINIO.

Vesicæ calculos Chrysanthemon eijcit.

DE CHAMÆ-



CHRYSANTHEMUM

Schmalzblüm.

NOMINA.

Carduus suarius.
Cardopatium.



Chamæleon un-
de dictus.

Suarus Carduus
quare nominatus

ΑΜΑΙΛΕΩΝ λεωνος Græcis, Chamæleon albus, Carduus suarius & uarius Latinis, officinis & barbaris Cardopatium appellatur. Quod nomen haud dubiè corruptū est, deductumq; à dictione Pancration, nam sic olim esse nominatū Chamæleonem Apuleius testatur: aut à Carduo uario, à qua dictione, u scilicet litera in p, & r in t mutata, in Cardopatiū facilis est lapsus. Germanis *Ueberwurß*/eleganti allusione ad Carduum suarium, nuncupatur, Chamæleon autem à foliorū uarietate dici cœpit. Mutat enim cum terra colores, Plinio teste: hic niger, illic uiridis, aliubi cyaneus, aliubi croceus, atq; alijs coloribus uidetur. Suarius autem Carduus dictus est, quod sues si in polenta exhibeatur, perimat. Ob quam etiam causam *Ueberwurß* Germanis nuncupatam puto.

FORMA.

Folia habet Silybo aut Scolymo similia, asperiora autem, acutiora, nigroq; Chamæleone ualidiora. Caule uacat, uerum è medio spinam Echino marino, aut Cinaræ similem erigit. Flores purpureos, ueluti capillos, qui in pappos euanescent. Semen Cnico simile. Radicē in pinguibus collibus crassam, in montosis uerò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, grauē olentē & dulcem. Plinius libro xxij. cap. xvij. breuius herbam hanc depingit, sic inquit: Asperiora folia habet, serpit in terra Echini modo spinas erigens, radice dulci, odore grauissimo. Quæ certè notæ in uniuersum omnes, herbæ quæ hodie barbara & corrupta uoce Cardopatiū uocatur, adamussim respondent, ita ut nemo non esse Chamæleonem perspicuè intelligat. Huc accedit quod facultates etiam eadem sint. Radix enim Chamæleonis albi hausta, uenenis resistit. Radix etiam Cardopatiij ex recentiorum traditione, mirificè uenenis aduersari, & contra pestilentiam populatim fauentem, ut paulò post dicemus, efficacissimū esse remediū dicitur. Quod si tamen rectiora quis protulerit, non grauabimur hic, ut in alijs quoq; mutare sententiā.

LOCVS.

In glabretis montium prouenit, & in syluis, ut hinc etiam syluaticus Carduus cognominatus sit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus cum suis floribus effodi potest.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius calefacit secundo ordine absoluto, desiccatur autem tertio.

VIRE. EX DIOSCORIDE.


Radix pota acetabuli mensura, latos lumbricos pellit. Sumitur autem in uino austero, cum decocto Origani, Hydropicis cōmodè drachma in uino datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinæ decoctum eius propinatur. Pro theriaca cum uino pota est. Occidit canes & sues. Mures item necat subacta cum polenta, aut hydrelæo madefacta.

EX GALENO.

Radix eius potui datur acetabuli mensura contra latos lumbricos cum uino austero. Exhibent etiam aqua inter cutem laborantibus.

EX PLINIO.

Hydropicos sanat succo radice decoctæ. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusdem in uino austero cum Origani scopis. Facit ad difficultatē urinæ. Hic succus occidit canes suesq; in polenta. Ad dita aqua & oleo contrahit in se mures & necat, nisi protinus aquam sorbeant. Radicem



881

CHAMAELEON
ALBVS.

Ebermütz.

C dicem eius aliqui concisam seruari iubent funiculis pendentē, decoquantq̄ in cibo contra fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant,

APPENDIX.

Recentiores radicē Cardui suarij drachmæ pondere in uino sumptam cōtra pestilentiaē contagia prodesse tradunt. Eandem etiam in aceto decoctam, contra scabiem, impetiginē, & omnes cutis sceditates curatu difficiles conferre scribunt, si eius decocto lauentur. Idem dentium etiam dolori succurrit.

DE CHAMAELEONE NIGRO

CAP. CCCXXXVIII.

NOMINA.



Chamaeleon niger cur dicitur.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ μέλας Græcis, Carduus niger aut Vernilagium Latinis dicitur. Officinis hæc planta incognita existit. Germanis allusione ad latinam nomenclaturam *schwarzer Gartendistel* uocari potest, quod scilicet in hortis tantum culta proueniat. Sunt qui eam à candore foliorum nominent *welsch weiß Distel* sed prior appellatio ad discriminandas plantas melior existit. Chamaeleon uerò dicitur est à uarietate foliorū, quæ pro terræ & locorū differentia, aut admodū uiridia, aut subalba, aut cœrulea, aut rubra inueniuntur. Niger uerò haud dubiè à radice appellari cœpit.

FORMA.

Folij Scolymo similis est, minora tamen, tenuioraq̄, & rubentia ea habet. Caulem emittit digitali crassitudine, dodrantalem, subrubrū, qui in summo habet umbellam, & spinosos flores tenues, hyacinthi æmulos, uersicolores. Radicē crassam, nigram, densam, & aliquando corrosam, quæ dissecta subflauescit, & cōmanducata mordet. Hæc quidem notæ quanquā plantæ, cuius hic picturā damus, ferè omnes uideantur quadrare: caulem enim euehit dodrantalē, & altiorē etiam, digitū equantem crassitudine, subrubrum, folia instar Scolymi, minora, subalba & leniter punicea, candidū ac hispidum florem, hyacinthina purpura uariatū, radicem nigram & subflauam: tamen cum non admodū linguam uellicet cōmanducata radix, fit ut nō parum an legitimus sit Chamaeleon niger addubitem. Verū cum multi huius temporis uiri eruditi hanc plantam Chamaeleonē nigrum esse credant, nolui hoc tempore ab ijs prorsus dissentire, atque adeo eandem quæ illi, plantæ huic indere appellationem uolui, maximè cum nullam aliam eidem cōuenire apud Dioscoridem descriptionem uideam, donec aliquid certius de ea nobis aut alijs compertum fuerit.

LOCVS.

Nusquam sua sponte in Germania prouenit, quare cultura indiget. Nascitur autem Chamaeleon niger, Dioscoride autore, siccis, campestribus, cliuosisq̄, & maritimis locis.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde in capitulis rotundis Augusto mense semen hispidum profert.

TEMPERAMENTVM.

Chamaeleontis nigri radix sicca est in tertio ordine, calefacit uerò in secundo absoluto.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix trita, additis exiguo atramento futorio, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigere potest. Abstergit etiam impetigines, admixtis sulphure & bitumine. Decoctum eius collutione dentium dolorē mitigat. Cum pari pipere & cera oblita, dolentibus dentibus auxiliatur. Quinetiā fouentur ea dentes, quū decocta in aceto, & calens imposta fuerit. Scriptorio stylo dolenti denti calida admota, eum frangit. Cum sulphure decolorē ob solē faciē, & alphas emendat. Miscetur medicamentis erodentibus. Phagedenas, ferinaq̄ ac tetra ulcera illita, ad mitiorē habitū transferens sanat.

EX GALENO.



CHAMAELEON
NIGER.

Schwarz Gartendistel.

C

EX GALENO.

Radix quiddam letale obtinet, quamobrem eius foris usus ad scabies, impetigines, alphos, & in summa ad omnia quae deterfionē postulant. Præterea emollientibus & discutientibus medicamentis miscetur, ac illita phagedænica ulcera sanant.

EX PLINIO.

Radice eius lichenes curantur, cum sulphure & bitumine unâ coctis: cōmanducata uerò dentes mobiles, aut in aceto decocta, Succo scabiem etiam quadrupedum sanant. Et ricinos canum necant.

DE CHAMÆPITY ▶ CAP ▶ CCCXXXIX ▶

NOMINA.

Ibiza.

Iua.



AMAIPIITYΣ Græcis, Aiuga siue Abiga, autore Plinio, Latinis dicitur. Inuenitur & Ibiza uocari, quod nomē, Hermolao teste, ferè seruant hodie Illyrici. Hinc abiectis duabus literis i & g, Iba, & ab Aiuga abiectio-
ne literarum a & g, Iua manauit in uulgi nomenclationē. Officinę Iuam cognomento mulchatam appellant, Germani ye lenger ye lieber. Cæterū Chamæpitys dicta est, quasi humilis & breuis, humiliq; depressa picea: nam eius folia piceam olent. Abiga uerò uocata propter abortus, quos, educendis ijs quæ in utero sunt, excitare solet.

Chamæpitys un-
de dicta.
Abiga quare uo-
cata.

GENERA.

Prima. Tria eius sunt genera. Vna folijs Sedi seu Aizoï, quam nos fceminã fecimus. Al-
Alter. tera ramis anchoræ modo incuruis, quam nondum uidimus. Tertia mas dicitur
Tertia. etiam Dioscoridi, Harum discrimina è descriptionibus certius cognosces.

D

FORMA.

Prima, herba est per terram serpens, subcurua, folia minori Azioo similia ha-
bens, multò tamen tenuiora, pinguiora: hoc est, ut Serapion interpretatur, super se
plus humiditatis tenacis habentia, & hirsuta, circa ramos frequentia, odore piceæ,
fiores exiguos, luteos aut candidos, radicem Cichorij. Altera cubitalibus est ra-
mis anchoræ modo incuruis, tenuibus, coma supradictæ simili, flore candido, semi-
ne nigro. Olet autem & ipsa piceam. Tertia quæ mascula appellatur, herbula est
foliolis tenuibus, candidis & hirsutis, caule aspero, candido, flosculis luteis, semine
secus alas pusillo, Piceam & hæc olet.

LOCVS.

Sua sponte, quod sciam, in Germania non prouenit. Nunc tamen in hortis plan-
tari ccepit. Plinius tertiam in petris nasci tradit.

TEMPVS.


Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Chamæpitys gustu quidem amarū saporem acri ualidiorem obtinet. Est autem
in calefaciendo secundus, in siccano uerò tertij ordinis.


VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia primæ septem diebus in uino pota, regio morbo medentur. Quadraginta
uerò ex hydromelite, ischiadicis sanant. Dantur peculiariter iecinorosis, urinæ dif-
ficultatibus, & renum uitij. Profunt etiam torminosis. Ea apud Heracleam Pon-
ticam, perinde atq; antidoto contra aconitum utuntur, bibentes decoctū. Ad ante-
dicta illinitur, cum polenta iure decocti macerata. Trita & cum fico pro pilulis data
aluum emollit. Excepta melle, squama aris, & resina, purgat. Apposita ex melle, ex
utero ducit. Mammarū duritias discutit, Vulnura glutinat, Vlcera quæ serpunt,
cum



CHAMAEPITYS
PRIMA.

Yelenger ye lieber weibele.



CHAMAEPITYS
TERTIA.

Yelenger ye lieber memle.

A cum melle illita cohibet, Secunda & tertia eandem uim obtinent, non tamen usque adeò efficacem.

EX GALENO.

Effectu expurgat Chamæpitys, abstergitq; uiscera plus quàm calfacit. Proinde regio morbo correptis, & omnino quibus facilè iecur obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum apposita cum melle. Sed & urinae mouendæ aptum est medicamen. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis decoctâ in melicrato. Herba porro ipsa uiridis magna uulnera conglutinat, & ulcera putrescentia sanat. Mammaram præterea durities discutit.

EX PLINIO.

Profunt aduersus scorpionū ictus. Item iecinori illitæ cum palmis aut cotoneis. Renibus & uesicæ, decoctū earū cum farina hordeacea. Morbo quoq; regio, & urinae difficultatibus, ex aqua decocta bibunt. Nouissima contra serpentes ualet cum melle. Sic & apposita uulvas purgat. Sanguinē densatum extrahit pota. Sudores facit, perunctis ea. Peculiariter renibus utilis est. Fiunt ex ea & hydropicis pilulæ, cum ficu aluum trahentes. Lumborū quoq; dolorē uictoriati pondere in uino finit, & tulsim recentē, Mortuos foetus ex aceto cocta pota q; eijcere protinus dicitur.

APPENDIX.

Recentiores herbarij, & magna officinarū pars, aliam Chamæpityn ostendunt, folio Saluix rimoso, angustiore tamen, & ad radicē maiore, flore subcandido ac luteo, & semine nigro: quæ tamē legitima Chamæpitys non est, sed prima potius Sideritidis, ut suo diximus loco, species. Desinant igitur subinde hac herba pro Chamæpity uera uti, ac illius loco has quarum nunc picturas damus usurpent. Erroris autem huius nulla alia fuit causa, quàm quod Chamæpitys etiam ueteribus alio nomine dicta sit Sideritis. Hinc pleriq; decepti eam herbam quæ priuatim ac propriè sic nominatur, pro Chamæpity usurpare ceperunt. Sideritis autē nulla alia de causa dicta est Chamæpitys, nisi quod illi uulnera glutinandū in sit facultas.

Officina-
rum
error.

DE PSYLLIO CAP. CCCXL

NOMINA.



ΨΥΛΛΙΟΝ græcè, herba Pulicaris latinè, nomen græcum in officinis retinet, germanicè Psyllien traut nominatur. Tam græcam autem quàm latinam appellationē à pulice, cuius effigiē semen eius refert, sortita est herba. Vel, ut nonnullis uidetur, quia si uiridis in domum feratur, generari in ea pulices prohibeat.

Psyllium unde
dictum.

FORMA.

Psyllion folia Coronopo similia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantaes. Tota herba ad sceni graminisue formam accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut terna in summo contracta conuolutaue, in quibus semen pulicibus simile, nigrum durumq;.

LOCVS.

In aruis & incultis nascitur. Nusquam tamen, quod sciam, in Germania nisi satum prouenit.

TEMPVS.


Flores tota ferè æstate ex capitulis eius, quæ spicæ formam obtinent, erumpentes dependent, canino capiti haud dissimiles, ut pictura abundè monstrat. Semen uero autumno profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen eius ex secundo refrigerantium est ordine, in desiccando uerò & humectando medium quodammodo & symmetrum. Cōmentum Mesues de substantia eius interiore calida nihil moror.

Mesues cōmentum.

VIRE S.



PSYLLIVM

Psyllienkraut.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

A Vis Pſyllio refrigeratoria. Cum roſaceo, aceto, aut aqua illitum articuloꝝ doloribus, parotidibus, tuberculis, cœdematis, luxatis, capitisq; doloribus prodeſt. Ente rocelis ſeu inteſtinorũ ramicibus puerorum, & umbilicis prominentibus cum aceto illitum medetur. Oportet autem acetabuli meſura tuſum in aquæ heminis duabus madere, & ubi aqua concreuerit illinire; egregiè ſiquidem refrigerat; deiectum enim in feruentem aquam, calorem eius reprimi. Prodeſt eryſipelatis. Perhibent ſi uiridis domum importetur, prohibere ne in ea pulices generentur. Tuſa cum adipẽ, ſordida & maligna ulcera expurgat. Succus eius cum melle ad aures fluxione tentatas, & uermiculofas conducit.

EX PLINIO.

Vis ei ad refrigerandũ ingens. Semen in uſu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & roſaceo, aut poſca. Ad cætera illinitur acetabuli meſura, ſextario aquæ denſat ac contrahit. Tunc terere ac craſſitudinẽ illinere oportet cuiuſq; dolori, & collectioni inflammationiq;. Tenafmo in aqua cum radicibus decoctum medetur. Omnibus articuloꝝ morbis ſalutare eſt huius ſemen madefactũ in aqua, admittiſ in heminam ſeminis duobus reſinæ colophonie cochlearibus, thuris uno.

DE PSEVDONARDO CAP. CCCXLI.

NOMINA.



B ΨΕΥΔΟΝΑΡΔΟΣ græcè & latinè nominatur, quod ſcilicet non ſit uera & genuina Nardus, cuius Dioſcorides & alij ueteres meminerunt.

Pſeudonardus unde dicta.

GENERA.

Duũ cernitur generum. Alterum procerius eſt, & maiorem ſpirat odorem, nec minus quàm Nardus placet. Hoc nos Pſeudonardũ marem diximus. Officinæ & uulguſ herbariorum Spicam à ſpicatis floribus nominant, Germani *Spicanardi*. Alterum amplitudine & odore minus, quod nos Pſeudonardũ feminam appellauimus. Officinæ & herbarij recentiores Lauandulam uel Lauen- *Lauandula.* dulam, eò quod balneis & hominum lauacris expetatur, elotaq; omnia ſi permiſceatur odoris commendat ſuauiſſitate, uocant. Germani ad hoc nomen alludentes *Lauendel* nuncupant.

FORMA.

Frutex eſt folio craſſiore, carnoſo, anguſto, colore languido, in candidum uergente, piloſo, frequentibus ſpicis in ariſtas ſparſis, floſculis in ſpica ferè cœruleis, in Lauendula autem purpureis.

LOCVS.

Gaudent apricis & petroſis, tanta ſuauiſſitatis fragantia, ut omnes penè flores odoris iucunditate uincant, qua dote ueſtibus inferuntur.

TEMPVS.

Vtraque perpetua coma exitu ueris caneſcit, Iunio & Iulio meſe ſpicatur, floribusq; prægnans eſt.


TEMPERAMENTVM.

Calefacit & ſiccit ordine ſecundo, tenuibusq; conſtat partibus, haud multum à natura Celticæ Nardi diſſidens.

VIRES.

Antiquus manuſcriptus herbarius eaſdem ferè facultates Pſeudonardo, quas Celtica habet, tribuit, dum in hunc modum ſcribit: Stomachi dolorem frigidum, eiufdem inflationes, uteri dolores, lienis duritiem, iecinorisq; obſtructiones tollit.

fff Strangu.




PSEUDONARDUS
MAS.

Spicantardi.



PSEVDONARDVS
FOEMINA.

Laucndel.



C Stranguriæ & difficultati urinæ auxiliatur. Capiti admota calefacit, eiusque virtutes exiccat. Hinc est quod recentiores tantisper eius usum in frigidis cerebri moruorum morbis, apoplexia, paralyfi, & similibus cōmendent.

Sequentia duo capita, quoniam absoluto fermè opere ad nos uenerunt, & idcirco suo loco reponi non potuere, tamen ne lector ijs fraudaretur, in calcem potius reijcere, quàm omnino præterire, collibuit.

DE DIGITALI CAP. CCCXLII

NOMINA.

Digitalis.



Quod appellatione tum græca tum latina herba hæc hodie destituta sit, nulla alia de causa factum existimamus, quàm quod ueteribus incognita fuerit. Nos pulchritudine eius illecti, *ἀδάμυρον* esse diutius non sumus passi. Appellauimus autem Digitalem, alludentes ad germanicam nomenclaturam *Singerhūt*/sic enim Germani hanc stirpem nominant, à florum similitudine, quæ digitale pulchrè referunt ac exprimunt. Hac appellatione utemur, donec nos uel alij meliorem inuenerint.

GENERA.

Digitalis purpurea. Duum est generū. Vna enim purpureos obtinet flores, ideoque Digitalem purpuream appellauimus. Germanis *brauner Singerhūt* dicitur. Altera luteos habet flores, ob id Digitalis lutea dicta nobis est. Germanis *geeler Singerhūt* nominatur. In alijs per omnia similes sunt.

D

FORMA.

Herba est cubitalis, folijs latis & oblongis, Plantagini non dissimilibus, in extremitatibus serratis, floribus à lateribus caulis ordine dependentib. digitalis formam referentibus, purpureis aut luteis. Quibus decidentibus, semen in calycibus latum & oblongum profert. Radix illi est exigua & capillata.

LOCVS.

Nascitur in montibus, umbrosis & saxosis locis.

TEMPVS.

Floret Iulio potissimū mense, atque subinde cadentibus floribus semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Impense amara est herba, perinde atque Gentiana, ut hoc nomine calidā & siccam esse euidentissimum sit.

VIREs.

Hæc herba haud dubiè quum opus est extenuatione, abstersione, purgatione, & obstructionis liberatione, efficax admodū esse solet. Nam, ut testatur Galenus libro iij. de simp. med. facul. cap. xvij. amari sapes abstergunt, expurgant, & quæ in uenis est crassitiem incidunt. Quamobrè menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, & ex thorace & pulmone pus educere. Quid multa? potest hæc herba ferè omnia quæ Gentiana, cuius uires suo in loco inuenient studiosi.



DIGITALIS
PURPUREA

Beauner Fingerhut.



DIGITALIS
LYTEA.

Geeler Fingerhut.

A NOMINA.



ΚΙΜΟΘΙΑΞ Græcis, Ocimastrum Latinis dicitur. Officinis inusitatum atque incognitum, Germanis wild Basilg appellatur. Ocimoïdes uerò Græcis haud alia ratione dictum est, quàm quod Ocimo, suis potissimum folijs simile sit. Ocimastrum autem Latini, quasi syluestre Ocimum appellauerunt. Nam sic ipsum uocare uidetur lib. xx. cap. xij, Plinius.

Ocimoïdes curdium.

Ocimastrum. Syluestre Ocimum.

FORMA.

Folia habet Ocimo similia, ramulos dodrantales, eisdemq; hirsutos, siliquas Hyoscyamo per similes, semine nigro plenas, Melanthio seu Nigellæ simili (legendū em̄ in Dioscoride *εὐκόρυθος*, & non *εὐκόρυτος*, ut habent aliqua exemplaria) Radix illi est gracilis & inutilis. Ex qua quidem deliniatione omnibus palam fit, stirpem, cuius effigiem atq; picturā damus, esse Ocimastrū: siquidē folia fert Ocimi, ramulos palmares & quadratos (quod Dioscorides omisit) hirsutos, flores purpureos (quos itidē Dioscorides nō explicauit) forma Ocimi floribus similes, qui tamen colore, qui illis candidus est, distant: decidentibus floribus siliquas Hyoscyamo similes, seminis nigri, Melanthio similis, plenas ostendit. Radice etiā nititur tenui & superuacua. His omnibus etiam accedit odor, qui planē Ocimum referre uidetur: ita ut nemo dubitare debeat, quin hæc herba uerum sit Ocimastrū, potissimum cum illi Dioscoridis descriptio sic quadret, ut nulla profus nota reclamare uideatur.

Dioscoridis locusemendatus.

LOCVS.

Nascitur arenosis in locis. Copiose autē iuxta Nirtingam ad Nicerum oppidulū prouenit, ubi id ipsum primū uidi, ac reperi: aliās, quod sciam, mihi nunquā uisum.

TEMPVS.

Floret in fine Septembris & Octobre mense, atq; simul in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

B Ocimastrum, maximè eius semen, est calidæ & siccæ temperaturæ, quod sapor etiam satis ostendit, qui cum modica adstrictione amarus est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen Ocimastrum in uino potum, medetur uiperarū & aliarum serpentū moribus. Ischiadicis datur cum myrrha & pipere.

EX GALENO.

Ocimoïdes quidam philiteriū cognominant. Radix superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est.

EX PLINIO.

Syluestri Ocimo uis efficacior ad eadem omnia, quæ satiuo. Peculiaris ad uitia quæ uomitionibus crebris cōtrahuntur, Vomiticisq; uulua, contraq; bestiarū morsus radix in uino est efficacissima.


APPENDIX.

Vel syluestre Plinij Ocimū diuersum est ab Ocimaastro, aut in uerbis eiusdē iam productis, error subest. Quum enim Ocimastrum radix, Dioscoridis & Galeni testimonio, inutilis sit, non rectè à Plinio dicitur quod eius radix in uino contra bestiarū morsus efficacissima sit: sed hoc potius, Dioscoride teste, semini tribuendum erit. Quare in Plinio legendū, contraq; bestiarū morsus semen in uino est efficacissimū.

Plinij locus emendatus.

Quam sanè lectionem Dioscoridis autoritas abundè confirmat, qui Ocimastrum semen cum uino potum, contra uiperarum & aliorum reptilium ictus efficax esse tradit.

fff 4



OCIMASTRUM

Wild Basilg

PICTORES OPERIS,
Henricus Hillmaurer.

Albertus Meyer.




SCULPTOR
Ditus Rodolph. Speckle.



EMENDANDA IN COMMENTARIIS

de *Stirpium historia*.

Pag. 4. uers. 11. legendum, Hypochondrijs, iecinori &c. Ibid. uers. 20. legendum, Eadem potest præstare cum sapa, aut lenticula. Pag. 8. uers. 11. Plin. lib. 21. cap. 21. marem quidem campeitre &c. Ibid. uers. 13. eiusdem nomenclaturæ: expungendum itaq; cōma post eiusdem. Ibid. uers. 16. quod masculum appellamus. Pag. 11. uers. 19. Ex Macro. Pag. 14. uers. 39. lege, de Acoro uero affirmare. Pag. 16. uers. 40. tubercula facultatem obtinet. Pag. 28. uers. 29. tenuis intestini dolores. Pag. 29. uers. 16. ramolum. Pag. 37. uers. ult. acris, ut piper, admodum sit. Pag. 43. uers. penult. axungia. Pag. 54. uers. 10. mollibus duntaxat spinis prædita. Pag. 79. uers. 22. Tæniæ, pro Tineas. Pag. 86. uers. 11. ab Aconis. Pag. 93. uers. 9. illita, aduersus. Pag. 98. uers. 8. si quis in uilla eam extruxerit. Pag. 126. uers. 27. desituitur. Pag. 128. uers. 34. lege, Cum polenta, & expunge dictionem Si. Pag. 135. uers. 46. Ieiuno. Pag. 141. uers. 26. aqueæ. Pag. 148. iuxta picturam lege, **BELLIS MAIOR**. Pag. 210. uers. ult. dulcis est quodammodo. Pag. 236. uers. 35. utiq; maximè. Pag. 263. iuxta picturam, **ERVCA SYLVESTRIS**. Pag. 264. uers. 19. Kunigundis. Pag. 304. iuxta picturam, **SATVREIA SEV THYMBRA SATIVA**. Pag. 326. uers. 34. nitatur, adijciendū, radice. Pag. 328. uers. 37. terrena substantia constat. Pag. 344. uers. 5. ^{uipis} enim Græcis &c. Pag. 355. uers. 28. tæniæ. Pag. 363. uers. 6. quæ in thorace sunt educit. Pag. 397. uers. 37. crasisq; nõnullis. Pag. 440. uers. 28. abundat, que. Pag. 450. uers. 25. per integrum retinuit annum amittit &c. Pag. eadem, uers. 38. Sedi etiam ad deiicienda. Pag. 452. uers. 1. ad secessum prouocat. Pag. 472. uers. 28. utranq; uero. Pag. 510. uers. 14. floreat. Pag. 529. uers. 13. aut cum lini, &c. Pag. 672. uers. 9. esset discrimen.



PALMA

ISING





3274

Complete

H. Bernard Ginn
1897

H. B. Ginn

22700

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00294954 3

nmahr IQK41.F95

De historia stirpium commentarii insignes

not

